




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 25-1-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:29:43
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:21:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: sunwenxin

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 25-2-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:33:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: sunwenxin

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	96844	100.000	17684	1898	1.095	--
总计		96844	100.000	17684			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 25-3-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:36:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:21:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: sunwenxin

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.562	96710	100.000	17704	1896	1.096	--
总计		96710	100.000	17704			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 25-4-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:39:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:21:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: sunwenxin

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.560	96797	100.000	17653	1894	1.098	--
总计		96797	100.000	17653			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-5-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:45:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:22:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	96508	100.000	17638	1897	1.099	--
总计		96508	100.000	17638			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-6-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:49:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	97136	100.000	17667	1886	1.099	--
总计		97136	100.000	17667			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-7-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:52:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	3449	100.000	674	2153	1.139	--
总计		3449	100.000	674			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-8-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:56:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	10559	100.000	2057	2146	1.103	--
总计		10559	100.000	2057			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-9-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:59:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	10058	100.000	1923	2070	1.098	--
总计		10058	100.000	1923			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-10-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:02:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	10057	100.000	1926	2103	1.080	--
总计		10057	100.000	1926			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-11-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:06:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	11401	100.000	2188	2105	1.093	--
总计		11401	100.000	2188			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-12-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:09:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	10942	100.000	2113	2150	1.094	--
总计		10942	100.000	2113			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-13-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:13:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	24832	100.000	4746	2072	1.094	--
总计		24832	100.000	4746			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-14-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:16:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	31474	100.000	6039	2107	1.096	--
总计		31474	100.000	6039			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-15-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:19:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	30892	100.000	5953	2109	1.095	--
总计		30892	100.000	5953			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-16-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:23:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	33564	100.000	6453	2103	1.094	--
总计		33564	100.000	6453			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-17-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:26:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	31716	100.000	6057	2100	1.092	--
总计		31716	100.000	6057			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-18-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:29:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	32947	100.000	6339	2101	1.103	--
总计		32947	100.000	6339			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-19-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:33:20
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	41055	100.000	7883	2107	1.094	--
总计		41055	100.000	7883			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-20-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:36:43
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	45934	100.000	8836	2109	1.092	--
总计		45934	100.000	8836			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-21-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:40:06
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	43747	100.000	8405	2102	1.094	--
总计		43747	100.000	8405			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-22-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:43:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	46506	100.000	8925	2103	1.093	--
总计		46506	100.000	8925			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-23-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:46:51
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	45691	100.000	8788	2109	1.090	--
总计		45691	100.000	8788			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-24-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:50:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	46118	100.000	8884	2096	1.092	--
总计		46118	100.000	8884			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-25-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:53:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:23:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	51642	100.000	9909	2102	1.094	--
总计		51642	100.000	9909			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-26-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:57:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	53940	100.000	10364	2105	1.096	--
总计		53940	100.000	10364			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-27-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:00:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	52437	100.000	10079	2107	1.092	--
总计		52437	100.000	10079			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-28-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:03:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	53620	100.000	10327	2109	1.088	--
总计		53620	100.000	10327			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-29-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:07:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	53247	100.000	10220	2105	1.092	--
总计		53247	100.000	10220			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-30-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:10:33
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	53977	100.000	10367	2103	1.095	--
总计		53977	100.000	10367			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-31-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:13:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	61965	100.000	11902	2101	1.093	--
总计		61965	100.000	11902			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-32-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:17:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	61146	100.000	11735	2094	1.092	--
总计		61146	100.000	11735			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-33-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:20:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	62866	100.000	12071	2104	1.093	--
总计		62866	100.000	12071			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-34-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:24:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.562	61581	100.000	11878	2103	1.093	--
总计		61581	100.000	11878			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-35-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:27:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	63091	100.000	12150	2100	1.098	--
总计		63091	100.000	12150			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-36-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	62878	100.000	12091	2114	1.093	--
总计		62878	100.000	12091			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-37-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:52:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	68256	100.000	13146	2111	1.098	--
总计		68256	100.000	13146			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-38-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:56:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	69927	100.000	13438	2104	1.096	--
总计		69927	100.000	13438			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-39-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:59:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	67105	100.000	12980	2119	1.096	--
总计		67105	100.000	12980			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-40-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:02:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	67747	100.000	13045	2113	1.094	--
总计		67747	100.000	13045			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-41-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:06:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	68229	100.000	13132	2108	1.099	--
总计		68229	100.000	13132			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-42-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:09:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	69950	100.000	13489	2121	1.098	--
总计		69950	100.000	13489			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-43-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:13:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	73630	100.000	14156	2111	1.094	--
总计		73630	100.000	14156			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-44-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:16:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	74760	100.000	14425	2125	1.098	--
总计		74760	100.000	14425			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-45-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:19:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	71841	100.000	13770	2103	1.098	--
总计		71841	100.000	13770			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-46-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:23:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	71960	100.000	13839	2106	1.097	--
总计		71960	100.000	13839			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-47-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:26:33
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:24:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	75009	100.000	14442	2104	1.095	--
总计		75009	100.000	14442			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-48-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:29:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	74435	100.000	14305	2107	1.098	--
总计		74435	100.000	14305			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-49-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:33:20
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	79506	100.000	15392	2127	1.096	--
总计		79506	100.000	15392			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-50-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:36:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	79631	100.000	15317	2112	1.098	--
总计		79631	100.000	15317			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-51-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:40:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	79585	100.000	15328	2126	1.098	--
总计		79585	100.000	15328			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-52-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:43:33
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	78479	100.000	15119	2122	1.096	--
总计		78479	100.000	15119			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-53-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:46:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	79865	100.000	15361	2109	1.098	--
总计		79865	100.000	15361			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-54-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:50:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	78508	100.000	15174	2118	1.096	--
总计		78508	100.000	15174			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-55-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:53:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	80492	100.000	15436	2110	1.095	--
总计		80492	100.000	15436			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-56-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:57:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	82549	100.000	15885	2107	1.096	--
总计		82549	100.000	15885			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-57-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:00:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	79705	100.000	15312	2108	1.097	--
总计		79705	100.000	15312			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-58-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:03:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	81886	100.000	15719	2113	1.098	--
总计		81886	100.000	15719			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-59-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:07:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	83902	100.000	16134	2108	1.097	--
总计		83902	100.000	16134			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-60-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:10:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	83523	100.000	16079	2116	1.098	--
总计		83523	100.000	16079			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-61-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:14:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	84381	100.000	16248	2114	1.096	--
总计		84381	100.000	16248			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-62-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:17:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	85800	100.000	16498	2107	1.098	--
总计		85800	100.000	16498			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-63-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:20:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	85132	100.000	16406	2111	1.097	--
总计		85132	100.000	16406			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-64-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:24:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	83493	100.000	16104	2111	1.096	--
总计		83493	100.000	16104			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-65-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:27:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	86479	100.000	16635	2112	1.099	--
总计		86479	100.000	16635			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-66-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:30:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	86674	100.000	16675	2111	1.099	--
总计		86674	100.000	16675			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-67-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:34:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	96960	100.000	17774	1886	1.102	--
总计		96960	100.000	17774			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-68-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:37:44
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	97117	100.000	17786	1883	1.103	--
总计		97117	100.000	17786			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-69-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:41:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:25:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-70-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:44:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.554	96994	100.000	17754	1877	1.101	--
总计		96994	100.000	17754			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-71-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:47:58
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	97084	100.000	17763	1883	1.104	--
总计		97084	100.000	17763			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-72-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:51:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	96923	100.000	17747	1882	1.105	--
总计		96923	100.000	17747			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-73-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:54:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	96819	100.000	17704	1888	1.102	--
总计		96819	100.000	17704			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-74-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:58:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	96988	100.000	17721	1881	1.103	--
总计		96988	100.000	17721			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-75-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:01:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	10800	100.000	2089	2135	1.112	--
总计		10800	100.000	2089			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-76-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:05:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	10599	100.000	2063	2137	1.094	--
总计		10599	100.000	2063			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-77-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:08:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	11245	100.000	2174	2133	1.108	--
总计		11245	100.000	2174			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-78-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:11:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	10644	100.000	2071	2139	1.104	--
总计		10644	100.000	2071			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-79-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:15:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	11162	100.000	2159	2128	1.090	--
总计		11162	100.000	2159			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-80-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:18:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	11141	100.000	2162	2144	1.104	--
总计		11141	100.000	2162			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-81-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:22:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	38006	100.000	7329	2129	1.101	--
总计		38006	100.000	7329			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-82-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:25:25
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	35875	100.000	6919	2133	1.101	--
总计		35875	100.000	6919			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-83-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:28:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	37684	100.000	7291	2127	1.099	--
总计		37684	100.000	7291			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-84-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:32:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	39081	100.000	7576	2125	1.100	--
总计		39081	100.000	7576			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-85-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:35:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	39971	100.000	7711	2119	1.100	--
总计		39971	100.000	7711			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-86-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:39:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	39288	100.000	7578	2124	1.097	--
总计		39288	100.000	7578			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-87-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:42:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	55596	100.000	10749	2123	1.103	--
总计		55596	100.000	10749			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-88-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:45:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	53439	100.000	10275	2122	1.101	--
总计		53439	100.000	10275			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-89-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:49:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	54211	100.000	10455	2124	1.099	--
总计		54211	100.000	10455			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-90-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:52:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:26:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	55447	100.000	10697	2127	1.096	--
总计		55447	100.000	10697			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-91-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:56:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	54850	100.000	10597	2132	1.101	--
总计		54850	100.000	10597			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-92-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:59:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	53225	100.000	10244	2133	1.102	--
总计		53225	100.000	10244			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-93-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:02:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	63454	100.000	12255	2129	1.101	--
总计		63454	100.000	12255			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-94-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:06:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	61812	100.000	11965	2124	1.099	--
总计		61812	100.000	11965			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-95-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:09:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	61129	100.000	11756	2120	1.101	--
总计		61129	100.000	11756			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-96-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:13:01
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	62984	100.000	12140	2124	1.099	--
总计		62984	100.000	12140			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-97-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:16:25
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	62458	100.000	12073	2127	1.101	--
总计		62458	100.000	12073			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-98-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:19:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	61158	100.000	11821	2127	1.101	--
总计		61158	100.000	11821			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-99-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:23:14
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	73154	100.000	14141	2129	1.104	--
总计		73154	100.000	14141			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-100-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:26:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	70879	100.000	13643	2131	1.099	--
总计		70879	100.000	13643			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-101-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:30:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	69629	100.000	13442	2129	1.100	--
总计		69629	100.000	13442			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-102-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:33:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	71170	100.000	13779	2126	1.101	--
总计		71170	100.000	13779			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-103-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:36:51
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	70063	100.000	13549	2127	1.099	--
总计		70063	100.000	13549			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-104-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:40:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	66811	100.000	12879	2122	1.102	--
总计		66811	100.000	12879			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-105-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:43:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	80490	100.000	15581	2127	1.101	--
总计		80490	100.000	15581			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-106-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:47:05
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	76971	100.000	14900	2123	1.099	--
总计		76971	100.000	14900			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-107-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:50:29
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	77095	100.000	14930	2129	1.101	--
总计		77095	100.000	14930			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-108-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:53:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.563	77727	100.000	15053	2126	1.098	--
总计		77727	100.000	15053			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-109-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:57:17
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	76434	100.000	14757	2128	1.100	--
总计		76434	100.000	14757			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-110-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:00:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	76913	100.000	14882	2134	1.101	--
总计		76913	100.000	14882			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-111-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:04:07
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	82596	100.000	15981	2148	1.102	--
总计		82596	100.000	15981			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-112-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:07:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:27:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	79676	100.000	15396	2135	1.101	--
总计		79676	100.000	15396			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-113-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:10:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	78876	100.000	15254	2138	1.101	--
总计		78876	100.000	15254			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-114-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:14:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	80432	100.000	15534	2151	1.101	--
总计		80432	100.000	15534			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-115-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:17:45
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	80866	100.000	15707	2147	1.101	--
总计		80866	100.000	15707			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-116-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:21:09
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	79030	100.000	15264	2141	1.103	--
总计		79030	100.000	15264			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-117-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:24:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	87305	100.000	16942	2151	1.102	--
总计		87305	100.000	16942			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-118-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:27:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	82721	100.000	15926	2137	1.103	--
总计		82721	100.000	15926			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-119-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:31:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	84697	100.000	16347	2144	1.103	--
总计		84697	100.000	16347			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-120-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:34:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	84336	100.000	16340	2135	1.099	--
总计		84336	100.000	16340			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-121-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:38:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	82526	100.000	15986	2146	1.101	--
总计		82526	100.000	15986			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-122-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:41:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	82002	100.000	15947	2146	1.102	--
总计		82002	100.000	15947			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-123-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:45:03
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	88713	100.000	17143	2132	1.105	--
总计		88713	100.000	17143			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-124-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:48:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	85149	100.000	16429	2126	1.104	--
总计		85149	100.000	16429			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-125-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:51:50
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	84911	100.000	16339	2129	1.105	--
总计		84911	100.000	16339			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-126-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:55:13
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	87965	100.000	17017	2137	1.102	--
总计		87965	100.000	17017			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-127-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:58:36
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	81741	100.000	15772	2123	1.103	--
总计		81741	100.000	15772			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-128-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:01:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	82808	100.000	16026	2137	1.104	--
总计		82808	100.000	16026			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-129-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:05:24
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	94354	100.000	18219	2132	1.102	--
总计		94354	100.000	18219			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-130-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:08:47
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	86839	100.000	16709	2131	1.102	--
总计		86839	100.000	16709			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-131-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:12:11
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	85193	100.000	16502	2128	1.104	--
总计		85193	100.000	16502			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-132-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:15:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	88598	100.000	17026	2136	1.104	--
总计		88598	100.000	17026			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-133-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:18:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:28:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	86214	100.000	16648	2135	1.102	--
总计		86214	100.000	16648			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-134-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:22:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	85485	100.000	16501	2130	1.103	--
总计		85485	100.000	16501			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-135-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:25:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	97024	100.000	17767	1883	1.103	--
总计		97024	100.000	17767			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-136-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:29:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	96740	100.000	17743	1890	1.104	--
总计		96740	100.000	17743			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-137-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:32:35
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-138-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:35:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	96721	100.000	17754	1894	1.106	--
总计		96721	100.000	17754			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-139-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:39:20
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	96969	100.000	17780	1886	1.105	--
总计		96969	100.000	17780			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-140-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:42:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	97039	100.000	17751	1888	1.104	--
总计		97039	100.000	17751			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-141-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:46:05
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	97115	100.000	17754	1888	1.107	--
总计		97115	100.000	17754			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-142-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:49:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	97031	100.000	17745	1886	1.105	--
总计		97031	100.000	17745			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-143-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:52:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	18259	100.000	3531	2118	1.089	--
总计		18259	100.000	3531			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-144-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:56:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	14960	100.000	2905	2135	1.104	--
总计		14960	100.000	2905			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-145-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:59:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	15222	100.000	2952	2130	1.115	--
总计		15222	100.000	2952			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-146-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:02:57
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	18285	100.000	3533	2154	1.100	--
总计		18285	100.000	3533			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-147-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:06:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	19581	100.000	3773	2124	1.095	--
总计		19581	100.000	3773			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-148-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:09:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	17810	100.000	3464	2135	1.106	--
总计		17810	100.000	3464			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-149-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:13:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	44675	100.000	8599	2120	1.106	--
总计		44675	100.000	8599			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-150-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:16:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	39692	100.000	7656	2129	1.102	--
总计		39692	100.000	7656			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-151-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:19:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	37572	100.000	7242	2136	1.097	--
总计		37572	100.000	7242			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-152-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:23:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	43683	100.000	8397	2132	1.096	--
总计		43683	100.000	8397			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-153-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:26:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	42933	100.000	8284	2131	1.104	--
总计		42933	100.000	8284			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-154-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:29:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	45203	100.000	8715	2122	1.099	--
总计		45203	100.000	8715			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-155-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:33:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:29:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	59831	100.000	11522	2129	1.099	--
总计		59831	100.000	11522			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-156-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:36:42
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	54714	100.000	10502	2125	1.097	--
总计		54714	100.000	10502			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-157-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:40:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	53514	100.000	10266	2135	1.103	--
总计		53514	100.000	10266			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-158-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:43:27
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	57566	100.000	11129	2129	1.103	--
总计		57566	100.000	11129			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-159-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:46:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	57139	100.000	10986	2134	1.100	--
总计		57139	100.000	10986			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-160-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:50:12
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	58065	100.000	11226	2131	1.102	--
总计		58065	100.000	11226			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-161-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:53:34
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	66953	100.000	12848	2130	1.102	--
总计		66953	100.000	12848			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-162-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:56:56
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	62231	100.000	11988	2147	1.101	--
总计		62231	100.000	11988			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-163-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:00:19
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.564	59496	100.000	11515	2118	1.104	--
总计		59496	100.000	11515			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-164-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:03:41
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	67309	100.000	12970	2132	1.101	--
总计		67309	100.000	12970			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-165-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:07:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	64478	100.000	12358	2125	1.100	--
总计		64478	100.000	12358			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-166-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:10:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	63780	100.000	12287	2131	1.101	--
总计		63780	100.000	12287			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-167-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:13:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	72623	100.000	13913	2123	1.103	--
总计		72623	100.000	13913			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-168-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:17:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	68693	100.000	13304	2139	1.098	--
总计		68693	100.000	13304			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-169-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:20:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	68190	100.000	13113	2124	1.104	--
总计		68190	100.000	13113			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-170-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:23:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	71645	100.000	13781	2134	1.099	--
总计		71645	100.000	13781			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-171-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:27:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	71557	100.000	13740	2129	1.102	--
总计		71557	100.000	13740			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-172-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:30:37
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	70172	100.000	13526	2125	1.101	--
总计		70172	100.000	13526			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-173-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:33:59
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	78703	100.000	15220	2126	1.100	--
总计		78703	100.000	15220			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-174-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:37:21
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	73193	100.000	14014	2124	1.098	--
总计		73193	100.000	14014			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-175-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:40:43
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	73816	100.000	14144	2124	1.101	--
总计		73816	100.000	14144			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-176-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:44:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:30:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	75579	100.000	14472	2126	1.100	--
总计		75579	100.000	14472			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-177-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:47:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	77396	100.000	14915	2126	1.102	--
总计		77396	100.000	14915			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-178-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:50:48
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	75928	100.000	14629	2122	1.103	--
总计		75928	100.000	14629			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-179-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:54:10
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	81356	100.000	15606	2131	1.101	--
总计		81356	100.000	15606			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-180-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:57:32
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	76717	100.000	14731	2129	1.103	--
总计		76717	100.000	14731			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-181-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:00:54
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	77282	100.000	14786	2121	1.103	--
总计		77282	100.000	14786			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-182-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:04:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	79606	100.000	15257	2124	1.103	--
总计		79606	100.000	15257			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-183-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:07:38
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	80148	100.000	15440	2130	1.101	--
总计		80148	100.000	15440			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-184-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:11:00
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	78123	100.000	15116	2135	1.102	--
总计		78123	100.000	15116			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-185-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:14:23
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	83861	100.000	16169	2126	1.100	--
总计		83861	100.000	16169			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-186-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:17:46
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	81760	100.000	15731	2139	1.101	--
总计		81760	100.000	15731			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-187-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:21:08
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	78471	100.000	15141	2125	1.103	--
总计		78471	100.000	15141			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-188-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:24:31
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	81672	100.000	15667	2127	1.103	--
总计		81672	100.000	15667			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-189-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:27:53
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	83846	100.000	16120	2129	1.105	--
总计		83846	100.000	16120			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-190-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:31:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	80470	100.000	15490	2134	1.101	--
总计		80470	100.000	15490			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-191-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:34:40
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.566	87254	100.000	16808	2129	1.105	--
总计		87254	100.000	16808			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-192-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:38:04
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.565	83910	100.000	16190	2126	1.102	--
总计		83910	100.000	16190			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-193-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:41:28
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	83500	100.000	16044	2132	1.101	--
总计		83500	100.000	16044			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-194-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:44:52
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	83502	100.000	16057	2134	1.100	--
总计		83502	100.000	16057			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-195-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqcx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:48:16
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	85292	100.000	16379	2133	1.099	--
总计		85292	100.000	16379			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-196-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:51:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.567	84333	100.000	16221	2131	1.100	--
总计		84333	100.000	16221			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-197-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:55:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	91116	100.000	17509	2134	1.102	--
总计		91116	100.000	17509			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-198-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:58:26
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:31:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	83693	100.000	16054	2129	1.102	--
总计		83693	100.000	16054			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-199-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:01:51
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:32:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	84887	100.000	16317	2140	1.101	--
总计		84887	100.000	16317			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-200-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:05:15
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:32:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	85534	100.000	16423	2134	1.102	--
总计		85534	100.000	16423			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-201-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:08:39
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:32:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.568	86930	100.000	16697	2137	1.104	--
总计		86930	100.000	16697			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-202-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:12:02
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:32:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.569	84902	100.000	16369	2143	1.102	--
总计		84902	100.000	16369			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-203-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:15:25
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:32:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.558	96807	100.000	17761	1900	1.107	--
总计		96807	100.000	17761			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-15/25-204-2 - cbzj-20mg-B0069N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX274-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:18:49
处理时间 (V2): 2025/01/11 11:32:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.557	96751	100.000	17775	1901	1.105	--
总计		96751	100.000	17775			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0069N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2