玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	96641	96159	96856	96480	96494	96526	0.27
2	11.19	96873	96910				96892	0.03

单位质量响应值		RSD%	判断
8657.04	8658.80	0.02	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0012N01批-pH6.8(内含0.16%CTAB)

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	8251	-	8251	8.628	16.68	34.17	8.63	16.68	34.16
	2	13391	-	13391	14.004			14.00		
	3	13577	-	13577	14.198			14.20		
	4	16219	-	16219	16.961			16.96		
	5	22695	-	22695	23.733			23.73		
	6	21555	-	21555	22.541			22.54		
10min	1	34777	-	34777	36.368	51.67	19.65	36.46	51.85	19.70
	2	41626	-	41626	43.530			43.69		
	3	49184	-	49184	51.434			51.59		
	4	54130	-	54130	56.606			56.79		
	5	60994	-	60994	63.784			64.05		
	6	55729	-	55729	58.278			58.53		
15min	1	65675	-	65675	68.679	76.86	8.24	69.18	77.62	8.36
	2	66693	-	66693	69.744			70.38		
	3	75329	-	75329	78.775			79.50		
	4	78261	-	78261	81.841			82.66		
	5	80479	-	80479	84.161			85.13		
	6	74536	-	74536	77.946			78.84		
20min	1	78441	-	78441	82.029	85.29	5.40	83.29	86.90	5.52
	2	77148	-	77148	80.677			82.09		
	3	77376	-	77376	80.916			82.52		
	4	87176	-	87176	91.164			92.89		
	5	84907	-	84907	88.791			90.70		
	6	84296	-	84296	88.152			89.92		
30min	1	88993	-	88993	93.064	93.92	2.67	95.24	96.48	2.83
	2	87167	-	87167	91.155			93.47		
	3	87015	-	87015	90.996			93.50		
	4	91777	-	91777	95.976			98.72		
	5	92275	-	92275	96.496			99.39		
	6	91619	-	91619	95.810			98.55		
45min	1	92999	-	92999	97.253	97.05	2.32	100.46	100.65	2.38
	2	89535	-	89535	93.631			96.95		
	3	94596	-	94596	98.924			102.44		
	4	91478	-	91478	95.663			99.47		
	5	95516	-	95516	99.886			103.85		
	6	92698	-	92698	96.939			100.75		
60min	1	94537	-	94537	98.862	98.08	1.04	103.15	102.76	0.97
	2	92843	-	92843	97.090			101.45		
	3	95255	-	95255	99.613			104.23		
	4	92760	-	92760	97.004			101.87		
	5	93599	-	93599	97.881			102.96		
	6	93757	-	93757	98.046			102.93		
90min	1	87280	-	87280	91.273	93.58	2.23	96.66	99.35	2.19
	2	89883	-	89883	93.995			99.44		
	3	89179	-	89179	93.259			98.98		
	4	91472	-	91472	95.657			101.60		
	5	87228	-	87228	91.218			97.38		
	6	91872	-	91872	96.075			102.05		
120min	1	90835	-	90835	94.990	94.78	0.95	101.39	101.59	1.08
	2	88998	-	88998	93.069			99.56		
	3	91280	-	91280	95.456			102.21		
	4	90469	-	90469	94.608			101.62		
	5	91275	-	91275	95.451			102.63		
	6	90938	-	90938	95.098			102.14		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	89151	-	89151	93.229	92.62	3.12	100.69	100.48	3.01
	2	88028	-	88028	92.055			99.58		
	3	83983	-	83983	87.825			95.64		
	4	87574	-	87574	91.580			99.64		
	5	91318	-	91318	95.496			103.73		
	6	91356	-	91356	95.535			103.63		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	96833	97115	96926	96429	96442	96749	0.32
2	11.19	96900	96720				96810	0.14

单位质量响应值		RSD%	判断
8677.04	8651.47	0.21	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0012N01批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	14030	-	14030	14.661	15.69	18.24	14.66	15.69	18.25
	2	17547	-	17547	18.336			18.34		
	3	12825	-	12825	13.402			13.40		
	4	18584	-	18584	19.420			19.42		
	5	15590	-	15590	16.291			16.29		
	6	11516	-	11516	12.034			12.03		
10min	1	33268	-	33268	34.765	34.83	3.79	34.93	35.01	3.83
	2	32799	-	32799	34.274			34.48		
	3	33535	-	33535	35.044			35.19		
	4	35558	-	35558	37.158			37.37		
	5	33124	-	33124	34.614			34.80		
	6	31707	-	31707	33.133			33.27		
15min	1	39842	-	39842	41.634	42.42	1.85	42.18	42.98	1.91
	2	40630	-	40630	42.458			43.04		
	3	40010	-	40010	41.810			42.35		
	4	41970	-	41970	43.858			44.49		
	5	40473	-	40473	42.294			42.86		
	6	40653	-	40653	42.482			42.98		
20min	1	41278	-	41278	43.135	44.03	2.83	44.15	45.06	2.78
	2	40582	-	40582	42.408			43.46		
	3	41441	-	41441	43.305			44.31		
	4	43254	-	43254	45.200			46.32		
	5	42748	-	42748	44.671			45.71		
	6	43486	-	43486	45.442			46.42		
30min	1	47144	-	47144	49.265	48.84	0.62	50.76	50.36	0.58
	2	47050	-	47050	49.167			50.69		
	3	46517	-	46517	48.610			50.09		
	4	46456	-	46456	48.546			50.16		
	5	46636	-	46636	48.734			50.27		
	6	46632	-	46632	48.730			50.21		
45min	1	48522	-	48522	50.705	51.30	1.68	52.74	53.36	1.62
	2	48235	-	48235	50.405			52.48		
	3	49393	-	49393	51.615			53.64		
	4	49815	-	49815	52.056			54.21		
	5	48377	-	48377	50.553			52.63		
	6	50185	-	50185	52.443			54.46		
60min	1	49858	-	49858	52.101	52.09	0.94	54.70	54.73	0.92
	2	49556	-	49556	51.785			54.42		
	3	49523	-	49523	51.751			54.35		
	4	49983	-	49983	52.231			54.97		
	5	50707	-	50707	52.988			55.62		
	6	49481	-	49481	51.707			54.31		
90min	1	51350	-	51350	53.660	53.30	2.20	56.84	56.51	2.09
	2	50312	-	50312	52.575			55.78		
	3	49236	-	49236	51.451			54.62		
	4	50894	-	50894	53.183			56.50		
	5	52044	-	52044	54.385			57.61		
	6	52203	-	52203	54.551			57.73		
120min	1	50209	-	50209	52.468	54.35	1.99	56.24	58.16	1.89
	2	51368	-	51368	53.679			57.47		
	3	52899	-	52899	55.279			59.02		
	4	52746	-	52746	55.119			59.03		
	5	52360	-	52360	54.715			58.54		
	6	52496	-	52496	54.858			58.64		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	53578	-	53578	55.988	55.19	1.59	60.35	59.60	1.52
	2	51499	-	51499	53.816			58.21		
	3	52162	-	52162	54.509			58.87		
	4	53641	-	53641	56.054			60.57		
	5	53005	-	53005	55.389			59.83		
	6	53011	-	53011	55.396			59.79		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	97074	97007	96403	96681	96803	96794	0.28
2	11.19	97095	96427				96761	0.49

单位质量响应值		RSD%	判断
8681.08	8647.10	0.28	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0012N01批-pH4.5

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	13936	-	13936	14.563	17.87	17.03	14.56	17.87	17.04
	2	21226	-	21226	22.181			22.18		
	3	17913	-	17913	18.719			18.72		
	4	15023	-	15023	15.699			15.70		
	5	19536	-	19536	20.415			20.42		
	6	14986	-	14986	15.660			15.66		
10min	1	33223	-	33223	34.718	36.14	6.43	34.88	36.34	6.48
	2	36884	-	36884	38.544			38.79		
	3	34140	-	34140	35.677			35.88		
	4	33037	-	33037	34.524			34.70		
	5	37783	-	37783	39.484			39.71		
	6	32417	-	32417	33.876			34.05		
15min	1	41061	-	41061	42.909	43.22	2.58	43.46	43.82	2.65
	2	42905	-	42905	44.836			45.51		
	3	40486	-	40486	42.308			42.91		
	4	41588	-	41588	43.460			44.02		
	5	42096	-	42096	43.991			44.66		
	6	40004	-	40004	41.804			42.35		
20min	1	43235	-	43235	45.181	45.90	3.42	46.21	46.98	3.43
	2	44229	-	44229	46.220			47.39		
	3	42661	-	42661	44.581			45.66		
	4	42838	-	42838	44.766			45.81		
	5	46735	-	46735	48.838			49.99		
	6	43833	-	43833	45.806			46.82		
30min	1	47662	-	47662	49.807	49.35	5.75	51.33	50.94	5.66
	2	49661	-	49661	51.896			53.58		
	3	47822	-	47822	49.974			51.54		
	4	47804	-	47804	49.956			51.49		
	5	48491	-	48491	50.673			52.37		
	6	41898	-	41898	43.784			45.31		
45min	1	50601	-	50601	52.878	52.92	1.49	54.96	55.06	1.29
	2	49540	-	49540	51.770			54.03		
	3	51080	-	51080	53.379			55.50		
	4	50454	-	50454	52.725			54.82		
	5	50399	-	50399	52.667			54.93		
	6	51800	-	51800	54.131			56.14		
60min	1	48941	-	48941	51.144	52.81	2.11	53.81	55.54	2.08
	2	50016	-	50016	52.267			55.11		
	3	51348	-	51348	53.659			56.38		
	4	51158	-	51158	53.460			56.14		
	5	51757	-	51757	54.086			56.93		
	6	49990	-	49990	52.240			54.85		
90min	1	51168	-	51168	53.471	54.10	1.16	56.71	57.41	1.14
	2	52521	-	52521	54.885			58.30		
	3	52103	-	52103	54.448			57.76		
	4	52236	-	52236	54.587			57.86		
	5	51128	-	51128	53.429			56.88		
	6	51436	-	51436	53.751			56.94		
120min	1	51845	-	51845	54.178	54.20	1.13	58.01	58.12	1.04
	2	51304	-	51304	53.613			57.64		
	3	51050	-	51050	53.348			57.27		
	4	52208	-	52208	54.558			58.44		
	5	52505	-	52505	54.868			58.91		
	6	52309	-	52309	54.663			58.45		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	52820	-	52820	55.197	55.43	0.75	59.63	59.95	0.81
	2	53158	-	53158	55.551			60.18		
	3	53651	-	53651	56.066			60.58		
	4	52908	-	52908	55.289			59.78		
	5	53218	-	53218	55.613			60.26		
	6	52496	-	52496	54.859			59.26		

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	96514	96834	96503	96430	96366	96529	0.19
2	11.19	97376	97532				97454	0.12

单位质量响应值		RSD%	判断
8657.31	8709.03	0.43	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0012N01批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	19121	-	19121	19.938	18.11	11.39	19.94	18.11	11.38
	2	18655	-	18655	19.452			19.45		
	3	19147	-	19147	19.965			19.96		
	4	17309	-	17309	18.048			18.05		
	5	15427	-	15427	16.086			16.09		
	6	14561	-	14561	15.183			15.18		
10min	1	34064	-	34064	35.519	35.09	1.59	35.74	35.30	1.59
	2	32905	-	32905	34.311			34.53		
	3	33835	-	33835	35.280			35.50		
	4	34175	-	34175	35.635			35.84		
	5	33070	-	33070	34.483			34.66		
	6	33892	-	33892	35.340			35.51		
15min	1	39910	-	39910	41.615	41.16	1.75	42.23	41.75	1.77
	2	39280	-	39280	40.958			41.56		
	3	40301	-	40301	42.023			42.64		
	4	39768	-	39768	41.467			42.06		
	5	38328	-	38328	39.965			40.53		
	6	39244	-	39244	40.920			41.48		
20min	1	42399	-	42399	44.210	43.68	2.62	45.29	44.73	2.54
	2	41084	-	41084	42.839			43.89		
	3	40386	-	40386	42.111			43.19		
	4	43334	-	43334	45.185			46.24		
	5	41501	-	41501	43.274			44.28		
	6	42651	-	42651	44.473			45.49		
30min	1	45484	-	45484	47.427	46.63	2.59	49.00	48.17	2.52
	2	45353	-	45353	47.290			48.82		
	3	43040	-	43040	44.879			46.43		
	4	45658	-	45658	47.608			49.17		
	5	45344	-	45344	47.281			48.77		
	6	43447	-	43447	45.303			46.81		
45min	1	46498	-	46498	48.484	47.61	1.92	50.58	49.67	1.89
	2	45373	-	45373	47.311			49.37		
	3	44828	-	44828	46.743			48.79		
	4	46729	-	46729	48.725			50.81		
	5	45959	-	45959	47.922			49.93		
	6	44597	-	44597	46.502			48.52		
60min	1	45424	-	45424	47.364	46.98	1.82	50.00	49.57	1.76
	2	44257	-	44257	46.147			48.73		
	3	44165	-	44165	46.052			48.62		
	4	45931	-	45931	47.893			50.52		
	5	45963	-	45963	47.926			50.47		
	6	44620	-	44620	46.526			49.06		
90min	1	45485	-	45485	47.428	47.87	1.42	50.59	50.97	1.37
	2	46095	-	46095	48.064			51.16		
	3	46561	-	46561	48.550			51.63		
	4	46699	-	46699	48.694			51.86		
	5	45509	-	45509	47.453			50.53		
	6	45083	-	45083	47.009			50.06		
120min	1	45005	-	45005	46.927	47.76	2.61	50.62	51.40	2.47
	2	45358	-	45358	47.296			50.92		
	3	47175	-	47175	49.190			52.81		
	4	47237	-	47237	49.255			52.96		
	5	45795	-	45795	47.751			51.36		
	6	44272	-	44272	46.163			49.73		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	46479	-	46479	48.464	49.09	2.28	52.67	53.25	2.16
	2	46902	-	46902	48.905			53.06		
	3	47447	-	47447	49.474			53.64		
	4	47995	-	47995	50.045			54.30		
	5	48276	-	48276	50.338			54.47		
	6	45358	-	45358	47.296			51.38		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-421-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:29:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-422-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:33:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	96641	100.000	15239	2552	1.061	--
总计		96641	100.000	15239			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-423-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:36:36
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	96159	100.000	15146	2554	1.070	--
总计		96159	100.000	15146			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-424-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:40:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	96856	100.000	15147	2532	1.070	--
总计		96856	100.000	15147			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-425-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:43:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	96480	100.000	15152	2537	1.070	--
总计		96480	100.000	15152			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-426-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:46:47
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	96494	100.000	15130	2548	1.078	--
总计		96494	100.000	15130			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-427-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:50:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	8251	100.000	1371	2733	1.088	--
总计		8251	100.000	1371			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-428-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:53:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	13391	100.000	2201	2723	1.079	--
总计		13391	100.000	2201			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-429-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 11:56:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	13577	100.000	2242	2734	1.094	--
总计		13577	100.000	2242			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-430-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:00:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:44:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	16219	100.000	2649	2758	1.066	--
总计		16219	100.000	2649			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-16/26-431-4 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:03:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V4）: 2025/01/11 11:48:46　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	22695	100.000	3765	2738	1.067	--
总计		22695	100.000	3765			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-432-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:07:04
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	21555	100.000	3503	2694	1.088	--
总计		21555	100.000	3503			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-433-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:10:27　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	34777	100.000	5701	2737	1.088	--
总计		34777	100.000	5701			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-434-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:13:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	41626	100.000	6752	2715	1.089	--
总计		41626	100.000	6752			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-435-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:17:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	49184	100.000	7979	2708	1.081	--
总计		49184	100.000	7979			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-436-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:20:35　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	54130	100.000	8750	2713	1.082	--
总计		54130	100.000	8750			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-437-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:23:58　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	60994	100.000	9928	2720	1.070	--
总计		60994	100.000	9928			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-438-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:27:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	55729	100.000	8973	2701	1.080	--
总计		55729	100.000	8973			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-439-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:30:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	65675	100.000	10649	2705	1.072	--
总计		65675	100.000	10649			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-440-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:34:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:22　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	66693	100.000	10798	2711	1.083	--
总计		66693	100.000	10798			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-441-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:37:29　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:25　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	75329	100.000	12218	2708	1.075	--
总计		75329	100.000	12218			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-442-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:40:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	78261	100.000	12642	2705	1.081	--
总计		78261	100.000	12642			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-443-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:44:13
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	80479	100.000	13087	2721	1.073	--
总计		80479	100.000	13087			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-444-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:47:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	74536	100.000	12088	2717	1.078	--
总计		74536	100.000	12088			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-445-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:50:57　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	78441	100.000	12712	2708	1.082	--
总计		78441	100.000	12712			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-446-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:54:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:38　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	77148	100.000	12493	2698	1.072	--
总计		77148	100.000	12493			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-447-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 12:57:43　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:41　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	77376	100.000	12561	2705	1.079	--
总计		77376	100.000	12561			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-448-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:01:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87176	100.000	14111	2698	1.074	--
总计		87176	100.000	14111			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-449-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:04:28　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	84907	100.000	13815	2717	1.077	--
总计		84907	100.000	13815			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-450-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:07:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	84296	100.000	13656	2709	1.078	--
总计		84296	100.000	13656			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-451-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:11:14
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	88993	100.000	14428	2711	1.080	--
总计		88993	100.000	14428			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-452-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:14:37
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	87167	100.000	14106	2705	1.073	--
总计		87167	100.000	14106			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-453-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:18:00
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:45:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87015	100.000	14026	2690	1.076	--
总计		87015	100.000	14026			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-454-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:21:22　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:01　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	91777	100.000	14834	2710	1.075	--
总计		91777	100.000	14834			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-455-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:24:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	92275	100.000	14948	2703	1.076	--
总计		92275	100.000	14948			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-456-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:28:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	91619	100.000	14841	2707	1.078	--
总计		91619	100.000	14841			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-457-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:31:29　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:09　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	92999	100.000	15078	2705	1.071	--
总计		92999	100.000	15078			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-458-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:34:52　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	89535	100.000	14487	2700	1.070	--
总计		89535	100.000	14487			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-459-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:38:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	94596	100.000	15336	2715	1.077	--
总计		94596	100.000	15336			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-460-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:41:37　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	91478	100.000	14823	2710	1.075	--
总计		91478	100.000	14823			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-461-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:45:00　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	95516	100.000	15469	2714	1.068	--
总计		95516	100.000	15469			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-462-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:48:25
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	92698	100.000	15029	2713	1.075	--
总计		92698	100.000	15029			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-463-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:51:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	94537	100.000	15338	2712	1.077	--
总计		94537	100.000	15338			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-464-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:55:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	92843	100.000	15041	2712	1.074	--
总计		92843	100.000	15041			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-465-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 13:58:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	95255	100.000	15376	2710	1.079	--
总计		95255	100.000	15376			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-466-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:01:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	92760	100.000	15002	2709	1.074	--
总计		92760	100.000	15002			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-467-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:05:19
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	93599	100.000	15184	2715	1.069	--
总计		93599	100.000	15184			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-468-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:08:42
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	93757	100.000	15173	2711	1.072	--
总计		93757	100.000	15173			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-469-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:12:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:41　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	87280	100.000	14191	2729	1.074	--
总计		87280	100.000	14191			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-470-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:15:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	89883	100.000	14572	2726	1.075	--
总计		89883	100.000	14572			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-471-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:18:52　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:46　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	89179	100.000	14505	2721	1.076	--
总计		89179	100.000	14505			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-472-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:22:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	91472	100.000	14835	2723	1.071	--
总计		91472	100.000	14835			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-473-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:25:38
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87228	100.000	14197	2723	1.069	--
总计		87228	100.000	14197			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-474-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:29:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	91872	100.000	14886	2726	1.079	--
总计		91872	100.000	14886			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-475-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:32:23
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:46:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	90835	100.000	14747	2717	1.076	--
总计		90835	100.000	14747			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-476-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:35:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	88998	100.000	14462	2718	1.070	--
总计		88998	100.000	14462			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-477-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:39:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	91280	100.000	14825	2732	1.078	--
总计		91280	100.000	14825			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-478-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:42:31　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	90469	100.000	14666	2703	1.074	--
总计		90469	100.000	14666			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-479-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:45:54　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:08　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	91275	100.000	14838	2736	1.071	--
总计		91275	100.000	14838			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-480-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:49:16　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	90938	100.000	14730	2714	1.073	--
总计		90938	100.000	14730			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-481-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:52:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	89151	100.000	14471	2709	1.081	--
总计		89151	100.000	14471			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-482-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:56:02　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	88028	100.000	14291	2734	1.081	--
总计		88028	100.000	14291			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-483-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 14:59:25　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	83983	100.000	13634	2712	1.078	--
总计		83983	100.000	13634			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-484-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:02:47　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:22　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	87574	100.000	14229	2721	1.072	--
总计		87574	100.000	14229			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-485-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:06:09　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:25　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	91318	100.000	14789	2711	1.070	--
总计		91318	100.000	14789			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-486-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:09:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	91356	100.000	14817	2712	1.072	--
总计		91356	100.000	14817			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-487-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:12:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96873	100.000	15230	2536	1.080	--
总计		96873	100.000	15230			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-488-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:16:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96910	100.000	15228	2531	1.079	--
总计		96910	100.000	15228			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-489-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:19:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:36
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-490-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:23:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96833	100.000	15214	2536	1.078	--
总计		96833	100.000	15214			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-491-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:26:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	97115	100.000	15185	2537	1.077	--
总计		97115	100.000	15185			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-492-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:30:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	96926	100.000	15178	2532	1.080	--
总计		96926	100.000	15178			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-493-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:33:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	96429	100.000	15141	2533	1.081	--
总计		96429	100.000	15141			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-494-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:36:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96442	100.000	15179	2544	1.081	--
总计		96442	100.000	15179			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-495-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:40:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	14030	100.000	2268	2701	1.067	--
总计		14030	100.000	2268			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-496-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:43:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	17547	100.000	2891	2752	1.095	--
总计		17547	100.000	2891			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-497-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:47:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:47:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	12825	100.000	2097	2702	1.069	--
总计		12825	100.000	2097			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-498-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:50:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	18584	100.000	3071	2733	1.068	--
总计		18584	100.000	3071			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-499-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:53:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	15590	100.000	2585	2750	1.082	--
总计		15590	100.000	2585			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-500-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 15:57:16　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	11516	100.000	1871	2659	1.110	--
总计		11516	100.000	1871			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-501-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:00:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	33268	100.000	5429	2730	1.076	--
总计		33268	100.000	5429			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-502-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:04:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	32799	100.000	5374	2733	1.087	--
总计		32799	100.000	5374			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-503-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:07:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	33535	100.000	5436	2737	1.081	--
总计		33535	100.000	5436			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-504-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:10:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	35558	100.000	5761	2706	1.073	--
总计		35558	100.000	5761			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-505-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:14:14
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	33124	100.000	5454	2747	1.074	--
总计		33124	100.000	5454			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-506-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:17:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	31707	100.000	5238	2773	1.073	--
总计		31707	100.000	5238			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-507-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:21:01
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	39842	100.000	6500	2739	1.062	--
总计		39842	100.000	6500			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-508-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:24:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	40630	100.000	6614	2730	1.074	--
总计		40630	100.000	6614			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-509-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:27:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	40010	100.000	6559	2746	1.078	--
总计		40010	100.000	6559			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-510-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:31:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	41970	100.000	6841	2730	1.077	--
总计		41970	100.000	6841			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-511-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:34:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	40473	100.000	6548	2725	1.079	--
总计		40473	100.000	6548			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-512-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:38:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	40653	100.000	6619	2720	1.086	--
总计		40653	100.000	6619			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-513-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:41:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	41278	100.000	6733	2728	1.081	--
总计		41278	100.000	6733			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-514-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:44:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	40582	100.000	6625	2721	1.074	--
总计		40582	100.000	6625			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-515-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:48:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	41441	100.000	6727	2714	1.082	--
总计		41441	100.000	6727			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-516-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:51:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	43254	100.000	7053	2715	1.069	--
总计		43254	100.000	7053			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-517-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:55:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	42748	100.000	6992	2726	1.074	--
总计		42748	100.000	6992			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-518-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 16:58:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	43486	100.000	7083	2708	1.079	--
总计		43486	100.000	7083			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-519-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:01:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:48:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47144	100.000	7631	2714	1.080	--
总计		47144	100.000	7631			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-520-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:05:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47050	100.000	7647	2715	1.073	--
总计		47050	100.000	7647			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-521-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:08:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46517	100.000	7557	2703	1.076	--
总计		46517	100.000	7557			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-522-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:12:03　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46456	100.000	7580	2727	1.077	--
总计		46456	100.000	7580			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-523-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:15:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	46636	100.000	7586	2719	1.073	--
总计		46636	100.000	7586			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-524-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:18:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46632	100.000	7577	2713	1.079	--
总计		46632	100.000	7577			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-525-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:22:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:15
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	48522	100.000	7915	2734	1.079	--
总计		48522	100.000	7915			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-526-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:25:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	48235	100.000	7857	2725	1.078	--
总计		48235	100.000	7857			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-527-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:29:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49393	100.000	8037	2720	1.072	--
总计		49393	100.000	8037			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-528-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:32:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	49815	100.000	8110	2727	1.084	--
总计		49815	100.000	8110			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-529-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:35:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	48377	100.000	7872	2733	1.084	--
总计		48377	100.000	7872			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-530-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:39:14　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	50185	100.000	8160	2706	1.075	--
总计		50185	100.000	8160			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-531-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:42:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	49858	100.000	8056	2714	1.078	--
总计		49858	100.000	8056			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-532-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:46:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49556	100.000	8041	2700	1.073	--
总计		49556	100.000	8041			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-533-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:49:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49523	100.000	8041	2700	1.078	--
总计		49523	100.000	8041			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-534-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:52:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	49983	100.000	8142	2711	1.071	--
总计		49983	100.000	8142			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-535-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:56:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	50707	100.000	8206	2713	1.075	--
总计		50707	100.000	8206			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-536-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 17:59:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49481	100.000	8038	2711	1.081	--
总计		49481	100.000	8038			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-537-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:03:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51350	100.000	8330	2710	1.080	--
总计		51350	100.000	8330			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-538-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:06:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	50312	100.000	8141	2701	1.074	--
总计		50312	100.000	8141			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-539-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:09:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	49236	100.000	8037	2722	1.076	--
总计		49236	100.000	8037			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-540-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:13:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	50894	100.000	8235	2699	1.076	--
总计		50894	100.000	8235			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-541-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:16:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:49:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52044	100.000	8408	2695	1.080	--
总计		52044	100.000	8408			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-542-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:20:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52203	100.000	8448	2711	1.081	--
总计		52203	100.000	8448			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-543-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:23:27　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	50209	100.000	8172	2705	1.091	--
总计		50209	100.000	8172			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-544-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:26:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51368	100.000	8345	2713	1.079	--
总计		51368	100.000	8345			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-545-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:30:13　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52899	100.000	8524	2703	1.082	--
总计		52899	100.000	8524			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-546-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:33:36　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:12　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52746	100.000	8582	2714	1.079	--
总计		52746	100.000	8582			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-547-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:36:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52360	100.000	8529	2714	1.076	--
总计		52360	100.000	8529			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-548-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:40:22　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52496	100.000	8469	2698	1.074	--
总计		52496	100.000	8469			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-549-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:43:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53578	100.000	8710	2712	1.071	--
总计		53578	100.000	8710			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-550-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:47:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51499	100.000	8416	2724	1.075	--
总计		51499	100.000	8416			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-551-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:50:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	52162	100.000	8515	2726	1.081	--
总计		52162	100.000	8515			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-552-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:53:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53641	100.000	8694	2713	1.068	--
总计		53641	100.000	8694			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-553-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 18:57:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	53005	100.000	8564	2705	1.080	--
总计		53005	100.000	8564			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-554-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:00:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53011	100.000	8605	2722	1.077	--
总计		53011	100.000	8605			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-555-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:04:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96900	100.000	15194	2531	1.078	--
总计		96900	100.000	15194			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-556-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:07:30　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96720	100.000	15184	2525	1.080	--
总计		96720	100.000	15184			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-557-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:10:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-558-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:14:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	97074	100.000	15183	2531	1.082	--
总计		97074	100.000	15183			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-559-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:17:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	97007	100.000	15172	2528	1.075	--
总计		97007	100.000	15172			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-560-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:21:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96403	100.000	15162	2537	1.078	--
总计		96403	100.000	15162			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-561-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:24:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	96681	100.000	15180	2524	1.086	--
总计		96681	100.000	15180			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-562-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:27:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96803	100.000	15174	2523	1.083	--
总计		96803	100.000	15174			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-563-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:31:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:50:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	13936	100.000	2297	2766	1.116	--
总计		13936	100.000	2297			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-564-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:34:33　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:02　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	21226	100.000	3504	2714	1.063	--
总计		21226	100.000	3504			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-565-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:37:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	17913	100.000	2978	2744	1.094	--
总计		17913	100.000	2978			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-566-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:41:17　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	15023	100.000	2471	2748	1.045	--
总计		15023	100.000	2471			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-567-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:44:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	19536	100.000	3254	2768	1.061	--
总计		19536	100.000	3254			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-568-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:48:01　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	14986	100.000	2487	2751	1.068	--
总计		14986	100.000	2487			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-569-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:51:23　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	33223	100.000	5440	2731	1.078	--
总计		33223	100.000	5440			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-570-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:54:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	36884	100.000	5968	2717	1.080	--
总计		36884	100.000	5968			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-571-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 19:58:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	34140	100.000	5575	2707	1.076	--
总计		34140	100.000	5575			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-572-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:01:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	33037	100.000	5385	2703	1.076	--
总计		33037	100.000	5385			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-573-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:04:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	37783	100.000	6122	2706	1.082	--
总计		37783	100.000	6122			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-574-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:08:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	32417	100.000	5275	2728	1.065	--
总计		32417	100.000	5275			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-575-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:11:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	41061	100.000	6709	2722	1.075	--
总计		41061	100.000	6709			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-576-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:14:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42905	100.000	6990	2743	1.071	--
总计		42905	100.000	6990			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-577-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:18:19
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	40486	100.000	6584	2701	1.087	--
总计		40486	100.000	6584			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-578-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:21:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	41588	100.000	6737	2710	1.065	--
总计		41588	100.000	6737			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-579-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:25:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	42096	100.000	6826	2705	1.076	--
总计		42096	100.000	6826			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-580-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:28:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	40004	100.000	6498	2710	1.084	--
总计		40004	100.000	6498			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-581-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:31:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	43235	100.000	7015	2715	1.075	--
总计		43235	100.000	7015			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-582-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:35:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	44229	100.000	7182	2709	1.078	--
总计		44229	100.000	7182			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-583-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:38:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42661	100.000	6919	2699	1.080	--
总计		42661	100.000	6919			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-584-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:41:58　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42838	100.000	6993	2691	1.084	--
总计		42838	100.000	6993			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-585-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:45:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:51:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	46735	100.000	7550	2706	1.075	--
总计		46735	100.000	7550			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-586-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:48:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:02　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	43833	100.000	7107	2706	1.075	--
总计		43833	100.000	7107			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-587-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:52:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47662	100.000	7699	2702	1.078	--
总计		47662	100.000	7699			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-588-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:55:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49661	100.000	8022	2694	1.075	--
总计		49661	100.000	8022			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-589-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 20:58:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47822	100.000	7750	2701	1.078	--
总计		47822	100.000	7750			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-590-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:02:07　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47804	100.000	7798	2718	1.075	--
总计		47804	100.000	7798			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-591-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:05:29　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	48491	100.000	7851	2702	1.077	--
总计		48491	100.000	7851			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-592-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:08:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	41898	100.000	6793	2693	1.072	--
总计		41898	100.000	6793			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-593-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:12:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	50601	100.000	8247	2717	1.084	--
总计		50601	100.000	8247			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-594-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:15:34　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	49540	100.000	8005	2699	1.083	--
总计		49540	100.000	8005			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-595-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:18:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51080	100.000	8314	2715	1.080	--
总计		51080	100.000	8314			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-596-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:22:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	50454	100.000	8235	2706	1.077	--
总计		50454	100.000	8235			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-597-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:25:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	50399	100.000	8187	2701	1.087	--
总计		50399	100.000	8187			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-598-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:29:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51800	100.000	8417	2714	1.076	--
总计		51800	100.000	8417			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-599-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:32:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	48941	100.000	7910	2702	1.083	--
总计		48941	100.000	7910			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-600-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:35:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	50016	100.000	8091	2689	1.076	--
总计		50016	100.000	8091			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-601-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:39:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	51348	100.000	8294	2700	1.081	--
总计		51348	100.000	8294			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-602-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:42:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51158	100.000	8277	2706	1.071	--
总计		51158	100.000	8277			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-603-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:45:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:48　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51757	100.000	8329	2683	1.078	--
总计		51757	100.000	8329			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-604-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:49:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	49990	100.000	8082	2699	1.074	--
总计		49990	100.000	8082			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-605-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:52:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51168	100.000	8277	2705	1.075	--
总计		51168	100.000	8277			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-606-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:55:57　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:52:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	52521	100.000	8467	2701	1.074	--
总计		52521	100.000	8467			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-607-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 21:59:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52103	100.000	8357	2696	1.069	--
总计		52103	100.000	8357			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-608-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:02:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52236	100.000	8439	2701	1.073	--
总计		52236	100.000	8439			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-609-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:06:05　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51128	100.000	8307	2715	1.084	--
总计		51128	100.000	8307			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-610-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:09:27　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51436	100.000	8312	2709	1.073	--
总计		51436	100.000	8312			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-611-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:12:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	51845	100.000	8369	2690	1.077	--
总计		51845	100.000	8369			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-612-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:16:14　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51304	100.000	8347	2720	1.075	--
总计		51304	100.000	8347			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-613-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:19:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	51050	100.000	8240	2713	1.081	--
总计		51050	100.000	8240			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-614-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:23:01　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52208	100.000	8393	2702	1.076	--
总计		52208	100.000	8393			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-615-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:26:24　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52505	100.000	8546	2712	1.073	--
总计		52505	100.000	8546			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-616-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:29:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52309	100.000	8458	2711	1.070	--
总计		52309	100.000	8458			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-617-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:33:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52820	100.000	8548	2703	1.085	--
总计		52820	100.000	8548			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-618-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:36:33　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	53158	100.000	8599	2701	1.081	--
总计		53158	100.000	8599			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-619-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:39:57　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	53651	100.000	8663	2691	1.081	--
总计		53651	100.000	8663			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-620-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:43:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52908	100.000	8597	2714	1.077	--
总计		52908	100.000	8597			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-621-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:46:43　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	53218	100.000	8663	2716	1.074	--
总计		53218	100.000	8663			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-622-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:50:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52496	100.000	8514	2723	1.070	--
总计		52496	100.000	8514			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-623-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:53:28　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:45　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	97095	100.000	15225	2524	1.085	--
总计		97095	100.000	15225			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-624-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 22:56:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96427	100.000	15205	2538	1.082	--
总计		96427	100.000	15205			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-625-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:00:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-626-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:03:37　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:53　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96514	100.000	15162	2527	1.086	--
总计		96514	100.000	15162			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-627-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:07:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96834	100.000	15178	2523	1.086	--
总计		96834	100.000	15178			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-628-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:10:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:53:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96503	100.000	15177	2530	1.080	--
总计		96503	100.000	15177			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-629-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:13:48　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:01　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96430	100.000	15156	2535	1.086	--
总计		96430	100.000	15156			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-630-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:17:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96366	100.000	15161	2533	1.085	--
总计		96366	100.000	15161			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-631-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:20:35　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	19121	100.000	3122	2692	1.072	--
总计		19121	100.000	3122			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-632-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:23:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	18655	100.000	3007	2686	1.069	--
总计		18655	100.000	3007			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-633-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:27:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:12　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	19147	100.000	3172	2725	1.062	--
总计		19147	100.000	3172			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-634-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:30:43　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	17309	100.000	2828	2689	1.058	--
总计		17309	100.000	2828			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-635-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:34:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	15427	100.000	2500	2672	1.076	--
总计		15427	100.000	2500			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-636-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:37:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	14561	100.000	2403	2713	1.072	--
总计		14561	100.000	2403			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-637-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:40:52　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	34064	100.000	5518	2700	1.079	--
总计		34064	100.000	5518			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-638-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:44:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	32905	100.000	5366	2699	1.063	--
总计		32905	100.000	5366			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-639-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:47:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	33835	100.000	5506	2718	1.078	--
总计		33835	100.000	5506			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-640-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:50:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:32　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	34175	100.000	5594	2707	1.080	--
总计		34175	100.000	5594			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-641-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:54:22　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:34　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	33070	100.000	5364	2682	1.064	--
总计		33070	100.000	5364			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-642-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/10 23:57:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:37　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	33892	100.000	5485	2712	1.068	--
总计		33892	100.000	5485			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-643-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:01:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	39910	100.000	6505	2701	1.070	--
总计		39910	100.000	6505			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-644-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:04:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	39280	100.000	6351	2702	1.075	--
总计		39280	100.000	6351			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-645-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:07:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	40301	100.000	6497	2707	1.084	--
总计		40301	100.000	6497			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-646-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:11:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	39768	100.000	6447	2697	1.094	--
总计		39768	100.000	6447			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-647-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:14:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	38328	100.000	6233	2719	1.082	--
总计		38328	100.000	6233			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-648-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:17:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	39244	100.000	6369	2705	1.085	--
总计		39244	100.000	6369			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-649-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:21:21　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	42399	100.000	6858	2706	1.084	--
总计		42399	100.000	6858			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-650-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:24:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:54:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	41084	100.000	6612	2685	1.078	--
总计		41084	100.000	6612			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-651-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:28:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	40386	100.000	6541	2694	1.077	--
总计		40386	100.000	6541			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-652-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:31:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	43334	100.000	6985	2685	1.075	--
总计		43334	100.000	6985			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-653-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:34:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	41501	100.000	6735	2695	1.088	--
总计		41501	100.000	6735			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-654-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:38:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	42651	100.000	6880	2676	1.091	--
总计		42651	100.000	6880			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-655-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:41:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45484	100.000	7336	2703	1.077	--
总计		45484	100.000	7336			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-656-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:44:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45353	100.000	7344	2693	1.069	--
总计		45353	100.000	7344			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-657-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:48:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	43040	100.000	6953	2677	1.075	--
总计		43040	100.000	6953			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-658-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:51:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	45658	100.000	7434	2704	1.083	--
总计		45658	100.000	7434			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-659-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:55:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45344	100.000	7328	2693	1.085	--
总计		45344	100.000	7328			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-660-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 00:58:28　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	43447	100.000	6974	2685	1.081	--
总计		43447	100.000	6974			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-661-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:01:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	46498	100.000	7522	2687	1.078	--
总计		46498	100.000	7522			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-662-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:05:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45373	100.000	7336	2704	1.079	--
总计		45373	100.000	7336			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-663-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:08:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	44828	100.000	7225	2697	1.077	--
总计		44828	100.000	7225			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-664-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:11:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46729	100.000	7559	2700	1.080	--
总计		46729	100.000	7559			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-665-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:15:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:41　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	45959	100.000	7399	2682	1.088	--
总计		45959	100.000	7399			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-666-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:18:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44597	100.000	7240	2705	1.080	--
总计		44597	100.000	7240			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-667-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:22:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	45424	100.000	7345	2687	1.075	--
总计		45424	100.000	7345			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-668-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:25:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	44257	100.000	7155	2691	1.086	--
总计		44257	100.000	7155			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-669-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:28:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44165	100.000	7108	2672	1.067	--
总计		44165	100.000	7108			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-670-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:32:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45931	100.000	7388	2697	1.079	--
总计		45931	100.000	7388			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-671-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:35:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:55:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45963	100.000	7397	2676	1.080	--
总计		45963	100.000	7397			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-672-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:38:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44620	100.000	7223	2684	1.082	--
总计		44620	100.000	7223			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-673-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:42:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45485	100.000	7342	2688	1.083	--
总计		45485	100.000	7342			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-674-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:45:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46095	100.000	7470	2706	1.087	--
总计		46095	100.000	7470			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-675-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:49:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:08
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	46561	100.000	7458	2668	1.084	--
总计		46561	100.000	7458			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-676-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:52:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:11
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46699	100.000	7595	2710	1.085	--
总计		46699	100.000	7595			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-677-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:55:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45509	100.000	7378	2680	1.088	--
总计		45509	100.000	7378			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-678-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 01:59:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45083	100.000	7313	2687	1.078	--
总计		45083	100.000	7313			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-679-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:02:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45005	100.000	7298	2694	1.083	--
总计		45005	100.000	7298			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-680-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:06:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45358	100.000	7387	2710	1.087	--
总计		45358	100.000	7387			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-681-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:09:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:24　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47175	100.000	7674	2700	1.080	--
总计		47175	100.000	7674			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-682-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:12:56　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47237	100.000	7673	2699	1.078	--
总计		47237	100.000	7673			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-683-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:16:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45795	100.000	7395	2681	1.081	--
总计		45795	100.000	7395			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-684-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:19:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44272	100.000	7194	2709	1.081	--
总计		44272	100.000	7194			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-685-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:23:08　　实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:35　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46479	100.000	7534	2710	1.085	--
总计		46479	100.000	7534			

图265 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-686-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:26:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46902	100.000	7597	2697	1.090	--
总计		46902	100.000	7597			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-687-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:29:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47447	100.000	7684	2697	1.081	--
总计		47447	100.000	7684			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-688-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:33:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	47995	100.000	7785	2713	1.079	--
总计		47995	100.000	7785			

图268 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-689-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:36:45
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	48276	100.000	7818	2695	1.083	--
总计		48276	100.000	7818			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-11/26-690-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:40:09
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 09:56:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	45358	100.000	7381	2700	1.087	--
总计		45358	100.000	7381			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-12/26-691-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:43:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 10:31:17
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	97376	100.000	15756	2610	1.086	--
总计		97376	100.000	15756			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-12/26-692-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 02:46:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V3）: 2025/01/11 10:31:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	97532	100.000	15798	2616	1.088	--
总计		97532	100.000	15798			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2