




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-421-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:29:49
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-422-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:33:13
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	96641	100.000	15239	2552	1.061	--
总计		96641	100.000	15239			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-423-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:36:36
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	96159	100.000	15146	2554	1.070	--
总计		96159	100.000	15146			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-424-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:40:00
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	96856	100.000	15147	2532	1.070	--
总计		96856	100.000	15147			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-425-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:43:24
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	96480	100.000	15152	2537	1.070	--
总计		96480	100.000	15152			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-426-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:46:47
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	96494	100.000	15130	2548	1.078	--
总计		96494	100.000	15130			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-427-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:50:11
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	8251	100.000	1371	2733	1.088	--
总计		8251	100.000	1371			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-428-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:53:34
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	13391	100.000	2201	2723	1.079	--
总计		13391	100.000	2201			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-429-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 11:56:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	13577	100.000	2242	2734	1.094	--
总计		13577	100.000	2242			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-430-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:00:19
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:44:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	16219	100.000	2649	2758	1.066	--
总计		16219	100.000	2649			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-16/26-431-4 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:03:42
处理时间 (V4) : 2025/01/11 11:48:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	22695	100.000	3765	2738	1.067	--
总计		22695	100.000	3765			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-432-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:07:04
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	21555	100.000	3503	2694	1.088	--
总计		21555	100.000	3503			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-433-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:10:27
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	34777	100.000	5701	2737	1.088	--
总计		34777	100.000	5701			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-434-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:13:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	41626	100.000	6752	2715	1.089	--
总计		41626	100.000	6752			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-435-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:17:13
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	49184	100.000	7979	2708	1.081	--
总计		49184	100.000	7979			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-436-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:20:35
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	54130	100.000	8750	2713	1.082	--
总计		54130	100.000	8750			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-437-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:23:58
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	60994	100.000	9928	2720	1.070	--
总计		60994	100.000	9928			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-438-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:27:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	55729	100.000	8973	2701	1.080	--
总计		55729	100.000	8973			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-439-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:30:42
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	65675	100.000	10649	2705	1.072	--
总计		65675	100.000	10649			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-440-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:34:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	66693	100.000	10798	2711	1.083	--
总计		66693	100.000	10798			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-441-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:37:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	75329	100.000	12218	2708	1.075	--
总计		75329	100.000	12218			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-442-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:40:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	78261	100.000	12642	2705	1.081	--
总计		78261	100.000	12642			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-443-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:44:13
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	80479	100.000	13087	2721	1.073	--
总计		80479	100.000	13087			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-444-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:47:34
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	74536	100.000	12088	2717	1.078	--
总计		74536	100.000	12088			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-445-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:50:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	78441	100.000	12712	2708	1.082	--
总计		78441	100.000	12712			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-446-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:54:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	77148	100.000	12493	2698	1.072	--
总计		77148	100.000	12493			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-447-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 12:57:43
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	77376	100.000	12561	2705	1.079	--
总计		77376	100.000	12561			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-448-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:01:05
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87176	100.000	14111	2698	1.074	--
总计		87176	100.000	14111			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-449-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:04:28
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	84907	100.000	13815	2717	1.077	--
总计		84907	100.000	13815			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-450-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:07:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	84296	100.000	13656	2709	1.078	--
总计		84296	100.000	13656			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-451-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:11:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	88993	100.000	14428	2711	1.080	--
总计		88993	100.000	14428			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-452-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:14:37
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	87167	100.000	14106	2705	1.073	--
总计		87167	100.000	14106			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-453-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:18:00
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:45:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87015	100.000	14026	2690	1.076	--
总计		87015	100.000	14026			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-454-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:21:22
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	91777	100.000	14834	2710	1.075	--
总计		91777	100.000	14834			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-455-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:24:44
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	92275	100.000	14948	2703	1.076	--
总计		92275	100.000	14948			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-456-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:28:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	91619	100.000	14841	2707	1.078	--
总计		91619	100.000	14841			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-457-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:31:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	92999	100.000	15078	2705	1.071	--
总计		92999	100.000	15078			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-458-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:34:52
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	89535	100.000	14487	2700	1.070	--
总计		89535	100.000	14487			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-459-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:38:15
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	94596	100.000	15336	2715	1.077	--
总计		94596	100.000	15336			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-460-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:41:37
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	91478	100.000	14823	2710	1.075	--
总计		91478	100.000	14823			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-461-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:45:00
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	95516	100.000	15469	2714	1.068	--
总计		95516	100.000	15469			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-462-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:48:25
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	92698	100.000	15029	2713	1.075	--
总计		92698	100.000	15029			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-463-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:51:48
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	94537	100.000	15338	2712	1.077	--
总计		94537	100.000	15338			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-464-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:55:11
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	92843	100.000	15041	2712	1.074	--
总计		92843	100.000	15041			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-465-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 13:58:34
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	95255	100.000	15376	2710	1.079	--
总计		95255	100.000	15376			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-466-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:01:56
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	92760	100.000	15002	2709	1.074	--
总计		92760	100.000	15002			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-467-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:05:19
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	93599	100.000	15184	2715	1.069	--
总计		93599	100.000	15184			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-468-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:08:42
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	93757	100.000	15173	2711	1.072	--
总计		93757	100.000	15173			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-469-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:12:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	87280	100.000	14191	2729	1.074	--
总计		87280	100.000	14191			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-470-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:15:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	89883	100.000	14572	2726	1.075	--
总计		89883	100.000	14572			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-471-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:18:52
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	89179	100.000	14505	2721	1.076	--
总计		89179	100.000	14505			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-472-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:22:15
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	91472	100.000	14835	2723	1.071	--
总计		91472	100.000	14835			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-473-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:25:38
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87228	100.000	14197	2723	1.069	--
总计		87228	100.000	14197			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-474-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:29:01
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	91872	100.000	14886	2726	1.079	--
总计		91872	100.000	14886			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-475-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:32:23
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:46:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	90835	100.000	14747	2717	1.076	--
总计		90835	100.000	14747			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-476-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:35:46
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	88998	100.000	14462	2718	1.070	--
总计		88998	100.000	14462			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-477-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:39:08
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	91280	100.000	14825	2732	1.078	--
总计		91280	100.000	14825			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-478-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:42:31
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	90469	100.000	14666	2703	1.074	--
总计		90469	100.000	14666			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-479-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:45:54
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	91275	100.000	14838	2736	1.071	--
总计		91275	100.000	14838			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-480-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:49:16
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	90938	100.000	14730	2714	1.073	--
总计		90938	100.000	14730			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-481-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:52:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	89151	100.000	14471	2709	1.081	--
总计		89151	100.000	14471			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-482-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:56:02
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	88028	100.000	14291	2734	1.081	--
总计		88028	100.000	14291			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-483-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 14:59:25
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	83983	100.000	13634	2712	1.078	--
总计		83983	100.000	13634			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-484-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:02:47
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	87574	100.000	14229	2721	1.072	--
总计		87574	100.000	14229			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-485-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:06:09
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	91318	100.000	14789	2711	1.070	--
总计		91318	100.000	14789			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-486-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:09:32
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	91356	100.000	14817	2712	1.072	--
总计		91356	100.000	14817			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-487-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:12:55
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96873	100.000	15230	2536	1.080	--
总计		96873	100.000	15230			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-488-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:16:19
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96910	100.000	15228	2531	1.079	--
总计		96910	100.000	15228			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-489-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:19:49
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-490-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:23:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96833	100.000	15214	2536	1.078	--
总计		96833	100.000	15214			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-491-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:26:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	97115	100.000	15185	2537	1.077	--
总计		97115	100.000	15185			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-492-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:30:04
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	96926	100.000	15178	2532	1.080	--
总计		96926	100.000	15178			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-493-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:33:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	96429	100.000	15141	2533	1.081	--
总计		96429	100.000	15141			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-494-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:36:54
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96442	100.000	15179	2544	1.081	--
总计		96442	100.000	15179			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-495-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:40:18
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	14030	100.000	2268	2701	1.067	--
总计		14030	100.000	2268			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-496-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:43:42
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	17547	100.000	2891	2752	1.095	--
总计		17547	100.000	2891			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-497-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:47:05
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:47:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	12825	100.000	2097	2702	1.069	--
总计		12825	100.000	2097			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-498-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:50:28
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	18584	100.000	3071	2733	1.068	--
总计		18584	100.000	3071			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-499-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:53:52
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	15590	100.000	2585	2750	1.082	--
总计		15590	100.000	2585			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-500-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 15:57:16
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	11516	100.000	1871	2659	1.110	--
总计		11516	100.000	1871			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-501-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:00:40
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	33268	100.000	5429	2730	1.076	--
总计		33268	100.000	5429			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-502-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:04:03
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	32799	100.000	5374	2733	1.087	--
总计		32799	100.000	5374			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-503-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:07:27
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	33535	100.000	5436	2737	1.081	--
总计		33535	100.000	5436			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-504-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:10:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	35558	100.000	5761	2706	1.073	--
总计		35558	100.000	5761			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-505-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:14:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	33124	100.000	5454	2747	1.074	--
总计		33124	100.000	5454			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-506-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:17:37
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	31707	100.000	5238	2773	1.073	--
总计		31707	100.000	5238			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-507-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:21:01
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	39842	100.000	6500	2739	1.062	--
总计		39842	100.000	6500			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-508-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:24:26
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	40630	100.000	6614	2730	1.074	--
总计		40630	100.000	6614			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-509-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:27:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	40010	100.000	6559	2746	1.078	--
总计		40010	100.000	6559			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-510-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:31:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	41970	100.000	6841	2730	1.077	--
总计		41970	100.000	6841			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-511-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:34:38
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	40473	100.000	6548	2725	1.079	--
总计		40473	100.000	6548			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-512-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:38:02
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	40653	100.000	6619	2720	1.086	--
总计		40653	100.000	6619			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-513-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:41:26
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	41278	100.000	6733	2728	1.081	--
总计		41278	100.000	6733			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-514-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:44:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	40582	100.000	6625	2721	1.074	--
总计		40582	100.000	6625			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-515-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:48:15
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	41441	100.000	6727	2714	1.082	--
总计		41441	100.000	6727			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-516-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:51:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	43254	100.000	7053	2715	1.069	--
总计		43254	100.000	7053			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-517-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:55:03
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	42748	100.000	6992	2726	1.074	--
总计		42748	100.000	6992			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-518-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 16:58:27
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	43486	100.000	7083	2708	1.079	--
总计		43486	100.000	7083			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-519-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:01:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:48:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47144	100.000	7631	2714	1.080	--
总计		47144	100.000	7631			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-520-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:05:15
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47050	100.000	7647	2715	1.073	--
总计		47050	100.000	7647			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-521-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:08:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46517	100.000	7557	2703	1.076	--
总计		46517	100.000	7557			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-522-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:12:03
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46456	100.000	7580	2727	1.077	--
总计		46456	100.000	7580			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-523-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:15:27
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	46636	100.000	7586	2719	1.073	--
总计		46636	100.000	7586			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-524-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:18:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46632	100.000	7577	2713	1.079	--
总计		46632	100.000	7577			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-525-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:22:15
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	48522	100.000	7915	2734	1.079	--
总计		48522	100.000	7915			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-526-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:25:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	48235	100.000	7857	2725	1.078	--
总计		48235	100.000	7857			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-527-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:29:02
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49393	100.000	8037	2720	1.072	--
总计		49393	100.000	8037			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-528-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:32:26
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	49815	100.000	8110	2727	1.084	--
总计		49815	100.000	8110			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-529-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:35:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	48377	100.000	7872	2733	1.084	--
总计		48377	100.000	7872			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-530-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:39:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	50185	100.000	8160	2706	1.075	--
总计		50185	100.000	8160			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-531-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:42:38
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	49858	100.000	8056	2714	1.078	--
总计		49858	100.000	8056			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-532-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:46:02
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49556	100.000	8041	2700	1.073	--
总计		49556	100.000	8041			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-533-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:49:26
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49523	100.000	8041	2700	1.078	--
总计		49523	100.000	8041			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-534-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:52:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	49983	100.000	8142	2711	1.071	--
总计		49983	100.000	8142			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-535-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:56:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	50707	100.000	8206	2713	1.075	--
总计		50707	100.000	8206			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-536-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 17:59:38
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49481	100.000	8038	2711	1.081	--
总计		49481	100.000	8038			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-537-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:03:02
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51350	100.000	8330	2710	1.080	--
总计		51350	100.000	8330			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-538-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:06:26
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	50312	100.000	8141	2701	1.074	--
总计		50312	100.000	8141			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-539-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:09:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	49236	100.000	8037	2722	1.076	--
总计		49236	100.000	8037			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-540-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:13:16
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	50894	100.000	8235	2699	1.076	--
总计		50894	100.000	8235			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-541-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:16:40
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:49:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52044	100.000	8408	2695	1.080	--
总计		52044	100.000	8408			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-542-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:20:04
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52203	100.000	8448	2711	1.081	--
总计		52203	100.000	8448			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-543-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:23:27
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	50209	100.000	8172	2705	1.091	--
总计		50209	100.000	8172			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-544-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:26:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51368	100.000	8345	2713	1.079	--
总计		51368	100.000	8345			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-545-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:30:13
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52899	100.000	8524	2703	1.082	--
总计		52899	100.000	8524			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-546-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:33:36
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52746	100.000	8582	2714	1.079	--
总计		52746	100.000	8582			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-547-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:36:59
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52360	100.000	8529	2714	1.076	--
总计		52360	100.000	8529			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-548-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:40:22
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52496	100.000	8469	2698	1.074	--
总计		52496	100.000	8469			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-549-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:43:45
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53578	100.000	8710	2712	1.071	--
总计		53578	100.000	8710			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-550-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:47:08
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51499	100.000	8416	2724	1.075	--
总计		51499	100.000	8416			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-551-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:50:32
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	52162	100.000	8515	2726	1.081	--
总计		52162	100.000	8515			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-552-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:53:55
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53641	100.000	8694	2713	1.068	--
总计		53641	100.000	8694			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-553-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 18:57:19
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	53005	100.000	8564	2705	1.080	--
总计		53005	100.000	8564			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-554-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:00:42
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53011	100.000	8605	2722	1.077	--
总计		53011	100.000	8605			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-555-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:04:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	96900	100.000	15194	2531	1.078	--
总计		96900	100.000	15194			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-556-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:07:30
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96720	100.000	15184	2525	1.080	--
总计		96720	100.000	15184			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-557-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:10:53
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-558-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:14:16
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	97074	100.000	15183	2531	1.082	--
总计		97074	100.000	15183			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-559-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:17:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	97007	100.000	15172	2528	1.075	--
总计		97007	100.000	15172			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-560-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:21:02
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96403	100.000	15162	2537	1.078	--
总计		96403	100.000	15162			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-561-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:24:25
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	96681	100.000	15180	2524	1.086	--
总计		96681	100.000	15180			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-562-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:27:48
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96803	100.000	15174	2523	1.083	--
总计		96803	100.000	15174			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-563-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:31:11
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:50:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	13936	100.000	2297	2766	1.116	--
总计		13936	100.000	2297			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-564-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:34:33
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	21226	100.000	3504	2714	1.063	--
总计		21226	100.000	3504			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-565-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:37:55
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	17913	100.000	2978	2744	1.094	--
总计		17913	100.000	2978			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-566-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:41:17
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	15023	100.000	2471	2748	1.045	--
总计		15023	100.000	2471			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-567-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:44:39
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	19536	100.000	3254	2768	1.061	--
总计		19536	100.000	3254			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-568-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:48:01
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	14986	100.000	2487	2751	1.068	--
总计		14986	100.000	2487			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-569-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:51:23
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	33223	100.000	5440	2731	1.078	--
总计		33223	100.000	5440			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-570-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:54:45
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	36884	100.000	5968	2717	1.080	--
总计		36884	100.000	5968			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-571-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 19:58:07
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	34140	100.000	5575	2707	1.076	--
总计		34140	100.000	5575			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-572-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:01:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	33037	100.000	5385	2703	1.076	--
总计		33037	100.000	5385			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-573-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:04:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	37783	100.000	6122	2706	1.082	--
总计		37783	100.000	6122			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-574-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:08:12
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	32417	100.000	5275	2728	1.065	--
总计		32417	100.000	5275			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-575-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:11:34
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	41061	100.000	6709	2722	1.075	--
总计		41061	100.000	6709			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-576-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:14:56
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42905	100.000	6990	2743	1.071	--
总计		42905	100.000	6990			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-577-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:18:19
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	40486	100.000	6584	2701	1.087	--
总计		40486	100.000	6584			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-578-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:21:41
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	41588	100.000	6737	2710	1.065	--
总计		41588	100.000	6737			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-579-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:25:03
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	42096	100.000	6826	2705	1.076	--
总计		42096	100.000	6826			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-580-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:28:25
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	40004	100.000	6498	2710	1.084	--
总计		40004	100.000	6498			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-581-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:31:47
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	43235	100.000	7015	2715	1.075	--
总计		43235	100.000	7015			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-582-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:35:09
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	44229	100.000	7182	2709	1.078	--
总计		44229	100.000	7182			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-583-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:38:36
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42661	100.000	6919	2699	1.080	--
总计		42661	100.000	6919			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-584-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:41:58
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42838	100.000	6993	2691	1.084	--
总计		42838	100.000	6993			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-585-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:45:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:51:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	46735	100.000	7550	2706	1.075	--
总计		46735	100.000	7550			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-586-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:48:42
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	43833	100.000	7107	2706	1.075	--
总计		43833	100.000	7107			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-587-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:52:04
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47662	100.000	7699	2702	1.078	--
总计		47662	100.000	7699			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-588-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:55:25
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	49661	100.000	8022	2694	1.075	--
总计		49661	100.000	8022			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-589-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 20:58:46
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47822	100.000	7750	2701	1.078	--
总计		47822	100.000	7750			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-590-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:02:07
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	47804	100.000	7798	2718	1.075	--
总计		47804	100.000	7798			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-591-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:05:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	48491	100.000	7851	2702	1.077	--
总计		48491	100.000	7851			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-592-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:08:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	41898	100.000	6793	2693	1.072	--
总计		41898	100.000	6793			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-593-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:12:12
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	50601	100.000	8247	2717	1.084	--
总计		50601	100.000	8247			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-594-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:15:34
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	49540	100.000	8005	2699	1.083	--
总计		49540	100.000	8005			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-595-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:18:56
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51080	100.000	8314	2715	1.080	--
总计		51080	100.000	8314			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-596-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:22:18
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	50454	100.000	8235	2706	1.077	--
总计		50454	100.000	8235			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-597-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:25:40
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	50399	100.000	8187	2701	1.087	--
总计		50399	100.000	8187			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-598-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:29:01
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51800	100.000	8417	2714	1.076	--
总计		51800	100.000	8417			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-599-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:32:23
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	48941	100.000	7910	2702	1.083	--
总计		48941	100.000	7910			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-600-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:35:45
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	50016	100.000	8091	2689	1.076	--
总计		50016	100.000	8091			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-601-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:39:07
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	51348	100.000	8294	2700	1.081	--
总计		51348	100.000	8294			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-602-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:42:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51158	100.000	8277	2706	1.071	--
总计		51158	100.000	8277			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-603-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:45:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	51757	100.000	8329	2683	1.078	--
总计		51757	100.000	8329			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-604-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:49:11
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	49990	100.000	8082	2699	1.074	--
总计		49990	100.000	8082			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-605-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:52:34
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51168	100.000	8277	2705	1.075	--
总计		51168	100.000	8277			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-606-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:55:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:52:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	52521	100.000	8467	2701	1.074	--
总计		52521	100.000	8467			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-607-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 21:59:21
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52103	100.000	8357	2696	1.069	--
总计		52103	100.000	8357			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-608-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:02:43
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52236	100.000	8439	2701	1.073	--
总计		52236	100.000	8439			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-609-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:06:05
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51128	100.000	8307	2715	1.084	--
总计		51128	100.000	8307			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-610-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:09:27
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51436	100.000	8312	2709	1.073	--
总计		51436	100.000	8312			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-611-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:12:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	51845	100.000	8369	2690	1.077	--
总计		51845	100.000	8369			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-612-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:16:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	51304	100.000	8347	2720	1.075	--
总计		51304	100.000	8347			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-613-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:19:38
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	51050	100.000	8240	2713	1.081	--
总计		51050	100.000	8240			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-614-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:23:01
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52208	100.000	8393	2702	1.076	--
总计		52208	100.000	8393			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-615-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:26:24
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52505	100.000	8546	2712	1.073	--
总计		52505	100.000	8546			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-616-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:29:47
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52309	100.000	8458	2711	1.070	--
总计		52309	100.000	8458			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-617-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:33:10
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	52820	100.000	8548	2703	1.085	--
总计		52820	100.000	8548			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-618-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:36:33
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	53158	100.000	8599	2701	1.081	--
总计		53158	100.000	8599			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-619-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:39:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	53651	100.000	8663	2691	1.081	--
总计		53651	100.000	8663			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-620-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:43:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52908	100.000	8597	2714	1.077	--
总计		52908	100.000	8597			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-621-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:46:43
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	53218	100.000	8663	2716	1.074	--
总计		53218	100.000	8663			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-622-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:50:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52496	100.000	8514	2723	1.070	--
总计		52496	100.000	8514			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-623-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:53:28
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	97095	100.000	15225	2524	1.085	--
总计		97095	100.000	15225			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-624-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 22:56:50
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96427	100.000	15205	2538	1.082	--
总计		96427	100.000	15205			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-625-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:00:13
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-626-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:03:37
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96514	100.000	15162	2527	1.086	--
总计		96514	100.000	15162			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-627-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:07:00
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96834	100.000	15178	2523	1.086	--
总计		96834	100.000	15178			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-628-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:10:24
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:53:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96503	100.000	15177	2530	1.080	--
总计		96503	100.000	15177			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-629-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:13:48
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96430	100.000	15156	2535	1.086	--
总计		96430	100.000	15156			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-630-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:17:12
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	96366	100.000	15161	2533	1.085	--
总计		96366	100.000	15161			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-631-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:20:35
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	19121	100.000	3122	2692	1.072	--
总计		19121	100.000	3122			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-632-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:23:58
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	18655	100.000	3007	2686	1.069	--
总计		18655	100.000	3007			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-633-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:27:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	19147	100.000	3172	2725	1.062	--
总计		19147	100.000	3172			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-634-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/10 23:30:43

处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	17309	100.000	2828	2689	1.058	--
总计		17309	100.000	2828			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-635-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:34:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	15427	100.000	2500	2672	1.076	--
总计		15427	100.000	2500			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-636-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:37:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	14561	100.000	2403	2713	1.072	--
总计		14561	100.000	2403			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-637-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:40:52
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	34064	100.000	5518	2700	1.079	--
总计		34064	100.000	5518			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-638-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:44:15
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	32905	100.000	5366	2699	1.063	--
总计		32905	100.000	5366			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-639-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:47:37
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	33835	100.000	5506	2718	1.078	--
总计		33835	100.000	5506			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱 温: 35°C

数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-640-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 20 μl

进样时间: 2025/01/10 23:50:59

处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	34175	100.000	5594	2707	1.080	--
总计		34175	100.000	5594			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-641-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:54:22
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	33070	100.000	5364	2682	1.064	--
总计		33070	100.000	5364			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-642-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/10 23:57:45
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	33892	100.000	5485	2712	1.068	--
总计		33892	100.000	5485			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-643-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:01:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	39910	100.000	6505	2701	1.070	--
总计		39910	100.000	6505			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-644-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:04:29
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	39280	100.000	6351	2702	1.075	--
总计		39280	100.000	6351			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-645-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:07:52
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	40301	100.000	6497	2707	1.084	--
总计		40301	100.000	6497			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-646-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:11:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	39768	100.000	6447	2697	1.094	--
总计		39768	100.000	6447			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-647-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:14:36
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	38328	100.000	6233	2719	1.082	--
总计		38328	100.000	6233			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-648-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:17:58
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	39244	100.000	6369	2705	1.085	--
总计		39244	100.000	6369			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-649-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:21:21
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	42399	100.000	6858	2706	1.084	--
总计		42399	100.000	6858			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-650-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:24:43
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:54:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	41084	100.000	6612	2685	1.078	--
总计		41084	100.000	6612			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-651-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:28:05
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	40386	100.000	6541	2694	1.077	--
总计		40386	100.000	6541			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-652-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:31:28
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	43334	100.000	6985	2685	1.075	--
总计		43334	100.000	6985			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-653-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:34:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	41501	100.000	6735	2695	1.088	--
总计		41501	100.000	6735			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-654-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:38:14
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	42651	100.000	6880	2676	1.091	--
总计		42651	100.000	6880			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-655-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:41:36
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45484	100.000	7336	2703	1.077	--
总计		45484	100.000	7336			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-656-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:44:59
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45353	100.000	7344	2693	1.069	--
总计		45353	100.000	7344			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-657-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:48:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	43040	100.000	6953	2677	1.075	--
总计		43040	100.000	6953			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-658-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:51:43
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	45658	100.000	7434	2704	1.083	--
总计		45658	100.000	7434			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-659-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:55:06
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45344	100.000	7328	2693	1.085	--
总计		45344	100.000	7328			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-660-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 00:58:28
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	43447	100.000	6974	2685	1.081	--
总计		43447	100.000	6974			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-661-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:01:51
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	46498	100.000	7522	2687	1.078	--
总计		46498	100.000	7522			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-662-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:05:13
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45373	100.000	7336	2704	1.079	--
总计		45373	100.000	7336			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-663-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:08:35
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	44828	100.000	7225	2697	1.077	--
总计		44828	100.000	7225			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-664-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:11:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46729	100.000	7559	2700	1.080	--
总计		46729	100.000	7559			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-665-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:15:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	45959	100.000	7399	2682	1.088	--
总计		45959	100.000	7399			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-666-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:18:42
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44597	100.000	7240	2705	1.080	--
总计		44597	100.000	7240			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-667-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:22:04
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	45424	100.000	7345	2687	1.075	--
总计		45424	100.000	7345			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-668-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:25:26
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	44257	100.000	7155	2691	1.086	--
总计		44257	100.000	7155			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-669-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:28:49
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44165	100.000	7108	2672	1.067	--
总计		44165	100.000	7108			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-670-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:32:12
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45931	100.000	7388	2697	1.079	--
总计		45931	100.000	7388			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-671-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:35:35
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:55:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45963	100.000	7397	2676	1.080	--
总计		45963	100.000	7397			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-672-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:38:59
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44620	100.000	7223	2684	1.082	--
总计		44620	100.000	7223			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-673-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:42:22
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45485	100.000	7342	2688	1.083	--
总计		45485	100.000	7342			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-674-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:45:46
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46095	100.000	7470	2706	1.087	--
总计		46095	100.000	7470			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-675-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:49:09
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	46561	100.000	7458	2668	1.084	--
总计		46561	100.000	7458			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-676-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:52:33
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46699	100.000	7595	2710	1.085	--
总计		46699	100.000	7595			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-677-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:55:56
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45509	100.000	7378	2680	1.088	--
总计		45509	100.000	7378			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-678-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 01:59:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45083	100.000	7313	2687	1.078	--
总计		45083	100.000	7313			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-679-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:02:44
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	45005	100.000	7298	2694	1.083	--
总计		45005	100.000	7298			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-680-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:06:08
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45358	100.000	7387	2710	1.087	--
总计		45358	100.000	7387			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-681-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:09:32
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47175	100.000	7674	2700	1.080	--
总计		47175	100.000	7674			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-682-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:12:56
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47237	100.000	7673	2699	1.078	--
总计		47237	100.000	7673			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-683-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:16:20
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	45795	100.000	7395	2681	1.081	--
总计		45795	100.000	7395			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-684-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:19:44
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	44272	100.000	7194	2709	1.081	--
总计		44272	100.000	7194			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-685-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:23:08
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46479	100.000	7534	2710	1.085	--
总计		46479	100.000	7534			

图265 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-686-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:26:33
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	46902	100.000	7597	2697	1.090	--
总计		46902	100.000	7597			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-687-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:29:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	47447	100.000	7684	2697	1.081	--
总计		47447	100.000	7684			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-688-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:33:21
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	47995	100.000	7785	2713	1.079	--
总计		47995	100.000	7785			

图268 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-689-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:36:45
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	48276	100.000	7818	2695	1.083	--
总计		48276	100.000	7818			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-11/26-690-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:40:09
处理时间 (V3): 2025/01/11 09:56:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	45358	100.000	7381	2700	1.087	--
总计		45358	100.000	7381			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-12/26-691-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:43:33
处理时间 (V3): 2025/01/11 10:31:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	97376	100.000	15756	2610	1.086	--
总计		97376	100.000	15756			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-12/26-692-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250110-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 02:46:57
处理时间 (V3): 2025/01/11 10:31:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.052	97532	100.000	15798	2616	1.088	--
总计		97532	100.000	15798			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2