玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	98340	98466	98410	98654	98404	98455	0.13
2	11.19	97717	97958				97838	0.18

单位质量响应值		RSD%	判断
8830.04	8743.34	0.70	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0083N01批-pH1.2

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	12083	-	12083	12.451	11.58	4.94	12.45	11.58	4.95
	2	11190	-	11190	11.531			11.53		
	3	11460	-	11460	11.809			11.81		
	4	11208	-	11208	11.549			11.55		
	5	10366	-	10366	10.682			10.68		
	6	11126	-	11126	11.465			11.46		
10min	1	33009	-	33009	34.014	33.04	4.10	34.15	33.16	4.09
	2	32935	-	32935	33.938			34.07		
	3	32624	-	32624	33.617			33.75		
	4	31234	-	31234	32.185			32.31		
	5	32819	-	32819	33.818			33.94		
	6	29741	-	29741	30.647			30.77		
15min	1	46812	-	46812	48.237	47.28	2.33	48.75	47.78	2.32
	2	46675	-	46675	48.096			48.60		
	3	45983	-	45983	47.383			47.89		
	4	45039	-	45039	46.410			46.90		
	5	44174	-	44174	45.519			46.01		
	6	46645	-	46645	48.065			48.53		
20min	1	54099	-	54099	55.746	55.45	1.22	56.80	56.47	1.22
	2	54600	-	54600	56.262			57.30		
	3	53786	-	53786	55.424			56.45		
	4	54297	-	54297	55.950			56.95		
	5	52961	-	52961	54.573			55.57		
	6	53129	-	53129	54.747			55.75		
30min	1	63012	-	63012	64.931	64.94	1.30	66.60	66.58	1.30
	2	63403	-	63403	65.333			67.00		
	3	63741	-	63741	65.682			67.33		
	4	63826	-	63826	65.769			67.39		
	5	61724	-	61724	63.603			65.21		
	6	62421	-	62421	64.322			65.93		
45min	1	70546	-	70546	72.694	71.68	1.58	75.09	74.04	1.57
	2	70019	-	70019	72.151			74.54		
	3	70521	-	70521	72.668			75.04		
	4	68777	-	68777	70.871			73.23		
	5	67758	-	67758	69.821			72.13		
	6	69779	-	69779	71.904			74.23		
60min	1	74777	-	74777	77.054	76.68	1.00	80.25	79.84	0.98
	2	75294	-	75294	77.586			80.78		
	3	73918	-	73918	76.169			79.35		
	4	74644	-	74644	76.917			80.06		
	5	74672	-	74672	76.946			80.03		
	6	73201	-	73201	75.430			78.55		
90min	1	80614	-	80614	83.068	82.01	1.15	87.13	86.02	1.14
	2	80698	-	80698	83.155			87.21		
	3	79279	-	79279	81.693			85.72		
	4	78695	-	78695	81.091			85.09		
	5	79643	-	79643	82.068			86.01		
	6	78601	-	78601	80.994			84.96		
120min	1	82740	-	82740	85.259	85.10	1.15	90.24	90.02	1.09
	2	81346	-	81346	83.823			88.80		
	3	83686	-	83686	86.234			91.17		
	4	83638	-	83638	86.185			91.08		
	5	81998	-	81998	84.495			89.35		
	6	82095	-	82095	84.595			89.46		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	84247	-	84247	86.812	87.84	0.90	92.74	93.71	0.83
	2	85223	-	85223	87.818			93.73		
	3	86365	-	86365	88.995			94.89		
	4	84915	-	84915	87.500			93.36		
	5	84859	-	84859	87.443			93.24		
	6	85867	-	85867	88.481			94.28		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	97785	98104	97867	97996	97955	97941	0.13
2	11.19	99242	98989				99116	0.19

单位质量响应值		RSD%	判断
8783.95	8857.55	0.60	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0083N01批-pH4.5

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	15564	-	15564	15.976	15.64	6.50	15.98	15.64	6.49
	2	16702	-	16702	17.144			17.14		
	3	14172	-	14172	14.547			14.55		
	4	14061	-	14061	14.433			14.43		
	5	15562	-	15562	15.974			15.97		
	6	15387	-	15387	15.794			15.79		
10min	1	42883	-	42883	44.018	41.81	6.80	44.20	41.98	6.78
	2	39721	-	39721	40.772			40.96		
	3	36282	-	36282	37.242			37.40		
	4	40857	-	40857	41.938			42.10		
	5	40348	-	40348	41.416			41.59		
	6	44289	-	44289	45.461			45.64		
15min	1	55077	-	55077	56.534	57.41	3.30	57.20	58.04	3.25
	2	57698	-	57698	59.225			59.87		
	3	54793	-	54793	56.243			56.82		
	4	56854	-	56854	58.358			58.98		
	5	57885	-	57885	59.417			60.05		
	6	53247	-	53247	54.656			55.34		
20min	1	63261	-	63261	64.935	65.42	2.09	66.23	66.70	2.10
	2	63627	-	63627	65.311			66.61		
	3	61503	-	61503	63.130			64.33		
	4	63920	-	63920	65.611			66.89		
	5	64826	-	64826	66.541			67.84		
	6	65286	-	65286	67.014			68.30		
30min	1	71577	-	71577	73.471	73.40	1.40	75.49	75.41	1.35
	2	72560	-	72560	74.480			76.51		
	3	72126	-	72126	74.035			75.94		
	4	70288	-	70288	72.148			74.15		
	5	70289	-	70289	72.149			74.19		
	6	72234	-	72234	74.145			76.18		
45min	1	74938	-	74938	76.921	80.67	2.77	79.75	83.48	2.67
	2	79075	-	79075	81.167			84.02		
	3	79833	-	79833	81.945			84.67		
	4	77964	-	77964	80.027			82.83		
	5	78300	-	78300	80.372			83.21		
	6	81418	-	81418	83.572			86.43		
60min	1	80234	-	80234	82.357	83.51	1.86	86.04	87.22	1.77
	2	80937	-	80937	83.079			86.84		
	3	83777	-	83777	85.994			89.63		
	4	79455	-	79455	81.557			85.25		
	5	81933	-	81933	84.101			87.83		
	6	81781	-	81781	83.945			87.73		
90min	1	85180	-	85180	87.434	87.56	1.94	92.04	92.20	1.84
	2	86258	-	86258	88.541			93.22		
	3	85495	-	85495	87.757			92.35		
	4	86058	-	86058	88.335			92.94		
	5	82118	-	82118	84.291			88.96		
	6	86685	-	86685	88.979			93.70		
120min	1	86855	-	86855	89.153	89.27	2.00	94.73	94.88	1.92
	2	87064	-	87064	89.368			95.03		
	3	87735	-	87735	90.057			95.62		
	4	84367	-	84367	86.599			92.18		
	5	86157	-	86157	88.437			94.04		
	6	89616	-	89616	91.987			97.69		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	86970	-	86970	89.271	90.99	1.59	95.84	97.60	1.54
	2	89560	-	89560	91.930			98.59		
	3	89051	-	89051	91.407			97.97		
	4	86857	-	86857	89.155			95.70		
	5	89196	-	89196	91.556			98.14		
	6	90250	-	90250	92.638			99.37		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

玛巴洛沙韦片项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	115240801	对照品来源	原料	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	100.6	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	2500
标示量(mg)	20	供试品稀释倍数	5	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	$A_{平均}$	RSD%
1	11.15	99311	99450	99134	98894	99100	99178	0.22
2	11.19	99632	99822				99727	0.14

单位质量响应值		RSD%	判断
8894.89	8912.15	0.14	数据可信



操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

供试品溶液-B0083N01批-pH6.8

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	16857	-	16857	17.142	18.14	7.92	17.14	18.14	7.92
	2	16763	-	16763	17.046			17.05		
	3	20512	-	20512	20.859			20.86		
	4	17130	-	17130	17.420			17.42		
	5	17585	-	17585	17.882			17.88		
	6	18196	-	18196	18.504			18.50		
10min	1	42022	-	42022	42.732	43.03	5.99	42.92	43.24	5.99
	2	39757	-	39757	40.429			40.62		
	3	46336	-	46336	47.119			47.35		
	4	43821	-	43821	44.562			44.76		
	5	39674	-	39674	40.345			40.54		
	6	42297	-	42297	43.012			43.22		
15min	1	57687	-	57687	58.662	58.63	2.31	59.33	59.31	2.34
	2	55611	-	55611	56.551			57.19		
	3	59148	-	59148	60.148			60.90		
	4	59039	-	59039	60.037			60.73		
	5	56984	-	56984	57.947			58.59		
	6	57488	-	57488	58.460			59.14		
20min	1	63845	-	63845	64.924	65.48	2.31	66.24	66.81	2.30
	2	63645	-	63645	64.721			65.99		
	3	65526	-	65526	66.634			68.06		
	4	66432	-	66432	67.555			68.91		
	5	64651	-	64651	65.744			67.03		
	6	62248	-	62248	63.300			64.63		
30min	1	73242	-	73242	74.480	72.18	2.57	76.52	74.24	2.53
	2	68515	-	68515	69.673			71.66		
	3	72326	-	72326	73.548			75.71		
	4	69882	-	69882	71.063			73.17		
	5	72039	-	72039	73.257			75.28		
	6	69853	-	69853	71.034			73.07		
45min	1	76337	-	76337	77.627	78.91	2.40	80.49	81.77	2.38
	2	75188	-	75188	76.459			79.22		
	3	79226	-	79226	80.565			83.55		
	4	78461	-	78461	79.787			82.68		
	5	79883	-	79883	81.233			84.07		
	6	76480	-	76480	77.773			80.60		
60min	1	80932	-	80932	82.300	81.31	1.56	86.03	85.05	1.57
	2	78707	-	78707	80.037			83.65		
	3	81520	-	81520	82.898			86.77		
	4	79330	-	79330	80.671			84.45		
	5	80674	-	80674	82.038			85.78		
	6	78593	-	78593	79.921			83.61		
90min	1	80954	-	80954	82.322	83.48	3.43	86.97	88.12	3.30
	2	78531	-	78531	79.858			84.36		
	3	83381	-	83381	84.790			89.59		
	4	80128	-	80128	81.482			86.16		
	5	86455	-	86455	87.916			92.57		
	6	83113	-	83113	84.518			89.10		
120min	1	82582	-	82582	83.978	86.27	2.22	89.54	91.84	2.11
	2	85488	-	85488	86.933			92.32		
	3	85189	-	85189	86.629			92.37		
	4	84073	-	84073	85.494			91.08		
	5	88014	-	88014	89.502			95.13		
	6	83686	-	83686	85.100			90.62		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

时间(分钟)	样品	A_1	A_2	$A_{平均}$	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶出量(%)	平均(%)	RSD%
极限	1	86140	-	86140	87.596	87.85	2.10	94.09	94.37	1.87
	2	89902	-	89902	91.422			97.77		
	3	85605	-	85605	87.052			93.75		
	4	84689	-	84689	86.120			92.65		
	5	86252	-	86252	87.710			94.33		
	6	85728	-	85728	87.177			93.64		

操作者: 谢超君

日　期: 2025-01-20

复核者:

日　期:

未审阅版本

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-652-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 13:59:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-653-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:02:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	98340	100.000	15795	2562	1.173	--
总计		98340	100.000	15795			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-654-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:06:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	98466	100.000	15799	2559	1.177	--
总计		98466	100.000	15799			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-655-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:09:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	98410	100.000	15801	2555	1.175	--
总计		98410	100.000	15801			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-656-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:13:08
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.046	98654	100.000	15805	2562	1.175	--
总计		98654	100.000	15805			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-657-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:16:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	98404	100.000	15802	2557	1.179	--
总计		98404	100.000	15802			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-658-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:19:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:35:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	12083	100.000	1987	2782	1.125	--
总计		12083	100.000	1987			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-659-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:23:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:02
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	11190	100.000	1880	2850	1.139	--
总计		11190	100.000	1880			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-660-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:26:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:05　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	11460	100.000	1872	2768	1.092	--
总计		11460	100.000	1872			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-661-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:30:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	11208	100.000	1876	2824	1.128	--
总计		11208	100.000	1876			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-662-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:33:29　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	10366	100.000	1703	2783	1.131	--
总计		10366	100.000	1703			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-663-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:36:52　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	11126	100.000	1837	2818	1.184	--
总计		11126	100.000	1837			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-664-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:40:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:16　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	33009	100.000	5468	2769	1.171	--
总计		33009	100.000	5468			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-665-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:43:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:19　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	32935	100.000	5491	2804	1.182	--
总计		32935	100.000	5491			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-666-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:47:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:22
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	32624	100.000	5436	2785	1.168	--
总计		32624	100.000	5436			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-667-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:50:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	31234	100.000	5215	2803	1.170	--
总计		31234	100.000	5215			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-668-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:53:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	32819	100.000	5451	2781	1.189	--
总计		32819	100.000	5451			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-669-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 14:57:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	29741	100.000	5005	2799	1.160	--
总计		29741	100.000	5005			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-670-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:00:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:33
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46812	100.000	7738	2789	1.177	--
总计		46812	100.000	7738			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-671-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:03:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	46675	100.000	7765	2792	1.183	--
总计		46675	100.000	7765			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-672-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:07:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:38　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	45983	100.000	7689	2810	1.179	--
总计		45983	100.000	7689			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-673-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:10:43
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:41
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	45039	100.000	7513	2788	1.177	--
总计		45039	100.000	7513			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-674-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:14:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	44174	100.000	7357	2790	1.175	--
总计		44174	100.000	7357			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-675-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:17:29
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	46645	100.000	7758	2797	1.172	--
总计		46645	100.000	7758			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-676-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:20:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	54099	100.000	8983	2778	1.177	--
总计		54099	100.000	8983			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-677-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:24:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	54600	100.000	9072	2787	1.180	--
总计		54600	100.000	9072			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-678-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:27:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53786	100.000	8950	2791	1.180	--
总计		53786	100.000	8950			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-679-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:30:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:36:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	54297	100.000	9050	2798	1.175	--
总计		54297	100.000	9050			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-680-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:34:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	52961	100.000	8827	2785	1.183	--
总计		52961	100.000	8827			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-681-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:37:44
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:05
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	53129	100.000	8815	2768	1.176	--
总计		53129	100.000	8815			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-682-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:41:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	63012	100.000	10481	2786	1.180	--
总计		63012	100.000	10481			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-683-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:44:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	63403	100.000	10543	2789	1.177	--
总计		63403	100.000	10543			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-684-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:47:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	63741	100.000	10605	2778	1.179	--
总计		63741	100.000	10605			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-685-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:51:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	63826	100.000	10610	2791	1.184	--
总计		63826	100.000	10610			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-686-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:54:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	61724	100.000	10273	2787	1.187	--
总计		61724	100.000	10273			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-687-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 15:58:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	62421	100.000	10377	2791	1.189	--
总计		62421	100.000	10377			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-688-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:01:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	70546	100.000	11785	2822	1.181	--
总计		70546	100.000	11785			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-689-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:04:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:27
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	70019	100.000	11680	2812	1.183	--
总计		70019	100.000	11680			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-690-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:08:10
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	70521	100.000	11815	2820	1.181	--
总计		70521	100.000	11815			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-691-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:11:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	68777	100.000	11441	2799	1.182	--
总计		68777	100.000	11441			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-692-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:14:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	67758	100.000	11258	2790	1.185	--
总计		67758	100.000	11258			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-693-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:18:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	69779	100.000	11645	2800	1.187	--
总计		69779	100.000	11645			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-694-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:21:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	74777	100.000	12436	2793	1.187	--
总计		74777	100.000	12436			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-695-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:25:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	75294	100.000	12523	2792	1.179	--
总计		75294	100.000	12523			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-696-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:28:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	73918	100.000	12356	2806	1.182	--
总计		73918	100.000	12356			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-697-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:31:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	74644	100.000	12444	2798	1.187	--
总计		74644	100.000	12444			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-698-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:35:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	74672	100.000	12500	2819	1.180	--
总计		74672	100.000	12500			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-699-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:38:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	73201	100.000	12178	2803	1.187	--
总计		73201	100.000	12178			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-700-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:41:59
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:37:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	80614	100.000	13400	2805	1.183	--
总计		80614	100.000	13400			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-701-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:45:23　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:01　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	80698	100.000	13479	2801	1.185	--
总计		80698	100.000	13479			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-702-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:48:46　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	79279	100.000	13232	2810	1.181	--
总计		79279	100.000	13232			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-703-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:52:10　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	78695	100.000	13126	2807	1.185	--
总计		78695	100.000	13126			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-704-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:55:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	79643	100.000	13248	2798	1.186	--
总计		79643	100.000	13248			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-705-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 16:58:57　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:13　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	78601	100.000	13069	2792	1.184	--
总计		78601	100.000	13069			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-706-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:02:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	82740	100.000	13790	2814	1.185	--
总计		82740	100.000	13790			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-707-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:05:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:18　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	81346	100.000	13522	2793	1.186	--
总计		81346	100.000	13522			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-708-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:09:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	83686	100.000	13976	2807	1.188	--
总计		83686	100.000	13976			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-709-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:12:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	83638	100.000	13906	2792	1.186	--
总计		83638	100.000	13906			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-710-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:15:53　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:26　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	81998	100.000	13647	2797	1.184	--
总计		81998	100.000	13647			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-711-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:19:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:29
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	82095	100.000	13696	2799	1.185	--
总计		82095	100.000	13696			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-712-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:22:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	84247	100.000	14061	2799	1.184	--
总计		84247	100.000	14061			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-713-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:26:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	85223	100.000	14188	2791	1.190	--
总计		85223	100.000	14188			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-714-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:29:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:37
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	86365	100.000	14364	2793	1.185	--
总计		86365	100.000	14364			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-715-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:32:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:40
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	84915	100.000	14126	2789	1.184	--
总计		84915	100.000	14126			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-716-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:36:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	84859	100.000	14092	2793	1.185	--
总计		84859	100.000	14092			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-717-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:39:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	85867	100.000	14309	2795	1.183	--
总计		85867	100.000	14309			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-718-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:42:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	97717	100.000	15703	2568	1.181	--
总计		97717	100.000	15703			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-719-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:46:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	97958	100.000	15695	2557	1.184	--
总计		97958	100.000	15695			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-720-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:49:46
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-721-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:53:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:38:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	97785	100.000	15689	2560	1.179	--
总计		97785	100.000	15689			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-722-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 17:56:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	98104	100.000	15698	2550	1.182	--
总计		98104	100.000	15698			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-723-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:00:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	97867	100.000	15679	2556	1.181	--
总计		97867	100.000	15679			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-724-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:03:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	97996	100.000	15689	2555	1.184	--
总计		97996	100.000	15689			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-725-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:06:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:12　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.045	97955	100.000	15677	2551	1.181	--
总计		97955	100.000	15677			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-726-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:10:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	15564	100.000	2633	2840	1.147	--
总计		15564	100.000	2633			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-727-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:13:39
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	16702	100.000	2764	2786	1.198	--
总计		16702	100.000	2764			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-728-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:17:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:21
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	14172	100.000	2363	2829	1.175	--
总计		14172	100.000	2363			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-729-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:20:26
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	14061	100.000	2393	2886	1.138	--
总计		14061	100.000	2393			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-730-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:23:50　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	15562	100.000	2600	2819	1.168	--
总计		15562	100.000	2600			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-731-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:27:14
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:30
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	15387	100.000	2540	2770	1.174	--
总计		15387	100.000	2540			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-732-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:30:38　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:33　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	42883	100.000	7163	2811	1.180	--
总计		42883	100.000	7163			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-733-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:34:03　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	39721	100.000	6648	2826	1.174	--
总计		39721	100.000	6648			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-734-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:37:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	36282	100.000	6077	2822	1.183	--
总计		36282	100.000	6077			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-735-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:40:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	40857	100.000	6749	2781	1.189	--
总计		40857	100.000	6749			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-736-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:44:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.053	40348	100.000	6738	2826	1.178	--
总计		40348	100.000	6738			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-737-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:47:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:48
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	44289	100.000	7376	2793	1.180	--
总计		44289	100.000	7376			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-738-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:51:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	55077	100.000	9183	2806	1.187	--
总计		55077	100.000	9183			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-739-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:54:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	57698	100.000	9670	2839	1.179	--
总计		57698	100.000	9670			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-740-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 18:57:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:56　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	54793	100.000	9138	2817	1.189	--
总计		54793	100.000	9138			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-741-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:01:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:39:59
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	56854	100.000	9434	2797	1.191	--
总计		56854	100.000	9434			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-742-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:04:37　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:02　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	57885	100.000	9670	2820	1.181	--
总计		57885	100.000	9670			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-743-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:08:01　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:04　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	53247	100.000	8894	2825	1.181	--
总计		53247	100.000	8894			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-744-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:11:25　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:07　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	63261	100.000	10541	2817	1.187	--
总计		63261	100.000	10541			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-745-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:14:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:10　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	63627	100.000	10617	2814	1.179	--
总计		63627	100.000	10617			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-746-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:18:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:13
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	61503	100.000	10268	2818	1.182	--
总计		61503	100.000	10268			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-747-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:21:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:16
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	63920	100.000	10706	2837	1.187	--
总计		63920	100.000	10706			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-748-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:25:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	64826	100.000	10808	2830	1.186	--
总计		64826	100.000	10808			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-749-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:28:26　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:21　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	65286	100.000	10919	2817	1.183	--
总计		65286	100.000	10919			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-750-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:31:50
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:24
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	71577	100.000	11962	2819	1.184	--
总计		71577	100.000	11962			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-751-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:35:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:27　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	72560	100.000	12131	2827	1.182	--
总计		72560	100.000	12131			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-752-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:38:39　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:29　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	72126	100.000	12059	2822	1.184	--
总计		72126	100.000	12059			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-753-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:42:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:32
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	70288	100.000	11746	2815	1.185	--
总计		70288	100.000	11746			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-754-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:45:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:35
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	70289	100.000	11751	2822	1.183	--
总计		70289	100.000	11751			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-755-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:48:52
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:38
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	72234	100.000	12072	2817	1.181	--
总计		72234	100.000	12072			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-756-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:52:17　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:40　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	74938	100.000	12482	2812	1.179	--
总计		74938	100.000	12482			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-757-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:55:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:43
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	79075	100.000	13215	2832	1.189	--
总计		79075	100.000	13215			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-758-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 19:59:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:46
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	79833	100.000	13362	2823	1.184	--
总计		79833	100.000	13362			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-759-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:02:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	77964	100.000	13072	2823	1.185	--
总计		77964	100.000	13072			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-760-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:05:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:51
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	78300	100.000	13128	2840	1.191	--
总计		78300	100.000	13128			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-761-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:09:18
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:54
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	81418	100.000	13587	2811	1.183	--
总计		81418	100.000	13587			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-762-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:12:42　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:40:57　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	80234	100.000	13445	2828	1.186	--
总计		80234	100.000	13445			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-763-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:16:07
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:00
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	80937	100.000	13532	2834	1.187	--
总计		80937	100.000	13532			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-764-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:19:31
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	83777	100.000	14008	2832	1.188	--
总计		83777	100.000	14008			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-765-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:22:56
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	79455	100.000	13227	2826	1.190	--
总计		79455	100.000	13227			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-766-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:26:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	81933	100.000	13686	2823	1.188	--
总计		81933	100.000	13686			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-767-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:29:45　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:12　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	81781	100.000	13712	2848	1.190	--
总计		81781	100.000	13712			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-768-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:33:09　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	85180	100.000	14266	2833	1.190	--
总计		85180	100.000	14266			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-769-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:36:34　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	86258	100.000	14478	2835	1.187	--
总计		86258	100.000	14478			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-770-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:39:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	85495	100.000	14306	2824	1.188	--
总计		85495	100.000	14306			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-771-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:43:22
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	86058	100.000	14410	2843	1.188	--
总计		86058	100.000	14410			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-772-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:46:47
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	82118	100.000	13740	2820	1.188	--
总计		82118	100.000	13740			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-773-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:50:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	86685	100.000	14483	2827	1.188	--
总计		86685	100.000	14483			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-774-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:53:35
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	86855	100.000	14527	2832	1.185	--
总计		86855	100.000	14527			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-775-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 20:56:58
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	87064	100.000	14584	2815	1.188	--
总计		87064	100.000	14584			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-776-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:00:21　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	87735	100.000	14613	2810	1.192	--
总计		87735	100.000	14613			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-777-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:03:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:39　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	84367	100.000	14120	2828	1.184	--
总计		84367	100.000	14120			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-778-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:07:06
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	86157	100.000	14412	2836	1.193	--
总计		86157	100.000	14412			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-779-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:10:30
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	89616	100.000	14861	2816	1.187	--
总计		89616	100.000	14861			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-780-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:13:53
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.054	86970	100.000	14533	2824	1.187	--
总计		86970	100.000	14533			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-781-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:17:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	89560	100.000	14952	2805	1.189	--
总计		89560	100.000	14952			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-782-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:20:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	89051	100.000	14758	2820	1.188	--
总计		89051	100.000	14758			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-783-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:24:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	86857	100.000	14442	2829	1.190	--
总计		86857	100.000	14442			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-784-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:27:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:41:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	89196	100.000	14965	2841	1.186	--
总计		89196	100.000	14965			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-785-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:30:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	90250	100.000	15039	2826	1.193	--
总计		90250	100.000	15039			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-786-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:34:15
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	99242	100.000	15846	2560	1.188	--
总计		99242	100.000	15846			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-787-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:37:40　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	98989	100.000	15880	2560	1.183	--
总计		98989	100.000	15880			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-788-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:41:03　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:09　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-789-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:44:26　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	99311	100.000	15906	2563	1.183	--
总计		99311	100.000	15906			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-790-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:47:49　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	99450	100.000	15916	2568	1.195	--
总计		99450	100.000	15916			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-791-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:51:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	99134	100.000	15872	2563	1.188	--
总计		99134	100.000	15872			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-792-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:54:36
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	98894	100.000	15840	2567	1.185	--
总计		98894	100.000	15840			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-793-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 21:57:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:23　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	99100	100.000	15850	2558	1.190	--
总计		99100	100.000	15850			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-794-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:01:21
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	16857	100.000	2820	2807	1.144	--
总计		16857	100.000	2820			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-795-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:04:44　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	16763	100.000	2785	2788	1.152	--
总计		16763	100.000	2785			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-796-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:08:06　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:31　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	20512	100.000	3395	2782	1.168	--
总计		20512	100.000	3395			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-797-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:11:28
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.061	17130	100.000	2828	2787	1.163	--
总计		17130	100.000	2828			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-798-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:14:51　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	17585	100.000	2934	2795	1.137	--
总计		17585	100.000	2934			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-799-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:18:12　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:39　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	18196	100.000	2971	2779	1.184	--
总计		18196	100.000	2971			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-800-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:21:35　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:42　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	42022	100.000	6946	2816	1.186	--
总计		42022	100.000	6946			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-801-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:24:57
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	39757	100.000	6604	2797	1.188	--
总计		39757	100.000	6604			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-802-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:28:19　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	46336	100.000	7704	2809	1.183	--
总计		46336	100.000	7704			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-803-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:31:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:49
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	43821	100.000	7274	2809	1.194	--
总计		43821	100.000	7274			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-804-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:35:04
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	39674	100.000	6596	2823	1.185	--
总计		39674	100.000	6596			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-805-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:38:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	42297	100.000	7030	2812	1.184	--
总计		42297	100.000	7030			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-806-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:41:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:42:57
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.059	57687	100.000	9589	2830	1.188	--
总计		57687	100.000	9589			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-807-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:45:11　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:00　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	55611	100.000	9254	2802	1.182	--
总计		55611	100.000	9254			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-808-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:48:34
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:03
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	59148	100.000	9830	2802	1.192	--
总计		59148	100.000	9830			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-809-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:51:57　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:06　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	59039	100.000	9807	2794	1.189	--
总计		59039	100.000	9807			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-810-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:55:20　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:09　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	56984	100.000	9498	2816	1.188	--
总计		56984	100.000	9498			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-811-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 22:58:41
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.058	57488	100.000	9558	2829	1.190	--
总计		57488	100.000	9558			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-812-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:02:04　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:15　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	63845	100.000	10598	2796	1.188	--
总计		63845	100.000	10598			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-813-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:05:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:18
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	63645	100.000	10585	2808	1.192	--
总计		63645	100.000	10585			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-814-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:08:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:20
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	65526	100.000	10891	2800	1.189	--
总计		65526	100.000	10891			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-815-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:12:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:23
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	66432	100.000	11040	2804	1.193	--
总计		66432	100.000	11040			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-816-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:15:32
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:26
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	64651	100.000	10778	2812	1.196	--
总计		64651	100.000	10778			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-817-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:18:55　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:28　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	62248	100.000	10350	2785	1.191	--
总计		62248	100.000	10350			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-818-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:22:16
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	73242	100.000	12205	2834	1.191	--
总计		73242	100.000	12205			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-819-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:25:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	68515	100.000	11357	2796	1.188	--
总计		68515	100.000	11357			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-820-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:28:59　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	72326	100.000	12061	2814	1.188	--
总计		72326	100.000	12061			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-821-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:32:20
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	69882	100.000	11614	2791	1.198	--
总计		69882	100.000	11614			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-822-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:35:42
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	72039	100.000	11988	2797	1.192	--
总计		72039	100.000	11988			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-823-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:39:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:44
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	69853	100.000	11622	2798	1.192	--
总计		69853	100.000	11622			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-824-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:42:26　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:47　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	76337	100.000	12691	2811	1.194	--
总计		76337	100.000	12691			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-825-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:45:48
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	75188	100.000	12516	2800	1.191	--
总计		75188	100.000	12516			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-826-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:49:11
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:52
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	79226	100.000	13206	2814	1.188	--
总计		79226	100.000	13206			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-827-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:52:33
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:55
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	78461	100.000	13042	2806	1.192	--
总计		78461	100.000	13042			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-828-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:55:55
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:43:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	79883	100.000	13263	2794	1.189	--
总计		79883	100.000	13263			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-829-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/11 23:59:17
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	76480	100.000	12784	2822	1.189	--
总计		76480	100.000	12784			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-830-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:02:41　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:03　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	80932	100.000	13492	2815	1.191	--
总计		80932	100.000	13492			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-831-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:06:03
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:06
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	78707	100.000	13085	2809	1.192	--
总计		78707	100.000	13085			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-832-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:09:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:09
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	81520	100.000	13613	2808	1.190	--
总计		81520	100.000	13613			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-833-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:12:47　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:11　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	79330	100.000	13196	2810	1.195	--
总计		79330	100.000	13196			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-834-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:16:09　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:14　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	80674	100.000	13467	2806	1.189	--
总计		80674	100.000	13467			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-835-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:19:32　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:17　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	78593	100.000	13096	2817	1.188	--
总计		78593	100.000	13096			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-836-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:22:54
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:19
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	80954	100.000	13535	2817	1.184	--
总计		80954	100.000	13535			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-837-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:26:17　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:22　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	78531	100.000	13074	2807	1.191	--
总计		78531	100.000	13074			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-838-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:29:40
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:25
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	83381	100.000	13928	2819	1.193	--
总计		83381	100.000	13928			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-839-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:33:05
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:28
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	80128	100.000	13348	2805	1.194	--
总计		80128	100.000	13348			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-840-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:36:27
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:31
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	86455	100.000	14360	2820	1.194	--
总计		86455	100.000	14360			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-841-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:39:51
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:34
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	83113	100.000	13882	2824	1.187	--
总计		83113	100.000	13882			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-842-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:43:15　　实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:36　　处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	82582	100.000	13760	2817	1.192	--
总计		82582	100.000	13760			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-843-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:46:38
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:39
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	85488	100.000	14201	2803	1.195	--
总计		85488	100.000	14201			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-844-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:50:02
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:42
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	85189	100.000	14199	2816	1.193	--
总计		85189	100.000	14199			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-845-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:53:25
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:45
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	84073	100.000	13953	2803	1.197	--
总计		84073	100.000	13953			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-846-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 00:56:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:47
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	88014	100.000	14648	2813	1.189	--
总计		88014	100.000	14648			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-847-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:00:12
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:50
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	83686	100.000	13932	2805	1.189	--
总计		83686	100.000	13932			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-848-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:03:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:53
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	86140	100.000	14357	2815	1.188	--
总计		86140	100.000	14357			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-849-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:07:00
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:56
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	89902	100.000	14951	2809	1.193	--
总计		89902	100.000	14951			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-850-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:10:24
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:44:58
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	85605	100.000	14273	2799	1.193	--
总计		85605	100.000	14273			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-851-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:13:49
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:45:01
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.055	84689	100.000	14089	2807	1.193	--
总计		84689	100.000	14089			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-852-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:17:13
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:45:04
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.057	86252	100.000	14300	2808	1.196	--
总计		86252	100.000	14300			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-853-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:20:37
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:45:07
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.056	85728	100.000	14225	2809	1.194	--
总计		85728	100.000	14225			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-854-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:24:01
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:45:10
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	99632	100.000	15953	2567	1.188	--
总计		99632	100.000	15953			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 0-17/24-855-2 - cbzj-20mg-B0083N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX273-1.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX273.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/01/12 01:27:23
实验者: xiechaojun
处理时间（V2）: 2025/01/13 09:45:12
处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.047	99822	100.000	15957	2555	1.193	--
总计		99822	100.000	15957			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0083N01批(20mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2