




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-695-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 13:59:42
处理时间 (V3): 2025/01/13 11:06:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-696-3 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:03:05
处理时间 (V3): 2025/01/13 11:06:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96962	100.000	14943	2506	1.089	--
总计		96962	100.000	14943			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-697-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:06:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	97135	100.000	14943	2513	1.088	--
总计		97135	100.000	14943			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-698-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:09:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96976	100.000	14944	2507	1.081	--
总计		96976	100.000	14944			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-699-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:13:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	97202	100.000	14993	2514	1.083	--
总计		97202	100.000	14993			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-700-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:16:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96765	100.000	14937	2511	1.084	--
总计		96765	100.000	14937			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-701-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:20:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	10377	100.000	1664	2694	1.059	--
总计		10377	100.000	1664			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-702-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:23:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	13906	100.000	2217	2586	1.084	--
总计		13906	100.000	2217			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-703-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:26:46
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	12713	100.000	2055	2654	1.045	--
总计		12713	100.000	2055			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-704-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:30:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	17261	100.000	2828	2704	1.052	--
总计		17261	100.000	2828			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-705-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:33:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	22233	100.000	3693	2761	1.046	--
总计		22233	100.000	3693			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-706-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:36:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	21794	100.000	3520	2687	1.069	--
总计		21794	100.000	3520			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-707-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:40:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	38772	100.000	6222	2683	1.074	--
总计		38772	100.000	6222			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-708-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:43:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	44152	100.000	7043	2694	1.071	--
总计		44152	100.000	7043			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-709-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:47:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	43733	100.000	7000	2669	1.068	--
总计		43733	100.000	7000			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-710-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:50:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	55135	100.000	8813	2691	1.075	--
总计		55135	100.000	8813			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-711-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:53:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	62933	100.000	10043	2694	1.068	--
总计		62933	100.000	10043			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-712-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 14:57:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	57402	100.000	9233	2714	1.082	--
总计		57402	100.000	9233			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-713-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:00:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	68995	100.000	11010	2668	1.071	--
总计		68995	100.000	11010			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-714-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:03:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:06:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	68993	100.000	10978	2672	1.076	--
总计		68993	100.000	10978			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-715-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:07:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	70440	100.000	11211	2663	1.072	--
总计		70440	100.000	11211			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-716-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:10:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	83989	100.000	13335	2670	1.079	--
总计		83989	100.000	13335			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-717-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:13:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	77094	100.000	12303	2675	1.072	--
总计		77094	100.000	12303			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-718-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:17:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	78129	100.000	12389	2652	1.072	--
总计		78129	100.000	12389			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-719-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:20:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	78755	100.000	12536	2662	1.072	--
总计		78755	100.000	12536			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-720-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:24:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	77997	100.000	12356	2652	1.072	--
总计		77997	100.000	12356			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-721-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:27:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	81738	100.000	12950	2646	1.074	--
总计		81738	100.000	12950			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-722-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	87504	100.000	13892	2667	1.070	--
总计		87504	100.000	13892			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-723-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:34:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	86995	100.000	13848	2680	1.068	--
总计		86995	100.000	13848			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-724-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:37:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	85575	100.000	13571	2666	1.072	--
总计		85575	100.000	13571			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-725-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:40:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	89610	100.000	14172	2648	1.076	--
总计		89610	100.000	14172			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-726-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:44:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	88774	100.000	14100	2666	1.074	--
总计		88774	100.000	14100			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-727-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:47:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90727	100.000	14353	2654	1.075	--
总计		90727	100.000	14353			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-728-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:51:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	92397	100.000	14758	2672	1.076	--
总计		92397	100.000	14758			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-729-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:54:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92226	100.000	14603	2659	1.078	--
总计		92226	100.000	14603			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-730-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 15:57:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92604	100.000	14626	2648	1.072	--
总计		92604	100.000	14626			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-731-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:01:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	94749	100.000	15022	2670	1.076	--
总计		94749	100.000	15022			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-732-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:04:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	92712	100.000	14671	2652	1.074	--
总计		92712	100.000	14671			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-733-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:08:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92330	100.000	14646	2661	1.077	--
总计		92330	100.000	14646			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-734-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:11:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	93300	100.000	14788	2655	1.072	--
总计		93300	100.000	14788			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-735-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:14:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:07:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	95496	100.000	15107	2650	1.076	--
总计		95496	100.000	15107			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-736-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:18:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	93557	100.000	14809	2649	1.076	--
总计		93557	100.000	14809			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-737-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:21:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	96181	100.000	15199	2656	1.077	--
总计		96181	100.000	15199			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-738-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:24:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	93468	100.000	14823	2657	1.069	--
总计		93468	100.000	14823			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-739-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:28:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	94647	100.000	15005	2655	1.077	--
总计		94647	100.000	15005			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-740-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:31:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	94036	100.000	14942	2671	1.074	--
总计		94036	100.000	14942			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-741-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:35:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	94963	100.000	15094	2664	1.074	--
总计		94963	100.000	15094			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-742-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:38:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	94855	100.000	15042	2668	1.076	--
总计		94855	100.000	15042			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-743-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:41:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	89934	100.000	14280	2676	1.078	--
总计		89934	100.000	14280			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-744-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:45:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90274	100.000	14439	2690	1.075	--
总计		90274	100.000	14439			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-745-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:48:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90755	100.000	14517	2692	1.080	--
总计		90755	100.000	14517			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-746-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:51:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	90689	100.000	14408	2683	1.075	--
总计		90689	100.000	14408			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-747-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:55:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92964	100.000	14811	2673	1.076	--
总计		92964	100.000	14811			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-748-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 16:58:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	92292	100.000	14624	2675	1.073	--
总计		92292	100.000	14624			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-749-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:02:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90237	100.000	14438	2685	1.078	--
总计		90237	100.000	14438			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-750-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:05:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	93998	100.000	14987	2700	1.068	--
总计		93998	100.000	14987			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-751-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:08:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	91400	100.000	14575	2687	1.076	--
总计		91400	100.000	14575			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-752-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:12:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	90717	100.000	14415	2663	1.079	--
总计		90717	100.000	14415			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-753-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:15:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	91737	100.000	14680	2703	1.068	--
总计		91737	100.000	14680			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-754-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:18:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	94343	100.000	15054	2704	1.066	--
总计		94343	100.000	15054			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-755-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:22:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	89464	100.000	14392	2725	1.080	--
总计		89464	100.000	14392			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-756-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:25:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	88039	100.000	14089	2685	1.080	--
总计		88039	100.000	14089			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-757-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:29:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:08:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	87794	100.000	14057	2708	1.073	--
总计		87794	100.000	14057			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-758-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:32:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:09:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	89902	100.000	14336	2702	1.075	--
总计		89902	100.000	14336			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-759-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:35:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:09:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	91507	100.000	14553	2675	1.072	--
总计		91507	100.000	14553			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-20/26-760-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:39:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:09:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	92219	100.000	14677	2673	1.070	--
总计		92219	100.000	14677			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-21/26-761-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:42:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:17:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97478	100.000	15623	2600	1.077	--
总计		97478	100.000	15623			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-21/26-762-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:46:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:17:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97508	100.000	15634	2605	1.082	--
总计		97508	100.000	15634			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-763-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:49:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-764-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:52:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	98186	100.000	15123	2500	1.075	--
总计		98186	100.000	15123			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-765-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:56:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97701	100.000	15081	2508	1.075	--
总计		97701	100.000	15081			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-766-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 17:59:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	97552	100.000	15090	2509	1.078	--
总计		97552	100.000	15090			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-767-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:03:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97770	100.000	15078	2504	1.078	--
总计		97770	100.000	15078			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-768-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:06:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	97583	100.000	15060	2503	1.077	--
总计		97583	100.000	15060			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-769-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:09:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	15922	100.000	2558	2731	1.089	--
总计		15922	100.000	2558			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-770-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:13:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	13290	100.000	2156	2715	1.074	--
总计		13290	100.000	2156			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-771-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:16:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	17991	100.000	2883	2722	1.087	--
总计		17991	100.000	2883			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-772-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:20:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	13055	100.000	2092	2695	1.099	--
总计		13055	100.000	2092			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-773-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:23:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	17864	100.000	2895	2688	1.052	--
总计		17864	100.000	2895			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-774-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:26:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	16024	100.000	2608	2709	1.081	--
总计		16024	100.000	2608			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-775-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:30:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	32751	100.000	5295	2695	1.060	--
总计		32751	100.000	5295			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-776-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:33:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	33666	100.000	5353	2676	1.076	--
总计		33666	100.000	5353			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-777-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:37:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	33145	100.000	5290	2682	1.086	--
总计		33145	100.000	5290			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-778-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:40:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	33769	100.000	5414	2670	1.074	--
总计		33769	100.000	5414			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-779-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:43:51
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:19:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	35538	100.000	5696	2684	1.070	--
总计		35538	100.000	5696			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-780-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:47:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	34298	100.000	5478	2698	1.081	--
总计		34298	100.000	5478			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-781-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:50:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	40794	100.000	6486	2682	1.073	--
总计		40794	100.000	6486			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-782-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:54:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	39858	100.000	6387	2690	1.084	--
总计		39858	100.000	6387			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-783-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 18:57:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	40683	100.000	6505	2676	1.082	--
总计		40683	100.000	6505			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-784-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:00:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	40346	100.000	6519	2696	1.075	--
总计		40346	100.000	6519			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-785-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:04:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	41985	100.000	6735	2696	1.080	--
总计		41985	100.000	6735			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-786-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:07:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	40177	100.000	6417	2679	1.074	--
总计		40177	100.000	6417			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-787-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:11:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	42873	100.000	6877	2710	1.070	--
总计		42873	100.000	6877			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-788-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:14:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	42812	100.000	6847	2681	1.077	--
总计		42812	100.000	6847			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-789-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:17:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	42315	100.000	6718	2672	1.081	--
总计		42315	100.000	6718			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-790-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:21:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	44278	100.000	7075	2706	1.067	--
总计		44278	100.000	7075			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-791-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:24:37
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	42746	100.000	6842	2682	1.077	--
总计		42746	100.000	6842			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-792-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqxx-pH1.2jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:28:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43728	100.000	6967	2693	1.063	--
总计		43728	100.000	6967			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-793-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:31:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	46997	100.000	7494	2685	1.091	--
总计		46997	100.000	7494			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-794-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:34:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	47531	100.000	7622	2699	1.087	--
总计		47531	100.000	7622			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-795-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:38:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	46902	100.000	7506	2669	1.077	--
总计		46902	100.000	7506			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-796-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:41:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	47168	100.000	7533	2695	1.075	--
总计		47168	100.000	7533			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-797-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:45:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	47796	100.000	7656	2695	1.081	--
总计		47796	100.000	7656			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-798-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:48:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	46464	100.000	7439	2684	1.087	--
总计		46464	100.000	7439			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-799-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:51:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:20:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50043	100.000	7982	2676	1.068	--
总计		50043	100.000	7982			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-800-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:55:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48093	100.000	7669	2681	1.077	--
总计		48093	100.000	7669			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-801-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 19:58:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48385	100.000	7740	2699	1.080	--
总计		48385	100.000	7740			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-802-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:02:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	50771	100.000	8036	2673	1.079	--
总计		50771	100.000	8036			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-803-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH1.2jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:05:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	49310	100.000	7888	2661	1.077	--
总计		49310	100.000	7888			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-804-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:08:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48401	100.000	7725	2690	1.081	--
总计		48401	100.000	7725			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-805-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:12:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50090	100.000	7930	2660	1.075	--
总计		50090	100.000	7930			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-806-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:15:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	49219	100.000	7886	2676	1.076	--
总计		49219	100.000	7886			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-807-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:19:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	50768	100.000	8081	2679	1.075	--
总计		50768	100.000	8081			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-808-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:22:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50962	100.000	8148	2692	1.070	--
总计		50962	100.000	8148			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-809-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:25:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50214	100.000	7936	2643	1.083	--
总计		50214	100.000	7936			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-810-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:29:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	51070	100.000	8146	2685	1.077	--
总计		51070	100.000	8146			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-811-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:32:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	52450	100.000	8320	2644	1.076	--
总计		52450	100.000	8320			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-812-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:36:02
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	50830	100.000	8103	2692	1.079	--
总计		50830	100.000	8103			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-813-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:39:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	51775	100.000	8213	2658	1.070	--
总计		51775	100.000	8213			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-814-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:42:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	51098	100.000	8148	2668	1.069	--
总计		51098	100.000	8148			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-815-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:46:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50172	100.000	7923	2648	1.079	--
总计		50172	100.000	7923			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-816-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:49:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52331	100.000	8380	2677	1.074	--
总计		52331	100.000	8380			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-817-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:53:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50948	100.000	8094	2675	1.076	--
总计		50948	100.000	8094			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-818-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:56:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	51271	100.000	8185	2680	1.079	--
总计		51271	100.000	8185			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-819-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 20:59:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	52711	100.000	8380	2674	1.084	--
总计		52711	100.000	8380			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-820-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:03:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:21:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	53143	100.000	8410	2663	1.083	--
总计		53143	100.000	8410			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-821-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:06:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	52783	100.000	8446	2695	1.083	--
总计		52783	100.000	8446			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-822-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:09:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	52539	100.000	8366	2672	1.073	--
总计		52539	100.000	8366			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-823-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:13:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	54054	100.000	8598	2683	1.089	--
总计		54054	100.000	8598			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-824-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:16:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	52865	100.000	8370	2675	1.080	--
总计		52865	100.000	8370			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-825-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:20:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	54188	100.000	8621	2700	1.085	--
总计		54188	100.000	8621			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-826-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:23:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	53963	100.000	8602	2695	1.081	--
总计		53963	100.000	8602			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-827-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:26:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53483	100.000	8464	2703	1.084	--
总计		53483	100.000	8464			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-828-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:30:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	53043	100.000	8448	2697	1.081	--
总计		53043	100.000	8448			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-829-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:33:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97078	100.000	14931	2499	1.081	--
总计		97078	100.000	14931			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-830-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:37:03
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97111	100.000	14932	2494	1.087	--
总计		97111	100.000	14932			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-831-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:40:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-832-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:43:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97102	100.000	14906	2503	1.086	--
总计		97102	100.000	14906			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-833-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:47:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97292	100.000	14899	2503	1.082	--
总计		97292	100.000	14899			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-834-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:50:34
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	97021	100.000	14931	2508	1.082	--
总计		97021	100.000	14931			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-835-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:53:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97167	100.000	14913	2503	1.081	--
总计		97167	100.000	14913			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-836-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 21:57:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97331	100.000	14907	2505	1.085	--
总计		97331	100.000	14907			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-837-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:00:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	19705	100.000	3201	2739	1.048	--
总计		19705	100.000	3201			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-838-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:04:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	17745	100.000	2857	2736	1.076	--
总计		17745	100.000	2857			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-839-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:07:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	15632	100.000	2513	2713	1.091	--
总计		15632	100.000	2513			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-840-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:10:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:22:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	19527	100.000	3153	2704	1.070	--
总计		19527	100.000	3153			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-841-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:14:13
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	17799	100.000	2851	2700	1.069	--
总计		17799	100.000	2851			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-842-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:17:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	16435	100.000	2657	2746	1.043	--
总计		16435	100.000	2657			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-843-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:20:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	37823	100.000	6077	2715	1.069	--
总计		37823	100.000	6077			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-844-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:24:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	35613	100.000	5691	2693	1.075	--
总计		35613	100.000	5691			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-845-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:27:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34232	100.000	5456	2686	1.081	--
总计		34232	100.000	5456			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-846-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:31:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	35891	100.000	5736	2702	1.072	--
总计		35891	100.000	5736			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-847-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:34:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	35822	100.000	5770	2747	1.072	--
总计		35822	100.000	5770			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-848-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:37:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	33967	100.000	5445	2740	1.089	--
总计		33967	100.000	5445			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-849-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:41:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	42241	100.000	6761	2713	1.081	--
总计		42241	100.000	6761			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-850-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:44:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	42517	100.000	6767	2702	1.074	--
总计		42517	100.000	6767			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-851-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:47:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	41529	100.000	6649	2687	1.079	--
总计		41529	100.000	6649			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-852-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:51:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	43318	100.000	6919	2709	1.085	--
总计		43318	100.000	6919			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-853-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:54:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	41769	100.000	6703	2706	1.084	--
总计		41769	100.000	6703			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-854-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 22:58:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43830	100.000	7029	2749	1.069	--
总计		43830	100.000	7029			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-855-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:01:23
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	47597	100.000	7656	2732	1.077	--
总计		47597	100.000	7656			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-856-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:04:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	44310	100.000	7090	2695	1.082	--
总计		44310	100.000	7090			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-857-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:08:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	43509	100.000	6955	2699	1.077	--
总计		43509	100.000	6955			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-858-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:11:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	44939	100.000	7142	2697	1.078	--
总计		44939	100.000	7142			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-859-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:14:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	43395	100.000	6881	2684	1.078	--
总计		43395	100.000	6881			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-860-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:18:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	43176	100.000	6937	2700	1.081	--
总计		43176	100.000	6937			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-861-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:21:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:23:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	49511	100.000	7828	2677	1.085	--
总计		49511	100.000	7828			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-862-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:24:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	49083	100.000	7888	2702	1.085	--
总计		49083	100.000	7888			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-863-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:28:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	47621	100.000	7644	2714	1.071	--
总计		47621	100.000	7644			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-864-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:31:39
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50003	100.000	7978	2687	1.073	--
总计		50003	100.000	7978			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-865-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:35:00
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48557	100.000	7749	2703	1.077	--
总计		48557	100.000	7749			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-866-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:38:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	48520	100.000	7765	2688	1.069	--
总计		48520	100.000	7765			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-867-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:41:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	50633	100.000	8078	2681	1.083	--
总计		50633	100.000	8078			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-868-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:45:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	50571	100.000	8039	2695	1.079	--
总计		50571	100.000	8039			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-869-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:48:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51381	100.000	8210	2701	1.081	--
总计		51381	100.000	8210			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-870-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:51:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.080	50435	100.000	8037	2682	1.086	--
总计		50435	100.000	8037			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-871-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:55:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:28
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51613	100.000	8254	2693	1.072	--
总计		51613	100.000	8254			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-872-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/11 23:58:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51668	100.000	8277	2710	1.087	--
总计		51668	100.000	8277			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-873-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:01:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	51978	100.000	8263	2706	1.080	--
总计		51978	100.000	8263			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-874-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:05:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	49995	100.000	7955	2710	1.091	--
总计		49995	100.000	7955			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-875-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:08:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	50113	100.000	7947	2693	1.074	--
总计		50113	100.000	7947			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-876-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:11:58
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	51273	100.000	8127	2703	1.081	--
总计		51273	100.000	8127			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-877-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:15:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52199	100.000	8270	2689	1.085	--
总计		52199	100.000	8270			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-878-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:18:41
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52384	100.000	8338	2705	1.085	--
总计		52384	100.000	8338			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-879-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:22:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52279	100.000	8299	2699	1.079	--
总计		52279	100.000	8299			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-880-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:25:27
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	52375	100.000	8298	2692	1.081	--
总计		52375	100.000	8298			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-881-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:28:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:24:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	52327	100.000	8318	2701	1.076	--
总计		52327	100.000	8318			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-882-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:32:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51934	100.000	8346	2714	1.078	--
总计		51934	100.000	8346			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-883-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:35:34
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52117	100.000	8331	2710	1.075	--
总计		52117	100.000	8331			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-884-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:38:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52785	100.000	8415	2696	1.084	--
总计		52785	100.000	8415			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-885-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:42:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:09
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	52100	100.000	8315	2705	1.086	--
总计		52100	100.000	8315			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-886-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:45:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	51264	100.000	8223	2704	1.076	--
总计		51264	100.000	8223			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-887-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:49:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	51212	100.000	8202	2712	1.074	--
总计		51212	100.000	8202			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-888-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH4.5jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:52:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	51884	100.000	8262	2688	1.077	--
总计		51884	100.000	8262			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-889-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:55:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53649	100.000	8537	2683	1.082	--
总计		53649	100.000	8537			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-890-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 00:59:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	52134	100.000	8317	2693	1.089	--
总计		52134	100.000	8317			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-891-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:02:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53473	100.000	8565	2729	1.079	--
总计		53473	100.000	8565			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-892-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:06:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53881	100.000	8565	2696	1.079	--
总计		53881	100.000	8565			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-893-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:09:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	54098	100.000	8662	2710	1.077	--
总计		54098	100.000	8662			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-894-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:12:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	53806	100.000	8566	2699	1.078	--
总计		53806	100.000	8566			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-895-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:16:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	53871	100.000	8623	2725	1.087	--
总计		53871	100.000	8623			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-896-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:19:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	54581	100.000	8632	2708	1.080	--
总计		54581	100.000	8632			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-897-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:23:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	97380	100.000	15023	2513	1.084	--
总计		97380	100.000	15023			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-898-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:26:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97471	100.000	14995	2507	1.081	--
总计		97471	100.000	14995			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-899-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:29:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-900-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:33:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	96957	100.000	14890	2507	1.084	--
总计		96957	100.000	14890			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-901-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:36:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97102	100.000	14866	2495	1.083	--
总计		97102	100.000	14866			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-902-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:40:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:25:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	96970	100.000	14913	2498	1.083	--
总计		96970	100.000	14913			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-903-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:43:29
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.077	97134	100.000	14919	2503	1.081	--
总计		97134	100.000	14919			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-904-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:46:52
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.076	97181	100.000	14903	2501	1.080	--
总计		97181	100.000	14903			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-905-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:50:15
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.081	17643	100.000	2804	2693	1.051	--
总计		17643	100.000	2804			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-906-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:53:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	15938	100.000	2540	2662	1.065	--
总计		15938	100.000	2540			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-907-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 01:57:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	15781	100.000	2535	2689	1.053	--
总计		15781	100.000	2535			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-908-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:00:24
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	19450	100.000	3104	2671	1.049	--
总计		19450	100.000	3104			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-909-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:03:48
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	18142	100.000	2912	2696	1.089	--
总计		18142	100.000	2912			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-910-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:07:11
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	19343	100.000	3089	2712	1.088	--
总计		19343	100.000	3089			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-911-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:10:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	33564	100.000	5315	2667	1.070	--
总计		33564	100.000	5315			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-912-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:13:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34976	100.000	5592	2680	1.078	--
总计		34976	100.000	5592			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-913-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:17:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	33699	100.000	5303	2662	1.071	--
总计		33699	100.000	5303			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-914-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:20:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34103	100.000	5380	2652	1.074	--
总计		34103	100.000	5380			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-915-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:24:05
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34474	100.000	5532	2703	1.075	--
总计		34474	100.000	5532			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-916-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:27:28
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	34126	100.000	5427	2663	1.081	--
总计		34126	100.000	5427			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-917-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:30:50
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	39608	100.000	6278	2674	1.077	--
总计		39608	100.000	6278			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-918-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:34:14
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	40132	100.000	6403	2697	1.084	--
总计		40132	100.000	6403			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-919-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:37:36
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	38802	100.000	6157	2665	1.077	--
总计		38802	100.000	6157			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-920-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:40:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	39139	100.000	6262	2681	1.079	--
总计		39139	100.000	6262			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-921-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:44:22
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	40205	100.000	6416	2661	1.086	--
总计		40205	100.000	6416			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-922-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:47:45
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:26:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	40481	100.000	6451	2663	1.077	--
总计		40481	100.000	6451			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-923-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:51:09
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	40881	100.000	6519	2668	1.076	--
总计		40881	100.000	6519			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-924-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:54:32
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43455	100.000	6923	2689	1.080	--
总计		43455	100.000	6923			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-925-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 02:57:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	42228	100.000	6654	2663	1.081	--
总计		42228	100.000	6654			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-926-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:01:17
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:10
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	42637	100.000	6772	2674	1.075	--
总计		42637	100.000	6772			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-927-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:04:40
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:13
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	41224	100.000	6514	2685	1.079	--
总计		41224	100.000	6514			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-928-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:08:04
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	42475	100.000	6756	2675	1.078	--
总计		42475	100.000	6756			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-929-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:11:26
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46917	100.000	7396	2682	1.068	--
总计		46917	100.000	7396			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-930-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:14:49
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46396	100.000	7394	2699	1.071	--
总计		46396	100.000	7394			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-931-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:18:12
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43426	100.000	6911	2674	1.086	--
总计		43426	100.000	6911			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-932-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:21:35
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45835	100.000	7264	2660	1.078	--
总计		45835	100.000	7264			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-933-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:24:59
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	43614	100.000	6900	2653	1.091	--
总计		43614	100.000	6900			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-934-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:28:21
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46675	100.000	7410	2685	1.091	--
总计		46675	100.000	7410			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-935-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:31:44
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45475	100.000	7268	2692	1.085	--
总计		45475	100.000	7268			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-936-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:35:08
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	47756	100.000	7546	2672	1.085	--
总计		47756	100.000	7546			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-937-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:38:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45055	100.000	7183	2685	1.075	--
总计		45055	100.000	7183			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-938-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:41:53
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	46201	100.000	7328	2662	1.079	--
总计		46201	100.000	7328			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-939-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:45:16
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	44937	100.000	7136	2668	1.073	--
总计		44937	100.000	7136			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-940-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:48:38
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	46916	100.000	7480	2674	1.076	--
总计		46916	100.000	7480			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-941-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:52:01
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	44868	100.000	7093	2667	1.076	--
总计		44868	100.000	7093			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-942-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:55:25
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:27:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46498	100.000	7392	2673	1.083	--
总计		46498	100.000	7392			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-943-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 03:58:47
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45183	100.000	7135	2651	1.085	--
总计		45183	100.000	7135			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-944-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:02:10
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46887	100.000	7433	2682	1.073	--
总计		46887	100.000	7433			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-945-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:05:33
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	43932	100.000	6992	2670	1.082	--
总计		43932	100.000	6992			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-946-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:08:56
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45695	100.000	7232	2654	1.080	--
总计		45695	100.000	7232			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-947-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:12:20
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47080	100.000	7494	2688	1.078	--
总计		47080	100.000	7494			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-948-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:15:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47274	100.000	7479	2666	1.077	--
总计		47274	100.000	7479			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-949-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:19:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:17
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45599	100.000	7221	2670	1.089	--
总计		45599	100.000	7221			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-950-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:22:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46226	100.000	7326	2678	1.074	--
总计		46226	100.000	7326			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-951-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqcx-pH6.8jz-90min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:25:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46211	100.000	7367	2680	1.077	--
总计		46211	100.000	7367			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-952-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-90min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:29:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45664	100.000	7299	2690	1.081	--
总计		45664	100.000	7299			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-953-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:32:42
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	45235	100.000	7170	2678	1.086	--
总计		45235	100.000	7170			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-954-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:36:06
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	45976	100.000	7327	2695	1.083	--
总计		45976	100.000	7327			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-955-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:39:30
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	44393	100.000	7062	2675	1.076	--
总计		44393	100.000	7062			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-956-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:42:54
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	48318	100.000	7659	2685	1.086	--
总计		48318	100.000	7659			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-957-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:46:18
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	48068	100.000	7652	2683	1.082	--
总计		48068	100.000	7652			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-958-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-120min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:49:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	46304	100.000	7386	2680	1.076	--
总计		46304	100.000	7386			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-959-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:53:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47748	100.000	7554	2685	1.073	--
总计		47748	100.000	7554			

图265 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-960-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:56:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	49361	100.000	7890	2707	1.072	--
总计		49361	100.000	7890			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-961-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 04:59:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	46097	100.000	7271	2661	1.088	--
总计		46097	100.000	7271			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-962-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:03:19
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	48511	100.000	7675	2666	1.083	--
总计		48511	100.000	7675			

图268 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-963-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:06:43
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:28:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.084	48745	100.000	7743	2702	1.080	--
总计		48745	100.000	7743			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-22/26-964-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:10:07
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:29:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.083	47346	100.000	7480	2660	1.071	--
总计		47346	100.000	7480			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-23/26-965-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:13:31
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:49:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.078	98785	100.000	15884	2612	1.081	--
总计		98785	100.000	15884			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱 温: 35°C
数据文件名: RC\$QTL-4125 - 0-23/26-966-2 - cbzj-40mg-B0012N01p-rcqx-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4125 - QTL-4125-RC-FX275-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4125 - 20250111-RCQX-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
进样时间: 2025/01/12 05:16:55
处理时间 (V2): 2025/01/13 11:50:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.079	98678	100.000	15883	2616	1.079	--
总计		98678	100.000	15883			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-B0012N01批(40mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2