



苯磺酸氨氯地平片项目信息

介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	5	系数	0.7211


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90756	90337	90401	90296	90292	90416	0.22
2	14.35	90410	90563				90486	0.12

单位质量响应值		RSD%	判断
6292.00	6305.64	0.16	数据可信

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121111批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	67327	-	67327	74.996	82.01	8.00	75.00	82.01	8.00
	2	65391	-	65391	72.840			72.84		
	3	79029	-	79029	88.031			88.03		
	4	77861	-	77861	86.730			86.73		
	5	77880	-	77880	86.751			86.75		
	6	74256	-	74256	82.714			82.71		
10min	1	77395	-	77395	86.211	91.85	3.70	86.96	92.67	3.72
	2	80392	-	80392	89.549			90.28		
	3	84891	-	84891	94.561			95.44		
	4	82574	-	82574	91.980			92.85		
	5	84833	-	84833	94.496			95.36		
	6	84665	-	84665	94.309			95.14		
15min	1	78513	-	78513	87.456	91.70	2.81	89.07	93.44	2.85
	2	80792	-	80792	89.995			91.62		
	3	84218	-	84218	93.811			95.64		
	4	82270	-	82270	91.641			93.43		
	5	83942	-	83942	93.504			95.32		
	6	84206	-	84206	93.798			95.57		
20min	1	79147	-	79147	88.163	91.83	2.31	90.65	94.48	2.37
	2	81295	-	81295	90.555			93.08		
	3	84123	-	84123	93.705			96.47		
	4	82766	-	82766	92.194			94.90		
	5	83854	-	83854	93.406			96.15		
	6	83427	-	83427	92.930			95.64		
30min	1	78623	-	78623	87.579	90.94	2.14	90.95	94.52	2.20
	2	80520	-	80520	89.692			93.12		
	3	82771	-	82771	92.199			95.90		
	4	82103	-	82103	91.455			95.08		
	5	82941	-	82941	92.389			96.07		
	6	82900	-	82900	92.343			95.98		
45min	1	77248	-	77248	86.047	90.29	2.67	90.29	94.77	2.71
	2	79654	-	79654	88.727			93.05		
	3	82629	-	82629	92.041			96.66		
	4	82293	-	82293	91.667			96.21		
	5	82443	-	82443	91.834			96.44		
	6	82049	-	82049	91.395			95.96		
60min	1	77694	-	77694	86.544	88.91	1.57	91.65	94.30	1.67
	2	79085	-	79085	88.093			93.31		
	3	80569	-	80569	89.747			95.29		
	4	79989	-	79989	89.100			94.56		
	5	81171	-	81171	90.417			95.94		
	6	80400	-	80400	89.558			95.03		
极限	1	80960	-	80960	90.182	88.70	0.92	96.15	94.97	0.75
	2	79322	-	79322	88.357			94.45		
	3	79277	-	79277	88.307			94.75		
	4	79356	-	79356	88.395			94.74		
	5	79930	-	79930	89.035			95.46		
	6	78920	-	78920	87.910			94.28		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	5	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	89861	90127	90313	90152	90252	90141	0.20
2	14.35	90093	90132				90112	0.04
单位质量响应值			RSD%	判断				
6272.86			0.08	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121111批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	66108	-	66108	73.903	82.10	6.64	73.90	82.10	6.65
	2	78554	-	78554	87.817			87.82		
	3	75800	-	75800	84.738			84.74		
	4	73369	-	73369	82.021			82.02		
	5	69321	-	69321	77.495			77.50		
	6	77491	-	77491	86.629			86.63		
10min	1	79018	-	79018	88.336	92.09	2.88	89.07	92.91	2.90
	2	83931	-	83931	93.828			94.71		
	3	84466	-	84466	94.426			95.27		
	4	80053	-	80053	89.493			90.31		
	5	82291	-	82291	91.995			92.77		
	6	84516	-	84516	94.482			95.35		
15min	1	79035	-	79035	88.355	92.03	2.72	89.98	93.77	2.74
	2	83560	-	83560	93.413			95.23		
	3	84066	-	84066	93.979			95.77		
	4	80109	-	80109	89.555			91.27		
	5	82702	-	82702	92.454			94.15		
	6	84442	-	84442	94.399			96.21		
20min	1	79656	-	79656	89.049	91.98	1.97	91.55	94.64	2.03
	2	83335	-	83335	93.162			95.91		
	3	83450	-	83450	93.290			96.02		
	4	81377	-	81377	90.973			93.58		
	5	81890	-	81890	91.546			94.17		
	6	83951	-	83951	93.850			96.61		
30min	1	79519	-	79519	88.896	91.19	1.53	92.29	94.77	1.59
	2	82340	-	82340	92.049			95.73		
	3	82812	-	82812	92.577			96.24		
	4	81060	-	81060	90.618			94.14		
	5	81169	-	81169	90.740			94.28		
	6	82537	-	82537	92.270			95.96		
45min	1	78522	-	78522	87.781	90.26	1.91	92.07	94.76	1.95
	2	82121	-	82121	91.805			96.41		
	3	81679	-	81679	91.310			95.90		
	4	79265	-	79265	88.612			93.04		
	5	80724	-	80724	90.243			94.69		
	6	82133	-	82133	91.818			96.43		
60min	1	78002	-	78002	87.200	89.30	1.37	92.36	94.70	1.44
	2	80582	-	80582	90.084			95.60		
	3	80616	-	80616	90.122			95.63		
	4	79096	-	79096	88.423			93.74		
	5	80409	-	80409	89.891			95.24		
	6	80604	-	80604	90.109			95.64		
极限	1	79707	-	79707	89.106	88.76	0.28	95.14	95.05	0.15
	2	79205	-	79205	88.545			94.97		
	3	79469	-	79469	88.840			95.24		
	4	79556	-	79556	88.937			95.13		
	5	79337	-	79337	88.692			94.94		
	6	79121	-	79121	88.451			94.89		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	5	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90323	90245	90287	90303	90283	90288	0.04
2	14.35	90122	90176				90149	0.05
单位质量响应值				RSD%	判断			
6283.09				0.02	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121611批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	72179	-	72179	80.608	77.39	10.32	80.61	77.40	10.33
	2	76242	-	76242	85.145			85.15		
	3	64603	-	64603	72.147			72.15		
	4	63186	-	63186	70.565			70.56		
	5	78143	-	78143	87.268			87.27		
	6	61458	-	61458	68.635			68.63		
10min	1	78179	-	78179	87.309	87.60	6.02	88.11	88.38	6.05
	2	81787	-	81787	91.338			92.19		
	3	79085	-	79085	88.320			89.04		
	4	71650	-	71650	80.017			80.72		
	5	84916	-	84916	94.832			95.71		
	6	75043	-	75043	83.806			84.49		
15min	1	78909	-	78909	88.124	88.03	4.98	89.80	89.68	5.02
	2	81975	-	81975	91.548			93.31		
	3	79342	-	79342	88.607			90.21		
	4	72348	-	72348	80.797			82.30		
	5	83427	-	83427	93.170			94.99		
	6	76957	-	76957	85.944			87.47		
20min	1	78802	-	78802	88.004	88.22	3.99	90.56	90.76	4.05
	2	80703	-	80703	90.127			92.81		
	3	80370	-	80370	89.756			92.25		
	4	73701	-	73701	82.308			84.62		
	5	82824	-	82824	92.496			95.25		
	6	77591	-	77591	86.652			89.04		
30min	1	79494	-	79494	88.777	88.63	4.07	92.22	92.04	4.12
	2	80509	-	80509	89.911			93.49		
	3	81094	-	81094	90.564			93.95		
	4	73914	-	73914	82.546			85.68		
	5	83322	-	83322	93.052			96.73		
	6	77858	-	77858	86.950			90.20		
45min	1	77708	-	77708	86.783	88.25	3.14	91.11	92.55	3.21
	2	80704	-	80704	90.129			94.61		
	3	80510	-	80510	89.912			94.21		
	4	74953	-	74953	83.706			87.67		
	5	81687	-	81687	91.226			95.83		
	6	78572	-	78572	87.748			91.87		
60min	1	76827	-	76827	85.799	87.27	2.58	90.99	92.45	2.69
	2	79337	-	79337	88.602			93.98		
	3	77797	-	77797	86.882			92.08		
	4	75318	-	75318	84.114			88.91		
	5	81138	-	81138	90.613			96.13		
	6	78430	-	78430	87.589			92.59		
极限	1	77289	-	77289	86.315	88.71	1.80	92.37	94.76	1.86
	2	80279	-	80279	89.654			95.92		
	3	80527	-	80527	89.931			95.99		
	4	79208	-	79208	88.458			94.10		
	5	80975	-	80975	90.431			96.86		
	6	78301	-	78301	87.445			93.32		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	5	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90361	90195	90263	90285	90166	90254	0.09
2	14.35	90730	90980				90855	0.20
单位质量响应值			RSD%	判断				
6280.72			0.57	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024121611批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	73940	-	73940	82.269	77.42	7.76	82.27	77.42	7.76
	2	64365	-	64365	71.616			71.62		
	3	72223	-	72223	80.359			80.36		
	4	66693	-	66693	74.206			74.21		
	5	76590	-	76590	85.218			85.22		
	6	63672	-	63672	70.845			70.84		
10min	1	80134	-	80134	89.161	87.36	4.22	89.98	88.13	4.24
	2	75591	-	75591	84.106			84.82		
	3	80953	-	80953	90.072			90.88		
	4	74623	-	74623	83.029			83.77		
	5	82944	-	82944	92.288			93.14		
	6	76849	-	76849	85.506			86.21		
15min	1	80407	-	80407	89.465	88.16	3.47	91.18	89.81	3.50
	2	77335	-	77335	86.047			87.60		
	3	80614	-	80614	89.695			91.40		
	4	75214	-	75214	83.687			85.26		
	5	83023	-	83023	92.376			94.15		
	6	78814	-	78814	87.692			89.26		
20min	1	79920	-	79920	88.923	88.29	3.68	91.53	90.82	3.71
	2	76732	-	76732	85.376			87.79		
	3	82359	-	82359	91.637			94.24		
	4	75472	-	75472	83.974			86.38		
	5	82692	-	82692	92.007			94.71		
	6	78939	-	78939	87.831			90.27		
30min	1	79936	-	79936	88.941	87.97	2.68	92.44	91.38	2.73
	2	77087	-	77087	85.771			89.04		
	3	80703	-	80703	89.794			93.31		
	4	75929	-	75929	84.482			87.73		
	5	81309	-	81309	90.468			94.09		
	6	79410	-	79410	88.356			91.67		
45min	1	79288	-	79288	88.220	88.54	2.42	92.61	92.83	2.45
	2	79947	-	79947	88.953			93.08		
	3	80902	-	80902	90.016			94.43		
	4	76170	-	76170	84.751			88.84		
	5	81769	-	81769	90.980			95.50		
	6	79397	-	79397	88.341			92.54		
60min	1	78873	-	78873	87.758	87.10	2.42	93.03	92.28	2.48
	2	76210	-	76210	84.795			89.81		
	3	80019	-	80019	89.033			94.35		
	4	75852	-	75852	84.397			89.34		
	5	80354	-	80354	89.406			94.84		
	6	78369	-	78369	87.197			92.28		
极限	1	79135	-	79135	88.050	88.84	0.86	94.20	94.89	0.96
	2	79855	-	79855	88.851			94.72		
	3	80046	-	80046	89.063			95.27		
	4	79095	-	79095	88.005			93.79		
	5	80937	-	80937	90.055			96.38		
	6	80031	-	80031	89.046			95.00		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	5	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90385	90231	90373	90172	90352	90303	0.11
2	14.35	90643	90655				90649	0.01
单位质量响应值			RSD%	判断				
6284.13			0.37	数据可信				

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024122311批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	67233	-	67233	74.871	80.70	5.70	74.87	80.70	5.70
	2	73450	-	73450	81.794			81.79		
	3	72786	-	72786	81.055			81.05		
	4	69396	-	69396	77.280			77.28		
	5	72592	-	72592	80.839			80.84		
	6	79348	-	79348	88.362			88.36		
10min	1	79920	-	79920	88.999	90.83	2.73	89.75	91.64	2.73
	2	82022	-	82022	91.340			92.16		
	3	80065	-	80065	89.161			89.97		
	4	79429	-	79429	88.453			89.23		
	5	85274	-	85274	94.962			95.77		
	6	82694	-	82694	92.089			92.97		
15min	1	78519	-	78519	87.439	89.96	2.48	89.08	91.68	2.48
	2	82243	-	82243	91.586			93.32		
	3	79026	-	79026	88.004			89.71		
	4	79976	-	79976	89.062			90.72		
	5	83747	-	83747	93.261			95.02		
	6	81202	-	81202	90.427			92.23		
20min	1	77962	-	77962	86.819	88.95	2.21	89.33	91.57	2.22
	2	80703	-	80703	89.871			92.52		
	3	77991	-	77991	86.851			89.43		
	4	79235	-	79235	88.237			90.78		
	5	82214	-	82214	91.554			94.24		
	6	81166	-	81166	90.387			93.10		
30min	1	77299	-	77299	86.081	88.25	1.95	89.46	91.76	1.97
	2	80254	-	80254	89.371			92.92		
	3	78275	-	78275	87.168			90.62		
	4	78516	-	78516	87.436			90.87		
	5	81595	-	81595	90.865			94.47		
	6	79565	-	79565	88.604			92.22		
45min	1	78764	-	78764	87.712	88.25	1.74	91.95	92.64	1.77
	2	79430	-	79430	88.454			92.89		
	3	77768	-	77768	86.603			90.93		
	4	77848	-	77848	86.692			91.00		
	5	80999	-	80999	90.201			94.72		
	6	80665	-	80665	89.829			94.33		
60min	1	76650	-	76650	85.358	87.07	1.90	90.48	92.34	1.91
	2	78951	-	78951	87.920			93.24		
	3	77576	-	77576	86.389			91.58		
	4	76682	-	76682	85.394			90.57		
	5	80401	-	80401	89.535			94.95		
	6	78857	-	78857	87.816			93.21		
极限	1	78433	-	78433	87.343	86.74	1.48	93.32	92.88	1.46
	2	78133	-	78133	87.009			93.21		
	3	77740	-	77740	86.572			92.62		
	4	75736	-	75736	84.340			90.37		
	5	79087	-	79087	88.072			94.38		
	6	78227	-	78227	87.114			93.39		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



苯磺酸氨氯地平片项目信息


介质体积(ml)	500	取样体积(ml)	5	补液体积(ml)	5
对照品批号	100546-202405	对照品来源	中检院	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	97.3	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	10000
标示量(mg)	2.5	供试品稀释倍数	5	系数	0.7211

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	14.37	90959	90979	90911	90780	90947	90915	0.09
2	14.35	91178	91108				91143	0.06
单位质量响应值				RSD%	判断			
6326.72				0.28	数据可信			

溶出曲线测定

苯磺酸氨氯地平片



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024122311批-pH1.2

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	76724	-	76724	84.921	80.30	3.95	84.92	80.30	3.95
	2	71039	-	71039	78.629			78.63		
	3	72764	-	72764	80.538			80.54		
	4	74685	-	74685	82.664			82.66		
	5	71498	-	71498	79.137			79.14		
	6	68596	-	68596	75.925			75.92		
10min	1	83555	-	83555	92.482	90.53	2.50	93.33	91.33	2.51
	2	80703	-	80703	89.325			90.11		
	3	83288	-	83288	92.186			92.99		
	4	83967	-	83967	92.938			93.76		
	5	79693	-	79693	88.207			89.00		
	6	79528	-	79528	88.025			88.78		
15min	1	80272	-	80272	88.848	89.54	1.55	90.62	91.24	1.56
	2	80728	-	80728	89.353			91.03		
	3	82374	-	82374	91.175			92.90		
	4	82494	-	82494	91.307			93.06		
	5	79984	-	79984	88.529			90.20		
	6	79527	-	79527	88.024			89.66		
20min	1	79501	-	79501	87.995	89.58	2.86	90.66	92.19	2.77
	2	79440	-	79440	87.927			90.50		
	3	81694	-	81694	90.422			93.06		
	4	82021	-	82021	90.784			93.45		
	5	78316	-	78316	86.683			89.24		
	6	84646	-	84646	93.689			96.21		
30min	1	79447	-	79447	87.935	88.25	1.82	91.48	91.76	1.80
	2	79844	-	79844	88.374			91.83		
	3	81665	-	81665	90.390			93.93		
	4	81025	-	81025	89.682			93.26		
	5	78644	-	78644	87.046			90.47		
	6	77791	-	77791	86.102			89.56		
45min	1	79413	-	79413	87.897	87.92	1.53	92.32	92.30	1.53
	2	78876	-	78876	87.303			91.64		
	3	80793	-	80793	89.425			93.87		
	4	80963	-	80963	89.613			94.09		
	5	78042	-	78042	86.380			90.68		
	6	78496	-	78496	86.882			91.20		
60min	1	79292	-	79292	87.763	87.09	1.60	93.06	92.35	1.60
	2	78043	-	78043	86.381			91.59		
	3	80273	-	80273	88.849			94.19		
	4	79742	-	79742	88.261			93.63		
	5	77459	-	77459	85.735			90.89		
	6	77289	-	77289	85.546			90.73		
极限	1	78235	-	78235	86.593	86.67	0.59	92.77	92.80	0.65
	2	78243	-	78243	86.602			92.68		
	3	78525	-	78525	86.914			93.14		
	4	79087	-	79087	87.536			93.79		
	5	77796	-	77796	86.108			92.12		
	6	77962	-	77962	86.291			92.33		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-07

复核者:

未审阅版本




J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-228-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 50μl
进样时间: 2025/03/06 11:28:54
处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min
波长: 238nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>
mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-229-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:32:49

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	90756	100.000	14935	3099	1.188	--
总计		90756	100.000	14935			

图2 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-230-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:36:43

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	90337	100.000	14935	3119	1.190	--
总计		90337	100.000	14935			

图3 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-231-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:40:39

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	90401	100.000	14955	3110	1.192	--
总计		90401	100.000	14955			

图4 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-232-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:44:35

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	90296	100.000	14952	3112	1.185	--
总计		90296	100.000	14952			

图5 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-233-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:48:32

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	90292	100.000	14952	3120	1.187	--
总计		90292	100.000	14952			

图6 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-234-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:52:26

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	67327	100.000	12401	3918	1.158	--
总计		67327	100.000	12401			

图7 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-235-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:56:22

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	65391	100.000	12014	3903	1.160	--
总计		65391	100.000	12014			

图8 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-236-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:00:15

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:16:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	79029	100.000	14506	3895	1.157	--
总计		79029	100.000	14506			

图9 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-237-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:04:10

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	77861	100.000	14283	3896	1.158	--
总计		77861	100.000	14283			

图10 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-238-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:08:04

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	77880	100.000	14334	3910	1.157	--
总计		77880	100.000	14334			

图11 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-239-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:11:59

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	74256	100.000	13682	3917	1.161	--
总计		74256	100.000	13682			

图12 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-240-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:15:54

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	77395	100.000	14208	3889	1.159	--
总计		77395	100.000	14208			

图13 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-241-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:19:48

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	80392	100.000	14770	3900	1.159	--
总计		80392	100.000	14770			

图14 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-242-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:23:43

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	84891	100.000	15589	3895	1.160	--
总计		84891	100.000	15589			

图15 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-243-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:27:38

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	82574	100.000	15153	3888	1.160	--
总计		82574	100.000	15153			

图16 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-244-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:31:32

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	84833	100.000	15507	3877	1.160	--
总计		84833	100.000	15507			

图17 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-245-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:35:26

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	84665	100.000	15538	3911	1.159	--
总计		84665	100.000	15538			

图18 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-246-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:39:21

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	78513	100.000	14439	3909	1.156	--
总计		78513	100.000	14439			

图19 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-247-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:43:16

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	80792	100.000	14796	3900	1.163	--
总计		80792	100.000	14796			

图20 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-248-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:47:12

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	84218	100.000	15452	3909	1.162	--
总计		84218	100.000	15452			

图21 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-249-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:51:06

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	82270	100.000	15020	3892	1.163	--
总计		82270	100.000	15020			

图22 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-250-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:55:00

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	83942	100.000	15383	3895	1.162	--
总计		83942	100.000	15383			

图23 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-251-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:58:54

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	84206	100.000	15410	3891	1.160	--
总计		84206	100.000	15410			

图24 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-252-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:02:49

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	79147	100.000	14486	3908	1.159	--
总计		79147	100.000	14486			

图25 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-253-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:06:45

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	81295	100.000	14861	3889	1.158	--
总计		81295	100.000	14861			

图26 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-254-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:10:39

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	84123	100.000	15386	3893	1.160	--
总计		84123	100.000	15386			

图27 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-255-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:14:34

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82766	100.000	15144	3886	1.160	--
总计		82766	100.000	15144			

图28 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-256-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:18:28

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	83854	100.000	15383	3900	1.157	--
总计		83854	100.000	15383			

图29 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-257-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:22:21

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:17:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	83427	100.000	15266	3909	1.164	--
总计		83427	100.000	15266			

图30 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-258-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:26:16

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	78623	100.000	14366	3891	1.164	--
总计		78623	100.000	14366			

图31 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-259-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:30:12

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	80520	100.000	14757	3887	1.161	--
总计		80520	100.000	14757			

图32 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-260-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:34:07

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	82771	100.000	15166	3891	1.163	--
总计		82771	100.000	15166			

图33 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-261-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:38:01

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82103	100.000	15075	3902	1.159	--
总计		82103	100.000	15075			

图34 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-262-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:41:55

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82941	100.000	15182	3910	1.161	--
总计		82941	100.000	15182			

图35 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-263-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:45:51

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	82900	100.000	15152	3907	1.164	--
总计		82900	100.000	15152			

图36 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-264-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:49:46

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	77248	100.000	14197	3882	1.162	--
总计		77248	100.000	14197			

图37 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-265-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:53:40

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	79654	100.000	14608	3884	1.159	--
总计		79654	100.000	14608			

图38 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-266-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:57:35

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82629	100.000	15223	3937	1.160	--
总计		82629	100.000	15223			

图39 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-267-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:01:30

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82293	100.000	15057	3903	1.160	--
总计		82293	100.000	15057			

图40 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-268-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:05:23

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	82443	100.000	15091	3892	1.162	--
总计		82443	100.000	15091			

图41 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-269-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:09:19

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	82049	100.000	15059	3920	1.161	--
总计		82049	100.000	15059			

图42 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-270-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:13:14

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	77694	100.000	14267	3896	1.159	--
总计		77694	100.000	14267			

图43 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-271-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:17:08

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	79085	100.000	14553	3898	1.164	--
总计		79085	100.000	14553			

图44 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-272-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:21:03

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	80569	100.000	14743	3893	1.164	--
总计		80569	100.000	14743			

图45 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-273-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:24:59

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	79989	100.000	14637	3883	1.162	--
总计		79989	100.000	14637			

图46 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-274-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:28:53

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	81171	100.000	14861	3887	1.164	--
总计		81171	100.000	14861			

图47 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-275-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:32:46

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	80400	100.000	14690	3894	1.162	--
总计		80400	100.000	14690			

图48 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-276-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:36:43

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	80960	100.000	14781	3879	1.161	--
总计		80960	100.000	14781			

图49 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-277-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:40:38

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	79322	100.000	14553	3905	1.161	--
总计		79322	100.000	14553			

图50 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-278-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:44:32

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	79277	100.000	14566	3880	1.163	--
总计		79277	100.000	14566			

图51 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-279-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:48:29

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:18:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	79356	100.000	14576	3880	1.157	--
总计		79356	100.000	14576			

图52 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-280-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:52:25

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:19:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	79930	100.000	14699	3898	1.162	--
总计		79930	100.000	14699			

图53 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-281-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:56:20

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:19:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	78920	100.000	14539	3891	1.163	--
总计		78920	100.000	14539			

图54 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-282-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:00:15

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:19:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90410	100.000	14995	3113	1.191	--
总计		90410	100.000	14995			

图55 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-125/26-283-3 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:04:12

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:19:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	90563	100.000	15010	3114	1.192	--
总计		90563	100.000	15010			

图56 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-511-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:28:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-512-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:32:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	89861	100.000	15344	3236	1.110	--
总计		89861	100.000	15344			

图58 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-513-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:36:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	90127	100.000	15357	3227	1.109	--
总计		90127	100.000	15357			

图59 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-514-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:40:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90313	100.000	15371	3228	1.111	--
总计		90313	100.000	15371			

图60 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-515-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:44:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90152	100.000	15356	3232	1.109	--
总计		90152	100.000	15356			

图61 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-516-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:48:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90252	100.000	15382	3230	1.112	--
总计		90252	100.000	15382			

图62 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-517-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:52:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	66108	100.000	12451	4006	1.072	--
总计		66108	100.000	12451			

图63 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-518-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 11:56:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78554	100.000	14810	4005	1.072	--
总计		78554	100.000	14810			

图64 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-519-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:00:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	75800	100.000	14334	4010	1.072	--
总计		75800	100.000	14334			

图65 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-520-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:04:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	73369	100.000	13883	4009	1.071	--
总计		73369	100.000	13883			

图66 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-521-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:08:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	69321	100.000	13106	4007	1.073	--
总计		69321	100.000	13106			

图67 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-522-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:11:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77491	100.000	14669	4018	1.072	--
总计		77491	100.000	14669			

图68 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-523-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:15:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79018	100.000	14956	4005	1.072	--
总计		79018	100.000	14956			

图69 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-524-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:19:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	83931	100.000	15849	3998	1.075	--
总计		83931	100.000	15849			

图70 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-525-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:23:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	84466	100.000	15999	4012	1.070	--
总计		84466	100.000	15999			

图71 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-526-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:27:36

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80053	100.000	15154	4005	1.074	--
总计		80053	100.000	15154			

图72 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-527-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:31:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:20:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	82291	100.000	15602	4001	1.072	--
总计		82291	100.000	15602			

图73 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-528-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:35:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	84516	100.000	16006	4008	1.072	--
总计		84516	100.000	16006			

图74 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-529-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:39:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79035	100.000	14999	4003	1.073	--
总计		79035	100.000	14999			

图75 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-530-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:43:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	83560	100.000	15824	4000	1.074	--
总计		83560	100.000	15824			

图76 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-531-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:47:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	84066	100.000	15928	4009	1.073	--
总计		84066	100.000	15928			

图77 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-532-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:51:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80109	100.000	15166	3999	1.072	--
总计		80109	100.000	15166			

图78 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-533-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:55:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	82702	100.000	15654	4001	1.071	--
总计		82702	100.000	15654			

图79 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-534-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 12:58:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	84442	100.000	16009	4002	1.071	--
总计		84442	100.000	16009			

图80 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-535-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:02:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79656	100.000	15136	4011	1.072	--
总计		79656	100.000	15136			

图81 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-536-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:06:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	83335	100.000	15789	3997	1.073	--
总计		83335	100.000	15789			

图82 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-537-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:10:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	83450	100.000	15830	4003	1.073	--
总计		83450	100.000	15830			

图83 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-538-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:14:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	81377	100.000	15406	4005	1.071	--
总计		81377	100.000	15406			

图84 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-539-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:18:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	81890	100.000	15530	4002	1.073	--
总计		81890	100.000	15530			

图85 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-540-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:22:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	83951	100.000	15925	4008	1.072	--
总计		83951	100.000	15925			

图86 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-541-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:26:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79519	100.000	15068	4001	1.070	--
总计		79519	100.000	15068			

图87 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-542-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:30:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	82340	100.000	15627	4009	1.072	--
总计		82340	100.000	15627			

图88 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-543-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:34:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	82812	100.000	15701	3999	1.071	--
总计		82812	100.000	15701			

图89 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-544-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:38:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	81060	100.000	15342	3999	1.072	--
总计		81060	100.000	15342			

图90 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-545-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:42:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	81169	100.000	15396	4010	1.069	--
总计		81169	100.000	15396			

图91 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-546-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:45:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	82537	100.000	15662	3996	1.071	--
总计		82537	100.000	15662			

图92 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-547-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:49:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	78522	100.000	14852	4002	1.074	--
总计		78522	100.000	14852			

图93 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-548-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:53:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	82121	100.000	15566	4015	1.071	--
总计		82121	100.000	15566			

图94 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-549-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 13:57:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:21:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	81679	100.000	15527	4025	1.072	--
总计		81679	100.000	15527			

图95 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-550-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:01:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79265	100.000	15022	4011	1.069	--
总计		79265	100.000	15022			

图96 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-551-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:05:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80724	100.000	15309	4007	1.069	--
总计		80724	100.000	15309			

图97 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-552-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:09:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	82133	100.000	15575	4013	1.069	--
总计		82133	100.000	15575			

图98 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-553-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:13:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78002	100.000	14771	3995	1.072	--
总计		78002	100.000	14771			

图99 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-554-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:17:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80582	100.000	15287	3997	1.071	--
总计		80582	100.000	15287			

图100 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-555-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:21:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80616	100.000	15295	4008	1.072	--
总计		80616	100.000	15295			

图101 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-556-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:25:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79096	100.000	14988	4010	1.072	--
总计		79096	100.000	14988			

图102 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-557-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:29:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80409	100.000	15221	3999	1.077	--
总计		80409	100.000	15221			

图103 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-558-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:32:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80604	100.000	15278	4011	1.072	--
总计		80604	100.000	15278			

图104 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-559-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:36:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79707	100.000	15119	4004	1.071	--
总计		79707	100.000	15119			

图105 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-560-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:40:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79205	100.000	15026	4009	1.074	--
总计		79205	100.000	15026			

图106 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-561-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:44:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79469	100.000	15072	4006	1.074	--
总计		79469	100.000	15072			

图107 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-562-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:48:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79556	100.000	15095	4006	1.069	--
总计		79556	100.000	15095			

图108 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-563-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:52:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79337	100.000	15052	4007	1.073	--
总计		79337	100.000	15052			

图109 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-564-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 14:56:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79121	100.000	15030	4004	1.073	--
总计		79121	100.000	15030			

图110 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-565-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:00:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90093	100.000	15524	3242	1.109	--
总计		90093	100.000	15524			

图111 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-566-2 - zzp-2.5mg-2024121111p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:04:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90132	100.000	15513	3239	1.109	--
总计		90132	100.000	15513			

图112 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121111批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-567-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:08:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-568-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:12:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90323	100.000	15572	3252	1.110	--
总计		90323	100.000	15572			

图114 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-569-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:16:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	90245	100.000	15566	3252	1.109	--
总计		90245	100.000	15566			

图115 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-570-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:20:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:22:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	90287	100.000	15560	3252	1.106	--
总计		90287	100.000	15560			

图116 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-571-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:24:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90303	100.000	15549	3247	1.108	--
总计		90303	100.000	15549			

图117 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-572-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:28:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90283	100.000	15546	3247	1.110	--
总计		90283	100.000	15546			

图118 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-573-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:31:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	72179	100.000	13665	3998	1.071	--
总计		72179	100.000	13665			

图119 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-574-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:35:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	76242	100.000	14453	4008	1.069	--
总计		76242	100.000	14453			

图120 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-575-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:39:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	64603	100.000	12212	3996	1.070	--
总计		64603	100.000	12212			

图121 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-576-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:43:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	63186	100.000	11970	4003	1.069	--
总计		63186	100.000	11970			

图122 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-577-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:47:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	78143	100.000	14792	4009	1.070	--
总计		78143	100.000	14792			

图123 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-578-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:51:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	61458	100.000	11644	4000	1.068	--
总计		61458	100.000	11644			

图124 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-579-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:55:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78179	100.000	14814	4005	1.070	--
总计		78179	100.000	14814			

图125 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-580-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 15:59:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	81787	100.000	15526	4017	1.071	--
总计		81787	100.000	15526			

图126 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-581-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:03:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79085	100.000	15001	4016	1.068	--
总计		79085	100.000	15001			

图127 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-582-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:07:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	71650	100.000	13598	4009	1.070	--
总计		71650	100.000	13598			

图128 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-583-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:11:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	84916	100.000	16116	4010	1.070	--
总计		84916	100.000	16116			

图129 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-584-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:15:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	75043	100.000	14226	4004	1.070	--
总计		75043	100.000	14226			

图130 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-585-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:19:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	78909	100.000	15001	4037	1.069	--
总计		78909	100.000	15001			

图131 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-586-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:23:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	81975	100.000	15558	4013	1.071	--
总计		81975	100.000	15558			

图132 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-587-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:27:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	79342	100.000	15021	3999	1.069	--
总计		79342	100.000	15021			

图133 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-588-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:30:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	72348	100.000	13742	4014	1.070	--
总计		72348	100.000	13742			

图134 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-589-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:34:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	83427	100.000	15850	4014	1.068	--
总计		83427	100.000	15850			

图135 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-590-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:38:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	76957	100.000	14579	4007	1.070	--
总计		76957	100.000	14579			

图136 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-591-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:42:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78802	100.000	14934	4004	1.066	--
总计		78802	100.000	14934			

图137 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-592-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:46:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:23:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80703	100.000	15290	4004	1.071	--
总计		80703	100.000	15290			

图138 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-593-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:50:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80370	100.000	15237	4005	1.069	--
总计		80370	100.000	15237			

图139 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-594-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:54:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	73701	100.000	13989	4014	1.069	--
总计		73701	100.000	13989			

图140 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-595-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 16:58:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	82824	100.000	15713	4009	1.067	--
总计		82824	100.000	15713			

图141 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-596-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:02:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	77591	100.000	14716	4007	1.070	--
总计		77591	100.000	14716			

图142 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-597-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:06:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	79494	100.000	15039	4006	1.069	--
总计		79494	100.000	15039			

图143 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-598-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:10:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	80509	100.000	15221	4001	1.070	--
总计		80509	100.000	15221			

图144 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-599-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:14:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	81094	100.000	15363	4006	1.069	--
总计		81094	100.000	15363			

图145 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-600-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:18:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	73914	100.000	14017	4013	1.069	--
总计		73914	100.000	14017			

图146 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-601-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:22:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	83322	100.000	15795	4016	1.070	--
总计		83322	100.000	15795			

图147 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-602-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:26:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	77858	100.000	14750	4002	1.069	--
总计		77858	100.000	14750			

图148 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-603-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:30:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	77708	100.000	14757	4016	1.068	--
总计		77708	100.000	14757			

图149 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-604-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:34:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80704	100.000	15334	4015	1.069	--
总计		80704	100.000	15334			

图150 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-605-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:37:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80510	100.000	15231	4003	1.070	--
总计		80510	100.000	15231			

图151 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-606-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:41:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	74953	100.000	14232	4018	1.067	--
总计		74953	100.000	14232			

图152 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-607-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:45:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	81687	100.000	15466	4005	1.070	--
总计		81687	100.000	15466			

图153 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-608-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:49:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	78572	100.000	14910	4021	1.070	--
总计		78572	100.000	14910			

图154 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-609-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:53:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	76827	100.000	14556	4003	1.068	--
总计		76827	100.000	14556			

图155 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-610-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 17:57:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	79337	100.000	15029	4011	1.070	--
总计		79337	100.000	15029			

图156 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-611-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:01:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	77797	100.000	14754	4014	1.070	--
总计		77797	100.000	14754			

图157 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-612-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:05:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	75318	100.000	14315	4029	1.066	--
总计		75318	100.000	14315			

图158 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-613-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:09:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:24:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	81138	100.000	15357	4013	1.067	--
总计		81138	100.000	15357			

图159 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-614-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:13:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78430	100.000	14893	4015	1.070	--
总计		78430	100.000	14893			

图160 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-615-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:17:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	77289	100.000	14682	4022	1.068	--
总计		77289	100.000	14682			

图161 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-616-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:21:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80279	100.000	15261	4018	1.071	--
总计		80279	100.000	15261			

图162 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-617-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:25:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80527	100.000	15290	4015	1.072	--
总计		80527	100.000	15290			

图163 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-618-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:29:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	79208	100.000	15062	4021	1.069	--
总计		79208	100.000	15062			

图164 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-619-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:33:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80975	100.000	15409	4033	1.068	--
总计		80975	100.000	15409			

图165 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-620-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:37:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78301	100.000	14899	4029	1.071	--
总计		78301	100.000	14899			

图166 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-621-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:41:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90122	100.000	15548	3257	1.108	--
总计		90122	100.000	15548			

图167 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-622-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:44:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90176	100.000	15543	3252	1.108	--
总计		90176	100.000	15543			

图168 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-623-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:48:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-624-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:52:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90361	100.000	15571	3252	1.108	--
总计		90361	100.000	15571			

图170 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-625-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 18:56:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90195	100.000	15570	3257	1.109	--
总计		90195	100.000	15570			

图171 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-626-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:00:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90263	100.000	15599	3268	1.107	--
总计		90263	100.000	15599			

图172 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-627-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:04:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	90285	100.000	15570	3260	1.109	--
总计		90285	100.000	15570			

图173 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-628-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:08:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	90166	100.000	15581	3270	1.109	--
总计		90166	100.000	15581			

图174 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-629-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:12:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	73940	100.000	14058	4021	1.070	--
总计		73940	100.000	14058			

图175 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-630-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:16:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	64365	100.000	12215	4017	1.072	--
总计		64365	100.000	12215			

图176 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-631-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:20:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	72223	100.000	13718	4012	1.069	--
总计		72223	100.000	13718			

图177 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-632-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:24:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	66693	100.000	12656	4005	1.068	--
总计		66693	100.000	12656			

图178 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-633-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:28:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	76590	100.000	14547	4008	1.070	--
总计		76590	100.000	14547			

图179 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-634-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:31:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	63672	100.000	12079	4018	1.070	--
总计		63672	100.000	12079			

图180 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-635-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:35:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:25:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80134	100.000	15213	4019	1.070	--
总计		80134	100.000	15213			

图181 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-636-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:39:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	75591	100.000	14390	4025	1.070	--
总计		75591	100.000	14390			

图182 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-637-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:43:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80953	100.000	15377	4024	1.069	--
总计		80953	100.000	15377			

图183 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-638-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:47:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	74623	100.000	14203	4030	1.067	--
总计		74623	100.000	14203			

图184 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-639-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:51:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	82944	100.000	15765	4024	1.071	--
总计		82944	100.000	15765			

图185 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-640-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:55:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	76849	100.000	14583	4019	1.069	--
总计		76849	100.000	14583			

图186 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-641-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 19:59:16

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80407	100.000	15318	4050	1.070	--
总计		80407	100.000	15318			

图187 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-642-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:03:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	77335	100.000	14692	4020	1.070	--
总计		77335	100.000	14692			

图188 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-643-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:07:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	80614	100.000	15297	4010	1.069	--
总计		80614	100.000	15297			

图189 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-644-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:10:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	75214	100.000	14282	4019	1.070	--
总计		75214	100.000	14282			

图190 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-645-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:14:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	83023	100.000	15740	4015	1.071	--
总计		83023	100.000	15740			

图191 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-646-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:18:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78814	100.000	14920	4011	1.073	--
总计		78814	100.000	14920			

图192 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-647-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:22:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	79920	100.000	15146	4007	1.068	--
总计		79920	100.000	15146			

图193 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-648-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:26:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	76732	100.000	14560	4022	1.067	--
总计		76732	100.000	14560			

图194 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-649-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:30:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	82359	100.000	15611	4007	1.070	--
总计		82359	100.000	15611			

图195 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-650-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:34:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	75472	100.000	14363	4031	1.070	--
总计		75472	100.000	14363			

图196 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-651-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:38:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	82692	100.000	15642	4009	1.071	--
总计		82692	100.000	15642			

图197 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-652-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:42:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	78939	100.000	14998	4024	1.072	--
总计		78939	100.000	14998			

图198 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-653-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:46:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79936	100.000	15230	4031	1.070	--
总计		79936	100.000	15230			

图199 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-654-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:50:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	77087	100.000	14693	4033	1.067	--
总计		77087	100.000	14693			

图200 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-655-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:53:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	80703	100.000	15359	4030	1.071	--
总计		80703	100.000	15359			

图201 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-656-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 20:57:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:26:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	75929	100.000	14480	4053	1.069	--
总计		75929	100.000	14480			

图202 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-657-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:01:43

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	81309	100.000	15492	4036	1.069	--
总计		81309	100.000	15492			

图203 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-658-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:05:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79410	100.000	15129	4037	1.071	--
总计		79410	100.000	15129			

图204 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-659-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:09:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	79288	100.000	15132	4047	1.070	--
总计		79288	100.000	15132			

图205 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-660-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:13:26

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79947	100.000	15308	4107	1.066	--
总计		79947	100.000	15308			

图206 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-661-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:17:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	80902	100.000	15419	4044	1.071	--
总计		80902	100.000	15419			

图207 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-662-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:21:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	76170	100.000	14522	4049	1.073	--
总计		76170	100.000	14522			

图208 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-663-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:25:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	81769	100.000	15643	4073	1.068	--
总计		81769	100.000	15643			

图209 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-664-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:29:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	79397	100.000	15156	4051	1.070	--
总计		79397	100.000	15156			

图210 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-665-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:32:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	78873	100.000	15094	4079	1.068	--
总计		78873	100.000	15094			

图211 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-666-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:36:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	76210	100.000	14539	4043	1.072	--
总计		76210	100.000	14539			

图212 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-667-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:40:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	80019	100.000	15283	4049	1.071	--
总计		80019	100.000	15283			

图213 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-668-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:44:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	75852	100.000	14491	4059	1.071	--
总计		75852	100.000	14491			

图214 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-669-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:48:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	80354	100.000	15346	4064	1.073	--
总计		80354	100.000	15346			

图215 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-670-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:52:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	78369	100.000	14998	4065	1.070	--
总计		78369	100.000	14998			

图216 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-671-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 21:56:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79135	100.000	15109	4076	1.068	--
总计		79135	100.000	15109			

图217 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-672-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:00:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79855	100.000	15254	4062	1.068	--
总计		79855	100.000	15254			

图218 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-673-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:04:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	80046	100.000	15288	4057	1.069	--
总计		80046	100.000	15288			

图219 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-674-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:08:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	79095	100.000	15094	4066	1.072	--
总计		79095	100.000	15094			

图220 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-675-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:12:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80937	100.000	15437	4060	1.075	--
总计		80937	100.000	15437			

图221 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-676-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:15:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80031	100.000	15267	4085	1.070	--
总计		80031	100.000	15267			

图222 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-677-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:19:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:27:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	90730	100.000	15827	3336	1.104	--
总计		90730	100.000	15827			

图223 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-678-2 - zzp-2.5mg-2024121611p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:23:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	90980	100.000	15833	3335	1.106	--
总计		90980	100.000	15833			

图224 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024121611批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-679-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:27:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-680-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:31:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	90385	100.000	15644	3281	1.107	--
总计		90385	100.000	15644			

图226 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-681-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:35:38

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	90231	100.000	15635	3284	1.108	--
总计		90231	100.000	15635			

图227 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-682-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:39:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	90373	100.000	15627	3290	1.110	--
总计		90373	100.000	15627			

图228 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-683-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:43:31

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	90172	100.000	15627	3294	1.109	--
总计		90172	100.000	15627			

图229 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-684-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:47:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	90352	100.000	15626	3296	1.108	--
总计		90352	100.000	15626			

图230 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-685-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:51:23

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	67233	100.000	12825	4074	1.066	--
总计		67233	100.000	12825			

图231 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-686-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:55:18

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	73450	100.000	14017	4068	1.067	--
总计		73450	100.000	14017			

图232 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-687-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 22:59:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	72786	100.000	13920	4084	1.067	--
总计		72786	100.000	13920			

图233 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-688-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:03:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	69396	100.000	13259	4095	1.068	--
总计		69396	100.000	13259			

图234 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-689-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:07:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	72592	100.000	13922	4113	1.063	--
总计		72592	100.000	13922			

图235 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-690-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:10:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79348	100.000	15193	4095	1.065	--
总计		79348	100.000	15193			

图236 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-691-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:14:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79920	100.000	15280	4072	1.072	--
总计		79920	100.000	15280			

图237 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-692-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:18:49

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	82022	100.000	15652	4059	1.072	--
总计		82022	100.000	15652			

图238 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-693-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:22:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80065	100.000	15287	4067	1.071	--
总计		80065	100.000	15287			

图239 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-694-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:26:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79429	100.000	15192	4076	1.067	--
总计		79429	100.000	15192			

图240 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-695-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:30:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	85274	100.000	16273	4078	1.072	--
总计		85274	100.000	16273			

图241 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-696-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:34:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82694	100.000	15770	4065	1.069	--
总计		82694	100.000	15770			

图242 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-697-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:38:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78519	100.000	14972	4065	1.072	--
总计		78519	100.000	14972			

图243 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-698-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:42:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82243	100.000	15705	4075	1.069	--
总计		82243	100.000	15705			

图244 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-699-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:46:15

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:28:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79026	100.000	15085	4086	1.072	--
总计		79026	100.000	15085			

图245 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-700-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:50:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79976	100.000	15257	4069	1.069	--
总计		79976	100.000	15257			

图246 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-701-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:54:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	83747	100.000	15976	4062	1.071	--
总计		83747	100.000	15976			

图247 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-702-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/06 23:58:00

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	81202	100.000	15481	4052	1.069	--
总计		81202	100.000	15481			

图248 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-703-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:01:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	77962	100.000	14864	4065	1.073	--
总计		77962	100.000	14864			

图249 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-704-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:05:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80703	100.000	15408	4062	1.069	--
总计		80703	100.000	15408			

图250 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

250



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-705-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:09:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	77991	100.000	14890	4073	1.068	--
总计		77991	100.000	14890			

图251 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-706-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:13:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79235	100.000	15144	4097	1.070	--
总计		79235	100.000	15144			

图252 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-707-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:17:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	82214	100.000	15730	4086	1.070	--
总计		82214	100.000	15730			

图253 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-708-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:21:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	81166	100.000	15516	4077	1.068	--
总计		81166	100.000	15516			

图254 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-709-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:25:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	77299	100.000	14735	4051	1.072	--
总计		77299	100.000	14735			

图255 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-710-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:29:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80254	100.000	15353	4084	1.066	--
总计		80254	100.000	15353			

图256 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-711-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:33:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78275	100.000	14951	4073	1.071	--
总计		78275	100.000	14951			

图257 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-712-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:37:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	78516	100.000	14980	4061	1.073	--
总计		78516	100.000	14980			

图258 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-713-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:41:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	81595	100.000	15579	4066	1.071	--
总计		81595	100.000	15579			

图259 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-714-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:45:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79565	100.000	15204	4065	1.069	--
总计		79565	100.000	15204			

图260 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

260



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-715-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:49:05

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78764	100.000	15085	4089	1.068	--
总计		78764	100.000	15085			

图261 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-716-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:53:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	79430	100.000	15186	4083	1.069	--
总计		79430	100.000	15186			

图262 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-717-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 00:56:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77768	100.000	14879	4091	1.068	--
总计		77768	100.000	14879			

图263 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-718-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:00:53

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77848	100.000	14870	4074	1.065	--
总计		77848	100.000	14870			

图264 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-719-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:04:48

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	80999	100.000	15486	4084	1.067	--
总计		80999	100.000	15486			

图265 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-720-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:08:44

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:29:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	80665	100.000	15411	4091	1.067	--
总计		80665	100.000	15411			

图266 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-721-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:12:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	76650	100.000	14586	4068	1.070	--
总计		76650	100.000	14586			

图267 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-722-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:16:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78951	100.000	15122	4091	1.068	--
总计		78951	100.000	15122			

图268 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-723-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:20:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77576	100.000	14841	4085	1.067	--
总计		77576	100.000	14841			

图269 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-724-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:24:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	76682	100.000	14665	4084	1.070	--
总计		76682	100.000	14665			

图270 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-725-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:28:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80401	100.000	15320	4077	1.070	--
总计		80401	100.000	15320			

图271 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-726-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:32:21

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78857	100.000	15053	4097	1.069	--
总计		78857	100.000	15053			

图272 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-727-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:36:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78433	100.000	14968	4092	1.070	--
总计		78433	100.000	14968			

图273 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-728-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:40:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	78133	100.000	14895	4071	1.068	--
总计		78133	100.000	14895			

图274 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-729-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:44:10

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	77740	100.000	14840	4078	1.069	--
总计		77740	100.000	14840			

图275 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-730-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:48:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	75736	100.000	14478	4084	1.068	--
总计		75736	100.000	14478			

图276 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-731-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:52:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	79087	100.000	15080	4081	1.070	--
总计		79087	100.000	15080			

图277 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-732-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:55:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78227	100.000	14900	4085	1.064	--
总计		78227	100.000	14900			

图278 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-733-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 01:59:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90643	100.000	15766	3338	1.103	--
总计		90643	100.000	15766			

图279 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-734-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:03:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90655	100.000	15760	3350	1.103	--
总计		90655	100.000	15760			

图280 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-735-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:07:46

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-736-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:11:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90959	100.000	15751	3316	1.103	--
总计		90959	100.000	15751			

图282 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-737-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:15:39

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90979	100.000	15760	3328	1.104	--
总计		90979	100.000	15760			

图283 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-738-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:19:33

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90911	100.000	15758	3329	1.103	--
总计		90911	100.000	15758			

图284 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-739-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:23:28

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90780	100.000	15742	3327	1.103	--
总计		90780	100.000	15742			

图285 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-740-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:27:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	90947	100.000	15754	3323	1.105	--
总计		90947	100.000	15754			

图286 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-741-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:31:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:30:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	76724	100.000	14575	4095	1.067	--
总计		76724	100.000	14575			

图287 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-742-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:35:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	71039	100.000	13485	4070	1.071	--
总计		71039	100.000	13485			

图288 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-743-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:39:07

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	72764	100.000	13831	4083	1.070	--
总计		72764	100.000	13831			

图289 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-744-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:43:02

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	74685	100.000	14297	4128	1.067	--
总计		74685	100.000	14297			

图290 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-745-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:46:57

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	71498	100.000	13630	4110	1.066	--
总计		71498	100.000	13630			

图291 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-746-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:50:51

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	68596	100.000	13038	4067	1.067	--
总计		68596	100.000	13038			

图292 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-747-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:54:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	83555	100.000	15939	4118	1.065	--
总计		83555	100.000	15939			

图293 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-748-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 02:58:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80703	100.000	15377	4081	1.071	--
总计		80703	100.000	15377			

图294 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-749-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:02:34

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83288	100.000	15864	4085	1.068	--
总计		83288	100.000	15864			

图295 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-750-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:06:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	83967	100.000	16002	4081	1.068	--
总计		83967	100.000	16002			

图296 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-751-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:10:24

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79693	100.000	15167	4091	1.070	--
总计		79693	100.000	15167			

图297 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-752-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:14:19

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79528	100.000	15118	4076	1.068	--
总计		79528	100.000	15118			

图298 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-753-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:18:14

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	80272	100.000	15270	4084	1.070	--
总计		80272	100.000	15270			

图299 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-754-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:22:09

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	80728	100.000	15367	4092	1.068	--
总计		80728	100.000	15367			

图300 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-755-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:26:04

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82374	100.000	15668	4078	1.072	--
总计		82374	100.000	15668			

图301 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-756-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:29:59

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82494	100.000	15665	4071	1.069	--
总计		82494	100.000	15665			

图302 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-757-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:33:55

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79984	100.000	15191	4094	1.066	--
总计		79984	100.000	15191			

图303 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-758-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:37:50

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79527	100.000	15119	4080	1.068	--
总计		79527	100.000	15119			

图304 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-759-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:41:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79501	100.000	15120	4082	1.068	--
总计		79501	100.000	15120			

图305 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

305



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-760-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:45:40

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	79440	100.000	15073	4074	1.066	--
总计		79440	100.000	15073			

图306 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-761-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:49:35

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	81694	100.000	15513	4078	1.067	--
总计		81694	100.000	15513			

图307 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-762-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:53:30

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	82021	100.000	15576	4081	1.070	--
总计		82021	100.000	15576			

图308 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-763-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 03:57:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:31:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	78316	100.000	14870	4078	1.068	--
总计		78316	100.000	14870			

图309 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-127/11-764-3 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:01:19

处理时间 (V3): 2025/03/07 11:35:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	84646	100.000	16994	4260	1.106	--
总计		84646	100.000	16994			

图310 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-765-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:05:13

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79447	100.000	15127	4086	1.069	--
总计		79447	100.000	15127			

图311 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-766-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:09:08

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79844	100.000	15155	4086	1.068	--
总计		79844	100.000	15155			

图312 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-767-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:13:03

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	81665	100.000	15515	4090	1.069	--
总计		81665	100.000	15515			

图313 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-768-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:16:58

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	81025	100.000	15414	4086	1.069	--
总计		81025	100.000	15414			

图314 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-769-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:20:54

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	78644	100.000	14962	4088	1.067	--
总计		78644	100.000	14962			

图315 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-770-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:24:47

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	77791	100.000	14836	4083	1.068	--
总计		77791	100.000	14836			

图316 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-771-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:28:42

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	79413	100.000	15107	4094	1.066	--
总计		79413	100.000	15107			

图317 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-772-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:32:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78876	100.000	14965	4072	1.067	--
总计		78876	100.000	14965			

图318 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-773-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:36:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:29

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80793	100.000	15378	4087	1.067	--
总计		80793	100.000	15378			

图319 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-774-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:40:27

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	80963	100.000	15438	4105	1.070	--
总计		80963	100.000	15438			

图320 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-775-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:44:22

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	78042	100.000	14865	4088	1.069	--
总计		78042	100.000	14865			

图321 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-776-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:48:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	78496	100.000	14974	4099	1.068	--
总计		78496	100.000	14974			

图322 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-777-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-7

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:52:11

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	79292	100.000	15184	4119	1.065	--
总计		79292	100.000	15184			

图323 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-778-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 04:56:06

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	78043	100.000	14910	4102	1.066	--
总计		78043	100.000	14910			

图324 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-779-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:00:01

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	80273	100.000	15321	4096	1.066	--
总计		80273	100.000	15321			

图325 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

325



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-780-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:03:56

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79742	100.000	15204	4089	1.069	--
总计		79742	100.000	15204			

图326 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-781-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:07:52

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	77459	100.000	14750	4077	1.069	--
总计		77459	100.000	14750			

图327 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-782-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:11:45

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	77289	100.000	14697	4078	1.071	--
总计		77289	100.000	14697			

图328 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-783-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:15:41

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:32:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78235	100.000	14866	4075	1.070	--
总计		78235	100.000	14866			

图329 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-784-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:19:37

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78243	100.000	14866	4081	1.070	--
总计		78243	100.000	14866			

图330 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-785-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P3.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:23:32

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.176	78525	100.000	14920	4077	1.070	--
总计		78525	100.000	14920			

图331 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-786-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P4.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:27:29

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	79087	100.000	15054	4094	1.069	--
总计		79087	100.000	15054			

图332 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-787-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P5.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:31:25

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	77796	100.000	14818	4096	1.066	--
总计		77796	100.000	14818			

图333 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-788-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-JX-P6.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:35:20

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	77962	100.000	14975	4133	1.065	--
总计		77962	100.000	14975			

图334 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-789-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:39:17

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	91178	100.000	15908	3357	1.100	--
总计		91178	100.000	15908			

图335 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



J405

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(75mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$J405 - 0-126/11-790-2 - zzp-2.5mg-2024122311p-rcqx-pH1.2jz-jf50z-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$J405 - J405-rcff-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$J405 - 20250306-rc-FX260.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 50μl

进样时间: 2025/03/07 05:43:12

处理时间 (V2): 2025/03/07 11:33:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

流速: 1.5ml/min

波长: 238nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 238nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	91108	100.000	15908	3360	1.101	--
总计		91108	100.000	15908			

图336 苯磺酸氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024122311批-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2