




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-769-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:37:41 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-770-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:41:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210421	100.000	33933	1849	1.136	--
总计		210421	100.000	33933			


图2 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-38/18-771-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:44:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:30:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	210417	100.000	33744	1844	1.138	--
总计		210417	100.000	33744			

图3 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-2




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-772-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:47:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210334	100.000	33758	1837	1.140	--
总计		210334	100.000	33758			

图4 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-773-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:51:13 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:37 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210493	100.000	33949	1851	1.137	--
总计		210493	100.000	33949			


图5 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-774-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:54:36 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	210353	100.000	33799	1842	1.138	--
总计		210353	100.000	33799			


图6 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-38/18-775-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:57:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:30:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2965	4.834	697	914	1.289	--
2	1.740	58364	95.166	9866	2049	1.127	6.668
总计		61329	100.000	10563			


图7 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-776-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:01:21 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:45 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	4714	6.630	1134	973	1.254	--
2	1.739	66395	93.370	11197	2036	1.121	6.749
总计		71109	100.000	12332			

图8 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-777-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:04:43 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:47 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	3663	5.139	836	896	1.315	--
2	1.740	67619	94.861	11439	2054	1.123	6.645
总计		71282	100.000	12275			

图9 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-778-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:08:06 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	3061	4.480	757	1003	1.146	--
2	1.740	65277	95.520	11011	2037	1.125	6.784
总计		68338	100.000	11768			

图10 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-779-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:11:28 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:53 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	3500	5.272	803	893	1.338	--
2	1.739	62897	94.728	10622	2036	1.130	6.626
总计		66398	100.000	11425			

图11 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-780-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:14:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:56 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	3390	5.071	792	907	1.276	--
2	1.740	63469	94.929	10655	2031	1.130	6.643
总计		66859	100.000	11447			


图12 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-781-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:18:12 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:30:58 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	6650	5.094	1545	913	1.283	--
2	1.738	123902	94.906	20902	2038	1.125	6.662
总计		130552	100.000	22448			


图13 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-782-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:21:34 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	7042	5.213	1660	936	1.279	--
2	1.739	128043	94.787	21576	2033	1.125	6.693
总计		135085	100.000	23236			


图14 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-783-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:24:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:04 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	6823	5.069	1589	931	1.299	--
2	1.740	127767	94.931	21479	2035	1.130	6.682
总计		134589	100.000	23068			

图15 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-784-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:28:20 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:06 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	6710	4.922	1584	953	1.286	--
2	1.740	129610	95.078	21834	2041	1.126	6.721
总计		136319	100.000	23418			


图16 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-785-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:31:42 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	6927	5.132	1625	935	1.269	--
2	1.740	128052	94.868	21590	2046	1.125	6.701
总计		134979	100.000	23216			


图17 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-786-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:35:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	6683	5.092	1579	946	1.267	--
2	1.740	124560	94.908	21021	2041	1.123	6.711
总计		131242	100.000	22600			


图18 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-787-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:38:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	10608	6.523	2501	935	1.275	--
2	1.739	152022	93.477	25554	2027	1.128	6.688
总计		162630	100.000	28055			

图19 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-788-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:41:48 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	11095	6.631	2619	940	1.287	--
2	1.738	156239	93.369	26233	2026	1.128	6.693
总计		167334	100.000	28851			

图20 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-789-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:45:10 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	10600	6.449	2500	938	1.290	--
2	1.738	153770	93.551	25831	2026	1.125	6.690
总计		164369	100.000	28330			

图21 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-790-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:48:31 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	10353	6.358	2466	947	1.279	--
2	1.738	152469	93.642	25671	2032	1.123	6.712
总计		162822	100.000	28137			

图22 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-791-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:51:54 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:26 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	10361	6.264	2486	949	1.248	--
2	1.739	155058	93.736	26109	2029	1.126	6.711
总计		165419	100.000	28596			


图23 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-792-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:55:16 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	10590	6.463	2487	933	1.286	--
2	1.739	153268	93.537	25747	2021	1.126	6.679
总计		163858	100.000	28234			

图24 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-793-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:58:39 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	14287	7.863	3363	941	1.292	--
2	1.739	167426	92.137	28058	2019	1.126	6.683
总计		181713	100.000	31421			

图25 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-794-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:02:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	14695	8.074	3477	946	1.269	--
2	1.739	167321	91.926	28098	2025	1.126	6.697
总计		182016	100.000	31575			


图26 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-38/18-795-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:05:23 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:31:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	14675	7.955	3453	932	1.284	--
2	1.739	169798	92.045	28531	2022	1.127	6.678
总计		184473	100.000	31984			


图27 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-796-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:08:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	14340	7.841	3379	943	1.291	--
2	1.738	168542	92.159	28316	2023	1.123	6.695
总计		182882	100.000	31695			


图28 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-797-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:12:07 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	14554	7.839	3434	941	1.287	--
2	1.738	171108	92.161	28769	2024	1.124	6.694
总计		185662	100.000	32203			

图29 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-798-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:15:29 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:45 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	14119	7.733	3373	955	1.258	--
2	1.739	168470	92.267	28312	2026	1.122	6.717
总计		182589	100.000	31685			

图30 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-38/18-799-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:18:51 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:31:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	24083	12.402	5704	943	1.282	--
2	1.738	170105	87.598	28554	2021	1.122	6.695
总计		194189	100.000	34258			


图31 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-800-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:22:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	25139	12.747	5958	949	1.286	--
2	1.738	172070	87.253	28917	2026	1.121	6.709
总计		197209	100.000	34875			


图32 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-801-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:25:37 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:53 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	24666	12.385	5833	951	1.277	--
2	1.739	174484	87.615	29272	2023	1.122	6.705
总计		199150	100.000	35105			


图33 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-38/18-802-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:28:59 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:31:56 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	24046	12.290	5689	948	1.287	--
2	1.738	171607	87.710	28807	2020	1.123	6.700
总计		195653	100.000	34497			


图34 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-39/18-803-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:32:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:35:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	25214	12.432	5834	936	1.336	--
2	1.739	177604	87.568	29775	2020	1.124	6.678
总计		202818	100.000	35608			

图35 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-804-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:35:44 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:36:53 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	23699	12.209	5576	944	1.290	--
2	1.739	170414	87.791	28583	2019	1.125	6.689
总计		194113	100.000	34158			


图36 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-805-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:39:07 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:36:56 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	36602	19.016	8619	938	1.287	--
2	1.738	155876	80.984	26050	2000	1.126	6.664
总计		192478	100.000	34669			


图37 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-806-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-15
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:42:30 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:36:58 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	38832	19.412	9133	940	1.289	--
2	1.739	161214	80.588	26963	2007	1.125	6.676
总计		200046	100.000	36097			

图38 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-807-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-24
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:45:53 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	37586	19.158	8862	942	1.286	--
2	1.739	158602	80.842	26558	2007	1.125	6.678
总计		196188	100.000	35420			

图39 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-808-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:49:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:37:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	37475	18.928	8861	945	1.284	--
2	1.738	160507	81.072	26876	2009	1.122	6.688
总计		197981	100.000	35737			


图40 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-809-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:52:39 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	38343	18.813	9071	952	1.287	--
2	1.739	165463	81.187	27770	2018	1.121	6.705
总计		203806	100.000	36842			


图41 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-810-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:56:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:10 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	37810	18.710	8924	945	1.286	--
2	1.738	164271	81.290	27483	2009	1.123	6.684
总计		202082	100.000	36407			


图42 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-811-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:59:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:37:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	48231	23.804	11404	948	1.285	--
2	1.739	154387	76.196	25866	2009	1.124	6.689
总计		202618	100.000	37270			


图43 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-812-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:02:46 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:16 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	48278	24.130	11386	942	1.291	--
2	1.739	151794	75.870	25397	2009	1.123	6.680
总计		200072	100.000	36783			

图44 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-813-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:06:08 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	48282	24.002	11394	945	1.292	--
2	1.738	152879	75.998	25611	2009	1.121	6.686
总计		201161	100.000	37005			


图45 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-814-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:09:31 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:21 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	47187	23.721	11163	948	1.289	--
2	1.738	151734	76.279	25437	2011	1.122	6.693
总计		198921	100.000	36600			


图46 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-815-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:12:53 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:24 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	47056	23.629	11082	940	1.291	--
2	1.738	152087	76.371	25434	2005	1.122	6.674
总计		199143	100.000	36516			

图47 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-816-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-52
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:22:07 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:27 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	46738	23.526	11052	948	1.290	--
2	1.738	151925	76.474	25471	2011	1.120	6.693
总计		198664	100.000	36523			

图48 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-817-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:25:30 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:30 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	52863	27.028	12439	943	1.289	--
2	1.739	142724	72.972	23809	1998	1.123	6.671
总计		195587	100.000	36248			


图49 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-818-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-17
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:28:54 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:32 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	53275	27.323	12548	943	1.288	--
2	1.739	141709	72.677	23681	2003	1.122	6.676
总计		194983	100.000	36229			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-819-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:32:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:35 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	53247	26.994	12557	943	1.285	--
2	1.739	144007	73.006	24063	2003	1.123	6.676
总计		197254	100.000	36620			


图51 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-820-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-35
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:35:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:38 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	53254	26.806	12593	949	1.283	--
2	1.739	145415	73.194	24371	2009	1.120	6.692
总计		198670	100.000	36965			


图52 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH7.8）介质-
桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-821-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:39:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:37:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	53975	26.575	12710	941	1.290	--
2	1.739	149127	73.425	24914	1999	1.121	6.671
总计		203102	100.000	37624			


图53 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-822-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-53
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:42:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.850	51850	26.496	12216	945	1.284	--
2	1.739	143840	73.504	24019	1998	1.121	6.675
总计		195690	100.000	36235			

图54 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-823-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:45:49 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	209944	100.000	33401	1808	1.135	--
总计		209944	100.000	33401			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-824-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:49:12 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:49 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	209420	100.000	33275	1800	1.136	--
总计		209420	100.000	33275			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-825-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:52:36 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:52 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-826-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:56:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:37:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210316	100.000	33464	1803	1.134	--
总计		210316	100.000	33464			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-827-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:59:24 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:37:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210380	100.000	33422	1798	1.135	--
总计		210380	100.000	33422			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-828-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:02:48 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:00 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	209907	100.000	33427	1804	1.133	--
总计		209907	100.000	33427			

图60 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-3




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-829-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:06:12 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210087	100.000	33413	1802	1.135	--
总计		210087	100.000	33413			


图61 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
浆法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-830-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:09:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:38:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.732	210072	100.000	33540	1813	1.131	--
总计		210072	100.000	33540			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-831-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:13:00 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2476	7.179	600	961	1.221	--
2	1.739	32009	92.821	5362	1996	1.119	6.677
总计		34485	100.000	5961			


图63 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-832-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:16:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2186	7.438	511	928	1.295	--
2	1.739	27209	92.562	4572	2008	1.113	6.639
总计		29396	100.000	5083			


图64 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-833-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:19:46 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	2672	7.779	656	994	1.144	--
2	1.739	31672	92.221	5270	1977	1.117	6.716
总计		34344	100.000	5926			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-834-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:23:10 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2448	7.021	578	923	1.185	--
2	1.739	32415	92.979	5412	1997	1.120	6.626
总计		34863	100.000	5990			


图66 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-835-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:26:33 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2283	7.332	538	931	1.321	--
2	1.739	28851	92.668	4855	2010	1.120	6.644
总计		31134	100.000	5393			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-836-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:29:55 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2263	6.803	552	978	1.305	--
2	1.740	30998	93.197	5207	2012	1.122	6.714
总计		33261	100.000	5760			

图68 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-837-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:33:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:26 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2953	5.701	688	916	1.212	--
2	1.739	48853	94.299	8156	2000	1.116	6.617
总计		51806	100.000	8844			


图69 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-838-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:36:41 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2523	5.265	603	934	1.259	--
2	1.739	45401	94.735	7556	1996	1.118	6.629
总计		47924	100.000	8159			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-839-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:40:05 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2629	5.241	637	969	1.241	--
2	1.740	47536	94.759	7924	1990	1.120	6.678
总计		50165	100.000	8561			


图71 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-840-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:43:28 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2776	5.362	645	929	1.272	--
2	1.740	48993	94.638	8234	2009	1.113	6.642
总计		51769	100.000	8879			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-841-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:46:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:37 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2678	5.498	630	939	1.316	--
2	1.740	46027	94.502	7697	1993	1.116	6.644
总计		48704	100.000	8327			


图73 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-842-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:50:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	2671	5.424	624	930	1.270	--
2	1.739	46570	94.576	7737	1992	1.125	6.625
总计		49240	100.000	8361			

图74 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-843-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:53:37 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3163	5.542	742	916	1.311	--
2	1.739	53917	94.458	9012	1998	1.117	6.609
总计		57080	100.000	9753			

图75 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-844-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:57:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:45 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2779	5.020	659	966	1.281	--
2	1.740	52574	94.980	8747	1987	1.127	6.670
总计		55353	100.000	9406			

图76 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-845-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:00:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:38:48 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2957	5.506	688	920	1.293	--
2	1.739	50745	94.494	8459	1977	1.112	6.594
总计		53702	100.000	9146			


图77 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH6.8) 介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-846-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:03:47 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2982	5.141	705	937	1.262	--
2	1.740	55016	94.859	9162	1987	1.118	6.632
总计		57997	100.000	9867			

图78 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-847-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:07:11 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:53 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3079	5.446	729	936	1.303	--
2	1.740	53463	94.554	8923	1998	1.112	6.634
总计		56543	100.000	9651			

图79 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-848-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:10:34 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:56 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	2915	5.103	694	922	1.251	--
2	1.740	54203	94.897	9029	1989	1.112	6.609
总计		57118	100.000	9723			

图80 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-849-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:13:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:38:59 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3511	5.804	829	950	1.286	--
2	1.740	56984	94.196	9478	1983	1.119	6.643
总计		60495	100.000	10308			

图81 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-850-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:17:21 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3165	5.365	744	937	1.301	--
2	1.740	55821	94.635	9275	1976	1.124	6.620
总计		58985	100.000	10019			

图82 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-851-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-22
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:20:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:04 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3403	5.808	811	962	1.294	--
2	1.740	55192	94.192	9220	2000	1.116	6.677
总计		58595	100.000	10031			


图83 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-852-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:24:08 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3384	5.516	799	931	1.294	--
2	1.740	57965	94.484	9647	1988	1.113	6.622
总计		61349	100.000	10447			

图84 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-853-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:27:30 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:10 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3408	5.710	806	964	1.291	--
2	1.739	56277	94.290	9381	1993	1.113	6.671
总计		59685	100.000	10187			

图85 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-854-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-49
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:30:53 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	3378	5.609	796	927	1.245	--
2	1.739	56847	94.391	9481	1989	1.122	6.622
总计		60225	100.000	10277			

图86 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-855-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-5
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:34:17 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	3844	6.289	907	946	1.248	--
2	1.739	57286	93.711	9534	1980	1.120	6.639
总计		61131	100.000	10441			

图87 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-856-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:37:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	3750	6.018	881	943	1.303	--
2	1.739	58563	93.982	9783	1984	1.115	6.643
总计		62313	100.000	10665			

图88 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-857-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:41:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:21 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.851	3858	6.350	920	959	1.278	--
2	1.739	56888	93.650	9473	1984	1.118	6.668
总计		60745	100.000	10392			


图89 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-858-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:44:28 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:24 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3921	6.194	920	930	1.260	--
2	1.740	59376	93.806	9875	1980	1.118	6.613
总计		63297	100.000	10795			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-859-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:47:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:27 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	3772	6.067	913	981	1.216	--
2	1.740	58391	93.933	9707	1979	1.118	6.688
总计		62162	100.000	10620			

图91 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-860-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-50
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:51:15 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	3795	6.099	902	942	1.264	--
2	1.739	58434	93.901	9716	1979	1.111	6.633
总计		62229	100.000	10617			

图92 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-861-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:54:39 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:32 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	4863	7.861	1169	954	1.202	--
2	1.739	57008	92.139	9467	1970	1.115	6.646
总计		61871	100.000	10636			


图93 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-862-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-15
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:58:03 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:35 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	4695	7.568	1114	957	1.291	--
2	1.739	57343	92.432	9524	1968	1.115	6.643
总计		62037	100.000	10639			

图94 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-863-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:01:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:38 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	4916	8.050	1169	952	1.280	--
2	1.739	56151	91.950	9326	1972	1.122	6.644
总计		61067	100.000	10495			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-864-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-33
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:04:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:40 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5000	7.764	1186	952	1.267	--
2	1.739	59401	92.236	9837	1968	1.120	6.636
总计		64401	100.000	11023			

图96 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-865-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:08:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:43 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5334	8.667	1249	934	1.285	--
2	1.739	56209	91.333	9315	1964	1.117	6.609
总计		61543	100.000	10564			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-866-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:11:38 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	4768	7.536	1141	959	1.273	--
2	1.739	58507	92.464	9719	1977	1.111	6.659
总计		63275	100.000	10861			

图98 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-867-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-7
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:15:02 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:49 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5903	9.082	1389	944	1.315	--
2	1.739	59093	90.918	9770	1962	1.119	6.626
总计		64995	100.000	11159			

图99 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-868-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:18:26 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:39:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5840	8.751	1384	972	1.309	--
2	1.739	60895	91.249	10117	1978	1.116	6.679
总计		66735	100.000	11500			


图100 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH6.8) 介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-869-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-25
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:21:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	6029	9.275	1438	965	1.314	--
2	1.739	58975	90.725	9777	1976	1.115	6.668
总计		65004	100.000	11215			


图101 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-870-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:25:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:39:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5811	8.889	1380	953	1.266	--
2	1.739	59561	91.111	9894	1971	1.115	6.643
总计		65373	100.000	11274			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-871-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-43
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:28:38 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:00 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5595	8.692	1339	958	1.244	--
2	1.739	58770	91.308	9756	1967	1.116	6.645
总计		64365	100.000	11095			


图103 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-872-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-52
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:32:02 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	5683	8.639	1347	946	1.275	--
2	1.739	60094	91.361	9970	1971	1.115	6.635
总计		65777	100.000	11317			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-873-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:35:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:06 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	6322	10.297	1493	940	1.288	--
2	1.739	55074	89.703	9089	1947	1.120	6.602
总计		61397	100.000	10582			

图105 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-874-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-17
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:38:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	6360	9.662	1515	950	1.262	--
2	1.739	59469	90.338	9837	1958	1.119	6.629
总计		65829	100.000	11352			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-875-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:42:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:11 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	6571	9.997	1567	963	1.284	--
2	1.740	59165	90.003	9808	1966	1.118	6.651
总计		65736	100.000	11375			

图107 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-876-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-35
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:45:38 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	6448	9.769	1534	948	1.246	--
2	1.740	59562	90.231	9869	1967	1.113	6.631
总计		66010	100.000	11403			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-877-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-44
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:49:02 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	6357	9.714	1503	948	1.266	--
2	1.740	59078	90.286	9813	1972	1.114	6.637
总计		65435	100.000	11316			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-878-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:52:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	6299	9.424	1503	957	1.276	--
2	1.741	60544	90.576	10023	1966	1.111	6.639
总计		66843	100.000	11526			

图110 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液（pH6.8）介质-
桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-879-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:55:50 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	207195	100.000	32676	1781	1.126	--
总计		207195	100.000	32676			

图111 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH6.8) 介质-
桨法-50转
对照品溶液-2-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-880-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:59:14 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:26 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	206954	100.000	32649	1778	1.127	--
总计		206954	100.000	32649			

图112 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-磷酸盐溶液 (pH6.8) 介质-
桨法-50转
对照品溶液-2-2




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-881-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-9
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:02:36 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转
溶剂




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-882-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:05:59 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	210223	100.000	33085	1774	1.129	--
总计		210223	100.000	33085			


图114 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-883-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:09:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:40:34 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	210199	100.000	33086	1775	1.129	--
总计		210199	100.000	33086			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-884-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:12:43 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:37 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	210104	100.000	33129	1780	1.126	--
总计		210104	100.000	33129			


图116 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-885-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:16:05 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:40 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	210131	100.000	33186	1785	1.126	--
总计		210131	100.000	33186			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-886-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:19:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	210091	100.000	33123	1778	1.126	--
总计		210091	100.000	33123			

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-887-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:22:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:40:45 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	883	100.000	209	956	1.355	--
总计		883	100.000	209			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-888-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-10
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:26:11 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:48 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	983	100.000	229	888	1.336	--
总计		983	100.000	229			

图120 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-889-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:29:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	885	100.000	213	915	1.153	--
总计		885	100.000	213			

图121 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-890-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:32:55 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1172	60.504	279	944	1.197	--
2	1.745	765	39.496	143	2580	1.147	7.167
总计		1938	100.000	422			

图122 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-40/18-891-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:36:17 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:40:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.852	1014	100.000	241	937	1.416	--
总计		1014	100.000	241			

图123 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-892-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-46
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:39:39 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:40:59 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	977	100.000	232	941	1.223	--
总计		977	100.000	232			


图124 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-893-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:43:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1116	37.424	263	918	1.159	--
2	1.739	1865	62.576	325	1975	1.129	6.575
总计		2981	100.000	588			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-894-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:46:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:04 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1222	40.328	285	949	1.356	--
2	1.740	1807	59.672	315	2076	1.130	6.728
总计		3029	100.000	600			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-895-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:49:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1161	39.467	275	963	1.320	--
2	1.741	1780	60.533	304	1917	1.076	6.586
总计		2941	100.000	580			


图127 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-896-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:53:06 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:10 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1176	35.762	290	1035	1.263	--
2	1.741	2113	64.238	357	1933	1.122	6.710
总计		3289	100.000	647			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-897-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:56:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1172	36.707	286	952	1.180	--
2	1.740	2020	63.293	348	2175	1.035	6.814
总计		3192	100.000	634			


图129 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-898-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:59:49 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1253	37.646	298	906	1.185	--
2	1.741	2076	62.354	366	2106	1.071	6.694
总计		3329	100.000	664			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-899-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:03:11 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1124	35.096	265	956	1.359	--
2	1.742	2078	64.904	358	2056	1.070	6.718
总计		3202	100.000	623			


图131 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-900-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:06:34 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:21 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1235	37.585	296	935	1.206	--
2	1.740	2051	62.415	360	2084	1.086	6.715
总计		3286	100.000	656			


图132 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-901-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:09:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:24 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1186	38.309	290	955	1.266	--
2	1.743	1911	61.691	323	2085	1.105	6.771
总计		3097	100.000	613			


图133 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-902-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:13:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:26 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1329	36.689	309	936	1.254	--
2	1.741	2293	63.311	387	1941	1.111	6.589
总计		3622	100.000	696			


图134 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-903-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:16:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:29 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1327	38.118	310	960	1.210	--
2	1.741	2155	61.882	368	1992	1.098	6.655
总计		3482	100.000	678			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-904-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:20:02 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:32 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1357	39.058	323	931	1.217	--
2	1.741	2117	60.942	374	2148	1.122	6.771
总计		3473	100.000	698			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-905-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:23:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:35 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1209	33.521	274	885	1.455	--
2	1.741	2398	66.479	388	1830	1.112	6.396
总计		3607	100.000	662			


图137 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-906-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:26:44 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:37 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1176	36.734	293	981	1.144	--
2	1.740	2026	63.266	339	1989	1.075	6.678
总计		3203	100.000	632			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-907-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-22
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:30:05 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:40 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1114	35.778	264	966	1.303	--
2	1.740	1999	64.222	350	2085	1.032	6.767
总计		3112	100.000	614			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-908-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:33:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:43 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1223	36.587	293	932	1.196	--
2	1.741	2119	63.413	361	2033	1.043	6.675
总计		3342	100.000	654			


图140 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-909-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:36:48 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1378	37.804	325	927	1.204	--
2	1.740	2267	62.196	374	2083	1.294	6.684
总计		3645	100.000	699			

图141 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-910-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-49
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:40:10 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:48 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1293	39.331	305	883	1.194	--
2	1.741	1995	60.669	348	2070	1.136	6.625
总计		3288	100.000	652			


图142 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-911-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-5
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:43:31 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:51 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1291	37.710	303	903	1.247	--
2	1.742	2132	62.290	358	2039	1.202	6.625
总计		3423	100.000	661			


图143 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-912-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:46:53 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:54 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1338	36.987	314	970	1.345	--
2	1.740	2279	63.013	376	2020	1.079	6.708
总计		3616	100.000	691			


图144 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-913-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:50:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1269	33.983	310	932	1.204	--
2	1.740	2464	66.017	427	1956	1.068	6.578
总计		3733	100.000	736			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-40/18-914-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:53:36 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:41:59 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1326	38.232	314	946	1.327	--
2	1.740	2143	61.768	368	1963	1.078	6.616
总计		3469	100.000	681			


图146 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-41/18-915-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:56:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:45:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1323	38.568	314	950	1.246	--
2	1.744	2107	61.432	351	1866	1.116	6.539
总计		3430	100.000	665			


图147 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-916-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:00:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1369	39.753	335	997	1.258	--
2	1.740	2074	60.247	356	2065	1.099	6.779
总计		3443	100.000	691			


图148 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-917-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:03:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:04 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1334	40.266	318	951	1.178	--
2	1.743	1979	59.734	344	2072	0.966	6.739
总计		3313	100.000	662			


图149 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-918-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-15
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:07:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1339	39.797	331	1004	1.269	--
2	1.741	2025	60.203	338	1984	1.121	6.720
总计		3364	100.000	669			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-919-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:10:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1308	41.339	296	874	1.372	--
2	1.741	1857	58.661	319	2037	1.019	6.573
总计		3165	100.000	615			


图151 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-920-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-33
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:13:44 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1381	38.528	334	999	1.306	--
2	1.742	2204	61.472	358	1975	1.190	6.692
总计		3585	100.000	692			


图152 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-921-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:17:06 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1400	41.325	330	920	1.292	--
2	1.745	1987	58.675	341	2126	1.037	6.740
总计		3387	100.000	671			


图153 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-922-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:20:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1506	42.789	357	940	1.223	--
2	1.743	2013	57.211	337	2031	1.013	6.681
总计		3519	100.000	694			


图154 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-923-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-7
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:23:48 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1116	40.524	267	1017	1.412	--
2	1.743	1638	59.476	276	1915	1.120	6.683
总计		2754	100.000	543			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-924-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-16
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:27:09 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.855	1393	34.935	331	929	1.304	--
2	1.741	2594	65.065	441	1978	1.134	6.594
总计		3987	100.000	771			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-925-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 20:30:30 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:46:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	2106	48.396	514	969	1.219	--
2	1.742	2246	51.604	367	1895	1.070	6.586
总计		4353	100.000	881			


图157 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液 (pH4.5) 介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-926-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:33:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1469	38.808	346	931	1.180	--
2	1.740	2317	61.192	403	2074	1.113	6.695
总计		3786	100.000	750			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-927-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-43
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:37:12 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1368	41.370	329	967	1.160	--
2	1.739	1939	58.630	340	2084	1.104	6.759
总计		3307	100.000	670			

图159 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-928-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-52
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:40:33 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1483	42.924	349	920	1.299	--
2	1.740	1972	57.076	330	2009	1.219	6.620
总计		3455	100.000	679			


图160 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-929-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-8
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:43:56 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:36 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.856	1404	38.018	325	912	1.281	--
2	1.741	2288	61.982	387	2084	1.126	6.661
总计		3692	100.000	711			


图161 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-930-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-17
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:47:17 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1453	44.960	331	903	1.322	--
2	1.741	1779	55.040	313	2032	1.099	6.610
总计		3233	100.000	644			


图162 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-931-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:50:39 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1640	46.279	386	939	1.248	--
2	1.739	1904	53.721	326	1957	1.154	6.597
总计		3544	100.000	712			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-932-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-35
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:54:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1499	41.164	354	945	1.265	--
2	1.743	2143	58.836	359	1926	1.098	6.580
总计		3642	100.000	713			

图164 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-933-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:57:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:47 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.854	1609	42.800	365	877	1.320	--
2	1.741	2150	57.200	367	2188	1.107	6.718
总计		3759	100.000	732			


图165 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-醋酸盐溶液（pH4.5）介质-
桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-934-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-53
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:00:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.853	1591	44.791	373	915	1.260	--
2	1.743	1961	55.209	324	1850	1.002	6.476
总计		3551	100.000	697			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-935-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:04:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:46:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	209227	100.000	32744	1754	1.123	--
总计		209227	100.000	32744			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-936-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:07:30 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:56 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	209087	100.000	32521	1732	1.127	--
总计		209087	100.000	32521			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-937-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-rj.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-9
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:10:54 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:46:58 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
溶剂




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-938-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:14:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:47:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	209060	100.000	32551	1736	1.129	--
总计		209060	100.000	32551			

图170 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1


170

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-939-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:17:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:47:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	209192	100.000	32740	1752	1.124	--
总计		209192	100.000	32740			

图171 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱


参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-940-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:21:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:47:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	208659	100.000	32460	1734	1.130	--
总计		208659	100.000	32460			

图172 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱


参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-941-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:24:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:47:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	208878	100.000	32494	1732	1.131	--
总计		208878	100.000	32494			

图173 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-942-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:27:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:47:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	208608	100.000	32557	1741	1.129	--
总计		208608	100.000	32557			

图174 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱


参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-943-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:31:15 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.861	1398	5.063	302	810	1.363	--
2	1.742	26220	94.937	4288	1941	1.107	6.313
总计		27618	100.000	4590			


图175 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-944-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-10
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:34:38 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.860	1307	5.221	291	818	1.216	--
2	1.743	23730	94.779	3887	1926	1.103	6.324
总计		25037	100.000	4178			


图176 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-945-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:38:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.862	1204	5.347	264	835	1.186	--
2	1.743	21309	94.653	3512	1950	1.103	6.353
总计		22513	100.000	3776			

图177 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-946-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-28
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:41:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.861	1323	5.309	288	749	1.242	--
2	1.743	23595	94.691	3852	1912	1.107	6.180
总计		24918	100.000	4140			


图178 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-947-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-37
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:44:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:26 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.860	1208	6.155	254	752	1.300	--
2	1.743	18426	93.845	3010	1934	1.115	6.218
总计		19634	100.000	3263			


图179 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-948-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:48:07 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	1295	5.608	282	839	1.238	--
2	1.743	21792	94.392	3615	1961	1.107	6.364
总计		23087	100.000	3897			

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-949-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:51:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:47:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	1750	4.611	385	810	1.190	--
2	1.742	36199	95.389	5928	1932	1.109	6.290
总计		37948	100.000	6313			


图181 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-950-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:54:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.862	1830	4.961	392	756	1.306	--
2	1.743	35063	95.039	5732	1933	1.114	6.207
总计		36894	100.000	6124			

图182 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-951-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:58:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:37 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	1778	4.802	392	761	1.187	--
2	1.744	35242	95.198	5818	1953	1.105	6.225
总计		37020	100.000	6210			

图183 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-952-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 22:01:36 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:47:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.861	1722	4.644	366	720	1.193	--
2	1.742	35361	95.356	5778	1938	1.117	6.148
总计		37084	100.000	6144			


图184 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-953-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:04:58 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:43 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.861	1702	5.033	366	784	1.288	--
2	1.742	32112	94.967	5264	1930	1.108	6.256
总计		33814	100.000	5630			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-954-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-47
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:08:20 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.860	1715	4.806	366	738	1.328	--
2	1.742	33968	95.194	5539	1940	1.109	6.197
总计		35683	100.000	5905			


图186 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-955-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:11:43 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:48 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	1969	4.677	426	799	1.161	--
2	1.742	40127	95.323	6520	1921	1.111	6.262
总计		42096	100.000	6946			


图187 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-956-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:15:05 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:51 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	2174	5.335	440	689	1.343	--
2	1.743	38578	94.665	6314	1928	1.116	6.066
总计		40753	100.000	6754			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-957-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:18:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:54 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2005	4.888	422	747	1.239	--
2	1.743	39022	95.112	6393	1929	1.103	6.154
总计		41027	100.000	6815			


图189 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-958-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:21:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2073	4.983	424	738	1.235	--
2	1.743	39522	95.017	6459	1936	1.111	6.158
总计		41595	100.000	6883			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-959-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:25:11 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:47:59 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	2027	5.127	435	764	1.296	--
2	1.743	37512	94.873	6131	1930	1.106	6.207
总计		39539	100.000	6565			

图191 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-960-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 22:28:33 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:48:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2033	4.929	431	756	1.252	--
2	1.744	39206	95.071	6398	1931	1.111	6.188
总计		41239	100.000	6829			

图192 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-961-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:31:56 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:05 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.863	2308	5.132	479	719	1.314	--
2	1.743	42664	94.868	6943	1913	1.107	6.107
总计		44972	100.000	7422			

图193 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-962-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-13
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:35:19 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2180	5.041	459	781	1.318	--
2	1.743	41065	94.959	6711	1927	1.108	6.225
总计		43245	100.000	7170			

图194 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-963-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-22
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:38:42 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:11 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2168	5.015	460	759	1.220	--
2	1.744	41073	94.985	6712	1919	1.113	6.171
总计		43241	100.000	7172			

图195 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-964-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:42:05 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:13 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2315	5.020	486	729	1.211	--
2	1.744	43804	94.980	7164	1930	1.112	6.125
总计		46119	100.000	7649			

图196 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-965-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:45:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:16 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2220	5.141	470	751	1.242	--
2	1.744	40960	94.859	6676	1922	1.113	6.173
总计		43180	100.000	7146			

图197 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-966-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 22:48:49 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:48:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2283	5.226	473	723	1.342	--
2	1.744	41397	94.774	6782	1933	1.109	6.119
总计		43680	100.000	7256			

图198 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-967-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-5
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:52:12 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:22 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2541	5.455	531	745	1.197	--
2	1.744	44041	94.545	7184	1925	1.112	6.162
总计		46582	100.000	7715			

图199 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-968-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:55:35 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2454	5.332	517	747	1.211	--
2	1.744	43575	94.668	7107	1917	1.106	6.147
总计		46030	100.000	7624			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-969-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:58:58 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:27 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2462	5.311	518	725	1.201	--
2	1.744	43899	94.689	7194	1927	1.107	6.113
总计		46362	100.000	7711			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-970-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:02:22 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:30 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2455	5.282	507	714	1.246	--
2	1.743	44027	94.718	7200	1928	1.108	6.102
总计		46482	100.000	7706			

图202 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-971-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:05:43 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:33 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2470	5.352	519	715	1.245	--
2	1.744	43687	94.648	7128	1922	1.111	6.103
总计		46157	100.000	7647			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-972-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:09:06 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:48:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2484	5.327	531	779	1.245	--
2	1.743	44135	94.673	7195	1919	1.109	6.216
总计		46619	100.000	7726			

图204 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-973-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-6
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:12:29 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:38 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	2667	5.589	579	775	1.200	--
2	1.744	45058	94.411	7375	1918	1.095	6.191
总计		47725	100.000	7954			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-974-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-15
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:15:53 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:41 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.864	2825	5.995	589	741	1.217	--
2	1.743	44305	94.005	7220	1910	1.108	6.136
总计		47131	100.000	7809			



SHIMADZU
LabSolutions


SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-975-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-24
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:19:16 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	2736	5.866	565	722	1.224	--
2	1.744	43915	94.134	7163	1919	1.112	6.091
总计		46651	100.000	7728			


图207 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-976-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-33
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:22:38 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:47 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	2796	5.766	581	773	1.188	--
2	1.744	45692	94.234	7473	1929	1.111	6.192
总计		48488	100.000	8054			

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-977-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:26:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	2800	5.908	591	753	1.264	--
2	1.744	44586	94.092	7267	1916	1.108	6.156
总计		47386	100.000	7859			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-978-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:29:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:52 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	3023	6.138	618	705	1.224	--
2	1.744	46228	93.862	7557	1919	1.109	6.067
总计		49251	100.000	8175			

图210 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-979-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-7
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:32:46 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:48:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3105	6.631	644	729	1.212	--
2	1.743	43722	93.369	7113	1911	1.111	6.103
总计		46827	100.000	7758			


图211 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-980-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:36:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:48:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3212	6.562	676	735	1.246	--
2	1.743	45734	93.438	7477	1924	1.106	6.130
总计		48946	100.000	8153			

图212 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-981-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-25
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:39:33 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	3182	6.562	651	724	1.218	--
2	1.743	45317	93.438	7402	1924	1.109	6.099
总计		48499	100.000	8053			


图213 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-982-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:42:56 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:04 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3023	6.548	622	699	1.240	--
2	1.743	43146	93.452	7028	1907	1.105	6.043
总计		46169	100.000	7650			


图214 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-983-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-43
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:46:19 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:07 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3274	6.662	657	705	1.232	--
2	1.744	45865	93.338	7494	1923	1.111	6.070
总计		49139	100.000	8151			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-984-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-52
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:49:42 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3328	6.691	687	692	1.251	--
2	1.744	46414	93.309	7583	1922	1.103	6.044
总计		49742	100.000	8270			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-985-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:53:07 实验者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/03/10 11:49:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3557	7.082	718	720	1.274	--
2	1.743	46671	92.918	7588	1905	1.109	6.083
总计		50228	100.000	8306			

图217 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-986-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-17
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:56:30 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3375	6.838	696	711	1.262	--
2	1.743	45988	93.162	7511	1915	1.108	6.077
总计		49363	100.000	8207			

图218 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱


参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-987-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:59:54 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:18 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	3370	6.758	689	748	1.256	--
2	1.744	46503	93.242	7586	1917	1.109	6.139
总计		49874	100.000	8275			

图219 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-988-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-35
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/08 00:03:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:21 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.865	3193	6.531	661	726	1.254	--
2	1.743	45697	93.469	7421	1899	1.106	6.087
总计		48890	100.000	8083			

图220 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1

220




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-989-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-44
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/08 00:06:41 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	3338	6.733	688	705	1.210	--
2	1.744	46240	93.267	7539	1906	1.102	6.048
总计		49578	100.000	8227			

图221 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-990-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-53
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/08 00:10:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:26 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 260nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.866	3405	6.818	694	721	1.286	--
2	1.743	46537	93.182	7587	1904	1.109	6.072
总计		49942	100.000	8281			

图222 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-42/18-991-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/08 00:13:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 11:49:29 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	207121	100.000	32150	1713	1.122	--
总计		207121	100.000	32150			

图223 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1


223

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-42/18-992-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX267.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx267.lcb
样品瓶号：4-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/08 00:16:52 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 11:49:32 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	207500	100.000	32172	1711	1.121	--
总计		207500	100.000	32172			

图224 美阿沙坦钾片溶出曲线测定HPLC图谱

参比制剂-12564941批(80mg规格)-均一性1-pH1.0盐酸溶液介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2