




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1809-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:38:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1810-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:41:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	210098	100.000	32503	1565	1.113	--
总计		210098	100.000	32503			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1811-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:44:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	210073	100.000	32490	1565	1.112	--
总计		210073	100.000	32490			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1812-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:48:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:46 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	210492	100.000	32525	1564	1.113	--
总计		210492	100.000	32525			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1813-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 11:51:33 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:45:49 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	210032	100.000	32476	1567	1.112	--
总计		210032	100.000	32476			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1814-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:54:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	210178	100.000	32480	1569	1.111	--
总计		210178	100.000	32480			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1815-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 11:58:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3848	5.423	886	844	1.192	--
2	1.676	67107	94.577	10751	1710	1.110	6.069
总计		70955	100.000	11636			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1816-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:01:40 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:45:58 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3720	5.368	852	832	1.255	--
2	1.676	65589	94.632	10541	1717	1.099	6.057
总计		69310	100.000	11394			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1817-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:05:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3828	5.612	863	818	1.255	--
2	1.676	64375	94.388	10362	1716	1.101	6.040
总计		68203	100.000	11225			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1818-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:08:24 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3623	5.197	836	852	1.276	--
2	1.676	66091	94.803	10609	1708	1.105	6.082
总计		69714	100.000	11445			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1819-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:11:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3668	5.368	847	868	1.287	--
2	1.676	64665	94.632	10368	1706	1.104	6.100
总计		68334	100.000	11214			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1820-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:15:09 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3445	5.169	805	859	1.268	--
2	1.675	63207	94.831	10150	1712	1.104	6.095
总计		66652	100.000	10956			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1821-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:18:30 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:11 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	6753	5.140	1566	855	1.224	--
2	1.676	124633	94.860	19995	1713	1.103	6.091
总计		131386	100.000	21561			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1822-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:21:52 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	6998	5.240	1620	853	1.225	--
2	1.676	126543	94.760	20278	1707	1.105	6.080
总计		133541	100.000	21898			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1823-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:25:13 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:16 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	7204	5.325	1650	859	1.247	--
2	1.676	128084	94.675	20511	1706	1.105	6.090
总计		135288	100.000	22161			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1824-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:28:34 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:19 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	6952	5.211	1616	855	1.247	--
2	1.676	126471	94.789	20269	1714	1.104	6.092
总计		133423	100.000	21884			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1825-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:31:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:22 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	6926	5.243	1589	855	1.217	--
2	1.676	125165	94.757	20074	1708	1.106	6.084
总计		132091	100.000	21663			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1826-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:35:19 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:24 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	6825	5.095	1573	846	1.231	--
2	1.676	127115	94.905	20371	1709	1.102	6.075
总计		133940	100.000	21944			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1827-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:38:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	10672	6.593	2463	850	1.235	--
2	1.675	151191	93.407	24240	1699	1.105	6.075
总计		161862	100.000	26703			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1828-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:42:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	10820	6.547	2504	857	1.218	--
2	1.675	154434	93.453	24731	1702	1.104	6.090
总计		165254	100.000	27235			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1829-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:45:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	11291	6.671	2615	856	1.225	--
2	1.675	157967	93.329	25349	1707	1.104	6.091
总计		169258	100.000	27964			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1830-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 12:48:47 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:35 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	10822	6.573	2499	867	1.236	--
2	1.675	153806	93.427	24655	1706	1.105	6.106
总计		164628	100.000	27154			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1831-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:52:09 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	10802	6.540	2490	849	1.233	--
2	1.675	154370	93.460	24727	1700	1.104	6.073
总计		165172	100.000	27217			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1832-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:55:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	10675	6.405	2461	855	1.227	--
2	1.675	156004	93.595	25011	1703	1.104	6.085
总计		166679	100.000	27472			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1833-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 12:58:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	14491	7.902	3362	862	1.230	--
2	1.675	168896	92.098	26987	1693	1.107	6.086
总计		183387	100.000	30349			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1834-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:02:15 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	14980	8.047	3460	861	1.244	--
2	1.675	171181	91.953	27437	1704	1.105	6.096
总计		186161	100.000	30896			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1835-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:05:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	14873	8.030	3448	867	1.228	--
2	1.676	170336	91.970	27200	1700	1.103	6.094
总计		185209	100.000	30648			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1836-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:08:58 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:51 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	14383	8.015	3313	856	1.230	--
2	1.676	165078	91.985	26369	1702	1.104	6.082
总计		179461	100.000	29683			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1837-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:12:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:46:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	14134	7.847	3272	859	1.233	--
2	1.676	165987	92.153	26527	1702	1.105	6.087
总计		180121	100.000	29799			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1838-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:15:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:46:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	14312	7.826	3299	859	1.227	--
2	1.676	168570	92.174	26951	1700	1.104	6.085
总计		182882	100.000	30250			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1839-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:19:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:00 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	24397	12.255	5674	868	1.232	--
2	1.675	174680	87.745	27954	1701	1.105	6.104
总计		199077	100.000	33628			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1840-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:22:24 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	24430	12.308	5651	861	1.238	--
2	1.675	174063	87.692	27882	1698	1.104	6.090
总计		198493	100.000	33533			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1841-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:25:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	24972	12.341	5790	863	1.235	--
2	1.675	177382	87.659	28392	1700	1.104	6.095
总计		202354	100.000	34183			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1842-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:29:08 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	23587	12.171	5490	869	1.236	--
2	1.675	170201	87.829	27270	1700	1.106	6.105
总计		193788	100.000	32760			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1843-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:32:29 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	23503	12.109	5419	859	1.233	--
2	1.675	170582	87.891	27273	1698	1.106	6.083
总计		194085	100.000	32692			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1844-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:35:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	23164	11.970	5350	864	1.235	--
2	1.675	170353	88.030	27221	1698	1.106	6.091
总计		193517	100.000	32571			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1845-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:39:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	37416	18.705	8674	866	1.238	--
2	1.675	162617	81.295	26031	1698	1.105	6.097
总计		200033	100.000	34704			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1846-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:42:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	37312	18.761	8655	867	1.234	--
2	1.675	161569	81.239	25850	1698	1.104	6.099
总计		198881	100.000	34505			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1847-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:45:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	37562	18.820	8703	865	1.234	--
2	1.675	162027	81.180	25951	1696	1.104	6.094
总计		199589	100.000	34654			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1848-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:49:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	37208	18.545	8628	865	1.232	--
2	1.675	163431	81.455	26195	1698	1.106	6.095
总计		200639	100.000	34823			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1849-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:52:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:27 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	37246	18.412	8618	870	1.241	--
2	1.676	165046	81.588	26345	1699	1.104	6.099
总计		202291	100.000	34963			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1850-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 13:56:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	35922	18.175	8314	866	1.234	--
2	1.675	161720	81.825	25814	1693	1.107	6.087
总计		197642	100.000	34127			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1851-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-7
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 13:59:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:33 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	46423	23.469	10729	863	1.237	--
2	1.675	151384	76.531	24188	1693	1.107	6.088
总计		197806	100.000	34917			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1852-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:02:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	47990	23.546	11103	863	1.238	--
2	1.675	155827	76.454	24923	1696	1.103	6.091
总计		203817	100.000	36026			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1853-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:06:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	47453	23.526	10974	863	1.238	--
2	1.675	154250	76.474	24677	1698	1.106	6.094
总计		201703	100.000	35652			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1854-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:09:33 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:41 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	48227	23.275	11191	869	1.239	--
2	1.676	158982	76.725	25417	1704	1.105	6.104
总计		207208	100.000	36608			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1855-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:12:55 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	46339	23.096	10754	871	1.235	--
2	1.676	154299	76.904	24639	1697	1.105	6.098
总计		200638	100.000	35394			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1856-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:16:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	46094	22.943	10692	870	1.237	--
2	1.676	154814	77.057	24738	1699	1.104	6.100
总计		200908	100.000	35430			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1857-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:19:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:49 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	50567	26.739	11702	864	1.238	--
2	1.675	138547	73.261	22144	1690	1.108	6.085
总计		189114	100.000	33846			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1858-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:23:03 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.834	48564	26.814	11241	862	1.237	--
2	1.674	132549	73.186	21167	1685	1.105	6.078
总计		181113	100.000	32408			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1859-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：1-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 14:26:25 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:47:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	51386	26.695	11883	866	1.238	--
2	1.676	141108	73.305	22471	1689	1.107	6.082
总计		192494	100.000	34354			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1860-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:29:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:47:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	53209	26.633	12277	865	1.240	--
2	1.676	146579	73.367	23424	1697	1.106	6.090
总计		199788	100.000	35701			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1861-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:33:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	52480	26.346	12126	865	1.238	--
2	1.676	146716	73.654	23382	1693	1.105	6.084
总计		199197	100.000	35507			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1862-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:36:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	52039	26.095	12077	871	1.230	--
2	1.676	147381	73.905	23489	1694	1.106	6.095
总计		199420	100.000	35565			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1863-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:39:57 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	210256	100.000	32371	1555	1.112	--
总计		210256	100.000	32371			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1864-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:43:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	210101	100.000	32374	1556	1.113	--
总计		210101	100.000	32374			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1865-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:46:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1866-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:50:08 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	208077	100.000	32074	1559	1.113	--
总计		208077	100.000	32074			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1867-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:53:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	208207	100.000	32053	1555	1.113	--
总计		208207	100.000	32053			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1868-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 14:56:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	208320	100.000	32087	1558	1.113	--
总计		208320	100.000	32087			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1869-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:00:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	207818	100.000	32041	1557	1.113	--
总计		207818	100.000	32041			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1870-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:03:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	207742	100.000	32031	1558	1.113	--
总计		207742	100.000	32031			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1871-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:07:07 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:27 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	2327	8.068	514	821	1.142	--
2	1.676	26517	91.932	4255	1715	1.111	6.023
总计		28844	100.000	4769			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1872-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:10:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	2596	7.762	594	864	1.248	--
2	1.676	30841	92.238	4971	1711	1.108	6.080
总计		33437	100.000	5565			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1873-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:13:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2273	7.475	530	861	1.214	--
2	1.676	28138	92.525	4492	1697	1.105	6.066
总计		30411	100.000	5022			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1874-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:17:17 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:35 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2362	7.516	542	850	1.230	--
2	1.676	29065	92.484	4655	1702	1.111	6.062
总计		31427	100.000	5197			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1875-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:20:39 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2360	7.175	558	912	1.227	--
2	1.675	30532	92.825	4885	1696	1.109	6.138
总计		32892	100.000	5443			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1876-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:24:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	2066	7.523	472	834	1.284	--
2	1.675	25400	92.477	4061	1697	1.109	6.035
总计		27466	100.000	4533			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1877-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:27:25 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:43 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	2635	5.514	614	846	1.187	--
2	1.675	45153	94.486	7246	1697	1.109	6.053
总计		47788	100.000	7860			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1878-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:30:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2908	5.533	686	881	1.267	--
2	1.675	49647	94.467	7929	1695	1.107	6.096
总计		52555	100.000	8615			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1879-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:34:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:48:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2625	5.628	615	876	1.269	--
2	1.675	44018	94.372	7074	1706	1.102	6.097
总计		46644	100.000	7689			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1880-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:37:36 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:51 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2573	5.205	600	893	1.225	--
2	1.675	46872	94.795	7475	1692	1.103	6.112
总计		49445	100.000	8076			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1881-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:41:00 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:54 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	2681	5.546	631	872	1.222	--
2	1.675	45667	94.454	7330	1701	1.105	6.094
总计		48348	100.000	7961			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1882-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:44:22 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:48:57 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	2776	5.844	642	861	1.222	--
2	1.675	44725	94.156	7168	1685	1.110	6.064
总计		47501	100.000	7810			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1883-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:47:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2872	5.305	671	869	1.192	--
2	1.676	51260	94.695	8187	1689	1.102	6.068
总计		54132	100.000	8858			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1884-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 15:51:10 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3206	5.491	744	849	1.229	--
2	1.675	55177	94.509	8827	1698	1.102	6.054
总计		58383	100.000	9571			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1885-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:54:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:06 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	2855	5.596	662	847	1.220	--
2	1.676	48160	94.404	7691	1690	1.110	6.040
总计		51014	100.000	8353			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1886-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 15:57:56 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	3045	5.363	698	866	1.252	--
2	1.676	53738	94.637	8578	1693	1.115	6.067
总计		56783	100.000	9276			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1887-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:01:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	2989	5.319	702	878	1.223	--
2	1.676	53201	94.681	8450	1689	1.112	6.079
总计		56190	100.000	9152			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1888-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:04:46 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3057	5.583	699	857	1.316	--
2	1.676	51696	94.417	8264	1695	1.102	6.062
总计		54753	100.000	8963			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1889-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:08:10 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3227	5.627	742	852	1.205	--
2	1.676	54115	94.373	8646	1690	1.105	6.047
总计		57342	100.000	9389			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1890-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:11:33 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:19 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	3553	5.971	825	867	1.211	--
2	1.676	55960	94.029	8947	1698	1.105	6.071
总计		59513	100.000	9772			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1891-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-22
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:14:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:22 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3408	6.125	791	862	1.228	--
2	1.676	52236	93.875	8342	1693	1.111	6.067
总计		55644	100.000	9134			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1892-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:18:20 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	3200	5.410	767	915	1.235	--
2	1.676	55949	94.590	8953	1697	1.110	6.139
总计		59148	100.000	9720			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1893-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:21:43 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3401	5.624	802	879	1.219	--
2	1.676	57079	94.376	9107	1693	1.108	6.089
总计		60480	100.000	9910			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1894-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:25:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:30 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	3424	5.891	785	835	1.225	--
2	1.676	54701	94.109	8726	1692	1.101	6.021
总计		58126	100.000	9511			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1895-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:28:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	3649	6.163	851	876	1.251	--
2	1.675	55561	93.837	8893	1687	1.105	6.083
总计		59210	100.000	9744			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1896-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:31:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3922	6.336	916	875	1.249	--
2	1.675	57976	93.664	9274	1687	1.103	6.080
总计		61898	100.000	10190			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1897-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:35:17 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:38 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	3638	6.683	855	878	1.226	--
2	1.676	50802	93.317	8094	1690	1.104	6.079
总计		54440	100.000	8949			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1898-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:38:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:41 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3768	6.067	870	849	1.201	--
2	1.676	58342	93.933	9291	1693	1.103	6.047
总计		62110	100.000	10161			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1899-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:42:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3941	6.514	909	874	1.277	--
2	1.676	56552	93.486	9028	1693	1.106	6.080
总计		60493	100.000	9937			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1900-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:45:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:47 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	3583	6.341	838	896	1.229	--
2	1.675	52932	93.659	8447	1685	1.104	6.106
总计		56515	100.000	9285			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1901-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:48:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	4587	7.473	1080	871	1.180	--
2	1.676	56796	92.527	9056	1685	1.105	6.073
总计		61383	100.000	10137			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1902-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:52:15 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	4660	7.958	1088	874	1.131	--
2	1.675	53899	92.042	8556	1680	1.104	6.075
总计		58559	100.000	9644			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1903-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 16:55:39 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:49:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	4525	8.127	1059	869	1.206	--
2	1.676	51152	91.873	8174	1691	1.098	6.072
总计		55677	100.000	9234			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1904-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 16:59:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:49:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	4728	7.770	1088	866	1.218	--
2	1.676	56127	92.230	8955	1694	1.108	6.072
总计		60855	100.000	10043			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1905-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:02:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:00 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	4902	8.045	1144	870	1.246	--
2	1.676	56028	91.955	8910	1681	1.106	6.064
总计		60930	100.000	10054			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1906-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:05:49 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	4785	7.598	1138	890	1.210	--
2	1.676	58191	92.402	9281	1690	1.106	6.099
总计		62976	100.000	10418			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1907-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:09:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:05 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	5402	8.812	1258	868	1.249	--
2	1.676	55901	91.188	8879	1682	1.110	6.068
总计		61303	100.000	10137			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1908-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:12:37 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:08 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	5841	8.967	1362	877	1.239	--
2	1.675	59300	91.033	9496	1692	1.106	6.092
总计		65141	100.000	10857			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1909-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-25
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:16:01 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:11 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	5686	9.578	1328	882	1.202	--
2	1.676	53686	90.422	8551	1694	1.109	6.095
总计		59373	100.000	9879			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1910-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:19:25 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:13 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	5561	8.544	1289	873	1.247	--
2	1.676	59527	91.456	9506	1696	1.107	6.086
总计		65088	100.000	10795			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1911-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:22:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:16 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	5315	9.023	1225	867	1.267	--
2	1.675	53591	90.977	8521	1678	1.105	6.057
总计		58907	100.000	9746			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1912-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:26:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:19 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	5519	8.765	1296	873	1.232	--
2	1.676	57443	91.235	9169	1697	1.102	6.088
总计		62962	100.000	10464			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1913-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:29:37 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:22 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	6155	9.562	1430	866	1.196	--
2	1.675	58213	90.438	9335	1695	1.109	6.080
总计		64368	100.000	10766			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1914-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:33:01 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	6440	9.665	1523	902	1.208	--
2	1.676	60194	90.335	9621	1687	1.106	6.115
总计		66634	100.000	11143			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1915-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:36:25 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:27 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	6211	10.226	1459	894	1.258	--
2	1.676	54526	89.774	8708	1701	1.106	6.117
总计		60737	100.000	10167			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1916-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-35
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:39:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:30 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	6253	9.482	1454	868	1.238	--
2	1.676	59698	90.518	9506	1702	1.108	6.083
总计		65951	100.000	10960			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1917-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:43:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:32 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	6238	9.728	1476	881	1.213	--
2	1.676	57889	90.272	9257	1697	1.106	6.099
总计		64127	100.000	10732			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1918-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:46:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:35 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	6390	9.729	1488	868	1.231	--
2	1.676	59297	90.271	9486	1704	1.107	6.088
总计		65687	100.000	10974			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1919-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 17:50:00 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:38 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	209706	100.000	32356	1561	1.113	--
总计		209706	100.000	32356			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1920-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH6.8-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:53:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:41 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	209428	100.000	32370	1563	1.115	--
总计		209428	100.000	32370			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1921-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 17:56:47 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1922-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:00:09 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:50:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	210698	100.000	32491	1563	1.115	--
总计		210698	100.000	32491			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1923-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:03:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	210546	100.000	32494	1564	1.113	--
总计		210546	100.000	32494			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1924-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:06:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:51 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	210433	100.000	32457	1563	1.113	--
总计		210433	100.000	32457			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1925-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:10:16 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:54 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	210560	100.000	32473	1562	1.114	--
总计		210560	100.000	32473			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1926-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:13:38 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:50:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	210541	100.000	32509	1566	1.114	--
总计		210541	100.000	32509			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1927-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:17:00 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:00 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	830	100.000	200	956	1.164	--
总计		830	100.000	200			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1928-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:20:22 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:03 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	888	100.000	213	959	1.108	--
总计		888	100.000	213			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1929-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-19
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:23:44 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:06 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	970	43.797	217	743	1.208	--
2	1.684	1245	56.203	182	1513	1.102	5.717
总计		2215	100.000	399			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1930-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:27:06 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:09 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	908	45.052	196	743	1.162	--
2	1.682	1108	54.948	173	1659	1.219	5.856
总计		2016	100.000	370			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1931-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:30:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:12 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	884	44.670	212	889	1.176	--
2	1.677	1095	55.330	175	1521	1.028	5.897
总计		1979	100.000	387			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1932-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:33:49 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	963	100.000	219	815	1.239	--
总计		963	100.000	219			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1933-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:37:10 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	1156	37.282	272	879	1.272	--
2	1.676	1945	62.718	335	1827	1.092	6.200
总计		3101	100.000	607			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1934-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:40:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1257	40.300	294	910	1.313	--
2	1.678	1862	59.700	311	1887	1.188	6.318
总计		3119	100.000	605			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1935-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-20
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:43:54 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:22 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1270	39.150	294	852	1.224	--
2	1.677	1974	60.850	327	1845	1.033	6.187
总计		3245	100.000	621			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1936-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:47:15 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1081	39.024	246	865	1.203	--
2	1.674	1689	60.976	282	1649	1.100	6.013
总计		2770	100.000	527			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1937-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:50:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1161	37.903	279	912	1.261	--
2	1.678	1903	62.097	318	1769	1.110	6.207
总计		3064	100.000	597			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1938-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 18:53:58 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1061	35.124	256	948	1.193	--
2	1.678	1960	64.876	328	1996	1.101	6.488
总计		3022	100.000	584			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1939-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 18:57:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1303	36.599	297	766	1.259	--
2	1.675	2257	63.401	363	1768	1.218	5.976
总计		3559	100.000	660			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1940-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 19:00:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1072	37.561	259	926	1.118	--
2	1.675	1781	62.439	302	1816	0.991	6.261
总计		2853	100.000	562			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1941-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 19:04:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1209	36.713	291	901	1.178	--
2	1.677	2084	63.287	333	1617	1.081	6.028
总计		3293	100.000	624			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1942-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:07:24 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1181	37.171	277	901	1.238	--
2	1.678	1996	62.829	332	1671	1.145	6.088
总计		3177	100.000	609			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1943-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:10:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1336	38.315	309	819	1.235	--
2	1.677	2152	61.685	359	1608	1.083	5.907
总计		3488	100.000	668			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1944-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 19:14:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1173	36.376	276	862	1.187	--
2	1.676	2051	63.624	344	1757	1.086	6.136
总计		3224	100.000	619			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1945-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 19:17:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	1275	38.633	312	973	1.154	--
2	1.678	2026	61.367	344	1901	1.128	6.418
总计		3301	100.000	656			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1946-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:20:50 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:52 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1127	34.998	270	890	1.160	--
2	1.675	2093	65.002	333	1686	1.127	6.082
总计		3219	100.000	602			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1947-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 19:24:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:51:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.835	1174	35.682	275	884	1.276	--
2	1.673	2115	64.318	344	1645	1.171	6.038
总计		3289	100.000	619			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1948-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:27:32 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:51:58 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1229	39.002	275	800	1.027	--
2	1.679	1922	60.998	316	1859	1.198	6.147
总计		3150	100.000	591			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1949-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:30:53 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:00 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1357	41.270	310	928	1.299	--
2	1.677	1931	58.730	333	1931	1.123	6.413
总计		3289	100.000	643			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1950-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-49
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:34:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1135	35.882	284	947	1.122	--
2	1.675	2028	64.118	350	1798	1.023	6.271
总计		3163	100.000	634			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1951-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-5
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:37:35 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:06 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1382	35.961	328	865	1.291	--
2	1.675	2461	64.039	372	1568	1.276	5.920
总计		3843	100.000	700			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1952-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:40:56 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1147	36.708	278	975	1.201	--
2	1.677	1978	63.292	337	1743	1.088	6.254
总计		3124	100.000	615			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1953-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:44:17 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:11 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1165	38.004	279	886	1.220	--
2	1.677	1900	61.996	321	1846	1.011	6.261
总计		3064	100.000	599			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1954-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:47:38 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:14 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1147	35.450	277	963	1.236	--
2	1.675	2088	64.550	325	1655	1.236	6.160
总计		3235	100.000	602			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1955-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:50:59 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1313	39.411	311	886	1.172	--
2	1.676	2019	60.589	322	1736	1.141	6.143
总计		3332	100.000	633			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1956-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 19:54:20 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:19 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1293	37.310	297	885	1.203	--
2	1.676	2173	62.690	354	1777	1.139	6.174
总计		3467	100.000	651			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1957-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 19:57:42 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:52:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1334	41.224	309	855	1.277	--
2	1.677	1902	58.776	331	1808	1.146	6.166
总计		3236	100.000	640			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1958-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-15
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:01:03 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1178	39.879	273	811	1.163	--
2	1.676	1776	60.121	294	1777	1.055	6.060
总计		2954	100.000	567			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1959-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 20:04:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:52:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1243	42.438	281	851	1.402	--
2	1.676	1686	57.562	277	1636	1.158	5.994
总计		2929	100.000	559			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1960-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-33
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:07:45 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:30 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1131	42.834	263	875	1.065	--
2	1.673	1510	57.166	256	2149	1.181	6.503
总计		2641	100.000	519			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1961-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:11:06 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:33 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1369	42.992	312	837	1.240	--
2	1.674	1816	57.008	300	1864	1.261	6.178
总计		3185	100.000	612			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1962-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-51
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:14:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:36 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1499	43.977	327	828	1.313	--
2	1.677	1910	56.023	321	1836	1.184	6.143
总计		3409	100.000	648			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1963-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 20:17:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:52:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1360	43.087	329	923	1.079	--
2	1.676	1797	56.913	311	1846	1.025	6.303
总计		3157	100.000	640			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1964-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-16
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:21:10 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:41 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1289	38.647	309	932	1.326	--
2	1.675	2046	61.353	325	1744	1.202	6.208
总计		3335	100.000	634			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1965-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-25
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:24:31 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	1387	41.715	324	865	1.242	--
2	1.677	1938	58.285	327	1878	1.051	6.269
总计		3325	100.000	651			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1966-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-34
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:27:52 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:46 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1460	44.622	333	856	1.229	--
2	1.676	1813	55.378	320	2017	1.098	6.353
总计		3273	100.000	653			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1967-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 20:31:13 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:52:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1761	47.896	403	800	1.232	--
2	1.676	1915	52.104	333	1984	1.115	6.237
总计		3676	100.000	736			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1968-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 20:34:34 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:52:52 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1411	41.043	332	895	1.225	--
2	1.679	2027	58.957	335	1853	1.133	6.273
总计		3438	100.000	666			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1969-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-8
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:37:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:52:55 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	1519	39.629	349	878	1.303	--
2	1.678	2314	60.371	366	1705	1.144	6.089
总计		3832	100.000	715			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1970-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 20:41:19 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:52:57 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1428	42.788	321	816	1.283	--
2	1.675	1910	57.212	321	1704	1.149	5.987
总计		3338	100.000	642			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1971-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-26
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:44:41 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:00 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1712	45.915	385	862	1.290	--
2	1.676	2016	54.085	338	1726	1.089	6.091
总计		3728	100.000	723			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1972-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-35
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:48:03 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1265	39.934	303	911	1.192	--
2	1.680	1902	60.066	318	1788	1.093	6.252
总计		3167	100.000	621			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1973-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:51:25 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:06 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	1388	42.863	322	830	1.062	--
2	1.676	1850	57.137	301	1622	1.132	5.938
总计		3237	100.000	623			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1974-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-53
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:54:46 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	1416	42.697	330	874	1.245	--
2	1.676	1900	57.303	322	1918	1.044	6.289
总计		3316	100.000	652			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1975-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 20:58:08 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	210708	100.000	32705	1581	1.115	--
总计		210708	100.000	32705			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1976-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH4.5-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:01:30 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:15 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	210433	100.000	32666	1580	1.113	--
总计		210433	100.000	32666			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1977-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:04:53 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1978-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:08:17 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	209786	100.000	32584	1580	1.114	--
总计		209786	100.000	32584			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1979-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:11:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:23 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	209488	100.000	32555	1582	1.116	--
总计		209488	100.000	32555			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1980-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:15:04 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	209641	100.000	32505	1581	1.115	--
总计		209641	100.000	32505			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1981-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:18:28 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:28 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	209823	100.000	32496	1579	1.115	--
总计		209823	100.000	32496			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1982-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:21:52 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:31 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	209047	100.000	32470	1586	1.114	--
总计		209047	100.000	32470			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1983-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:25:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:33 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1225	5.436	263	708	1.169	--
2	1.675	21308	94.564	3446	1732	1.112	5.781
总计		22532	100.000	3709			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1984-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:28:36 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.842	1374	5.104	273	676	1.382	--
2	1.676	25545	94.896	4148	1748	1.104	5.753
总计		26918	100.000	4421			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1985-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:31:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:39 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	1201	5.262	265	753	1.189	--
2	1.676	21621	94.738	3495	1735	1.105	5.858
总计		22822	100.000	3761			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1986-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:35:20 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:42 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.841	1415	5.424	287	624	1.297	--
2	1.676	24672	94.576	3981	1727	1.118	5.639
总计		26087	100.000	4267			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1987-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-37
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:38:42 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	1386	4.853	291	659	1.182	--
2	1.676	27170	95.147	4405	1723	1.103	5.673
总计		28556	100.000	4696			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1988-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-46
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:42:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:47 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1435	5.459	295	682	1.250	--
2	1.675	24846	94.541	3979	1718	1.108	5.726
总计		26281	100.000	4274			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1989-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-2
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:45:27 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:50 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.842	1644	4.676	344	743	1.345	--
2	1.676	33525	95.324	5406	1713	1.102	5.836
总计		35169	100.000	5750			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1990-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-11
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:48:49 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:53 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.845	1878	4.795	381	619	1.237	--
2	1.676	37292	95.205	6010	1732	1.113	5.597
总计		39170	100.000	6391			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1991-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 21:52:12 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:53:55 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1693	4.717	344	722	1.355	--
2	1.676	34194	95.283	5478	1719	1.108	5.798
总计		35887	100.000	5822			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1992-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-29
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:55:34 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:53:58 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.845	1827	4.785	370	651	1.167	--
2	1.675	36359	95.215	5856	1715	1.112	5.639
总计		38186	100.000	6226			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1993-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-38
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 21:58:56 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:01 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1566	4.090	348	802	1.139	--
2	1.676	36727	95.910	5953	1723	1.113	5.933
总计		38293	100.000	6301			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1994-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-47
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:02:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:03 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1739	4.664	352	663	1.345	--
2	1.676	35544	95.336	5746	1732	1.107	5.704
总计		37283	100.000	6098			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1995-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-3
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:05:41 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:06 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	1877	4.665	397	744	1.222	--
2	1.675	38355	95.335	6215	1733	1.107	5.844
总计		40231	100.000	6612			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1996-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-12
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:09:04 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:09 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1921	4.591	399	686	1.270	--
2	1.675	39921	95.409	6440	1727	1.110	5.735
总计		41842	100.000	6838			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1997-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-21
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:12:26 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:12 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.843	1712	4.199	365	743	1.173	--
2	1.676	39068	95.801	6300	1719	1.113	5.832
总计		40780	100.000	6665			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1998-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-30
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:15:49 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:15 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.845	2095	4.884	425	690	1.318	--
2	1.676	40791	95.116	6539	1713	1.113	5.713
总计		42885	100.000	6964			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-1999-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-39
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:19:11 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:17 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	1963	4.588	418	766	1.260	--
2	1.677	40819	95.412	6581	1724	1.104	5.849
总计		42781	100.000	7000			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2000-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-48
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:22:34 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:20 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.845	1898	4.543	397	692	1.192	--
2	1.676	39883	95.457	6421	1729	1.105	5.734
总计		41781	100.000	6817			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2001-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-4
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:25:57 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:23 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.845	1863	4.434	414	814	1.170	--
2	1.675	40148	95.566	6443	1726	1.116	5.931
总计		42011	100.000	6857			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2002-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-13
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:29:20 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:25 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2040	4.670	431	717	1.292	--
2	1.676	41648	95.330	6688	1724	1.111	5.770
总计		43689	100.000	7119			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2003-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-22
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:32:43 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2197	5.054	442	640	1.205	--
2	1.676	41274	94.946	6644	1721	1.105	5.617
总计		43471	100.000	7086			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2004-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-31
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:36:05 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2326	5.227	471	654	1.282	--
2	1.676	42164	94.773	6785	1733	1.109	5.663
总计		44489	100.000	7256			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2005-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-40
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:39:28 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:34 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.845	2230	5.070	453	674	1.294	--
2	1.676	41748	94.930	6716	1727	1.112	5.696
总计		43978	100.000	7170			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2006-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-49
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:42:51 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:37 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2261	5.147	451	634	1.199	--
2	1.676	41663	94.853	6711	1722	1.107	5.609
总计		43924	100.000	7162			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2007-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-5
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:46:14 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2360	5.192	491	712	1.230	--
2	1.676	43104	94.808	6928	1719	1.108	5.749
总计		45465	100.000	7419			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2008-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-14
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:49:37 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:42 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.844	2447	5.354	481	645	1.356	--
2	1.676	43257	94.646	6939	1716	1.115	5.642
总计		45704	100.000	7420			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2009-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-23
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:53:00 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:45 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2377	5.253	484	678	1.280	--
2	1.676	42879	94.747	6897	1721	1.107	5.693
总计		45256	100.000	7381			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2010-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-32
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 22:56:23 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:47 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2447	5.346	503	659	1.187	--
2	1.676	43323	94.654	6955	1723	1.114	5.657
总计		45770	100.000	7458			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2011-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 22:59:46 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:54:50 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.848	2611	5.235	543	694	1.007	--
2	1.676	47259	94.765	7499	1694	1.075	5.680
总计		49870	100.000	8042			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2012-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-50
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:03:09 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:54:53 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2518	5.431	510	665	1.247	--
2	1.676	43838	94.569	7061	1722	1.106	5.673
总计		46356	100.000	7571			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2013-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:06:32 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:54:56 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.846	2880	6.094	562	631	1.218	--
2	1.676	44371	93.906	7164	1731	1.109	5.613
总计		47250	100.000	7726			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2014-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:09:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:54:59 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	2709	5.730	565	703	1.202	--
2	1.677	44562	94.270	7199	1727	1.108	5.743
总计		47271	100.000	7764			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2015-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:13:18 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:02 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.848	2788	5.965	555	637	1.280	--
2	1.677	43951	94.035	7080	1724	1.113	5.607
总计		46739	100.000	7634			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2016-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-33
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:16:40 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:05 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	2911	6.272	578	619	1.227	--
2	1.677	43507	93.728	7024	1725	1.104	5.579
总计		46418	100.000	7602			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2017-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-42
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:20:02 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:08 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	2626	5.593	543	708	1.222	--
2	1.677	44323	94.407	7142	1725	1.110	5.743
总计		46949	100.000	7685			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2018-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:23:24 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:11 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.848	2795	5.853	573	678	1.229	--
2	1.677	44961	94.147	7265	1735	1.113	5.690
总计		47756	100.000	7838			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2019-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:26:48 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:14 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.848	3181	6.752	628	622	1.174	--
2	1.677	43937	93.248	7109	1725	1.110	5.574
总计		47119	100.000	7737			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2020-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:30:11 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	3050	6.575	624	696	1.233	--
2	1.677	43332	93.425	6994	1725	1.110	5.721
总计		46381	100.000	7618			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2021-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:33:35 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:20 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	3206	6.790	624	643	1.266	--
2	1.677	44010	93.210	7097	1715	1.108	5.612
总计		47216	100.000	7721			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2022-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:36:58 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:22 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	3293	6.884	640	640	1.259	--
2	1.677	44541	93.116	7170	1726	1.116	5.616
总计		47834	100.000	7810			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2023-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:40:21 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:25 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.849	3025	6.521	606	675	1.252	--
2	1.677	43370	93.479	6988	1726	1.116	5.668
总计		46395	100.000	7594			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2024-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-52
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:43:44 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:28 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	3146	6.486	628	659	1.244	--
2	1.676	45359	93.514	7269	1721	1.107	5.646
总计		48506	100.000	7897			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2025-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-8
进样体积：10μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:47:07 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:31 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.849	3195	6.462	645	660	1.191	--
2	1.677	46253	93.538	7432	1731	1.115	5.645
总计		49449	100.000	8077			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2026-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-17
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:50:31 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:33 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.848	3269	6.728	649	673	1.292	--
2	1.677	45322	93.272	7281	1726	1.111	5.675
总计		48592	100.000	7930			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2027-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/07 23:53:54 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:36 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	3376	6.791	658	642	1.212	--
2	1.676	46337	93.209	7470	1720	1.106	5.609
总计		49713	100.000	8128			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2028-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-35
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/07 23:57:18 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:39 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.847	3416	6.890	697	665	1.220	--
2	1.677	46165	93.110	7430	1728	1.115	5.665
总计		49582	100.000	8127			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30 $^{\circ}$ C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2029-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-44
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/08 00:00:41 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:41 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.849	3243	6.665	646	654	1.237	--
2	1.676	45411	93.335	7329	1720	1.107	5.623
总计		48654	100.000	7976			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：260nm
数据文件名：RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2030-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
方法文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名：RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号：4-53
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/08 00:04:03 实验者：jiangjinwei
处理时间（V2）：2025/03/10 09:55:44 处理者：jiangjinwei
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.848	4108	7.990	687	604	1.891	--
2	1.677	47304	92.010	7623	1726	1.112	5.531
总计		51412	100.000	8310			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2031-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/08 00:07:26 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:47 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	211439	100.000	32817	1581	1.116	--
总计		211439	100.000	32817			




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 30°C 波长: 260nm
数据文件名: RC\$SMF-4080 - 0-37/29-2032-2 - cbzj-12564941p-rcqx-80mg-pH1.0-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX278.lcm
批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250307-fx278.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/08 00:10:50 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/10 09:55:49 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	210805	100.000	32755	1583	1.115	--
总计		210805	100.000	32755			