



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-107-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:01:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:46:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
溶剂



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-108-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:07:59

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:46:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.273	1189015	137395	100.000	8777	1.155	--
总计		1189015	137395	100.000			

图2 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-109-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:14:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	1190192	137725	100.000	8827	1.152	--
总计		1190192	137725	100.000			

图3 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-110-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:20:48

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1189555	137394	100.000	8811	1.151	--
总计		1189555	137394	100.000			

图4 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-111-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:27:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	1188971	137738	100.000	8821	1.151	--
总计		1188971	137738	100.000			

图5 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-112-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:33:34

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1189371	137677	100.000	8852	1.150	--
总计		1189371	137677	100.000			

图6 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-113-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:39:56

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.274	1307801	151537	100.000	8823	1.149	--
总计		1307801	151537	100.000			

图7 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-114-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 14:46:19


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1308332	151714	100.000	8883	1.149	--
总计		1308332	151714	100.000			

图8 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-115-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-10

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 14:52:41


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1315971	152786	100.000	8903	1.148	--
总计		1315971	152786	100.000			

图9 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-116-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 14:59:03

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1314866	152749	100.000	8914	1.148	--
总计		1314866	152749	100.000			

图10 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-117-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 15:05:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	1312755	152565	100.000	8918	1.147	--
总计		1312755	152565	100.000			

图11 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-118-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-19

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 15:11:47


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1313309	152365	100.000	8883	1.148	--
总计		1313309	152365	100.000			

图12 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-119-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 15:18:08

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	1295393	150020	100.000	8839	1.147	--
总计		1295393	150020	100.000			

图13 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-120-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 15:24:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	1295625	149939	100.000	8828	1.148	--
总计		1295625	149939	100.000			

图14 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-121-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-37

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 15:30:52


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1303937	150907	100.000	8843	1.149	--
总计		1303937	150907	100.000			

图15 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-122-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-37

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 15:37:14


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1304364	150945	100.000	8827	1.148	--
总计		1304364	150945	100.000			

图16 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-123-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 15:43:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1319096	152699	100.000	8853	1.149	--
总计		1319096	152699	100.000			

图17 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-124-2 - zzp-2025020621p-rcd-shuijz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 15:49:58

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1319919	153002	100.000	8869	1.148	--
总计		1319919	153002	100.000			

图18 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020621批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-125-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-2

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 15:56:20


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.278	1328215	154371	100.000	8890	1.147	--
总计		1328215	154371	100.000			

图19 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-126-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-2

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 16:02:42


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1328062	153953	100.000	8880	1.148	--
总计		1328062	153953	100.000			

图20 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-127-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 16:09:05

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.277	1308951	151986	100.000	8886	1.148	--
总计		1308951	151986	100.000			

图21 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-128-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:15:27 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	1310024	152097	100.000	8874	1.149	--
总计		1310024	152097	100.000			

图22 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-129-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 16:21:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1326644	153322	100.000	8817	1.147	--
总计		1326644	153322	100.000			

图23 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-130-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 16:28:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:47:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	1325806	153291	100.000	8811	1.148	--
总计		1325806	153291	100.000			

图24 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-131-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P4-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:34:33 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:01 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.277	1315550	152182	100.000	8822	1.147	--
总计		1315550	152182	100.000			

图25 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-132-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P4-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 16:40:55 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:04 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1314878	152474	100.000	8876	1.146	--
总计		1314878	152474	100.000			

图26 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-133-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 16:47:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1326270	153788	100.000	8879	1.147	--
总计		1326270	153788	100.000			

图27 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-134-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 16:53:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.277	1326056	154335	100.000	8923	1.144	--
总计		1326056	154335	100.000			

图28 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-135-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-47

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:00:01


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1317665	153383	100.000	8952	1.143	--
总计		1317665	153383	100.000			

图29 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-136-2 - zzp-2025020721p-rcd-shuijz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-47

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:06:21


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1319345	153561	100.000	8950	1.144	--
总计		1319345	153561	100.000			

图30 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020721批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-137-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/10 17:12:44 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:17 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1338843	155836	100.000	8935	1.143	--
总计		1338843	155836	100.000			

图31 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-138-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-3

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:19:06


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.277	1338021	155871	100.000	8946	1.143	--
总计		1338021	155871	100.000			

图32 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-139-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-12

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:25:28


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.278	1323665	154353	100.000	8944	1.141	--
总计		1323665	154353	100.000			

图33 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-140-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-12

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:31:50


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1324433	154030	100.000	8931	1.144	--
总计		1324433	154030	100.000			

图34 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-141-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P3-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-21

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:38:12


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.277	1353805	157609	100.000	8936	1.144	--
总计		1353805	157609	100.000			

图35 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-142-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P3-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-21

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:44:32


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1354725	157594	100.000	8934	1.144	--
总计		1354725	157594	100.000			

图36 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-143-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P4-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-30

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 17:50:55


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1312697	152935	100.000	8956	1.143	--
总计		1312697	152935	100.000			

图37 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-144-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P4-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 17:57:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.275	1312481	152639	100.000	8914	1.145	--
总计		1312481	152639	100.000			

图38 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-145-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P5-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:03:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1318028	153373	100.000	8937	1.144	--
总计		1318028	153373	100.000			

图39 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-146-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P5-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:10:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.272	1316950	153511	100.000	8908	1.146	--
总计		1316950	153511	100.000			

图40 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-147-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P6-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:16:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:43

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.277	1329904	154819	100.000	8938	1.143	--
总计		1329904	154819	100.000			

图41 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-148-2 - zzp-2025020821p-rcd-shuijz-jf50z-P6-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:22:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.276	1329268	154808	100.000	8944	1.142	--
总计		1329268	154808	100.000			

图42 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品(2025020821批)-水介质-桨法-50转-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-149-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 18:29:08


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.278	1181017	137845	100.000	8957	1.139	--
总计		1181017	137845	100.000			

图43 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 18-3/18-150-2 - zzp-rcd-shuijz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcd-FX267.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250310-rcd-FX267.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/03/10 18:35:32


处理者: jiangjinwei

处理时间(V2): 2025/03/11 08:48:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	5.280	1182909	138157	100.000	8967	1.138	--
总计		1182909	138157	100.000			

图44 洛索洛芬钠细粒剂溶出度测定HPLC图谱
自制品-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2