



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-405-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:07:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-406-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:09:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	20980	100.000	4902	3476	1.433	--
总计		20980	100.000	4902			

图2 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-407-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:12:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21007	100.000	4913	3493	1.436	--
总计		21007	100.000	4913			

图3 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30°C
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-408-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 1-18
: 100 μl
: 2025/03/10 14:14:49
: 2025/03/11 09:00:10
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	20975	100.000	4900	3484	1.438	--
总计		20975	100.000	4900			

图4 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-409-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:17:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	20958	100.000	4894	3475	1.438	--
总计		20958	100.000	4894			

图5 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-410-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:19:48

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	20998	100.000	4902	3474	1.436	--
总计		20998	100.000	4902			

图6 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-411-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:22:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.556	6808	100.000	1662	3344	1.350	--
总计		6808	100.000	1662			

图7 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-412-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:24:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.554	8202	100.000	1999	3327	1.324	--
总计		8202	100.000	1999			

图8 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-413-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:27:13

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	6664	100.000	1637	3360	1.335	--
总计		6664	100.000	1637			

图9 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-414-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:29:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.554	6889	100.000	1676	3301	1.345	--
总计		6889	100.000	1676			

图10 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-415-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:32:09

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	6646	100.000	1622	3309	1.331	--
总计		6646	100.000	1622			

图11 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3µm)
: 30°C
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-416-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 1-46
: 100 µl
: 2025/03/10 14:34:37
: 2025/03/11 09:00:32
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	7561	100.000	1830	3296	1.352	--
总计		7561	100.000	1830			

图12 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-417-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 1-2
: 100 μl
: 2025/03/10 14:37:05
: 2025/03/11 09:00:35
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.554	13520	100.000	3232	3242	1.355	--
总计		13520	100.000	3232			

图13 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-418-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:39:33

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	14092	100.000	3365	3238	1.335	--
总计		14092	100.000	3365			

图14 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-419-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:42:01

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	13228	100.000	3157	3233	1.360	--
总计		13228	100.000	3157			

图15 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-420-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:44:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	12328	100.000	2951	3245	1.353	--
总计		12328	100.000	2951			

图16 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-421-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 1-38
: 100 μl
: 2025/03/10 14:46:55
: 2025/03/11 09:00:45
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	13579	100.000	3217	3191	1.355	--
总计		13579	100.000	3217			

图17 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-422-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:49:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	13938	100.000	3315	3216	1.350	--
总计		13938	100.000	3315			

图18 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-423-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:51:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	17112	100.000	4045	3207	1.350	--
总计		17112	100.000	4045			

图19 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-424-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:54:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	17455	100.000	4126	3202	1.358	--
总计		17455	100.000	4126			

图20 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-425-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:56:46

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	17072	100.000	4029	3189	1.353	--
总计		17072	100.000	4029			

图21 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-426-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:59:14

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:00:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	16199	100.000	3829	3203	1.353	--
总计		16199	100.000	3829			

图22 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-427-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:01:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	17053	100.000	4025	3194	1.335	--
总计		17053	100.000	4025			

图23 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-428-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:04:10

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	16773	100.000	3950	3175	1.350	--
总计		16773	100.000	3950			

图24 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-429-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:06:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.555	18935	100.000	4508	3264	1.344	--
总计		18935	100.000	4508			

图25 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-430-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:09:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	18775	100.000	4409	3190	1.361	--
总计		18775	100.000	4409			

图26 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-431-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:11:34

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	18484	100.000	4358	3214	1.355	--
总计		18484	100.000	4358			

图27 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-432-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:14:02

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	17944	100.000	4202	3182	1.355	--
总计		17944	100.000	4202			

图28 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-433-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:16:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	18663	100.000	4362	3179	1.363	--
总计		18663	100.000	4362			

图29 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-434-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-20min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 1-49
: 100 μl
: 2025/03/10 15:18:57
: 2025/03/11 09:01:20
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	18271	100.000	4292	3199	1.369	--
总计		18271	100.000	4292			

图30 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-435-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:21:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	20192	100.000	4746	3196	1.368	--
总计		20192	100.000	4746			

图31 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-436-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:23:54

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20296	100.000	4754	3189	1.362	--
总计		20296	100.000	4754			

图32 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-437-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:26:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	19758	100.000	4666	3214	1.351	--
总计		19758	100.000	4666			

图33 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-438-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:28:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	19836	100.000	4658	3195	1.354	--
总计		19836	100.000	4658			

图34 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-439-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:31:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20006	100.000	4681	3183	1.366	--
总计		20006	100.000	4681			

图35 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-440-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:33:46

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20063	100.000	4681	3175	1.358	--
总计		20063	100.000	4681			

图36 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-441-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-45min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 1-6
: 100 μl
: 2025/03/10 15:36:14
: 2025/03/11 09:01:39
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	21251	100.000	5006	3200	1.363	--
总计		21251	100.000	5006			

图37 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-442-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:38:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	21032	100.000	4920	3180	1.364	--
总计		21032	100.000	4920			

图38 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-443-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:41:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20783	100.000	4888	3207	1.383	--
总计		20783	100.000	4888			

图39 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-444-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:43:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20869	100.000	4867	3173	1.362	--
总计		20869	100.000	4867			

图40 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-445-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:46:07

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20861	100.000	4850	3161	1.358	--
总计		20861	100.000	4850			

图41 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-446-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:48:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20724	100.000	4828	3156	1.340	--
总计		20724	100.000	4828			

图42 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-447-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:51:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	20932	100.000	4911	3185	1.372	--
总计		20932	100.000	4911			

图43 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-448-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:53:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:01:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21942	100.000	5128	3164	1.364	--
总计		21942	100.000	5128			

图44 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-449-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:56:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21173	100.000	4990	3197	1.367	--
总计		21173	100.000	4990			

图45 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-450-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:58:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	21585	100.000	5026	3162	1.369	--
总计		21585	100.000	5026			

图46 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-451-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:00:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	21538	100.000	5007	3155	1.361	--
总计		21538	100.000	5007			

图47 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-452-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:03:27

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.553	21073	100.000	4943	3185	1.359	--
总计		21073	100.000	4943			

图48 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-453-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:05:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21779	100.000	5110	3179	1.375	--
总计		21779	100.000	5110			

图49 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-454-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:08:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21986	100.000	5120	3153	1.370	--
总计		21986	100.000	5120			

图50 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-455-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:10:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21429	100.000	5045	3193	1.379	--
总计		21429	100.000	5045			

图51 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-456-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:13:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21952	100.000	5118	3156	1.363	--
总计		21952	100.000	5118			

图52 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-457-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:15:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	21573	100.000	5023	3148	1.356	--
总计		21573	100.000	5023			

图53 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-458-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:18:19

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21495	100.000	5007	3155	1.363	--
总计		21495	100.000	5007			

图54 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-459-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:20:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	22024	100.000	5164	3182	1.361	--
总计		22024	100.000	5164			

图55 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-460-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-jx.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 4-10
: 100 μl
: 2025/03/10 16:23:16
: 2025/03/11 09:02:29
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21976	100.000	5108	3139	1.354	--
总计		21976	100.000	5108			

图56 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-461-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:25:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21217	100.000	5011	3195	1.371	--
总计		21217	100.000	5011			

图57 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-462-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:28:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	22131	100.000	5162	3159	1.375	--
总计		22131	100.000	5162			

图58 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-463-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:30:40

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	22399	100.000	5230	3159	1.370	--
总计		22399	100.000	5230			

图59 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-464-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:33:08

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21667	100.000	5051	3151	1.374	--
总计		21667	100.000	5051			

图60 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-465-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:35:37

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	20986	100.000	4933	3502	1.421	--
总计		20986	100.000	4933			

图61 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-466-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:38:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	21002	100.000	4931	3495	1.423	--
总计		21002	100.000	4931			

图62 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-467-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:40:36

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-468-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:43:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	21075	100.000	4936	3484	1.425	--
总计		21075	100.000	4936			

图64 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-469-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 2-18
: 100 μl
: 2025/03/10 16:45:35
: 2025/03/11 09:02:52
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	21025	100.000	4923	3474	1.425	--
总计		21025	100.000	4923			

图65 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-470-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:48:04

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	21053	100.000	4930	3467	1.420	--
总计		21053	100.000	4930			

图66 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-471-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:50:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:02:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	21059	100.000	4925	3457	1.422	--
总计		21059	100.000	4925			

图67 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-472-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:53:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.622	21075	100.000	4927	3474	1.424	--
总计		21075	100.000	4927			

图68 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-473-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:55:33

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	7167	100.000	1706	3179	1.303	--
总计		7167	100.000	1706			

图69 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-474-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:58:02

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	6845	100.000	1623	3162	1.322	--
总计		6845	100.000	1623			

图70 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-475-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:00:31

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	7041	100.000	1665	3154	1.300	--
总计		7041	100.000	1665			

图71 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-476-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 2-28
: 100 μl
: 2025/03/10 17:03:00
: 2025/03/11 09:03:11
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	7890	100.000	1869	3178	1.327	--
总计		7890	100.000	1869			

图72 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-477-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:05:29

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	7333	100.000	1731	3156	1.344	--
总计		7333	100.000	1731			

图73 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-478-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 2-46
: 100 μl
: 2025/03/10 17:07:58
: 2025/03/11 09:03:17
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	8952	100.000	2096	3114	1.309	--
总计		8952	100.000	2096			

图74 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-479-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:10:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	13838	100.000	3230	3132	1.345	--
总计		13838	100.000	3230			

图75 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-480-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:12:57

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	14137	100.000	3287	3101	1.339	--
总计		14137	100.000	3287			

图76 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-481-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:15:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	13646	100.000	3189	3126	1.335	--
总计		13646	100.000	3189			

图77 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-482-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:17:55

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	14306	100.000	3343	3124	1.354	--
总计		14306	100.000	3343			

图78 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-483-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:20:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	14254	100.000	3330	3118	1.359	--
总计		14254	100.000	3330			

图79 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-484-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:22:53

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	15163	100.000	3523	3100	1.348	--
总计		15163	100.000	3523			

图80 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-485-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:25:23

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	17478	100.000	4068	3117	1.359	--
总计		17478	100.000	4068			

图81 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-486-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:27:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	17467	100.000	4060	3114	1.359	--
总计		17467	100.000	4060			

图82 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-487-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:30:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	17325	100.000	4036	3124	1.359	--
总计		17325	100.000	4036			

图83 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-488-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:32:51

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	17657	100.000	4117	3127	1.364	--
总计		17657	100.000	4117			

图84 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-489-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:35:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	16970	100.000	3960	3117	1.350	--
总计		16970	100.000	3960			

图85 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-490-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:37:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	18077	100.000	4198	3118	1.353	--
总计		18077	100.000	4198			

图86 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-491-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:40:19

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	18472	100.000	4303	3120	1.364	--
总计		18472	100.000	4303			

图87 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-492-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:42:48

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	19051	100.000	4432	3119	1.365	--
总计		19051	100.000	4432			

图88 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-493-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:45:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	19228	100.000	4481	3118	1.354	--
总计		19228	100.000	4481			

图89 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-494-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:47:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:03:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	19144	100.000	4441	3111	1.349	--
总计		19144	100.000	4441			

图90 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-495-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:50:17

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.547	18955	100.000	4426	3129	1.364	--
总计		18955	100.000	4426			

图91 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-496-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:52:46

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	18845	100.000	4376	3110	1.342	--
总计		18845	100.000	4376			

图92 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-497-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:55:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20511	100.000	4773	3122	1.362	--
总计		20511	100.000	4773			

图93 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-498-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:57:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	20387	100.000	4746	3124	1.370	--
总计		20387	100.000	4746			

图94 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-499-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:00:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	20587	100.000	4787	3118	1.350	--
总计		20587	100.000	4787			

图95 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-500-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:02:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	20541	100.000	4792	3135	1.362	--
总计		20541	100.000	4792			

图96 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-501-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:05:14

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	20169	100.000	4715	3141	1.373	--
总计		20169	100.000	4715			

图97 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-502-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:07:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	20462	100.000	4763	3125	1.367	--
总计		20462	100.000	4763			

图98 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-503-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-45min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 2-6
: 100 μl
: 2025/03/10 18:10:15
: 2025/03/11 09:04:22
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21327	100.000	4950	3123	1.373	--
总计		21327	100.000	4950			

图99 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-504-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:12:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21132	100.000	4922	3134	1.366	--
总计		21132	100.000	4922			

图100 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-505-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:15:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21451	100.000	4993	3128	1.373	--
总计		21451	100.000	4993			

图101 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-506-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:17:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21803	100.000	5085	3135	1.382	--
总计		21803	100.000	5085			

图102 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-507-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:20:14

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21183	100.000	4930	3141	1.391	--
总计		21183	100.000	4930			

图103 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-508-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:22:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21247	100.000	4946	3124	1.383	--
总计		21247	100.000	4946			

图104 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-509-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:25:13

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21889	100.000	5101	3132	1.377	--
总计		21889	100.000	5101			

图105 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-510-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:27:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21797	100.000	5063	3130	1.384	--
总计		21797	100.000	5063			

图106 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-511-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:30:13

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	22084	100.000	5147	3137	1.380	--
总计		22084	100.000	5147			

图107 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-512-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:32:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	22013	100.000	5117	3121	1.360	--
总计		22013	100.000	5117			

图108 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-513-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:35:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21747	100.000	5061	3127	1.375	--
总计		21747	100.000	5061			

图109 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-514-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:37:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21461	100.000	4994	3128	1.381	--
总计		21461	100.000	4994			

图110 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-515-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:40:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	22182	100.000	5158	3134	1.387	--
总计		22182	100.000	5158			

图111 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-516-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:42:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21938	100.000	5100	3130	1.386	--
总计		21938	100.000	5100			

图112 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-517-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:45:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:04:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	22043	100.000	5125	3131	1.388	--
总计		22043	100.000	5125			

图113 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-518-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:47:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	22097	100.000	5151	3132	1.379	--
总计		22097	100.000	5151			

图114 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-519-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:50:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21771	100.000	5060	3119	1.374	--
总计		21771	100.000	5060			

图115 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-520-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:52:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21873	100.000	5040	3077	1.386	--
总计		21873	100.000	5040			

图116 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-521-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:55:09

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	22335	100.000	5141	3068	1.386	--
总计		22335	100.000	5141			

图117 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-522-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:57:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21886	100.000	5084	3111	1.377	--
总计		21886	100.000	5084			

图118 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-523-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:00:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21973	100.000	5107	3120	1.373	--
总计		21973	100.000	5107			

图119 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-524-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:02:34

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	22249	100.000	5185	3132	1.375	--
总计		22249	100.000	5185			

图120 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-525-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:05:02

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21947	100.000	5132	3141	1.387	--
总计		21947	100.000	5132			

图121 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-526-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:07:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21919	100.000	5087	3119	1.366	--
总计		21919	100.000	5087			

图122 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-527-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:09:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21006	100.000	4931	3496	1.420	--
总计		21006	100.000	4931			

图123 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-528-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:12:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21003	100.000	4920	3498	1.426	--
总计		21003	100.000	4920			

图124 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-529-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:14:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图125 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-530-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:17:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21021	100.000	4908	3458	1.416	--
总计		21021	100.000	4908			

图126 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-531-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:19:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21034	100.000	4938	3501	1.422	--
总计		21034	100.000	4938			

图127 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-532-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-3.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-18
: 100 μl
: 2025/03/10 19:22:20
: 2025/03/11 09:05:39
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21056	100.000	4938	3506	1.423	--
总计		21056	100.000	4938			

图128 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30°C
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-533-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-4.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-18
: 100 μl
: 2025/03/10 19:24:48
: 2025/03/11 09:05:42
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21017	100.000	4929	3483	1.415	--
总计		21017	100.000	4929			

图129 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-534-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:27:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	21042	100.000	4934	3506	1.421	--
总计		21042	100.000	4934			

图130 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-535-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:29:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	7112	100.000	1667	3131	1.318	--
总计		7112	100.000	1667			

图131 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-536-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-10
: 100 μl
: 2025/03/10 19:32:10
: 2025/03/11 09:05:50
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	8423	100.000	1964	3131	1.333	--
总计		8423	100.000	1964			

图132 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-537-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:34:37

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	7611	100.000	1780	3128	1.347	--
总计		7611	100.000	1780			

图133 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-538-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:37:04

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:05:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.552	7877	100.000	1829	3093	1.342	--
总计		7877	100.000	1829			

图134 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-539-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-5min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-37
: 100 μl
: 2025/03/10 19:39:31
: 2025/03/11 09:05:58
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.551	8037	100.000	1864	3095	1.327	--
总计		8037	100.000	1864			

图135 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-540-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:41:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	6705	100.000	1569	3097	1.319	--
总计		6705	100.000	1569			

图136 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-541-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:44:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	13986	100.000	3229	3087	1.357	--
总计		13986	100.000	3229			

图137 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-542-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-10min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-11
: 100 μl
: 2025/03/10 19:46:53
: 2025/03/11 09:06:06
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	14540	100.000	3387	3119	1.361	--
总计		14540	100.000	3387			

图138 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-543-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:49:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	14041	100.000	3273	3125	1.368	--
总计		14041	100.000	3273			

图139 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-544-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:51:49

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	14770	100.000	3420	3095	1.369	--
总计		14770	100.000	3420			

图140 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-545-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:54:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	14890	100.000	3419	3056	1.367	--
总计		14890	100.000	3419			

图141 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-546-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:56:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	13624	100.000	3150	3073	1.360	--
总计		13624	100.000	3150			

图142 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-547-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:59:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	17543	100.000	4037	3068	1.352	--
总计		17543	100.000	4037			

图143 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-548-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:01:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	17769	100.000	4097	3072	1.366	--
总计		17769	100.000	4097			

图144 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-549-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:04:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	17147	100.000	3967	3081	1.369	--
总计		17147	100.000	3967			

图145 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-550-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-15min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-30
: 100 μl
: 2025/03/10 20:06:33
: 2025/03/11 09:06:27
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	16620	100.000	3821	3062	1.375	--
总计		16620	100.000	3821			

图146 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-551-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:09:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	17682	100.000	4091	3106	1.385	--
总计		17682	100.000	4091			

图147 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-552-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:11:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	16889	100.000	3887	3063	1.358	--
总计		16889	100.000	3887			

图148 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-553-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:13:55

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	19117	100.000	4420	3096	1.379	--
总计		19117	100.000	4420			

图149 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-554-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:16:23

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	19163	100.000	4421	3097	1.353	--
总计		19163	100.000	4421			

图150 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-555-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:18:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	18634	100.000	4303	3083	1.378	--
总计		18634	100.000	4303			

图151 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-556-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-20min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-31
: 100 μl
: 2025/03/10 20:21:18
: 2025/03/11 09:06:43
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	18723	100.000	4344	3123	1.385	--
总计		18723	100.000	4344			

图152 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-557-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:23:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	19100	100.000	4379	3047	1.355	--
总计		19100	100.000	4379			

图153 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-558-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:26:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	18363	100.000	4234	3067	1.371	--
总计		18363	100.000	4234			

图154 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-559-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:28:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20327	100.000	4690	3068	1.367	--
总计		20327	100.000	4690			

图155 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-560-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:31:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20334	100.000	4706	3102	1.372	--
总计		20334	100.000	4706			

图156 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-561-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:33:33

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	19850	100.000	4646	3159	1.382	--
总计		19850	100.000	4646			

图157 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-562-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:36:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:06:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20335	100.000	4685	3064	1.373	--
总计		20335	100.000	4685			

图158 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-563-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:38:27

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20464	100.000	4713	3071	1.386	--
总计		20464	100.000	4713			

图159 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
: 30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-564-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-30min.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 3-50
: 100 μl
: 2025/03/10 20:40:54
: 2025/03/11 09:07:04
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	19949	100.000	4637	3126	1.379	--
总计		19949	100.000	4637			

图160 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-565-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:43:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21105	100.000	4873	3082	1.368	--
总计		21105	100.000	4873			

图161 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-566-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:45:49

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	21221	100.000	4899	3079	1.381	--
总计		21221	100.000	4899			

图162 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-567-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:48:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20559	100.000	4789	3123	1.366	--
总计		20559	100.000	4789			

图163 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-568-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:50:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21127	100.000	4894	3109	1.366	--
总计		21127	100.000	4894			

图164 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-569-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:53:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21068	100.000	4878	3083	1.375	--
总计		21068	100.000	4878			

图165 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-570-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:55:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.550	20904	100.000	4855	3135	1.400	--
总计		20904	100.000	4855			

图166 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-571-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:58:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21457	100.000	4963	3082	1.380	--
总计		21457	100.000	4963			

图167 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-572-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:00:33

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21405	100.000	4934	3068	1.362	--
总计		21405	100.000	4934			

图168 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-573-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:03:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20988	100.000	4809	3024	1.365	--
总计		20988	100.000	4809			

图169 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-574-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:05:27

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21574	100.000	5041	3143	1.388	--
总计		21574	100.000	5041			

图170 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-575-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:07:54

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	21377	100.000	5010	3149	1.376	--
总计		21377	100.000	5010			

图171 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-576-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:10:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.549	20953	100.000	4887	3135	1.380	--
总计		20953	100.000	4887			

图172 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-577-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:12:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21491	100.000	5003	3122	1.378	--
总计		21491	100.000	5003			

图173 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-578-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:15:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21677	100.000	5039	3118	1.370	--
总计		21677	100.000	5039			

图174 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-579-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:17:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21110	100.000	4908	3127	1.374	--
总计		21110	100.000	4908			

图175 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-580-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:20:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21856	100.000	5084	3119	1.372	--
总计		21856	100.000	5084			

图176 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-581-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:22:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21469	100.000	5019	3130	1.369	--
总计		21469	100.000	5019			

图177 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-582-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:25:07

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21371	100.000	5001	3137	1.373	--
总计		21371	100.000	5001			

图178 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-583-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:27:36

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:07:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21425	100.000	4998	3122	1.381	--
总计		21425	100.000	4998			

图179 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394


＜样品信息＞

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-584-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p2-jx.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 4-12
: 100 μl
: 2025/03/10 21:30:05
: 2025/03/11 09:07:57
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min
波长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21517	100.000	5024	3134	1.384	--
总计		21517	100.000	5024			

图180 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394


<样品信息>

色谱柱
柱温
数据文件名
方法文件名
批处理文件名
样品瓶号
进样体积
进样时间
处理时间(V2)
仪器型号

: XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)
:30℃
: RC\$SMF-394 - 27-12/27-585-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p3-jx.lcd
: RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm
: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb
: 4-21
: 100 μl
: 2025/03/10 21:32:34
: 2025/03/11 09:07:59
: SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流 速: 1.0ml/min
波 长: 251nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21338	100.000	4977	3124	1.380	--
总计		21338	100.000	4977			

图181 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-586-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:35:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:08:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21950	100.000	5115	3124	1.375	--
总计		21950	100.000	5115			

图182 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-587-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:37:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:08:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.547	21612	100.000	5045	3123	1.384	--
总计		21612	100.000	5045			

图183 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-588-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:40:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:08:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.548	21379	100.000	5003	3145	1.379	--
总计		21379	100.000	5003			

图184 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-589-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:42:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:08:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.624	20938	100.000	4932	3491	1.404	--
总计		20938	100.000	4932			

图185 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-394

＜样品信息＞

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-12/27-590-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH1.2jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX276-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX276.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:44:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:08:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX276)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.623	20941	100.000	4921	3496	1.415	--
总计		20941	100.000	4921			

图186 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH1.2介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2