



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-457-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:07:39

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-458-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:10:08

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21801	100.000	5327	3789	1.203	--
总计		21801	100.000	5327			

图2 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-459-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:12:38

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21722	100.000	5343	3829	1.211	--
总计		21722	100.000	5343			

图3 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-460-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:15:08

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21782	100.000	5340	3807	1.210	--
总计		21782	100.000	5340			

图4 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-461-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:17:37

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21724	100.000	5331	3806	1.216	--
总计		21724	100.000	5331			

图5 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-462-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:20:06

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21661	100.000	5346	3841	1.213	--
总计		21661	100.000	5346			

图6 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-463-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:22:35

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	3111	100.000	782	3501	1.230	--
总计		3111	100.000	782			

图7 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-464-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:25:03

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	3756	100.000	939	3438	1.185	--
总计		3756	100.000	939			

图8 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-465-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:27:31

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.578	2183	100.000	583	3691	1.152	--
总计		2183	100.000	583			

图9 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-466-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:30:00

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	3235	100.000	830	3552	1.184	--
总计		3235	100.000	830			

图10 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-467-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:32:28

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	3273	100.000	811	3470	1.178	--
总计		3273	100.000	811			

图11 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-468-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:34:56

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	4725	100.000	1145	3309	1.223	--
总计		4725	100.000	1145			

图12 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-469-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:37:24

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	7508	100.000	1803	3303	1.247	--
总计		7508	100.000	1803			

图13 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-470-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:39:53

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	8496	100.000	2032	3316	1.240	--
总计		8496	100.000	2032			

图14 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-471-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:42:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	7455	100.000	1758	3244	1.286	--
总计		7455	100.000	1758			

图15 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-472-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:44:49

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	8554	100.000	2026	3287	1.245	--
总计		8554	100.000	2026			

图16 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-473-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:47:17

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	8482	100.000	2012	3250	1.262	--
总计		8482	100.000	2012			

图17 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-474-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:49:44

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:58:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	9237	100.000	2166	3241	1.289	--
总计		9237	100.000	2166			

图18 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-475-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:52:12

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	10470	100.000	2461	3254	1.279	--
总计		10470	100.000	2461			

图19 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-476-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:54:41

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	11914	100.000	2792	3260	1.282	--
总计		11914	100.000	2792			

图20 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-477-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:57:09

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	10398	100.000	2427	3243	1.296	--
总计		10398	100.000	2427			

图21 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-478-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 14:59:37

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	11424	100.000	2678	3267	1.274	--
总计		11424	100.000	2678			

图22 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-479-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:02:06

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	11617	100.000	2724	3242	1.282	--
总计		11617	100.000	2724			

图23 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-480-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:04:35

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	11545	100.000	2679	3266	1.309	--
总计		11545	100.000	2679			

图24 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-481-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:07:03

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	13072	100.000	3060	3287	1.319	--
总计		13072	100.000	3060			

图25 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-482-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:09:31

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	14067	100.000	3265	3252	1.299	--
总计		14067	100.000	3265			

图26 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-483-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:11:59

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	11752	100.000	2759	3263	1.268	--
总计		11752	100.000	2759			

图27 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-484-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:14:27

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	13175	100.000	3060	3223	1.288	--
总计		13175	100.000	3060			

图28 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-485-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:16:55

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13921	100.000	3224	3230	1.296	--
总计		13921	100.000	3224			

图29 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-486-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:19:23

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	13389	100.000	3129	3230	1.265	--
总计		13389	100.000	3129			

图30 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-487-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:21:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15320	100.000	3548	3225	1.287	--
总计		15320	100.000	3548			

图31 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-488-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:24:20

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	16686	100.000	3846	3229	1.299	--
总计		16686	100.000	3846			

图32 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-489-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:26:48

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	14267	100.000	3295	3226	1.277	--
总计		14267	100.000	3295			

图33 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-490-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:29:16

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15185	100.000	3532	3236	1.284	--
总计		15185	100.000	3532			

图34 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-491-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:31:44

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	16142	100.000	3737	3260	1.289	--
总计		16142	100.000	3737			

图35 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-492-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:34:12

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15825	100.000	3656	3231	1.306	--
总计		15825	100.000	3656			

图36 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-493-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:36:41

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.584	16628	100.000	3847	3254	1.302	--
总计		16628	100.000	3847			

图37 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-494-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:39:09

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17644	100.000	4098	3265	1.289	--
总计		17644	100.000	4098			

图38 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-495-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:41:37

处理时间(V3) : 2025/03/11 10:59:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15918	100.000	3677	3241	1.309	--
总计		15918	100.000	3677			

图39 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-496-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:44:05

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	16819	100.000	3902	3260	1.307	--
总计		16819	100.000	3902			

图40 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-497-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:46:33

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18015	100.000	4164	3248	1.311	--
总计		18015	100.000	4164			

图41 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-498-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:49:01

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	17506	100.000	4052	3254	1.306	--
总计		17506	100.000	4052			

图42 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-499-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:51:29

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18294	100.000	4199	3230	1.323	--
总计		18294	100.000	4199			

图43 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-500-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:53:58

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17171	100.000	3997	3256	1.298	--
总计		17171	100.000	3997			

图44 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-501-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:56:27

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17324	100.000	4013	3253	1.305	--
总计		17324	100.000	4013			

图45 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-502-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:58:55

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18005	100.000	4204	3261	1.296	--
总计		18005	100.000	4204			

图46 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-503-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:01:23

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19304	100.000	4442	3241	1.327	--
总计		19304	100.000	4442			

图47 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-504-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:03:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	18442	100.000	4273	3251	1.303	--
总计		18442	100.000	4273			

图48 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-505-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:06:20

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19052	100.000	4426	3247	1.303	--
总计		19052	100.000	4426			

图49 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-506-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:08:50

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19705	100.000	4554	3258	1.320	--
总计		19705	100.000	4554			

图50 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-507-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:11:19

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17909	100.000	4154	3255	1.303	--
总计		17909	100.000	4154			

图51 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-508-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:13:48

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18924	100.000	4379	3238	1.311	--
总计		18924	100.000	4379			

图52 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-509-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:16:17

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	19815	100.000	4590	3225	1.308	--
总计		19815	100.000	4590			

图53 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-510-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:18:45

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	19369	100.000	4493	3261	1.308	--
总计		19369	100.000	4493			

图54 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-511-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:21:13

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19364	100.000	4444	3228	1.320	--
总计		19364	100.000	4444			

图55 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-512-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:23:42

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19866	100.000	4588	3231	1.304	--
总计		19866	100.000	4588			

图56 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-513-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:26:11

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	18483	100.000	4274	3243	1.312	--
总计		18483	100.000	4274			

图57 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-514-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:28:39

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	19500	100.000	4531	3245	1.307	--
总计		19500	100.000	4531			

图58 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-515-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:31:07

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	19556	100.000	4570	3248	1.284	--
总计		19556	100.000	4570			

图59 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-516-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:33:35

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	19823	100.000	4608	3250	1.310	--
总计		19823	100.000	4608			

图60 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-517-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:36:04

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:00:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	21822	100.000	5349	3807	1.213	--
总计		21822	100.000	5349			

图61 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-518-3 - zzp-25022201p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:38:33

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	21641	100.000	5357	3840	1.215	--
总计		21641	100.000	5357			

图62 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-519-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:41:04

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图63 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-520-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:43:34

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21812	100.000	5335	3786	1.218	--
总计		21812	100.000	5335			

图64 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-521-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:46:04

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21852	100.000	5318	3750	1.213	--
总计		21852	100.000	5318			

图65 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-522-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:48:34

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21895	100.000	5299	3740	1.217	--
总计		21895	100.000	5299			

图66 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-523-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:51:04

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21847	100.000	5304	3758	1.207	--
总计		21847	100.000	5304			

图67 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-524-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:53:35

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21708	100.000	5302	3757	1.215	--
总计		21708	100.000	5302			

图68 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-525-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:56:04

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	2964	100.000	737	3405	1.181	--
总计		2964	100.000	737			

图69 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-526-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:58:36

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	3340	100.000	826	3372	1.202	--
总计		3340	100.000	826			

图70 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-527-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:01:05

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	2779	100.000	689	3392	1.240	--
总计		2779	100.000	689			

图71 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-528-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:03:34

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	2924	100.000	728	3489	1.216	--
总计		2924	100.000	728			

图72 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-529-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:06:03

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	2782	100.000	692	3334	1.204	--
总计		2782	100.000	692			

图73 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-530-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:08:32

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	3172	100.000	793	3424	1.202	--
总计		3172	100.000	793			

图74 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-531-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:11:02

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	7528	100.000	1772	3236	1.285	--
总计		7528	100.000	1772			

图75 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-532-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:13:31

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	8206	100.000	1926	3201	1.277	--
总计		8206	100.000	1926			

图76 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-533-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:16:01

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	7808	100.000	1847	3245	1.268	--
总计		7808	100.000	1847			

图77 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-534-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:18:30

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	7884	100.000	1881	3295	1.273	--
总计		7884	100.000	1881			

图78 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-535-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:20:59

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.579	7751	100.000	1827	3284	1.275	--
总计		7751	100.000	1827			

图79 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-536-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:23:28

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	7721	100.000	1830	3278	1.275	--
总计		7721	100.000	1830			

图80 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-537-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:25:58

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	11758	100.000	2725	3243	1.304	--
总计		11758	100.000	2725			

图81 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-538-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:28:27

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:01:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	11788	100.000	2741	3232	1.306	--
总计		11788	100.000	2741			

图82 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-539-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:30:56

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	11038	100.000	2586	3269	1.280	--
总计		11038	100.000	2586			

图83 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-540-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:33:25

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	11605	100.000	2694	3226	1.297	--
总计		11605	100.000	2694			

图84 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-541-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:35:54

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	10903	100.000	2568	3256	1.264	--
总计		10903	100.000	2568			

图85 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-542-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:38:24

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	10566	100.000	2472	3241	1.282	--
总计		10566	100.000	2472			

图86 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-543-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:40:54

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	13238	100.000	3094	3244	1.298	--
总计		13238	100.000	3094			

图87 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-544-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:43:23

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	13748	100.000	3193	3227	1.305	--
总计		13748	100.000	3193			

图88 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-545-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:45:53

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	13281	100.000	3074	3220	1.320	--
总计		13281	100.000	3074			

图89 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-546-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:48:22

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13467	100.000	3128	3235	1.288	--
总计		13467	100.000	3128			

图90 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-547-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:50:52

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13365	100.000	3087	3212	1.310	--
总计		13365	100.000	3087			

图91 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-548-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:53:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	13014	100.000	3029	3243	1.298	--
总计		13014	100.000	3029			

图92 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-549-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:55:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	15480	100.000	3596	3240	1.305	--
总计		15480	100.000	3596			

图93 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-550-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:58:22

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	16064	100.000	3731	3222	1.300	--
总计		16064	100.000	3731			

图94 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-551-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:00:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	15781	100.000	3651	3222	1.307	--
总计		15781	100.000	3651			

图95 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-552-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:03:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	15893	100.000	3690	3251	1.316	--
总计		15893	100.000	3690			

图96 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-553-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:05:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	15511	100.000	3589	3221	1.312	--
总计		15511	100.000	3589			

图97 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-554-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:08:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	15051	100.000	3474	3207	1.307	--
总计		15051	100.000	3474			

图98 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-555-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:10:52

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17369	100.000	4034	3229	1.284	--
总计		17369	100.000	4034			

图99 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-556-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:13:22

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	18296	100.000	4228	3228	1.309	--
总计		18296	100.000	4228			

图100 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-557-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:15:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17492	100.000	4042	3220	1.314	--
总计		17492	100.000	4042			

图101 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-558-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:18:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17613	100.000	4079	3223	1.321	--
总计		17613	100.000	4079			

图102 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-559-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:20:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:02:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17393	100.000	4042	3239	1.311	--
总计		17393	100.000	4042			

图103 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-560-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:23:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17442	100.000	4026	3225	1.322	--
总计		17442	100.000	4026			

图104 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-561-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:25:51

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18538	100.000	4297	3250	1.319	--
总计		18538	100.000	4297			

图105 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-562-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:28:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19249	100.000	4436	3228	1.327	--
总计		19249	100.000	4436			

图106 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-563-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:30:52

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18684	100.000	4295	3225	1.313	--
总计		18684	100.000	4295			

图107 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-564-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:33:22

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18804	100.000	4351	3229	1.306	--
总计		18804	100.000	4351			

图108 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-565-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:35:52

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18376	100.000	4252	3248	1.298	--
总计		18376	100.000	4252			

图109 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-566-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:38:22

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18378	100.000	4215	3208	1.313	--
总计		18378	100.000	4215			

图110 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-567-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:40:52

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19096	100.000	4419	3242	1.327	--
总计		19096	100.000	4419			

图111 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-568-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:43:23

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	20180	100.000	4645	3218	1.312	--
总计		20180	100.000	4645			

图112 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-569-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:45:54

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19711	100.000	4532	3215	1.325	--
总计		19711	100.000	4532			

图113 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-570-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:48:25

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19700	100.000	4546	3220	1.314	--
总计		19700	100.000	4546			

图114 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-571-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:50:55

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	19394	100.000	4476	3216	1.304	--
总计		19394	100.000	4476			

图115 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-572-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:53:26

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19433	100.000	4481	3196	1.298	--
总计		19433	100.000	4481			

图116 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-573-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:55:55

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19503	100.000	4502	3228	1.301	--
总计		19503	100.000	4502			

图117 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-574-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:58:24

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	20368	100.000	4683	3208	1.334	--
总计		20368	100.000	4683			

图118 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-575-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:00:53

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19777	100.000	4542	3217	1.315	--
总计		19777	100.000	4542			

图119 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-576-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:03:21

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	20132	100.000	4633	3225	1.318	--
总计		20132	100.000	4633			

图120 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-577-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:05:50

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.583	19634	100.000	4494	3208	1.332	--
总计		19634	100.000	4494			

图121 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-578-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:08:18

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19551	100.000	4494	3211	1.321	--
总计		19551	100.000	4494			

图122 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-16/30-579-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:10:49

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:03:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	21638	100.000	5303	3760	1.212	--
总计		21638	100.000	5303			

图123 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-17/30-580-3 - zzp-25022202p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:13:19

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:12:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21624	100.000	5291	3773	1.215	--
总计		21624	100.000	5291			

图124 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-581-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:15:48

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:12:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图125 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-582-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:18:16

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:12:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21863	100.000	5322	3768	1.219	--
总计		21863	100.000	5322			

图126 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-583-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:20:45

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:12:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21819	100.000	5331	3779	1.210	--
总计		21819	100.000	5331			

图127 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-584-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:23:13

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:13:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21893	100.000	5326	3765	1.216	--
总计		21893	100.000	5326			

图128 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-585-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:25:42

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:13:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21834	100.000	5322	3772	1.227	--
总计		21834	100.000	5322			

图129 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-586-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:28:11

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:13:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21870	100.000	5324	3775	1.224	--
总计		21870	100.000	5324			

图130 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-587-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:30:39

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:13:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	3920	100.000	954	3329	1.200	--
总计		3920	100.000	954			

图131 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-588-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:33:07

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:13:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图132 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-589-3 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:35:35

处理时间(V3) : 2025/03/11 11:13:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	2416	100.000	612	3529	1.190	--
总计		2416	100.000	612			

图133 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-590-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:38:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	3950	100.000	959	3342	1.216	--
总计		3950	100.000	959			

图134 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-591-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:40:31

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	3598	100.000	885	3408	1.251	--
总计		3598	100.000	885			

图135 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-592-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:42:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	4359	100.000	1045	3305	1.237	--
总计		4359	100.000	1045			

图136 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-593-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:45:27

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	8482	100.000	1979	3206	1.297	--
总计		8482	100.000	1979			

图137 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-594-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:47:55

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	8415	100.000	1986	3280	1.275	--
总计		8415	100.000	1986			

图138 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-595-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:50:23

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	7421	100.000	1773	3326	1.247	--
总计		7421	100.000	1773			

图139 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-596-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:52:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	8439	100.000	1957	3225	1.279	--
总计		8439	100.000	1957			

图140 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-597-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:55:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	8419	100.000	1966	3225	1.283	--
总计		8419	100.000	1966			

图141 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-598-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:57:46

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	8943	100.000	2087	3237	1.295	--
总计		8943	100.000	2087			

图142 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-599-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:00:14

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	11697	100.000	2722	3231	1.313	--
总计		11697	100.000	2722			

图143 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-600-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:02:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	11682	100.000	2697	3207	1.299	--
总计		11682	100.000	2697			

图144 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-601-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:05:10

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	10608	100.000	2498	3244	1.261	--
总计		10608	100.000	2498			

图145 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-602-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:07:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	11478	100.000	2661	3208	1.286	--
总计		11478	100.000	2661			

图146 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-603-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:10:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	11582	100.000	2684	3213	1.298	--
总计		11582	100.000	2684			

图147 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-604-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:12:34

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:13:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	12067	100.000	2783	3189	1.300	--
总计		12067	100.000	2783			

图148 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-605-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:15:01

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	13891	100.000	3206	3209	1.316	--
总计		13891	100.000	3206			

图149 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-606-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:17:29

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13563	100.000	3120	3194	1.303	--
总计		13563	100.000	3120			

图150 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-607-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:19:57

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	12411	100.000	2882	3231	1.302	--
总计		12411	100.000	2882			

图151 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-608-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:22:25

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13839	100.000	3191	3223	1.337	--
总计		13839	100.000	3191			

图152 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-609-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:24:53

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13560	100.000	3148	3199	1.296	--
总计		13560	100.000	3148			

图153 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-610-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:27:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	13747	100.000	3171	3213	1.329	--
总计		13747	100.000	3171			

图154 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-611-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:29:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15804	100.000	3657	3239	1.319	--
总计		15804	100.000	3657			

图155 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-612-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:32:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	15493	100.000	3583	3213	1.298	--
总计		15493	100.000	3583			

图156 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-613-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:34:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	14203	100.000	3297	3228	1.298	--
总计		14203	100.000	3297			

图157 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-614-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:37:10

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15696	100.000	3632	3224	1.316	--
总计		15696	100.000	3632			

图158 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-615-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:39:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	15935	100.000	3686	3234	1.311	--
总计		15935	100.000	3686			

图159 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-616-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:42:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	15884	100.000	3652	3238	1.313	--
总计		15884	100.000	3652			

图160 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-617-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:44:33

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17582	100.000	4075	3225	1.300	--
总计		17582	100.000	4075			

图161 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-618-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:47:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17670	100.000	4085	3225	1.314	--
总计		17670	100.000	4085			

图162 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-619-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:49:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	16230	100.000	3774	3238	1.302	--
总计		16230	100.000	3774			

图163 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-620-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:51:55

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17888	100.000	4137	3222	1.303	--
总计		17888	100.000	4137			

图164 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-621-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:54:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17619	100.000	4077	3254	1.307	--
总计		17619	100.000	4077			

图165 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-622-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:56:49

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17439	100.000	4006	3243	1.329	--
总计		17439	100.000	4006			

图166 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-623-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:59:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	18853	100.000	4368	3248	1.321	--
总计		18853	100.000	4368			

图167 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-624-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:01:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:14:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18651	100.000	4318	3255	1.319	--
总计		18651	100.000	4318			

图168 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-625-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:04:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	17179	100.000	3996	3256	1.305	--
总计		17179	100.000	3996			

图169 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-626-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:06:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18942	100.000	4384	3249	1.321	--
总计		18942	100.000	4384			

图170 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-627-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:09:07

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	18827	100.000	4382	3272	1.320	--
总计		18827	100.000	4382			

图171 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-628-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:11:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	18422	100.000	4283	3259	1.297	--
总计		18422	100.000	4283			

图172 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-629-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:14:04

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19548	100.000	4518	3240	1.320	--
总计		19548	100.000	4518			

图173 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-630-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:16:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	19646	100.000	4575	3256	1.307	--
总计		19646	100.000	4575			

图174 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-631-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:19:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	17325	100.000	3968	3163	1.300	--
总计		17325	100.000	3968			

图175 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-632-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:21:29

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	19233	100.000	4430	3221	1.316	--
总计		19233	100.000	4430			

图176 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-633-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:23:57

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19648	100.000	4518	3223	1.331	--
总计		19648	100.000	4518			

图177 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-634-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-90min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:26:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19536	100.000	4498	3248	1.325	--
总计		19536	100.000	4498			

图178 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-90min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-635-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:28:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.580	20221	100.000	4639	3210	1.318	--
总计		20221	100.000	4639			

图179 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-636-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:31:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19591	100.000	4514	3223	1.314	--
总计		19591	100.000	4514			

图180 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-637-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:33:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	18251	100.000	4179	3186	1.312	--
总计		18251	100.000	4179			

图181 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-638-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:36:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19666	100.000	4510	3198	1.322	--
总计		19666	100.000	4510			

图182 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-639-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:38:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.581	20135	100.000	4610	3185	1.318	--
总计		20135	100.000	4610			

图183 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-640-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:41:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.582	19625	100.000	4484	3195	1.330	--
总计		19625	100.000	4484			

图184 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-641-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:43:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.628	21847	100.000	5302	3760	1.211	--
总计		21847	100.000	5302			

图185 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-18/30-642-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH4.5jz-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX279.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:46:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 11:15:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX279)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.627	21685	100.000	5312	3822	1.232	--
总计		21685	100.000	5312			

图186 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH4.5介质-篮法-100转
对照品溶液-2-2