



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-444-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:56:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-445-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 15:58:55

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21560	100.000	5123	3605	1.219	--
总计		21560	100.000	5123			

图2 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-446-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:01:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21649	100.000	5127	3590	1.217	--
总计		21649	100.000	5127			

图3 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-447-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:03:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.635	21588	100.000	5129	3601	1.214	--
总计		21588	100.000	5129			

图4 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-448-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:06:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.635	21523	100.000	5123	3607	1.226	--
总计		21523	100.000	5123			

图5 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-449-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:08:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.635	21589	100.000	5128	3601	1.215	--
总计		21589	100.000	5128			

图6 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-450-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:11:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	13399	100.000	3243	3640	1.198	--
总计		13399	100.000	3243			

图7 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-451-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:13:54

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	13491	100.000	3279	3670	1.190	--
总计		13491	100.000	3279			

图8 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-452-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:16:23

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	12883	100.000	3110	3655	1.189	--
总计		12883	100.000	3110			

图9 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-453-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:18:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	12679	100.000	3073	3687	1.206	--
总计		12679	100.000	3073			

图10 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-454-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:21:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	12733	100.000	3075	3658	1.185	--
总计		12733	100.000	3075			

图11 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-455-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:23:51

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	11228	100.000	2720	3691	1.183	--
总计		11228	100.000	2720			

图12 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-456-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:26:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	20080	100.000	4845	3658	1.220	--
总计		20080	100.000	4845			

图13 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-457-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:28:49

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	19895	100.000	4795	3648	1.203	--
总计		19895	100.000	4795			

图14 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-458-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:31:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	18737	100.000	4538	3662	1.199	--
总计		18737	100.000	4538			

图15 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-459-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:33:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:24:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	19564	100.000	4726	3648	1.200	--
总计		19564	100.000	4726			

图16 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-460-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:36:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	19366	100.000	4675	3648	1.218	--
总计		19366	100.000	4675			

图17 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-461-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:38:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	18883	100.000	4581	3661	1.207	--
总计		18883	100.000	4581			

图18 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-462-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:41:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22099	100.000	5321	3636	1.214	--
总计		22099	100.000	5321			

图19 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-463-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:43:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22138	100.000	5348	3655	1.218	--
总计		22138	100.000	5348			

图20 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-464-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:46:14

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	21627	100.000	5221	3675	1.207	--
总计		21627	100.000	5221			

图21 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-465-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:48:43

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22143	100.000	5347	3657	1.210	--
总计		22143	100.000	5347			

图22 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-466-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:51:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21356	100.000	5149	3644	1.209	--
总计		21356	100.000	5149			

图23 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-467-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:53:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21609	100.000	5208	3639	1.211	--
总计		21609	100.000	5208			

图24 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-468-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:56:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22791	100.000	5493	3644	1.210	--
总计		22791	100.000	5493			

图25 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-469-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 16:58:40

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22595	100.000	5456	3641	1.203	--
总计		22595	100.000	5456			

图26 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-470-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:01:10

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22345	100.000	5379	3649	1.208	--
总计		22345	100.000	5379			

图27 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-471-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:03:40

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22951	100.000	5539	3651	1.207	--
总计		22951	100.000	5539			

图28 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-472-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:06:09

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21982	100.000	5283	3642	1.212	--
总计		21982	100.000	5283			

图29 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-473-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:08:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22731	100.000	5478	3636	1.209	--
总计		22731	100.000	5478			

图30 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-474-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:11:08

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22993	100.000	5505	3623	1.203	--
总计		22993	100.000	5505			

图31 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-475-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:13:37

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23130	100.000	5569	3640	1.222	--
总计		23130	100.000	5569			

图32 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-476-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:16:07

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22755	100.000	5519	3696	1.218	--
总计		22755	100.000	5519			

图33 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-477-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:18:36

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23586	100.000	5680	3643	1.210	--
总计		23586	100.000	5680			

图34 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-478-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:21:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22277	100.000	5368	3654	1.218	--
总计		22277	100.000	5368			

图35 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-479-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:23:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23071	100.000	5559	3650	1.219	--
总计		23071	100.000	5559			

图36 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-480-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:26:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:25:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23030	100.000	5545	3633	1.213	--
总计		23030	100.000	5545			

图37 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-481-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:28:34

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23489	100.000	5656	3646	1.206	--
总计		23489	100.000	5656			

图38 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-482-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:31:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23055	100.000	5557	3642	1.212	--
总计		23055	100.000	5557			

图39 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-483-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:33:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	24189	100.000	5820	3637	1.208	--
总计		24189	100.000	5820			

图40 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-484-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:36:02

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22150	100.000	5366	3658	1.216	--
总计		22150	100.000	5366			

图41 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-485-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:38:31

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23696	100.000	5679	3618	1.211	--
总计		23696	100.000	5679			

图42 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-486-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:41:01

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23404	100.000	5614	3650	1.207	--
总计		23404	100.000	5614			

图43 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-487-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:43:31

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23582	100.000	5684	3654	1.221	--
总计		23582	100.000	5684			

图44 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-488-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:46:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23466	100.000	5627	3635	1.210	--
总计		23466	100.000	5627			

图45 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-489-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:48:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	24521	100.000	5943	3669	1.221	--
总计		24521	100.000	5943			

图46 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-490-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:51:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22392	100.000	5412	3667	1.213	--
总计		22392	100.000	5412			

图47 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-491-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:53:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23298	100.000	5636	3675	1.216	--
总计		23298	100.000	5636			

图48 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-492-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:56:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23063	100.000	5522	3626	1.216	--
总计		23063	100.000	5522			

图49 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-493-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:58:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23619	100.000	5687	3659	1.221	--
总计		23619	100.000	5687			

图50 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-494-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:01:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23230	100.000	5608	3656	1.211	--
总计		23230	100.000	5608			

图51 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-495-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:03:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	24986	100.000	6041	3656	1.214	--
总计		24986	100.000	6041			

图52 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-496-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:06:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22361	100.000	5403	3652	1.211	--
总计		22361	100.000	5403			

图53 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-497-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:08:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	23401	100.000	5657	3671	1.216	--
总计		23401	100.000	5657			

图54 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-498-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:11:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21321	100.000	5129	3648	1.220	--
总计		21321	100.000	5129			

图55 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-499-2 - zzp-25022201p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:13:29

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21363	100.000	5137	3644	1.207	--
总计		21363	100.000	5137			

图56 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022201批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-500-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:15:57

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-501-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:18:25

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21751	100.000	5184	3626	1.215	--
总计		21751	100.000	5184			

图58 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-502-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:20:53

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:26:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21755	100.000	5183	3636	1.225	--
总计		21755	100.000	5183			

图59 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-503-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:23:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21665	100.000	5178	3640	1.221	--
总计		21665	100.000	5178			

图60 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-504-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:25:49

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21613	100.000	5178	3637	1.218	--
总计		21613	100.000	5178			

图61 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-505-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:28:17

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21657	100.000	5169	3620	1.220	--
总计		21657	100.000	5169			

图62 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-506-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:30:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	12828	100.000	3109	3670	1.189	--
总计		12828	100.000	3109			

图63 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-507-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:33:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	13459	100.000	3266	3661	1.194	--
总计		13459	100.000	3266			

图64 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-508-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:35:38

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	16000	100.000	3861	3657	1.195	--
总计		16000	100.000	3861			

图65 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-509-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:38:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	12142	100.000	2932	3653	1.192	--
总计		12142	100.000	2932			

图66 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-510-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:40:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	13903	100.000	3386	3696	1.198	--
总计		13903	100.000	3386			

图67 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-511-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:43:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	10900	100.000	2626	3663	1.188	--
总计		10900	100.000	2626			

图68 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-512-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:45:27

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	19154	100.000	4617	3634	1.215	--
总计		19154	100.000	4617			

图69 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-513-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:47:54

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	19544	100.000	4722	3664	1.203	--
总计		19544	100.000	4722			

图70 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-514-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:50:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	20929	100.000	5050	3654	1.208	--
总计		20929	100.000	5050			

图71 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-515-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:52:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	19406	100.000	4713	3671	1.201	--
总计		19406	100.000	4713			

图72 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-516-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:55:17

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	19173	100.000	4652	3687	1.209	--
总计		19173	100.000	4652			

图73 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-517-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 18:57:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	18572	100.000	4489	3676	1.199	--
总计		18572	100.000	4489			

图74 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-518-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:00:13

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22023	100.000	5350	3716	1.217	--
总计		22023	100.000	5350			

图75 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-519-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:02:40

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22460	100.000	5436	3672	1.215	--
总计		22460	100.000	5436			

图76 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-520-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:05:07

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22186	100.000	5366	3661	1.207	--
总计		22186	100.000	5366			

图77 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-521-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:07:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22244	100.000	5376	3664	1.214	--
总计		22244	100.000	5376			

图78 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-522-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:10:02

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21222	100.000	5137	3675	1.209	--
总计		21222	100.000	5137			

图79 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-523-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:12:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	20858	100.000	5047	3678	1.212	--
总计		20858	100.000	5047			

图80 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-524-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:14:58

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:27:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.639	22744	100.000	5516	3687	1.208	--
总计		22744	100.000	5516			

图81 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-525-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:17:25

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22738	100.000	5537	3676	1.212	--
总计		22738	100.000	5537			

图82 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-526-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:19:53

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22897	100.000	5523	3656	1.210	--
总计		22897	100.000	5523			

图83 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-527-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:22:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22796	100.000	5524	3702	1.213	--
总计		22796	100.000	5524			

图84 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-528-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:24:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22778	100.000	5475	3626	1.218	--
总计		22778	100.000	5475			

图85 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-529-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:27:15

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:12

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21676	100.000	5251	3684	1.203	--
总计		21676	100.000	5251			

图86 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-530-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:29:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23286	100.000	5642	3690	1.208	--
总计		23286	100.000	5642			

图87 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-531-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:32:09

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23324	100.000	5633	3675	1.215	--
总计		23324	100.000	5633			

图88 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-532-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:34:36

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:21

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23476	100.000	5673	3672	1.219	--
总计		23476	100.000	5673			

图89 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-533-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:37:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23233	100.000	5638	3684	1.208	--
总计		23233	100.000	5638			

图90 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-534-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:39:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22994	100.000	5570	3681	1.203	--
总计		22994	100.000	5570			

图91 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-535-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:41:57

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22344	100.000	5426	3699	1.211	--
总计		22344	100.000	5426			

图92 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-536-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:44:25

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23289	100.000	5649	3682	1.213	--
总计		23289	100.000	5649			

图93 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-537-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:46:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23370	100.000	5670	3684	1.213	--
总计		23370	100.000	5670			

图94 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-538-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:49:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23930	100.000	5780	3678	1.218	--
总计		23930	100.000	5780			

图95 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-539-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:51:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23351	100.000	5648	3673	1.210	--
总计		23351	100.000	5648			

图96 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-540-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:54:14

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22860	100.000	5573	3701	1.217	--
总计		22860	100.000	5573			

图97 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-541-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:56:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22812	100.000	5517	3687	1.206	--
总计		22812	100.000	5517			

图98 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-542-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 19:59:09

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:49

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23252	100.000	5642	3682	1.210	--
总计		23252	100.000	5642			

图99 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-543-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:01:37

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23462	100.000	5688	3689	1.205	--
总计		23462	100.000	5688			

图100 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-544-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:04:04

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	24684	100.000	5949	3662	1.216	--
总计		24684	100.000	5949			

图101 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-545-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:06:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:28:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23385	100.000	5684	3701	1.215	--
总计		23385	100.000	5684			

图102 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-546-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:09:00

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23073	100.000	5588	3690	1.216	--
总计		23073	100.000	5588			

图103 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-547-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:11:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	22976	100.000	5569	3693	1.212	--
总计		22976	100.000	5569			

图104 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-548-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:13:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.638	23321	100.000	5651	3676	1.212	--
总计		23321	100.000	5651			

图105 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-549-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:16:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23465	100.000	5677	3691	1.216	--
总计		23465	100.000	5677			

图106 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-550-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:18:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	24122	100.000	5865	3691	1.219	--
总计		24122	100.000	5865			

图107 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-551-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:21:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:15

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23646	100.000	5700	3671	1.205	--
总计		23646	100.000	5700			

图108 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-552-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:23:48

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:18

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23407	100.000	5627	3669	1.218	--
总计		23407	100.000	5627			

图109 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-553-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:26:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23010	100.000	5593	3694	1.214	--
总计		23010	100.000	5593			

图110 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-554-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:28:44

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21521	100.000	5179	3677	1.222	--
总计		21521	100.000	5179			

图111 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-555-2 - zzp-25022202p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:31:12

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21485	100.000	5174	3680	1.217	--
总计		21485	100.000	5174			

图112 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022202批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-556-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-9

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:33:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-557-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:36:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21539	100.000	5180	3672	1.220	--
总计		21539	100.000	5180			

图114 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-558-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:38:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:34

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21602	100.000	5181	3674	1.214	--
总计		21602	100.000	5181			

图115 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-559-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:41:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21518	100.000	5179	3665	1.223	--
总计		21518	100.000	5179			

图116 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-560-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:43:41

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:40

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21540	100.000	5185	3678	1.216	--
总计		21540	100.000	5185			

图117 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-561-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:46:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:43

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21696	100.000	5200	3673	1.218	--
总计		21696	100.000	5200			

图118 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-562-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:48:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:46

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	16315	100.000	3932	3695	1.196	--
总计		16315	100.000	3932			

图119 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-563-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:51:07

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	13539	100.000	3285	3722	1.185	--
总计		13539	100.000	3285			

图120 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 :30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-564-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:53:35

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	12293	100.000	2998	3752	1.201	--
总计		12293	100.000	2998			

图121 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-565-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:56:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	13948	100.000	3377	3723	1.192	--
总计		13948	100.000	3377			

图122 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-566-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 20:58:31

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:29:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	10154	100.000	2464	3690	1.181	--
总计		10154	100.000	2464			

图123 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-567-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:00:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	15480	100.000	3775	3726	1.213	--
总计		15480	100.000	3775			

图124 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-568-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:03:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	20702	100.000	4997	3694	1.208	--
总计		20702	100.000	4997			

图125 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-569-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:05:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	19251	100.000	4661	3708	1.198	--
总计		19251	100.000	4661			

图126 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-570-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:08:24

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	19255	100.000	4650	3705	1.221	--
总计		19255	100.000	4650			

图127 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-571-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:10:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	20514	100.000	4976	3704	1.210	--
总计		20514	100.000	4976			

图128 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-572-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:13:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	17053	100.000	4150	3737	1.203	--
总计		17053	100.000	4150			

图129 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-573-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:15:48

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	20529	100.000	4989	3721	1.200	--
总计		20529	100.000	4989			

图130 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-574-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:18:18

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22059	100.000	5351	3717	1.223	--
总计		22059	100.000	5351			

图131 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-575-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:20:47

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	20911	100.000	5087	3725	1.205	--
总计		20911	100.000	5087			

图132 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-576-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:23:16

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:25

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21853	100.000	5319	3736	1.220	--
总计		21853	100.000	5319			

图133 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-577-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:25:45

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22009	100.000	5336	3719	1.212	--
总计		22009	100.000	5336			

图134 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-578-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:28:13

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	20051	100.000	4877	3734	1.216	--
总计		20051	100.000	4877			

图135 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-579-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:30:42

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22028	100.000	5330	3689	1.205	--
总计		22028	100.000	5330			

图136 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-580-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:33:11

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:37

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22536	100.000	5428	3687	1.214	--
总计		22536	100.000	5428			

图137 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-581-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:35:40

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21743	100.000	5262	3699	1.215	--
总计		21743	100.000	5262			

图138 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-582-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:38:09

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22441	100.000	5451	3704	1.219	--
总计		22441	100.000	5451			

图139 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-583-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:40:39

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22723	100.000	5537	3739	1.221	--
总计		22723	100.000	5537			

图140 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-584-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:43:08

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	21907	100.000	5327	3758	1.219	--
总计		21907	100.000	5327			

图141 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-585-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:45:37

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22635	100.000	5510	3755	1.204	--
总计		22635	100.000	5510			

图142 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-586-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:48:06

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22664	100.000	5519	3729	1.211	--
总计		22664	100.000	5519			

图143 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-587-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:50:36

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22232	100.000	5421	3733	1.219	--
总计		22232	100.000	5421			

图144 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-588-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:53:05

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:30:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22876	100.000	5540	3718	1.204	--
总计		22876	100.000	5540			

图145 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-589-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:55:34

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23720	100.000	5768	3736	1.219	--
总计		23720	100.000	5768			

图146 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-590-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 21:58:03

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22876	100.000	5548	3742	1.204	--
总计		22876	100.000	5548			

图147 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-591-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:00:32

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:07

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23059	100.000	5592	3725	1.209	--
总计		23059	100.000	5592			

图148 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-592-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:03:01

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:10

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22951	100.000	5563	3729	1.215	--
总计		22951	100.000	5563			

图149 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-593-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:05:30

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22691	100.000	5535	3746	1.217	--
总计		22691	100.000	5535			

图150 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-594-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:07:59

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:16

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22926	100.000	5583	3745	1.222	--
总计		22926	100.000	5583			

图151 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-595-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:10:28

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:19

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	24736	100.000	6013	3736	1.219	--
总计		24736	100.000	6013			

图152 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-596-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:12:57

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:22

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22829	100.000	5566	3746	1.214	--
总计		22829	100.000	5566			

图153 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-597-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:15:26

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:24

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23274	100.000	5649	3719	1.211	--
总计		23274	100.000	5649			

图154 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-598-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:17:56

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:27

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	22831	100.000	5525	3718	1.219	--
总计		22831	100.000	5525			

图155 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-599-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:20:25

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:30

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23159	100.000	5624	3718	1.214	--
总计		23159	100.000	5624			

图156 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-600-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:22:54

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:33

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.636	23463	100.000	5655	3682	1.217	--
总计		23463	100.000	5655			

图157 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-601-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:25:23

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	25211	100.000	6144	3731	1.219	--
总计		25211	100.000	6144			

图158 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-602-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:27:53

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23379	100.000	5690	3716	1.214	--
总计		23379	100.000	5690			

图159 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-603-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:30:22

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23206	100.000	5659	3733	1.211	--
总计		23206	100.000	5659			

图160 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-604-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:32:52

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	22831	100.000	5574	3745	1.216	--
总计		22831	100.000	5574			

图161 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-605-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-17

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:35:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23105	100.000	5604	3706	1.206	--
总计		23105	100.000	5604			

图162 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-606-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:37:51

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23087	100.000	5606	3723	1.220	--
总计		23087	100.000	5606			

图163 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-607-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:40:21

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:52

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	26141	100.000	6386	3773	1.213	--
总计		26141	100.000	6386			

图164 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-608-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:42:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:55

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23504	100.000	5747	3756	1.214	--
总计		23504	100.000	5747			

图165 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-609-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:45:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:31:58

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	23116	100.000	5655	3752	1.222	--
总计		23116	100.000	5655			

图166 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30℃

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-610-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:47:50

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:32:01

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21550	100.000	5232	3745	1.220	--
总计		21550	100.000	5232			

图167 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SMF-394

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,3μm)

柱温 : 30°C

数据文件名 : RC\$SMF-394 - 27-15/29-611-2 - zzp-25022203p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$SMF-394 - SMF-394-rcqx-FX278-1.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-394 - SMF-394-20250310-FX278.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 100 μl

进样时间 : 2025/03/10 22:50:20

处理时间(V2) : 2025/03/11 09:32:04

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX278)

流速: 1.0ml/min


波长: 251nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 251nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.637	21506	100.000	5223	3754	1.232	--
总计		21506	100.000	5223			

图168 佩玛贝特片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25022203批-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2