




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1231-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 14:29:13
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1232-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:33:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:23:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1520755	100.000	199935	3490	1.109	--
总计		1520755	100.000	199935			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1233-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 14:37:59
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:26
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.890	1517886	100.000	200529	3493	1.110	--
总计		1517886	100.000	200529			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1234-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 14:42:22
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.886	1516781	100.000	200481	3496	1.109	--
总计		1516781	100.000	200481			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1235-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 14:46:46
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1518556	100.000	200111	3506	1.111	--
总计		1518556	100.000	200111			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1236-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:51:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:23:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.891	1522268	100.000	200677	3492	1.114	--
总计		1522268	100.000	200677			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1237-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/10 14:55:32

处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:23:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	289689	100.000	39719	3786	1.109	--
总计		289689	100.000	39719			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1238-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 14:59:53


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	279052	100.000	38110	3803	1.111	--
总计		279052	100.000	38110			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1239-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:04:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	267787	100.000	36688	3787	1.115	--
总计		267787	100.000	36688			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1240-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:08:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	273511	100.000	37422	3776	1.114	--
总计		273511	100.000	37422			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1241-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:12:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	272994	100.000	37341	3801	1.114	--
总计		272994	100.000	37341			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1242-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:17:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	283448	100.000	38822	3809	1.115	--
总计		283448	100.000	38822			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1243-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:21:41

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	591171	100.000	80926	3791	1.117	--
总计		591171	100.000	80926			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1244-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:26:04


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:23:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	594063	100.000	81030	3789	1.116	--
总计		594063	100.000	81030			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1245-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:30:25


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	588674	100.000	80644	3779	1.115	--
总计		588674	100.000	80644			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1246-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:34:47

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	609302	100.000	82985	3777	1.118	--
总计		609302	100.000	82985			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1247-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:39:09


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	608831	100.000	83010	3787	1.120	--
总计		608831	100.000	83010			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1248-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:43:31

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	620478	100.000	84696	3792	1.119	--
总计		620478	100.000	84696			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1249-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:47:53


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	938781	100.000	128198	3792	1.119	--
总计		938781	100.000	128198			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1250-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 15:52:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	859559	100.000	117574	3802	1.120	--
总计		859559	100.000	117574			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1251-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-21

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 15:56:38


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	861119	100.000	117468	3779	1.114	--
总计		861119	100.000	117468			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1252-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:00:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	877132	100.000	119655	3784	1.114	--
总计		877132	100.000	119655			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1253-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:05:21


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	906134	100.000	123408	3778	1.114	--
总计		906134	100.000	123408			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1254-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:09:43

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	908367	100.000	123943	3779	1.113	--
总计		908367	100.000	123943			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1255-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:14:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1203629	100.000	164568	3797	1.112	--
总计		1203629	100.000	164568			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1256-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:18:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1076417	100.000	146978	3788	1.114	--
总计		1076417	100.000	146978			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1257-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:22:50


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1086271	100.000	148723	3781	1.113	--
总计		1086271	100.000	148723			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1258-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:27:12


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1098532	100.000	149952	3786	1.114	--
总计		1098532	100.000	149952			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1259-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:31:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1183902	100.000	161217	3780	1.112	--
总计		1183902	100.000	161217			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1260-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:35:56


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1207354	100.000	164722	3784	1.111	--
总计		1207354	100.000	164722			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1261-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 16:40:18
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1420991	100.000	193602	3783	1.113	--
总计		1420991	100.000	193602			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1262-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:44:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1359022	100.000	186117	3796	1.114	--
总计		1359022	100.000	186117			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1263-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:49:01


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:24:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1380361	100.000	188473	3771	1.113	--
总计		1380361	100.000	188473			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1264-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 16:53:23
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:24:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1402705	100.000	191717	3794	1.113	--
总计		1402705	100.000	191717			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1265-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:57:45

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:24:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1429338	100.000	195391	3796	1.113	--
总计		1429338	100.000	195391			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1266-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:02:07


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1418048	100.000	193583	3791	1.114	--
总计		1418048	100.000	193583			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1267-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:06:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1488752	100.000	203237	3790	1.115	--
总计		1488752	100.000	203237			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1268-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:10:50


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	1469752	100.000	201290	3782	1.115	--
总计		1469752	100.000	201290			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1269-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:15:12


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1499449	100.000	204796	3792	1.114	--
总计		1499449	100.000	204796			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1270-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:19:34


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1496565	100.000	204087	3793	1.116	--
总计		1496565	100.000	204087			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1271-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 17:23:56
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1490997	100.000	203354	3791	1.115	--
总计		1490997	100.000	203354			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1272-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:28:18


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1491439	100.000	203456	3788	1.116	--
总计		1491439	100.000	203456			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1273-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-7

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:32:40


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1490565	100.000	203299	3766	1.116	--
总计		1490565	100.000	203299			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1274-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-16

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/10 17:37:02

处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1469566	100.000	200834	3786	1.117	--
总计		1469566	100.000	200834			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1275-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 17:41:24
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1497755	100.000	204032	3780	1.117	--
总计		1497755	100.000	204032			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1276-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:45:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:25:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1496153	100.000	203683	3778	1.119	--
总计		1496153	100.000	203683			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1277-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:50:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1489207	100.000	203893	3778	1.119	--
总计		1489207	100.000	203893			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1278-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:54:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1489318	100.000	203463	3776	1.120	--
总计		1489318	100.000	203463			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1279-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:58:54

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1495708	100.000	203878	3773	1.120	--
总计		1495708	100.000	203878			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1280-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:03:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1463123	100.000	199747	3780	1.121	--
总计		1463123	100.000	199747			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1281-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:07:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1481235	100.000	202157	3796	1.121	--
总计		1481235	100.000	202157			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1282-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:12:03


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1485635	100.000	202606	3792	1.120	--
总计		1485635	100.000	202606			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1283-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 18:16:25
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1471038	100.000	200842	3797	1.120	--
总计		1471038	100.000	200842			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1284-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:20:48

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1506892	100.000	205750	3806	1.122	--
总计		1506892	100.000	205750			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1285-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:25:11


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:25:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1521877	100.000	201600	3527	1.124	--
总计		1521877	100.000	201600			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1286-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:29:34


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:25:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1517349	100.000	200853	3526	1.124	--
总计		1517349	100.000	200853			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1287-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:33:58

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:25:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1288-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:38:22


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1520985	100.000	201468	3525	1.121	--
总计		1520985	100.000	201468			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1289-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:42:46

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.891	1517352	100.000	201409	3523	1.122	--
总计		1517352	100.000	201409			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1290-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 18:47:10
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:26:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1522927	100.000	201606	3515	1.121	--
总计		1522927	100.000	201606			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1291-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:51:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1520095	100.000	201356	3517	1.120	--
总计		1520095	100.000	201356			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1292-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:55:58


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:26:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1518405	100.000	201248	3519	1.121	--
总计		1518405	100.000	201248			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1293-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:00:21


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	269703	100.000	36987	3804	1.119	--
总计		269703	100.000	36987			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1294-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:04:44


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	270784	100.000	37148	3811	1.117	--
总计		270784	100.000	37148			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1295-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:09:07


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	276796	100.000	37925	3808	1.118	--
总计		276796	100.000	37925			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1296-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:13:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	317394	100.000	43576	3824	1.118	--
总计		317394	100.000	43576			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1297-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:17:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	273482	100.000	37627	3840	1.118	--
总计		273482	100.000	37627			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1298-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:22:16

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	329529	100.000	45298	3825	1.120	--
总计		329529	100.000	45298			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1299-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:26:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	583849	100.000	80146	3828	1.120	--
总计		583849	100.000	80146			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1300-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:31:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.898	599949	100.000	82499	3809	1.120	--
总计		599949	100.000	82499			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1301-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:35:25

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	617999	100.000	84868	3823	1.120	--
总计		617999	100.000	84868			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1302-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:39:48

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	700359	100.000	96279	3832	1.120	--
总计		700359	100.000	96279			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1303-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:44:11


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:26:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	610615	100.000	83969	3825	1.120	--
总计		610615	100.000	83969			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1304-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:48:34


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	642098	100.000	88247	3828	1.119	--
总计		642098	100.000	88247			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1305-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:52:58

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	864347	100.000	118726	3825	1.119	--
总计		864347	100.000	118726			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1306-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:57:21


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	885401	100.000	121604	3828	1.119	--
总计		885401	100.000	121604			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1307-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:01:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:26:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	904852	100.000	124183	3823	1.118	--
总计		904852	100.000	124183			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1308-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:06:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:26:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1024713	100.000	140503	3821	1.117	--
总计		1024713	100.000	140503			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1309-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:10:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	857920	100.000	117731	3821	1.117	--
总计		857920	100.000	117731			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1310-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:14:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	938009	100.000	128628	3819	1.115	--
总计		938009	100.000	128628			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1311-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:19:15

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1122111	100.000	154204	3829	1.115	--
总计		1122111	100.000	154204			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1312-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:23:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1112873	100.000	152978	3831	1.115	--
总计		1112873	100.000	152978			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1313-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:28:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:27:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1198796	100.000	164899	3838	1.117	--
总计		1198796	100.000	164899			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1314-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:32:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1253095	100.000	172478	3846	1.118	--
总计		1253095	100.000	172478			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1315-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:36:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1083767	100.000	149254	3852	1.119	--
总计		1083767	100.000	149254			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1316-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:41:16


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1164257	100.000	159908	3847	1.119	--
总计		1164257	100.000	159908			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1317-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:45:39


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1376950	100.000	189403	3848	1.119	--
总计		1376950	100.000	189403			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1318-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:50:03


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1394003	100.000	192008	3841	1.118	--
总计		1394003	100.000	192008			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1319-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:54:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1416552	100.000	194789	3851	1.118	--
总计		1416552	100.000	194789			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1320-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:58:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1471441	100.000	202262	3850	1.119	--
总计		1471441	100.000	202262			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1321-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:03:15

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1362186	100.000	187632	3853	1.118	--
总计		1362186	100.000	187632			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1322-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:07:39


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:27:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1449415	100.000	200138	3843	1.118	--
总计		1449415	100.000	200138			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1323-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:12:03


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1516974	100.000	209284	3867	1.118	--
总计		1516974	100.000	209284			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1324-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:16:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1494251	100.000	205966	3867	1.117	--
总计		1494251	100.000	205966			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1325-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:20:51


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1492775	100.000	205884	3856	1.117	--
总计		1492775	100.000	205884			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1326-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:25:16


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1504742	100.000	207425	3860	1.116	--
总计		1504742	100.000	207425			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1327-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:29:39


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:27:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1458909	100.000	201373	3873	1.115	--
总计		1458909	100.000	201373			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1328-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:34:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.898	1520333	100.000	210057	3852	1.116	--
总计		1520333	100.000	210057			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1329-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:38:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:27:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1519717	100.000	209572	3865	1.116	--
总计		1519717	100.000	209572			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1330-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:42:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1492058	100.000	205353	3857	1.115	--
总计		1492058	100.000	205353			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1331-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:47:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1486107	100.000	205237	3880	1.115	--
总计		1486107	100.000	205237			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1332-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:51:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1509332	100.000	208460	3863	1.112	--
总计		1509332	100.000	208460			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1333-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:56:05


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1462431	100.000	201927	3861	1.111	--
总计		1462431	100.000	201927			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1334-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:00:28


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	1519331	100.000	209477	3858	1.111	--
总计		1519331	100.000	209477			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1335-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:04:53


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1519570	100.000	209690	3863	1.110	--
总计		1519570	100.000	209690			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1336-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:09:16

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1523441	100.000	210033	3870	1.110	--
总计		1523441	100.000	210033			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1337-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:13:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1507509	100.000	207816	3863	1.110	--
总计		1507509	100.000	207816			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1338-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:18:04


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1507135	100.000	208252	3869	1.110	--
总计		1507135	100.000	208252			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1339-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:22:28


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1482773	100.000	204834	3863	1.107	--
总计		1482773	100.000	204834			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1340-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 22:26:52

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1520696	100.000	209981	3861	1.106	--
总计		1520696	100.000	209981			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1341-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:31:17


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1512824	100.000	202062	3582	1.111	--
总计		1512824	100.000	202062			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1342-2 - zzp-2023010511p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:35:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1516527	100.000	202273	3569	1.110	--
总计		1516527	100.000	202273			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010511批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1343-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 22:40:03
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:28:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1344-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:44:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1516279	100.000	201991	3563	1.110	--
总计		1516279	100.000	201991			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1345-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:48:47


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1517849	100.000	202488	3564	1.109	--
总计		1517849	100.000	202488			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1346-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:53:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1515401	100.000	202036	3564	1.110	--
总计		1515401	100.000	202036			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1347-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:57:32


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.893	1513551	100.000	201782	3568	1.111	--
总计		1513551	100.000	201782			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1348-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:01:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:28:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.894	1513827	100.000	201904	3565	1.110	--
总计		1513827	100.000	201904			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1349-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:06:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.900	261192	100.000	36017	3851	1.104	--
总计		261192	100.000	36017			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1350-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:10:36


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:28:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	246053	100.000	34038	3859	1.104	--
总计		246053	100.000	34038			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1351-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:14:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	335977	100.000	46446	3859	1.103	--
总计		335977	100.000	46446			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1352-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:19:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	274709	100.000	37903	3856	1.103	--
总计		274709	100.000	37903			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1353-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:23:42


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	260042	100.000	35929	3854	1.101	--
总计		260042	100.000	35929			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1354-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:28:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	273940	100.000	37793	3840	1.099	--
总计		273940	100.000	37793			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1355-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:32:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	623072	100.000	85994	3849	1.099	--
总计		623072	100.000	85994			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1356-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:36:47


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	622261	100.000	85922	3852	1.098	--
总计		622261	100.000	85922			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1357-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:41:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	685605	100.000	94642	3853	1.098	--
总计		685605	100.000	94642			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1358-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:45:31


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	685933	100.000	94707	3859	1.098	--
总计		685933	100.000	94707			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1359-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:49:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	661021	100.000	91325	3856	1.098	--
总计		661021	100.000	91325			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1360-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:54:15

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	673352	100.000	92761	3843	1.096	--
总计		673352	100.000	92761			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1361-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:58:36


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	919263	100.000	126788	3846	1.097	--
总计		919263	100.000	126788			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1362-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:02:57


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	881597	100.000	121470	3845	1.096	--
总计		881597	100.000	121470			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1363-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:07:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	992698	100.000	136919	3842	1.096	--
总计		992698	100.000	136919			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1364-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:11:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	964004	100.000	133077	3851	1.096	--
总计		964004	100.000	133077			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1365-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:16:01


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	925423	100.000	127724	3852	1.095	--
总计		925423	100.000	127724			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1366-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:20:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	888691	100.000	122666	3850	1.094	--
总计		888691	100.000	122666			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1367-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:24:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1139013	100.000	157018	3844	1.094	--
总计		1139013	100.000	157018			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1368-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:29:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:29:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1121464	100.000	154444	3832	1.093	--
总计		1121464	100.000	154444			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1369-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:33:29


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1236852	100.000	170681	3844	1.091	--
总计		1236852	100.000	170681			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1370-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:37:50


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1182588	100.000	163304	3849	1.091	--
总计		1182588	100.000	163304			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1371-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:42:11


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1124406	100.000	154896	3847	1.091	--
总计		1124406	100.000	154896			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1372-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:46:32


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:29:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1144234	100.000	158110	3863	1.090	--
总计		1144234	100.000	158110			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1373-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:50:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1426990	100.000	197007	3853	1.088	--
总计		1426990	100.000	197007			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1374-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:55:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1390772	100.000	192114	3856	1.090	--
总计		1390772	100.000	192114			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1375-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:59:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1465464	100.000	201996	3860	1.090	--
总计		1465464	100.000	201996			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1376-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:03:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1408906	100.000	194607	3851	1.089	--
总计		1408906	100.000	194607			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1377-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:08:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1418063	100.000	195510	3847	1.090	--
总计		1418063	100.000	195510			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1378-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:12:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1356669	100.000	186726	3841	1.090	--
总计		1356669	100.000	186726			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1379-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:17:02


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1511008	100.000	208440	3851	1.089	--
总计		1511008	100.000	208440			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1380-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 01:21:23
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:30:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1502135	100.000	207168	3844	1.088	--
总计		1502135	100.000	207168			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1381-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:25:44


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1506391	100.000	207987	3851	1.088	--
总计		1506391	100.000	207987			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1382-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:30:05


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1497536	100.000	206211	3849	1.089	--
总计		1497536	100.000	206211			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1383-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:34:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1500885	100.000	207071	3850	1.089	--
总计		1500885	100.000	207071			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1384-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:38:47

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1486052	100.000	204998	3850	1.088	--
总计		1486052	100.000	204998			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1385-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:43:08


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1505431	100.000	207794	3852	1.087	--
总计		1505431	100.000	207794			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1386-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:47:28


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1503396	100.000	207825	3865	1.088	--
总计		1503396	100.000	207825			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1387-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 01:51:50
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:30:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	1511488	100.000	208612	3864	1.088	--
总计		1511488	100.000	208612			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1388-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 01:56:12
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:30:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1503144	100.000	206979	3856	1.088	--
总计		1503144	100.000	206979			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1389-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:00:34


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1502793	100.000	207775	3868	1.087	--
总计		1502793	100.000	207775			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1390-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:04:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.899	1499920	100.000	207394	3867	1.086	--
总计		1499920	100.000	207394			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1391-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:09:17


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1457283	100.000	201293	3860	1.085	--
总计		1457283	100.000	201293			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1392-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:13:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:30:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1468689	100.000	203114	3868	1.084	--
总计		1468689	100.000	203114			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1393-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:18:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:30:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	1477134	100.000	204462	3877	1.084	--
总计		1477134	100.000	204462			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1394-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:22:23


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1493367	100.000	206491	3862	1.083	--
总计		1493367	100.000	206491			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1395-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:26:45


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1501930	100.000	207644	3862	1.082	--
总计		1501930	100.000	207644			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1396-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:31:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	1496222	100.000	206286	3860	1.082	--
总计		1496222	100.000	206286			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1397-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:35:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.896	1508503	100.000	201804	3567	1.086	--
总计		1508503	100.000	201804			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1398-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:39:49

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	1508721	100.000	201720	3569	1.085	--
总计		1508721	100.000	201720			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1399-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 02:44:13
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:31:16
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1400-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:48:38


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.896	1510267	100.000	201851	3559	1.083	--
总计		1510267	100.000	201851			

图170 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1401-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:53:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.892	1511166	100.000	201186	3547	1.082	--
总计		1511166	100.000	201186			

图171 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1402-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:57:24


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.895	1510311	100.000	201728	3558	1.081	--
总计		1510311	100.000	201728			

图172 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1403-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:01:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.897	1510402	100.000	201818	3563	1.081	--
总计		1510402	100.000	201818			

图173 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1404-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:06:13


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:31:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.898	1512056	100.000	201586	3553	1.079	--
总计		1512056	100.000	201586			

图174 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1405-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:10:36


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	343236	100.000	47358	3835	1.072	--
总计		343236	100.000	47358			

图175 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1406-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:14:58

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.902	346506	100.000	47805	3847	1.072	--
总计		346506	100.000	47805			

图176 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1407-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:19:21

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	351660	100.000	48535	3828	1.069	--
总计		351660	100.000	48535			

图177 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1408-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:23:44

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	333925	100.000	46129	3836	1.070	--
总计		333925	100.000	46129			

图178 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1409-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:28:06

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	330221	100.000	45567	3828	1.067	--
总计		330221	100.000	45567			

图179 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1410-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:32:29


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	342202	100.000	47171	3826	1.068	--
总计		342202	100.000	47171			

图180 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1411-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:36:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	689885	100.000	94998	3814	1.066	--
总计		689885	100.000	94998			

图181 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1412-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:41:14

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	703243	100.000	96900	3816	1.064	--
总计		703243	100.000	96900			

图182 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1413-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:45:37


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	687711	100.000	94652	3812	1.065	--
总计		687711	100.000	94652			

图183 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1414-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:49:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:31:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	674339	100.000	92876	3822	1.062	--
总计		674339	100.000	92876			

图184 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1415-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 03:54:22
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	652587	100.000	89639	3800	1.062	--
总计		652587	100.000	89639			

图185 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1416-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:58:45


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	655908	100.000	90088	3801	1.060	--
总计		655908	100.000	90088			

图186 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1417-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:03:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	970522	100.000	133285	3807	1.061	--
总计		970522	100.000	133285			

图187 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1418-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:07:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	977772	100.000	134257	3801	1.060	--
总计		977772	100.000	134257			

图188 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1419-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:11:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	968989	100.000	133044	3798	1.059	--
总计		968989	100.000	133044			

图189 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1420-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:16:14


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.901	933315	100.000	127620	3771	1.058	--
总计		933315	100.000	127620			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1421-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:20:36


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	901809	100.000	123660	3779	1.056	--
总计		901809	100.000	123660			

图191 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1422-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:24:58


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	906168	100.000	123994	3775	1.055	--
总计		906168	100.000	123994			

图192 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1423-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:29:21

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1182385	100.000	161370	3765	1.054	--
总计		1182385	100.000	161370			

图193 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1424-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 04:33:44
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1165450	100.000	159101	3757	1.052	--
总计		1165450	100.000	159101			

图194 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1425-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:38:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	1195475	100.000	163455	3754	1.050	--
总计		1195475	100.000	163455			

图195 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1426-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:42:30


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1146840	100.000	156949	3759	1.049	--
总计		1146840	100.000	156949			

图196 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1427-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:46:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1096381	100.000	149903	3751	1.048	--
总计		1096381	100.000	149903			

图197 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1428-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:51:16


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.905	1128396	100.000	154193	3749	1.048	--
总计		1128396	100.000	154193			

图198 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1429-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:55:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.906	1390988	100.000	189501	3729	1.046	--
总计		1390988	100.000	189501			

图199 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1430-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:00:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1397727	100.000	189968	3718	1.043	--
总计		1397727	100.000	189968			

图200 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1431-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:04:25


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1442023	100.000	195524	3704	1.040	--
总计		1442023	100.000	195524			

图201 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1432-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:08:49


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1376775	100.000	186611	3701	1.038	--
总计		1376775	100.000	186611			

图202 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1433-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:13:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1352870	100.000	183236	3693	1.036	--
总计		1352870	100.000	183236			

图203 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1434-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:17:35


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:32:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1373688	100.000	185954	3683	1.033	--
总计		1373688	100.000	185954			

图204 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1435-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:21:58


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:32:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1448166	100.000	195226	3660	1.031	--
总计		1448166	100.000	195226			

图205 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1436-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:26:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:32:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1461353	100.000	196585	3656	1.029	--
总计		1461353	100.000	196585			

图206 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1437-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:30:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1498142	100.000	201270	3641	1.026	--
总计		1498142	100.000	201270			

图207 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1438-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:35:07


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1452864	100.000	194772	3632	1.023	--
总计		1452864	100.000	194772			

图208 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1439-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:39:29


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1429193	100.000	191242	3612	1.020	--
总计		1429193	100.000	191242			

图209 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1440-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:43:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.907	1454266	100.000	194441	3597	1.018	--
总计		1454266	100.000	194441			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1441-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:48:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1447476	100.000	193318	3596	1.016	--
总计		1447476	100.000	193318			

图211 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1442-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:52:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1461546	100.000	194294	3578	1.013	--
总计		1461546	100.000	194294			

图212 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1443-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:57:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1506076	100.000	199787	3564	1.012	--
总计		1506076	100.000	199787			

图213 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1444-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:01:26


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1452300	100.000	192669	3554	1.009	--
总计		1452300	100.000	192669			

图214 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1445-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:05:50


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1430648	100.000	189303	3549	1.007	--
总计		1430648	100.000	189303			

图215 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1446-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:10:13


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1444043	100.000	190905	3531	1.004	--
总计		1444043	100.000	190905			

图216 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1447-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:14:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1448022	100.000	190928	3510	1.001	--
总计		1448022	100.000	190928			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1448-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:19:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.908	1462388	100.000	192170	3483	0.998	--
总计		1462388	100.000	192170			

图218 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1449-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:23:25


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.909	1510266	100.000	198060	3472	0.996	--
总计		1510266	100.000	198060			

图219 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1450-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:27:50


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1458214	100.000	190919	3459	0.997	--
总计		1458214	100.000	190919			

图220 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1451-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:32:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1431629	100.000	186812	3433	0.997	--
总计		1431629	100.000	186812			

图221 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1452-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:36:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.910	1447983	100.000	188629	3415	0.997	--
总计		1447983	100.000	188629			

图222 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1453-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:41:01


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:33:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.904	1519302	100.000	192312	3179	1.003	--
总计		1519302	100.000	192312			

图223 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-231/24-1454-2 - zzp-2023010611p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX273.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:45:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:33:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.903	1520367	100.000	191794	3155	1.003	--
总计		1520367	100.000	191794			

图224 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010611批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2201-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:22:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:56:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

225

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2202-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:26:27

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:56:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1511791	100.000	228443	4710	1.189	--
总计		1511791	100.000	228443			

图226 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2203-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:30:47


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:56:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.925	1509734	100.000	228428	4710	1.189	--
总计		1509734	100.000	228428			

图227 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2204-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:35:09


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.927	1511989	100.000	228632	4704	1.188	--
总计		1511989	100.000	228632			

图228 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2205-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:39:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1510042	100.000	227935	4698	1.188	--
总计		1510042	100.000	227935			

图229 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2206-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:43:54

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.926	1512413	100.000	228310	4695	1.188	--
总计		1512413	100.000	228310			

图230 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2207-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:52:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	247282	100.000	38620	5061	1.184	--
总计		247282	100.000	38620			

图231 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2208-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:56:54


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	310016	100.000	48369	5056	1.185	--
总计		310016	100.000	48369			

图232 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2209-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:01:17


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	356749	100.000	55613	5051	1.185	--
总计		356749	100.000	55613			

图233 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2210-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:05:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	271002	100.000	42247	5052	1.183	--
总计		271002	100.000	42247			

图234 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2211-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:10:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	278282	100.000	43378	5042	1.183	--
总计		278282	100.000	43378			

图235 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2212-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:14:24

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	288509	100.000	44845	5041	1.184	--
总计		288509	100.000	44845			

图236 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2213-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:18:45


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	551905	100.000	85895	5038	1.183	--
总计		551905	100.000	85895			

图237 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2214-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 17:23:07
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	600516	100.000	93442	5032	1.183	--
总计		600516	100.000	93442			

图238 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2215-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:27:29

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	721624	100.000	112284	5029	1.182	--
总计		721624	100.000	112284			

图239 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2216-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:31:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	587644	100.000	91454	5030	1.181	--
总计		587644	100.000	91454			

图240 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2217-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:36:12


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	605490	100.000	93951	5018	1.182	--
总计		605490	100.000	93951			

图241 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2218-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:40:34


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	619190	100.000	96152	5018	1.181	--
总计		619190	100.000	96152			

图242 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2219-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:44:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	823322	100.000	128045	5016	1.180	--
总计		823322	100.000	128045			

图243 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2220-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:49:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	934207	100.000	145171	5008	1.179	--
总计		934207	100.000	145171			

图244 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2221-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:53:41


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:57:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1023158	100.000	158710	5004	1.180	--
总计		1023158	100.000	158710			

图245 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2222-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:58:02


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	866551	100.000	134376	5001	1.179	--
总计		866551	100.000	134376			

图246 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2223-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:02:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:57:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	892942	100.000	138504	4995	1.178	--
总计		892942	100.000	138504			

图247 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2224-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 18:06:46
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:57:59
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	922929	100.000	142994	4983	1.178	--
总计		922929	100.000	142994			

图248 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2225-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:11:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1032796	100.000	160264	4989	1.176	--
总计		1032796	100.000	160264			

图249 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2226-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 18:15:31

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1176553	100.000	182395	4984	1.176	--
总计		1176553	100.000	182395			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2227-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:19:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1251625	100.000	193875	4981	1.175	--
总计		1251625	100.000	193875			

图251 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2228-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:24:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1093661	100.000	169558	4980	1.174	--
总计		1093661	100.000	169558			

图252 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2229-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:28:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1108428	100.000	171798	4969	1.174	--
总计		1108428	100.000	171798			

图253 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2230-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:32:59


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1132286	100.000	175430	4966	1.173	--
总计		1132286	100.000	175430			

图254 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2231-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:37:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1348968	100.000	208515	4958	1.173	--
总计		1348968	100.000	208515			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2232-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:41:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1446308	100.000	223550	4955	1.172	--
总计		1446308	100.000	223550			

图256 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2233-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 18:46:06

处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1481386	100.000	229049	4955	1.171	--
总计		1481386	100.000	229049			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2234-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:50:27

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1377749	100.000	212968	4947	1.171	--
总计		1377749	100.000	212968			

图258 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2235-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:54:49

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1413088	100.000	218608	4947	1.169	--
总计		1413088	100.000	218608			

图259 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2236-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:59:12


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1425572	100.000	220470	4941	1.168	--
总计		1425572	100.000	220470			

图260 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2237-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:03:34


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1482822	100.000	229179	4929	1.168	--
总计		1482822	100.000	229179			

图261 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2238-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:07:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1528386	100.000	236112	4925	1.167	--
总计		1528386	100.000	236112			

图262 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2239-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:12:17


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1506735	100.000	232609	4924	1.166	--
总计		1506735	100.000	232609			

图263 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2240-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:16:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1517903	100.000	234261	4915	1.166	--
总计		1517903	100.000	234261			

图264 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2241-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:21:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1513011	100.000	233451	4915	1.165	--
总计		1513011	100.000	233451			

图265 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2242-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:25:23


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1508476	100.000	232780	4913	1.164	--
总计		1508476	100.000	232780			

图266 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2243-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-7

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 19:29:45


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:58:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1485288	100.000	229048	4906	1.163	--
总计		1485288	100.000	229048			

图267 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2244-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:34:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:58:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1516880	100.000	233837	4897	1.162	--
总计		1516880	100.000	233837			

图268 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2245-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:38:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:58:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1500319	100.000	231073	4893	1.161	--
总计		1500319	100.000	231073			

图269 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2246-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:42:51


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1522799	100.000	234481	4889	1.161	--
总计		1522799	100.000	234481			

图270 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

270



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2247-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:47:14


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1518155	100.000	233913	4892	1.161	--
总计		1518155	100.000	233913			

图271 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2248-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:51:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1508445	100.000	232250	4887	1.161	--
总计		1508445	100.000	232250			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2249-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:55:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1489165	100.000	229299	4886	1.160	--
总计		1489165	100.000	229299			

图273 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2250-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:00:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1519317	100.000	233732	4877	1.159	--
总计		1519317	100.000	233732			

图274 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2251-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:04:44

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1499040	100.000	230489	4874	1.158	--
总计		1499040	100.000	230489			

图275 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

275



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2252-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:09:07


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1523195	100.000	234098	4866	1.157	--
总计		1523195	100.000	234098			

图276 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2253-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:13:31


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1514678	100.000	232645	4857	1.157	--
总计		1514678	100.000	232645			

图277 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2254-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:17:54


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1517823	100.000	233033	4853	1.156	--
总计		1517823	100.000	233033			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2255-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:22:18


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1514264	100.000	225160	4508	1.154	--
总计		1514264	100.000	225160			

图279 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2256-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:26:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1515370	100.000	225308	4508	1.153	--
总计		1515370	100.000	225308			

图280 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2257-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 20:31:06
处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2258-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:35:31


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1518518	100.000	225583	4497	1.151	--
总计		1518518	100.000	225583			

图282 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2259-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:39:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1521386	100.000	225839	4492	1.150	--
总计		1521386	100.000	225839			

图283 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2260-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:44:20


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1519081	100.000	225307	4482	1.149	--
总计		1519081	100.000	225307			

图284 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2261-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:48:45


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 09:59:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1521594	100.000	225606	4480	1.149	--
总计		1521594	100.000	225606			

图285 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2262-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:53:08


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.930	1520087	100.000	225242	4472	1.148	--
总计		1520087	100.000	225242			

图286 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2263-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/10 20:57:32

处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 09:59:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	301082	100.000	46051	4804	1.145	--
总计		301082	100.000	46051			

图287 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2264-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:01:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	256077	100.000	39127	4793	1.144	--
总计		256077	100.000	39127			

图288 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2265-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:06:18

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	356268	100.000	54385	4782	1.144	--
总计		356268	100.000	54385			

图289 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2266-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:10:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	272772	100.000	41607	4776	1.144	--
总计		272772	100.000	41607			

图290 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2267-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:15:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 09:59:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	279942	100.000	42686	4770	1.142	--
总计		279942	100.000	42686			

图291 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2268-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:19:28


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	312515	100.000	47609	4762	1.141	--
总计		312515	100.000	47609			

图292 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2269-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:23:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	596313	100.000	90859	4762	1.141	--
总计		596313	100.000	90859			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2270-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:28:14


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	553568	100.000	84401	4777	1.140	--
总计		553568	100.000	84401			

图294 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2271-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:32:37


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	623164	100.000	94889	4761	1.140	--
总计		623164	100.000	94889			

图295 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2272-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:36:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	723564	100.000	110124	4754	1.140	--
总计		723564	100.000	110124			

图296 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2273-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:41:23

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	571961	100.000	86970	4746	1.139	--
总计		571961	100.000	86970			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2274-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 21:45:46
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:18
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	620142	100.000	94219	4736	1.138	--
总计		620142	100.000	94219			

图298 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2275-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:50:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	990164	100.000	150385	4737	1.138	--
总计		990164	100.000	150385			

图299 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2276-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:54:34


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	827541	100.000	125646	4729	1.136	--
总计		827541	100.000	125646			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2277-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:58:57


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	905749	100.000	137471	4722	1.137	--
总计		905749	100.000	137471			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2278-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 22:03:19
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:30
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1025182	100.000	155369	4708	1.135	--
总计		1025182	100.000	155369			

图302 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2279-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:07:43


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	828791	100.000	125582	4712	1.135	--
总计		828791	100.000	125582			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2280-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 22:12:06
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:00:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	921614	100.000	139477	4698	1.134	--
总计		921614	100.000	139477			

图304 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2281-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:16:31


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1198325	100.000	181299	4690	1.133	--
总计		1198325	100.000	181299			

图305 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2282-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:20:55


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1036381	100.000	156572	4678	1.132	--
总计		1036381	100.000	156572			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2283-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:25:18


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1136174	100.000	171603	4674	1.131	--
总计		1136174	100.000	171603			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2284-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:29:43

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1259140	100.000	189992	4665	1.131	--
总计		1259140	100.000	189992			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2285-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:34:06


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1047735	100.000	158042	4660	1.130	--
总计		1047735	100.000	158042			

图309 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2286-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:38:29


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:00:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1134579	100.000	170924	4649	1.129	--
总计		1134579	100.000	170924			

图310 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2287-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:42:52


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1471864	100.000	221649	4639	1.129	--
总计		1471864	100.000	221649			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2288-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:47:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:00:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1338320	100.000	201385	4637	1.127	--
总计		1338320	100.000	201385			

图312 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2289-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:51:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1372524	100.000	206340	4627	1.127	--
总计		1372524	100.000	206340			

图313 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2290-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:56:03


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1492838	100.000	224298	4618	1.126	--
总计		1492838	100.000	224298			

图314 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2291-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:00:27


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1334846	100.000	200393	4616	1.125	--
总计		1334846	100.000	200393			

图315 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2292-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:04:49


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1427892	100.000	214386	4610	1.124	--
总计		1427892	100.000	214386			

图316 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2293-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:09:13


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1511278	100.000	226570	4596	1.124	--
总计		1511278	100.000	226570			

图317 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2294-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:13:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1505545	100.000	225498	4587	1.123	--
总计		1505545	100.000	225498			

图318 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2295-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:18:02


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1477316	100.000	221155	4582	1.122	--
总计		1477316	100.000	221155			

图319 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2296-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 23:22:26
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1500664	100.000	224544	4577	1.121	--
总计		1500664	100.000	224544			

图320 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2297-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:26:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1452463	100.000	217117	4569	1.121	--
总计		1452463	100.000	217117			

图321 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2298-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:31:12


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1509504	100.000	225435	4559	1.120	--
总计		1509504	100.000	225435			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2299-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-7

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 23:35:34

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1509056	100.000	225211	4550	1.119	--
总计		1509056	100.000	225211			

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2300-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:39:58


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1497157	100.000	223245	4545	1.118	--
总计		1497157	100.000	223245			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2301-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:44:22

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1463453	100.000	218042	4540	1.117	--
总计		1463453	100.000	218042			

图325 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2302-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:48:45


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1512119	100.000	225158	4530	1.117	--
总计		1512119	100.000	225158			

图326 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2303-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:53:10


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1471885	100.000	218883	4518	1.115	--
总计		1471885	100.000	218883			

图327 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2304-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:57:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1512449	100.000	224766	4511	1.115	--
总计		1512449	100.000	224766			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2305-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 00:01:57
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:01:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1509855	100.000	224176	4504	1.115	--
总计		1509855	100.000	224176			

图329 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2306-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:06:21


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1518342	100.000	225330	4500	1.114	--
总计		1518342	100.000	225330			

图330 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2307-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:10:44


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:01:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1486279	100.000	220458	4491	1.113	--
总计		1486279	100.000	220458			

图331 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2308-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:15:08


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1512051	100.000	224020	4482	1.113	--
总计		1512051	100.000	224020			

图332 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2309-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:19:32


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:01:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1473627	100.000	218243	4479	1.112	--
总计		1473627	100.000	218243			

图333 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2310-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:23:55


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:02:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1508609	100.000	223253	4471	1.111	--
总计		1508609	100.000	223253			

图334 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2311-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:28:20


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:02:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1521491	100.000	218242	4167	1.110	--
总计		1521491	100.000	218242			

图335 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

〈样品信息〉

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-232/25-2312-2 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:32:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:02:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

〈色谱图〉

mV



〈峰表〉

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	1517959	100.000	217679	4165	1.108	--
总计		1517959	100.000	217679			

图336 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2