



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2313-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 00:37:06
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:04:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2314-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:41:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:04:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	2983697	100.000	427043	4149	1.109	--
总计		2983697	100.000	427043			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2315-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:45:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:04:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.932	2984241	100.000	426630	4144	1.109	--
总计		2984241	100.000	426630			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2316-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:50:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:04:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	2977673	100.000	425606	4140	1.108	--
总计		2977673	100.000	425606			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2317-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:54:35

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:04:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	2978626	100.000	425502	4127	1.107	--
总计		2978626	100.000	425502			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2318-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:58:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:04:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.931	2984452	100.000	425975	4126	1.107	--
总计		2984452	100.000	425975			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2319-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:03:19

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:04:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	664085	100.000	97634	4412	1.106	--
总计		664085	100.000	97634			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2320-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:07:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:04:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	669906	100.000	98413	4406	1.105	--
总计		669906	100.000	98413			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2321-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:12:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	699127	100.000	102623	4389	1.104	--
总计		699127	100.000	102623			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2322-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:16:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:05:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	683447	100.000	100270	4384	1.103	--
总计		683447	100.000	100270			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2323-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:20:45

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:05:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	673312	100.000	98696	4376	1.102	--
总计		673312	100.000	98696			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2324-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:25:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:05:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	675075	100.000	98824	4370	1.102	--
总计		675075	100.000	98824			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2325-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:29:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1339980	100.000	195941	4366	1.102	--
总计		1339980	100.000	195941			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2326-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:33:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1318925	100.000	192679	4356	1.102	--
总计		1318925	100.000	192679			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2327-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:38:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1424049	100.000	207935	4343	1.101	--
总计		1424049	100.000	207935			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2328-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:42:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1391135	100.000	203025	4337	1.100	--
总计		1391135	100.000	203025			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2329-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:46:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1378723	100.000	201093	4334	1.100	--
总计		1378723	100.000	201093			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2330-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:51:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1370848	100.000	199943	4332	1.100	--
总计		1370848	100.000	199943			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2331-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:55:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1873339	100.000	273013	4325	1.100	--
总计		1873339	100.000	273013			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2332-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:59:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1917632	100.000	279266	4318	1.100	--
总计		1917632	100.000	279266			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2333-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:04:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1994574	100.000	290197	4309	1.099	--
总计		1994574	100.000	290197			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2334-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:08:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1950729	100.000	283494	4301	1.098	--
总计		1950729	100.000	283494			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2335-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:13:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1926562	100.000	279720	4291	1.098	--
总计		1926562	100.000	279720			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2336-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:17:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1901200	100.000	275755	4289	1.097	--
总计		1901200	100.000	275755			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2337-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:21:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2283741	100.000	331000	4283	1.097	--
总计		2283741	100.000	331000			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2338-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:26:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2342287	100.000	339165	4274	1.096	--
总计		2342287	100.000	339165			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2339-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:30:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2401181	100.000	347497	4271	1.096	--
总计		2401181	100.000	347497			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2340-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:34:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2385842	100.000	344968	4264	1.096	--
总计		2385842	100.000	344968			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2341-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:39:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2317642	100.000	334921	4258	1.095	--
总计		2317642	100.000	334921			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2342-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:43:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:05:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2324617	100.000	335403	4247	1.094	--
总计		2324617	100.000	335403			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2343-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:47:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:06:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2792326	100.000	402603	4241	1.094	--
总计		2792326	100.000	402603			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2344-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:52:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:06:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2828606	100.000	407516	4236	1.093	--
总计		2828606	100.000	407516			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2345-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:56:38

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:06:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2841419	100.000	409297	4232	1.093	--
总计		2841419	100.000	409297			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2346-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:01:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2835808	100.000	408182	4224	1.092	--
总计		2835808	100.000	408182			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2347-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:05:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2769358	100.000	398423	4216	1.092	--
总计		2769358	100.000	398423			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2348-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:09:45

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:06:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2824043	100.000	405730	4213	1.092	--
总计		2824043	100.000	405730			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2349-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:14:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2926315	100.000	420613	4200	1.091	--
总计		2926315	100.000	420613			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2350-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:18:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2926624	100.000	420111	4198	1.091	--
总计		2926624	100.000	420111			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2351-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:22:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2939695	100.000	421477	4192	1.090	--
总计		2939695	100.000	421477			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2352-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:27:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2937452	100.000	420700	4186	1.090	--
总计		2937452	100.000	420700			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2353-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:31:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2911822	100.000	416777	4172	1.088	--
总计		2911822	100.000	416777			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2354-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:35:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2958709	100.000	422864	4167	1.087	--
总计		2958709	100.000	422864			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2355-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:40:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	2932109	100.000	419299	4159	1.088	--
总计		2932109	100.000	419299			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2356-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:44:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2958829	100.000	422386	4155	1.087	--
总计		2958829	100.000	422386			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2357-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:48:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2955375	100.000	421471	4149	1.087	--
总计		2955375	100.000	421471			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2358-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:53:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2935921	100.000	418841	4153	1.086	--
总计		2935921	100.000	418841			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2359-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:57:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2918760	100.000	416476	4151	1.086	--
总计		2918760	100.000	416476			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2360-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:02:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2965072	100.000	422815	4144	1.086	--
总计		2965072	100.000	422815			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2361-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:06:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:06:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2921549	100.000	416386	4139	1.085	--
总计		2921549	100.000	416386			

图49 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2362-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:10:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:06:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2973628	100.000	423148	4131	1.084	--
总计		2973628	100.000	423148			

图50 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2363-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:15:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 10:06:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2945674	100.000	419007	4128	1.084	--
总计		2945674	100.000	419007			

图51 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2364-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:19:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2930515	100.000	416422	4117	1.083	--
总计		2930515	100.000	416422			

图52 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2365-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:23:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2930812	100.000	416276	4112	1.083	--
总计		2930812	100.000	416276			

图53 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2366-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 04:28:18
处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	2977718	100.000	422481	4104	1.083	--
总计		2977718	100.000	422481			

图54 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2367-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:32:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.933	2941626	100.000	404425	3827	1.080	--
总计		2941626	100.000	404425			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2368-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:37:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:07:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	2943005	100.000	404215	3826	1.079	--
总计		2943005	100.000	404215			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2369-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:41:25

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:07:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2370-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:45:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:07:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	2976324	100.000	408204	3811	1.078	--
总计		2976324	100.000	408204			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2371-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:50:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	2977541	100.000	408153	3811	1.078	--
总计		2977541	100.000	408153			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2372-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:54:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:07:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	2974292	100.000	407238	3801	1.078	--
总计		2974292	100.000	407238			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2373-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:59:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	2969486	100.000	406575	3795	1.077	--
总计		2969486	100.000	406575			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2374-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:03:26

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	2969770	100.000	406161	3788	1.077	--
总计		2969770	100.000	406161			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2375-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:07:49

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	643881	100.000	90598	4040	1.075	--
总计		643881	100.000	90598			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2376-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:12:11

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	680680	100.000	95690	4030	1.074	--
总计		680680	100.000	95690			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2377-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:16:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	677835	100.000	95176	4025	1.074	--
总计		677835	100.000	95176			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2378-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:20:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	721655	100.000	101277	4023	1.074	--
总计		721655	100.000	101277			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2379-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:25:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	680014	100.000	95396	4013	1.073	--
总计		680014	100.000	95396			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2380-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:29:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	665449	100.000	93404	4007	1.073	--
总计		665449	100.000	93404			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2381-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:34:03

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1334957	100.000	186908	3997	1.073	--
总计		1334957	100.000	186908			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2382-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:38:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1400657	100.000	195920	3993	1.072	--
总计		1400657	100.000	195920			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2383-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:42:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:07:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1432613	100.000	200181	3988	1.071	--
总计		1432613	100.000	200181			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2384-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:47:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:07:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1449420	100.000	202628	3979	1.072	--
总计		1449420	100.000	202628			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2385-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:51:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1426244	100.000	199219	3975	1.071	--
总计		1426244	100.000	199219			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2386-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:55:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1493563	100.000	208577	3965	1.071	--
总计		1493563	100.000	208577			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2387-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:00:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1878722	100.000	261759	3966	1.071	--
总计		1878722	100.000	261759			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2388-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:04:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:08:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1966105	100.000	273734	3956	1.070	--
总计		1966105	100.000	273734			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2389-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:09:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1978361	100.000	275109	3946	1.071	--
总计		1978361	100.000	275109			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2390-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:13:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1966260	100.000	273994	3939	1.070	--
总计		1966260	100.000	273994			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2391-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:17:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1979921	100.000	275534	3933	1.070	--
总计		1979921	100.000	275534			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2392-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:22:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1978252	100.000	275319	3932	1.069	--
总计		1978252	100.000	275319			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2393-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:26:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2303680	100.000	319350	3920	1.069	--
总计		2303680	100.000	319350			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2394-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:31:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2385861	100.000	330654	3917	1.069	--
总计		2385861	100.000	330654			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2395-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:35:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2392270	100.000	331522	3914	1.068	--
总计		2392270	100.000	331522			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2396-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:39:46

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2355811	100.000	326463	3907	1.068	--
总计		2355811	100.000	326463			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2397-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:44:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2423582	100.000	335660	3903	1.068	--
总计		2423582	100.000	335660			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2398-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:48:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2406702	100.000	333150	3895	1.067	--
总计		2406702	100.000	333150			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2399-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:52:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2814737	100.000	389213	3894	1.067	--
总计		2814737	100.000	389213			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2400-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:57:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2840801	100.000	392237	3883	1.066	--
总计		2840801	100.000	392237			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2401-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:01:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2843855	100.000	392238	3879	1.066	--
总计		2843855	100.000	392238			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2402-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:06:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:08:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2813625	100.000	388095	3874	1.066	--
总计		2813625	100.000	388095			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2403-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:10:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2865944	100.000	395270	3865	1.066	--
总计		2865944	100.000	395270			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2404-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:14:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:08:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2825111	100.000	389497	3864	1.065	--
总计		2825111	100.000	389497			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2405-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:19:14

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:08:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2958479	100.000	407100	3857	1.065	--
总计		2958479	100.000	407100			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2406-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:23:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2966323	100.000	408051	3849	1.065	--
总计		2966323	100.000	408051			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2407-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:28:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2967604	100.000	408079	3839	1.064	--
总计		2967604	100.000	408079			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2408-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:32:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2929880	100.000	402676	3842	1.064	--
总计		2929880	100.000	402676			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2409-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:36:46

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2959175	100.000	406350	3828	1.064	--
总计		2959175	100.000	406350			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2410-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:41:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2948201	100.000	404638	3824	1.064	--
总计		2948201	100.000	404638			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2411-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:45:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2941958	100.000	403459	3825	1.063	--
总计		2941958	100.000	403459			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2412-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:49:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:09:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2935830	100.000	402405	3818	1.063	--
总计		2935830	100.000	402405			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2413-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:54:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2961325	100.000	405489	3806	1.063	--
总计		2961325	100.000	405489			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2414-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 07:58:43
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:09:23
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2924483	100.000	400178	3801	1.063	--
总计		2924483	100.000	400178			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2415-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:03:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2971629	100.000	406276	3793	1.062	--
总计		2971629	100.000	406276			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2416-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:07:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	2915042	100.000	398210	3789	1.062	--
总计		2915042	100.000	398210			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2417-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:11:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2947747	100.000	402565	3784	1.061	--
总计		2947747	100.000	402565			

图105 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2418-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:16:16

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2964465	100.000	404756	3780	1.061	--
总计		2964465	100.000	404756			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2419-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:20:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2965060	100.000	404024	3772	1.060	--
总计		2965060	100.000	404024			

图107 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2420-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:25:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2914880	100.000	397100	3765	1.060	--
总计		2914880	100.000	397100			

图108 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2421-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 08:29:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:09:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2954319	100.000	402267	3762	1.060	--
总计		2954319	100.000	402267			

图109 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2422-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:33:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:09:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	2935216	100.000	399281	3753	1.060	--
总计		2935216	100.000	399281			

图110 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2423-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:38:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	2981317	100.000	394575	3523	1.059	--
总计		2981317	100.000	394575			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-233/25-2424-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:42:37

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:09:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	2980576	100.000	394335	3518	1.058	--
总计		2980576	100.000	394335			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1657-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/10 16:52:42
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:18:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1658-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 16:57:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:18:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2958474	100.000	430183	4065	1.061	--
总计		2958474	100.000	430183			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1659-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/10 17:01:28
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:18:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2959501	100.000	429789	4047	1.058	--
总计		2959501	100.000	429789			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1660-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/10 17:05:51
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:18:58
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2960714	100.000	429866	4038	1.058	--
总计		2960714	100.000	429866			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1661-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:10:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2960800	100.000	428561	4018	1.056	--
总计		2960800	100.000	428561			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1662-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/10 17:14:35
处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2963596	100.000	428078	4003	1.056	--
总计		2963596	100.000	428078			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1663-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:18:57


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	735371	100.000	109558	4318	1.048	--
总计		735371	100.000	109558			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1664-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-10

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:23:18


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	682087	100.000	101615	4302	1.045	--
总计		682087	100.000	101615			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1665-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:27:39


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	673129	100.000	100308	4295	1.045	--
总计		673129	100.000	100308			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1666-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-28

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:32:01


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	670853	100.000	99695	4305	1.041	--
总计		670853	100.000	99695			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1667-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/10 17:36:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	690692	100.000	102446	4275	1.038	--
总计		690692	100.000	102446			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1668-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-46

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:40:44


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	647520	100.000	95557	4241	1.030	--
总计		647520	100.000	95557			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1669-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-2

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 17:45:11


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1459257	100.000	214542	4239	1.027	--
总计		1459257	100.000	214542			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1670-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:49:33


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1414209	100.000	207596	4227	1.025	--
总计		1414209	100.000	207596			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1671-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:53:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1394636	100.000	204781	4228	1.024	--
总计		1394636	100.000	204781			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1672-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 17:58:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1370007	100.000	200891	4219	1.024	--
总计		1370007	100.000	200891			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1673-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:02:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1412084	100.000	206937	4215	1.024	--
总计		1412084	100.000	206937			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1674-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:07:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.885	1332256	100.000	195383	4215	1.024	--
总计		1332256	100.000	195383			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1675-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 18:11:26


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:19:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.885	1985359	100.000	290373	4196	1.021	--
总计		1985359	100.000	290373			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1676-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:15:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	2016340	100.000	294577	4194	1.020	--
总计		2016340	100.000	294577			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1677-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:20:10


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:19:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1986100	100.000	289393	4175	1.024	--
总计		1986100	100.000	289393			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1678-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-30

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 18:24:32


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1944422	100.000	283236	4165	1.025	--
总计		1944422	100.000	283236			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1679-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:28:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:19:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	1945297	100.000	283744	4154	1.025	--
总计		1945297	100.000	283744			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1680-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:33:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	1890956	100.000	274572	4141	1.025	--
总计		1890956	100.000	274572			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1681-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:37:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	2394166	100.000	347156	4131	1.025	--
总计		2394166	100.000	347156			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1682-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-13

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 18:42:00


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:20:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	2450511	100.000	355794	4134	1.025	--
总计		2450511	100.000	355794			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1683-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:46:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2400526	100.000	349103	4130	1.026	--
总计		2400526	100.000	349103			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1684-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-31

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 18:50:43


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:20:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.884	2342675	100.000	339466	4126	1.026	--
总计		2342675	100.000	339466			

图140 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1685-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:55:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2332703	100.000	339106	4119	1.026	--
总计		2332703	100.000	339106			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1686-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 18:59:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	2304027	100.000	334135	4114	1.025	--
总计		2304027	100.000	334135			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1687-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:03:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2822854	100.000	409583	4115	1.025	--
总计		2822854	100.000	409583			

图143 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1688-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:08:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	2867209	100.000	415755	4124	1.026	--
总计		2867209	100.000	415755			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1689-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:12:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.883	2866731	100.000	414942	4110	1.026	--
总计		2866731	100.000	414942			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1690-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:16:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2845317	100.000	412516	4107	1.026	--
总计		2845317	100.000	412516			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1691-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:21:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2792481	100.000	404910	4099	1.026	--
总计		2792481	100.000	404910			

图147 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1692-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-50

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 19:25:41


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:20:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2803562	100.000	406096	4101	1.027	--
总计		2803562	100.000	406096			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1693-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-6

版本号: 6.115

进样体积: 5 μl

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 19:30:02


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:20:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.881	2924239	100.000	424279	4101	1.027	--
总计		2924239	100.000	424279			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1694-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-15

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:34:23

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:20:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2987577	100.000	432908	4094	1.028	--
总计		2987577	100.000	432908			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1695-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:38:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.881	2980175	100.000	431987	4095	1.027	--
总计		2980175	100.000	431987			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1696-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-33

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 19:43:07


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:20:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2979043	100.000	431416	4097	1.027	--
总计		2979043	100.000	431416			

图152 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1697-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 19:47:29

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:20:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2904837	100.000	420948	4096	1.027	--
总计		2904837	100.000	420948			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1698-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-51

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 19:51:51


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2955456	100.000	427700	4096	1.027	--
总计		2955456	100.000	427700			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1699-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-7

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 19:56:13


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:20:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.881	2929266	100.000	424396	4090	1.026	--
总计		2929266	100.000	424396			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1700-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:00:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:20:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.882	2971771	100.000	430646	4103	1.029	--
总计		2971771	100.000	430646			

图156 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1701-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:04:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:21:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.880	2981516	100.000	432711	4099	1.030	--
总计		2981516	100.000	432711			

图157 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1702-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:09:18

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.880	2969712	100.000	430921	4099	1.031	--
总计		2969712	100.000	430921			

图158 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1703-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:13:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.880	2901657	100.000	420952	4092	1.033	--
总计		2901657	100.000	420952			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1704-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:18:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2954912	100.000	428742	4091	1.034	--
总计		2954912	100.000	428742			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1705-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/10 20:22:23 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2924850	100.000	423860	4084	1.034	--
总计		2924850	100.000	423860			

图161 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1706-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/10 20:26:45
处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:15
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2967338	100.000	430568	4092	1.034	--
总计		2967338	100.000	430568			

图162 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1707-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:31:08


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2961253	100.000	429810	4096	1.034	--
总计		2961253	100.000	429810			

图163 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1708-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/10 20:35:30
处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2956925	100.000	428992	4090	1.034	--
总计		2956925	100.000	428992			

图164 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1709-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:39:53


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2908574	100.000	421999	4093	1.035	--
总计		2908574	100.000	421999			

图165 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1710-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-53

版本号: 6.115

进样体积: 5 μl

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 20:44:15


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2958074	100.000	429140	4090	1.036	--
总计		2958074	100.000	429140			

图166 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1711-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/10 20:48:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	2974270	100.000	416520	3784	1.046	--
总计		2974270	100.000	416520			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1712-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 20:53:00


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2970093	100.000	415953	3789	1.046	--
总计		2970093	100.000	415953			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1713-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-9

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 20:57:24


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1714-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/10 21:01:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2976246	100.000	416333	3780	1.046	--
总计		2976246	100.000	416333			

图170 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1715-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/10 21:06:10

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2973413	100.000	415792	3781	1.048	--
总计		2973413	100.000	415792			

图171 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1716-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:10:33

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2971815	100.000	415691	3785	1.048	--
总计		2971815	100.000	415691			

图172 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1717-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:14:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2970424	100.000	416129	3789	1.050	--
总计		2970424	100.000	416129			

图173 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1718-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:19:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:21:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2970798	100.000	415891	3779	1.048	--
总计		2970798	100.000	415891			

图174 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1719-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/10 21:23:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	659308	100.000	95507	4090	1.039	--
总计		659308	100.000	95507			

图175 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1720-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/10 21:28:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	689587	100.000	100147	4101	1.038	--
总计		689587	100.000	100147			

图176 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1721-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/10 21:32:32

处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:21:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	672557	100.000	97581	4101	1.038	--
总计		672557	100.000	97581			

图177 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1722-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:36:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	673657	100.000	97969	4108	1.038	--
总计		673657	100.000	97969			

图178 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1723-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:41:17

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	682317	100.000	99078	4106	1.038	--
总计		682317	100.000	99078			

图179 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1724-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-46

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 21:45:39


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:22:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	737447	100.000	107204	4110	1.040	--
总计		737447	100.000	107204			

图180 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1725-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-2

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 21:50:02


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:22:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1326926	100.000	192574	4100	1.040	--
总计		1326926	100.000	192574			

图181 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1726-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 21:54:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1415602	100.000	205499	4101	1.042	--
总计		1415602	100.000	205499			

图182 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1727-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-20

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 21:58:48


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:22:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1373588	100.000	199294	4101	1.041	--
总计		1373588	100.000	199294			

图183 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1728-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:03:11


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	1387540	100.000	201392	4094	1.042	--
总计		1387540	100.000	201392			

图184 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1729-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:07:34


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1416944	100.000	205093	4088	1.044	--
总计		1416944	100.000	205093			

图185 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1730-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:11:58


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1477796	100.000	213867	4085	1.044	--
总计		1477796	100.000	213867			

图186 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1731-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:16:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1882308	100.000	272629	4083	1.046	--
总计		1882308	100.000	272629			

图187 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1732-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:20:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1949158	100.000	282451	4092	1.043	--
总计		1949158	100.000	282451			

图188 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1733-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:25:07

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1951341	100.000	283122	4097	1.045	--
总计		1951341	100.000	283122			

图189 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1734-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:29:30


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:22:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1974229	100.000	286283	4098	1.047	--
总计		1974229	100.000	286283			

图190 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1735-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:33:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:22:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2015228	100.000	292224	4092	1.045	--
总计		2015228	100.000	292224			

图191 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1736-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:38:15


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1993049	100.000	288649	4094	1.046	--
总计		1993049	100.000	288649			

图192 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1737-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:42:38


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2307379	100.000	334017	4092	1.046	--
总计		2307379	100.000	334017			

图193 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1738-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:47:02


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2337750	100.000	338947	4102	1.047	--
总计		2337750	100.000	338947			

图194 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1739-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:51:25

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2351829	100.000	341073	4091	1.046	--
总计		2351829	100.000	341073			

图195 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1740-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 22:55:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2397245	100.000	348054	4093	1.047	--
总计		2397245	100.000	348054			

图196 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1741-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:00:10


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:22:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2450620	100.000	355838	4093	1.047	--
总计		2450620	100.000	355838			

图197 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1742-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:04:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:22:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2405076	100.000	348739	4092	1.047	--
总计		2405076	100.000	348739			

图198 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1743-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-5

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 23:08:55


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:22:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2803015	100.000	406871	4089	1.047	--
总计		2803015	100.000	406871			

图199 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1744-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:13:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2793892	100.000	404985	4098	1.049	--
总计		2793892	100.000	404985			

图200 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

200



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1745-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:17:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2858065	100.000	415361	4094	1.050	--
总计		2858065	100.000	415361			

图201 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1746-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:22:05

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:23:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2871029	100.000	417197	4098	1.049	--
总计		2871029	100.000	417197			

图202 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1747-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:26:28

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2888019	100.000	418883	4098	1.051	--
总计		2888019	100.000	418883			

图203 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1748-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-50

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 23:30:51


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:23:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2845167	100.000	412933	4095	1.051	--
总计		2845167	100.000	412933			

图204 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1749-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-6

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:35:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2962214	100.000	430684	4092	1.052	--
总计		2962214	100.000	430684			

图205 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1750-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-15

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 23:39:38


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2906332	100.000	421538	4084	1.052	--
总计		2906332	100.000	421538			

图206 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1751-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:44:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2981236	100.000	432435	4091	1.053	--
总计		2981236	100.000	432435			

图207 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1752-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:48:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2985065	100.000	432908	4087	1.053	--
总计		2985065	100.000	432908			

图208 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1753-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/10 23:52:48

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:23:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2990502	100.000	433780	4084	1.054	--
总计		2990502	100.000	433780			

图209 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1754-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-51

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/10 23:57:11


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2965881	100.000	430786	4094	1.052	--
总计		2965881	100.000	430786			

图210 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

210



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1755-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-7

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 00:01:35


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:23:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2951121	100.000	428664	4099	1.052	--
总计		2951121	100.000	428664			

图211 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1756-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:05:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2930789	100.000	425801	4100	1.053	--
总计		2930789	100.000	425801			

图212 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1757-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:10:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2985814	100.000	433994	4096	1.052	--
总计		2985814	100.000	433994			

图213 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1758-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:14:45

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:23:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	3022206	100.000	438444	4092	1.052	--
总计		3022206	100.000	438444			

图214 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1759-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:19:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:23:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2992711	100.000	434017	4094	1.053	--
总计		2992711	100.000	434017			

图215 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1760-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:23:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2936618	100.000	426202	4090	1.054	--
总计		2936618	100.000	426202			

图216 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1761-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:27:55


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2950881	100.000	428797	4087	1.055	--
总计		2950881	100.000	428797			

图217 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1762-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:32:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:23:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2907445	100.000	423088	4099	1.055	--
总计		2907445	100.000	423088			

图218 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1763-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:36:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:23:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2975376	100.000	433279	4102	1.054	--
总计		2975376	100.000	433279			

图219 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1764-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:41:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2974316	100.000	433090	4112	1.053	--
总计		2974316	100.000	433090			

图220 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

220



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1765-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 00:45:30
处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:03
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2990751	100.000	435226	4106	1.054	--
总计		2990751	100.000	435226			

图221 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1766-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 00:49:54
处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:05
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2930270	100.000	426465	4109	1.053	--
总计		2930270	100.000	426465			

图222 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

222

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1767-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:54:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2968033	100.000	417132	3801	1.059	--
总计		2968033	100.000	417132			

图223 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1768-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 00:58:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2967530	100.000	417132	3794	1.060	--
总计		2967530	100.000	417132			

图224 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1769-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 01:03:03
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:14
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

225

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1770-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:07:25

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	2967908	100.000	418113	3795	1.060	--
总计		2967908	100.000	418113			

图226 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1771-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:11:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/11 10:24:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	2970366	100.000	417870	3785	1.059	--
总计		2970366	100.000	417870			

图227 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1772-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:16:09

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	2969117	100.000	417469	3782	1.059	--
总计		2969117	100.000	417469			

图228 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1773-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:20:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.864	2967349	100.000	417651	3791	1.060	--
总计		2967349	100.000	417651			

图229 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1774-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:24:53

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2967856	100.000	416998	3790	1.060	--
总计		2967856	100.000	416998			

图230 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1775-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:29:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.873	669735	100.000	97517	4099	1.052	--
总计		669735	100.000	97517			

图231 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1776-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-10

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 01:33:37


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	657888	100.000	95877	4115	1.051	--
总计		657888	100.000	95877			

图232 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1777-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-19

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 01:37:58


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	644655	100.000	93964	4111	1.051	--
总计		644655	100.000	93964			

图233 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1778-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:42:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/11 10:24:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	698440	100.000	101703	4118	1.050	--
总计		698440	100.000	101703			

图234 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1779-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:46:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	698418	100.000	101703	4121	1.049	--
总计		698418	100.000	101703			

图235 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1780-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 01:51:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	698079	100.000	101639	4117	1.049	--
总计		698079	100.000	101639			

图236 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1781-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-2

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 01:55:24

处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:24:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.873	1355739	100.000	197236	4096	1.050	--
总计		1355739	100.000	197236			

图237 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1782-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 01:59:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	1324693	100.000	192558	4102	1.049	--
总计		1324693	100.000	192558			

图238 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1783-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 02:04:06

处理时间(V2): 2025/03/11 10:24:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1315201	100.000	190914	4100	1.049	--
总计		1315201	100.000	190914			

图239 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1784-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:08:28

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:24:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	1410446	100.000	204991	4102	1.048	--
总计		1410446	100.000	204991			

图240 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1785-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:12:49


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1435845	100.000	208750	4111	1.049	--
总计		1435845	100.000	208750			

图241 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1786-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:17:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1409321	100.000	204653	4117	1.051	--
总计		1409321	100.000	204653			

图242 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1787-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:21:31

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1893855	100.000	275147	4110	1.051	--
总计		1893855	100.000	275147			

图243 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1788-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:25:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1830112	100.000	265862	4104	1.052	--
总计		1830112	100.000	265862			

图244 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1789-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:30:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1845686	100.000	268375	4116	1.051	--
总计		1845686	100.000	268375			

图245 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

245



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1790-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:34:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1974378	100.000	286802	4113	1.050	--
总计		1974378	100.000	286802			

图246 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1791-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:38:54


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1985429	100.000	288323	4123	1.050	--
总计		1985429	100.000	288323			

图247 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1792-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:43:16

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	1977430	100.000	287131	4117	1.051	--
总计		1977430	100.000	287131			

图248 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1793-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:47:37


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2328432	100.000	338341	4115	1.051	--
总计		2328432	100.000	338341			

图249 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1794-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 02:51:58

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:25:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2253362	100.000	327714	4110	1.053	--
总计		2253362	100.000	327714			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1795-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 02:56:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2252688	100.000	327137	4104	1.051	--
总计		2252688	100.000	327137			

图251 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1796-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:00:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2435700	100.000	354130	4120	1.051	--
总计		2435700	100.000	354130			

图252 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1797-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:05:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2370345	100.000	344639	4103	1.052	--
总计		2370345	100.000	344639			

图253 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

253

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1798-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:09:23


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2408287	100.000	350229	4108	1.051	--
总计		2408287	100.000	350229			

图254 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1799-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/11 03:13:43

处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.874	2820803	100.000	409544	4096	1.051	--
总计		2820803	100.000	409544			

图255 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1800-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:18:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2750195	100.000	398354	4096	1.049	--
总计		2750195	100.000	398354			

图256 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

256



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1801-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:22:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2716165	100.000	393592	4098	1.048	--
总计		2716165	100.000	393592			

图257 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1802-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:26:45

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:25:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2903594	100.000	420233	4090	1.048	--
总计		2903594	100.000	420233			

图258 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1803-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:31:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2848968	100.000	411910	4091	1.048	--
总计		2848968	100.000	411910			

图259 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1804-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:35:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2822914	100.000	408470	4096	1.049	--
总计		2822914	100.000	408470			

图260 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

260



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1805-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:39:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2942042	100.000	425591	4084	1.047	--
总计		2942042	100.000	425591			

图261 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1806-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:44:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:25:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2889407	100.000	417545	4089	1.047	--
总计		2889407	100.000	417545			

图262 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1807-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:48:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2858427	100.000	413052	4088	1.046	--
总计		2858427	100.000	413052			

图263 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1808-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:52:50

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	3019080	100.000	436178	4083	1.045	--
总计		3019080	100.000	436178			

图264 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1809-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 03:57:10

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:26:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2973597	100.000	429776	4088	1.044	--
总计		2973597	100.000	429776			

图265 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1810-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-51

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 04:01:31


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:26:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2909466	100.000	419864	4078	1.044	--
总计		2909466	100.000	419864			

图266 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1811-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-7

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 04:05:52


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:26:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2932903	100.000	423350	4080	1.043	--
总计		2932903	100.000	423350			

图267 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1812-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:10:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2891509	100.000	417063	4077	1.042	--
总计		2891509	100.000	417063			

图268 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1813-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:14:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2869049	100.000	413629	4072	1.041	--
总计		2869049	100.000	413629			

图269 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1814-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:18:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	3027074	100.000	436173	4071	1.042	--
总计		3027074	100.000	436173			

图270 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

270



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1815-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:23:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2940247	100.000	423580	4070	1.042	--
总计		2940247	100.000	423580			

图271 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1816-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:27:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2929036	100.000	422039	4069	1.041	--
总计		2929036	100.000	422039			

图272 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1817-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:31:58


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2932117	100.000	422467	4062	1.040	--
总计		2932117	100.000	422467			

图273 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

273



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1818-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:36:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2900502	100.000	417907	4058	1.040	--
总计		2900502	100.000	417907			

图274 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1819-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 04:40:41
处理时间 (V2): 2025/03/11 10:26:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2879721	100.000	414522	4057	1.039	--
总计		2879721	100.000	414522			

图275 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

275



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1820-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 04:45:02
处理时间 (V2): 2025/03/11 10:26:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	3039481	100.000	437394	4053	1.039	--
总计		3039481	100.000	437394			

图276 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1821-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:49:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2949177	100.000	424043	4049	1.039	--
总计		2949177	100.000	424043			

图277 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1822-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 04:53:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:26:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.875	2917730	100.000	419582	4044	1.037	--
总计		2917730	100.000	419582			

图278 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

278

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1823-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 04:58:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2967362	100.000	412033	3725	1.043	--
总计		2967362	100.000	412033			

图279 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1824-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-1-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 05:02:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:26:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2967587	100.000	410934	3713	1.044	--
总计		2967587	100.000	410934			

图280 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

280



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1825-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:06:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1826-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:11:17


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:26:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2964150	100.000	410955	3712	1.042	--
总计		2964150	100.000	410955			

图282 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1827-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:15:41


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:27:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.866	2964504	100.000	410886	3711	1.041	--
总计		2964504	100.000	410886			

图283 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1828-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:20:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:27:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2964478	100.000	410433	3722	1.040	--
总计		2964478	100.000	410433			

图284 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1829-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 05:24:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2965815	100.000	409594	3704	1.039	--
总计		2965815	100.000	409594			

图285 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

285




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1830-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 05:28:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.867	2965769	100.000	409125	3701	1.038	--
总计		2965769	100.000	409125			

图286 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1831-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 05:33:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	703946	100.000	100682	4012	1.028	--
总计		703946	100.000	100682			

图287 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1832-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-10

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 05:37:34


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	699642	100.000	100020	4016	1.028	--
总计		699642	100.000	100020			

图288 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1833-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:41:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:27:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	699924	100.000	100080	4010	1.026	--
总计		699924	100.000	100080			

图289 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1834-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 05:46:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	645960	100.000	92325	4006	1.027	--
总计		645960	100.000	92325			

图290 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

290



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1835-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:50:39

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	656961	100.000	93801	4004	1.025	--
总计		656961	100.000	93801			

图291 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1836-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:55:01

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	675942	100.000	96552	3999	1.025	--
总计		675942	100.000	96552			

图292 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1837-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 05:59:24


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1402778	100.000	199754	3988	1.025	--
总计		1402778	100.000	199754			

图293 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1838-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-11

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 06:03:46


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1438853	100.000	204758	3981	1.023	--
总计		1438853	100.000	204758			

图294 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1839-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:08:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1405562	100.000	200108	3976	1.022	--
总计		1405562	100.000	200108			

图295 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1840-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:12:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1318187	100.000	187465	3967	1.021	--
总计		1318187	100.000	187465			

图296 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1841-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:16:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1327425	100.000	188503	3969	1.021	--
总计		1327425	100.000	188503			

图297 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1842-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:21:13

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1361214	100.000	193326	3958	1.020	--
总计		1361214	100.000	193326			

图298 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1843-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:25:35


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1970361	100.000	279289	3957	1.021	--
总计		1970361	100.000	279289			

图299 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1844-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:29:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1989021	100.000	281745	3946	1.018	--
总计		1989021	100.000	281745			

图300 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

300



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1845-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:34:20

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:27:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1972753	100.000	279414	3948	1.018	--
总计		1972753	100.000	279414			

图301 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1846-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:38:42

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	1850825	100.000	262013	3943	1.018	--
总计		1850825	100.000	262013			

图302 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1847-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:43:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:27:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1833441	100.000	259211	3941	1.018	--
总计		1833441	100.000	259211			

图303 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1848-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:47:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	1905276	100.000	269197	3937	1.017	--
总计		1905276	100.000	269197			

图304 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1849-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:51:50

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:28:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2403611	100.000	339793	3928	1.016	--
总计		2403611	100.000	339793			

图305 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

305



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1850-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 06:56:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:28:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2376822	100.000	335953	3924	1.016	--
总计		2376822	100.000	335953			

图306 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1851-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:00:34

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:28:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2428553	100.000	342171	3915	1.014	--
总计		2428553	100.000	342171			

图307 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1852-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:04:57

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:28:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2268572	100.000	320117	3915	1.012	--
总计		2268572	100.000	320117			

图308 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1853-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:09:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2230069	100.000	314042	3900	1.012	--
总计		2230069	100.000	314042			

图309 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1854-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 07:13:41

处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2335580	100.000	328423	3891	1.012	--
总计		2335580	100.000	328423			

图310 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1855-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:18:04

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:28:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2821119	100.000	396608	3886	1.012	--
总计		2821119	100.000	396608			

图311 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1856-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:22:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2823636	100.000	396815	3884	1.012	--
总计		2823636	100.000	396815			

图312 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1857-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:26:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2900996	100.000	406619	3871	1.010	--
总计		2900996	100.000	406619			

图313 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1858-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:31:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:28:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2828465	100.000	396309	3871	1.010	--
总计		2828465	100.000	396309			

图314 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1859-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/11 07:35:33

处理时间 (V2): 2025/03/11 10:28:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.876	2750356	100.000	384819	3864	1.009	--
总计		2750356	100.000	384819			

图315 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1860-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:39:56

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/11 10:28:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2821594	100.000	394992	3858	1.008	--
总计		2821594	100.000	394992			

图316 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1861-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:44:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2924242	100.000	409339	3855	1.007	--
总计		2924242	100.000	409339			

图317 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1862-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 07:48:41

处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2943040	100.000	411508	3847	1.007	--
总计		2943040	100.000	411508			

图318 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1863-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:53:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	3025734	100.000	422751	3836	1.007	--
总计		3025734	100.000	422751			

图319 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1864-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 07:57:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2866791	100.000	400553	3840	1.006	--
总计		2866791	100.000	400553			

图320 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

320



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1865-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:01:49

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:28:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2889364	100.000	403010	3829	1.005	--
总计		2889364	100.000	403010			

图321 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1866-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:06:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2953937	100.000	412315	3832	1.004	--
总计		2953937	100.000	412315			

图322 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1867-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:10:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2910833	100.000	406288	3826	1.005	--
总计		2910833	100.000	406288			

图323 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1868-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:14:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:28:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2939908	100.000	409866	3817	1.005	--
总计		2939908	100.000	409866			

图324 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1869-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-25

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:19:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	3026383	100.000	421890	3816	1.004	--
总计		3026383	100.000	421890			

图325 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

325



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1870-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:23:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2871557	100.000	399832	3805	1.004	--
总计		2871557	100.000	399832			

图326 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1871-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:28:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:29:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2890510	100.000	402160	3803	1.004	--
总计		2890510	100.000	402160			

图327 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1872-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 08:32:31

处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:29:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2945338	100.000	409643	3800	1.003	--
总计		2945338	100.000	409643			

图328 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1873-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:36:53


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2919654	100.000	405621	3789	1.002	--
总计		2919654	100.000	405621			

图329 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1874-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:41:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	2944885	100.000	408556	3781	1.000	--
总计		2944885	100.000	408556			

图330 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1875-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 08:45:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:29:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.879	3036130	100.000	420998	3778	1.001	--
总计		3036130	100.000	420998			

图331 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1876-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:50:03


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2883732	100.000	399251	3769	0.999	--
总计		2883732	100.000	399251			

图332 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1877-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:54:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.878	2881072	100.000	398465	3761	0.998	--
总计		2881072	100.000	398465			

图333 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1878-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 08:58:49


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/11 10:29:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.877	2936023	100.000	405210	3747	0.998	--
总计		2936023	100.000	405210			

图334 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1879-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 09:03:12

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:29:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.869	2986142	100.000	398190	3463	1.007	--
总计		2986142	100.000	398190			

图335 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)
柱温:30 $^{\circ}$ C
数据文件名: RC\$938 - 0-234/26-1880-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH12.0jz-2-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250310-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 5 μ l
进样时间:2025/03/11 09:07:35
处理时间 (V2) : 2025/03/11 10:29:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.868	2984013	100.000	397745	3467	1.006	--
总计		2984013	100.000	397745			

图336 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH12.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2