



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-2-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-9

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 11:48:12

处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:39


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-3-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 11:51:36

处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	306451	100.000	47561	3061	1.132	--
总计		306451	100.000	47561			

图2 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-4-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 11:54:59 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:47 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	307275	100.000	47655	3062	1.131	--
总计		307275	100.000	47655			

图3 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-5-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 11:58:22 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:50 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	306780	100.000	47566	3065	1.131	--
总计		306780	100.000	47566			

图4 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-6-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 12:01:46 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:53 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	307749	100.000	47819	3070	1.130	--
总计		307749	100.000	47819			

图5 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-7-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 12:05:09 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:56 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	307553	100.000	47810	3070	1.130	--
总计		307553	100.000	47810			

图6 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-8-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-1

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:08:32

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:25:59

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	316898	100.000	51844	3434	1.126	--
总计		316898	100.000	51844			

图7 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-9-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 12:11:54 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	310857	100.000	50878	3438	1.126	--
总计		310857	100.000	50878			

图8 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-10-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-19

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:15:16

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	325362	100.000	53175	3433	1.126	--
总计		325362	100.000	53175			

图9 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：50℃

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-11-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-28

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:18:40

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min

波长：207nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	306285	100.000	50129	3437	1.125	--
总计		306285	100.000	50129			

图10 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-12-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:22:02

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	323342	100.000	52792	3432	1.127	--
总计		323342	100.000	52792			

图11 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-13-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:25:24

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	311306	100.000	50891	3432	1.127	--
总计		311306	100.000	50891			

图12 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-14-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:28:47

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.353	332146	100.000	54291	3432	1.127	--
总计		332146	100.000	54291			

图13 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-15-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-11

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:32:10

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:19

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.354	322962	100.000	52833	3433	1.126	--
总计		322962	100.000	52833			

图14 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-16-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:35:32

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	337607	100.000	55228	3433	1.127	--
总计		337607	100.000	55228			

图15 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-17-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:38:55

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	334231	100.000	54563	3444	1.128	--
总计		334231	100.000	54563			

图16 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-18-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:42:17

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:28

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	338313	100.000	55239	3433	1.127	--
总计		338313	100.000	55239			

图17 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-19-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:45:39

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	342689	100.000	56070	3439	1.126	--
总计		342689	100.000	56070			

图18 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-20-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:49:02

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:34

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	330855	100.000	54082	3433	1.127	--
总计		330855	100.000	54082			

图19 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-21-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-12

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:52:25

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	332829	100.000	54410	3431	1.126	--
总计		332829	100.000	54410			

图20 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-22-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-21

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 12:55:48

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:40

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	341658	100.000	55873	3436	1.127	--
总计		341658	100.000	55873			

图21 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-23-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-30

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 12:59:10

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	343384	100.000	56092	3433	1.127	--
总计		343384	100.000	56092			

图22 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-24-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:02:32

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:45

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	337192	100.000	55083	3437	1.126	--
总计		337192	100.000	55083			

图23 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-25-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:05:55

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:49

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	347706	100.000	56805	3444	1.127	--
总计		347706	100.000	56805			

图24 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-26-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-4

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:09:18

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	333443	100.000	54493	3442	1.126	--
总计		333443	100.000	54493			

图25 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-27-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-13

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:12:40

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	333880	100.000	54546	3441	1.126	--
总计		333880	100.000	54546			

图26 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-28-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:16:02

处理时间(V2)：2025/03/11 13:26:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	338676	100.000	55082	3433	1.127	--
总计		338676	100.000	55082			

图27 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-29-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 13:19:24

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:00

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	346095	100.000	56474	3451	1.127	--
总计		346095	100.000	56474			

图28 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-30-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-40

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:22:46

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	338551	100.000	55193	3445	1.126	--
总计		338551	100.000	55193			

图29 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-31-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-49

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:26:08

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	343532	100.000	55950	3443	1.126	--
总计		343532	100.000	55950			

图30 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.0ml/min

柱温：50℃

波长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-32-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-5

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:29:30

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	330248	100.000	53731	3451	1.127	--
总计		330248	100.000	53731			

图31 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-33-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:32:53

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	324547	100.000	52830	3442	1.127	--
总计		324547	100.000	52830			

图32 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-34-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:36:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	329409	100.000	53614	3447	1.126	--
总计		329409	100.000	53614			

图33 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-35-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:39:40

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	342448	100.000	55853	3449	1.126	--
总计		342448	100.000	55853			

图34 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.0ml/min

柱温：50℃

波长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-36-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：1-41

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 13:43:03

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	337620	100.000	54948	3448	1.126	--
总计		337620	100.000	54948			

图35 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-37-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:46:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:23 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	341071	100.000	55545	3448	1.127	--
总计		341071	100.000	55545			

图36 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-38-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:49:47 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:25 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	307500	100.000	47676	3090	1.129	--
总计		307500	100.000	47676			

图37 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-39-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 13:53:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:28 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	306945	100.000	47664	3094	1.128	--
总计		306945	100.000	47664			

图38 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-40-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/03/10 13:56:36

处理时间(V2): 2025/03/11 13:27:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-41-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 14:00:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	306668	100.000	47589	3090	1.129	--
总计		306668	100.000	47589			

图40 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-42-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 14:03:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	307498	100.000	47607	3083	1.130	--
总计		307498	100.000	47607			

图41 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-43-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 14:06:48 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	306878	100.000	47533	3086	1.130	--
总计		306878	100.000	47533			

图42 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-44-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 14:10:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	306530	100.000	47511	3088	1.129	--
总计		306530	100.000	47511			

图43 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-45-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:13:39

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	306589	100.000	47608	3090	1.130	--
总计		306589	100.000	47608			

图44 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-46-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-1

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:17:03

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	325939	100.000	53221	3446	1.126	--
总计		325939	100.000	53221			

图45 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-47-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-10

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:20:27

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	328558	100.000	53680	3451	1.125	--
总计		328558	100.000	53680			

图46 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-48-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-19 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 14:23:51 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	324415	100.000	53047	3455	1.125	--
总计		324415	100.000	53047			

图47 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-49-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-28

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:27:15

处理时间(V2)：2025/03/11 13:27:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	329586	100.000	53885	3457	1.125	--
总计		329586	100.000	53885			

图48 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-50-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:30:38

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	348052	100.000	56853	3450	1.126	--
总计		348052	100.000	56853			

图49 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-51-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:34:01

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	349968	100.000	57110	3450	1.127	--
总计		349968	100.000	57110			

图50 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-52-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:37:25

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	333307	100.000	54435	3455	1.125	--
总计		333307	100.000	54435			

图51 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-53-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-11

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:40:49

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	337457	100.000	55174	3455	1.125	--
总计		337457	100.000	55174			

图52 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-54-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:44:12

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	336335	100.000	54941	3452	1.125	--
总计		336335	100.000	54941			

图53 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-55-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-29

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:47:35

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	331520	100.000	54088	3450	1.127	--
总计		331520	100.000	54088			

图54 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-56-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-38

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:50:58

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:17

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	345293	100.000	56431	3455	1.125	--
总计		345293	100.000	56431			

图55 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-57-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 14:54:21

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	355480	100.000	58016	3447	1.127	--
总计		355480	100.000	58016			

图56 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-58-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 14:57:46

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:22

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	333792	100.000	54505	3447	1.126	--
总计		333792	100.000	54505			

图57 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-59-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-12

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:01:09

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338226	100.000	55270	3449	1.124	--
总计		338226	100.000	55270			

图58 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-60-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:04:33

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	334815	100.000	54743	3450	1.125	--
总计		334815	100.000	54743			

图59 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-61-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-30

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:07:56

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	333717	100.000	54579	3451	1.125	--
总计		333717	100.000	54579			

图60 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-62-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-39

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:11:20

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	348443	100.000	56929	3449	1.126	--
总计		348443	100.000	56929			

图61 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-63-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-48

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:14:44

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	352226	100.000	57563	3447	1.126	--
总计		352226	100.000	57563			

图62 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-64-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:18:08

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	332604	100.000	54350	3454	1.126	--
总计		332604	100.000	54350			

图63 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-65-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-13

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:21:31

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338271	100.000	55277	3453	1.126	--
总计		338271	100.000	55277			

图64 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-66-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-22

版本号：6.115

进样体积：10 μl

实验者：xiechaojun

进样时间：2025/03/10 15:24:54


处理者：xiechaojun

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	336311	100.000	54924	3451	1.126	--
总计		336311	100.000	54924			

图65 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-67-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:28:19

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	329028	100.000	53710	3450	1.126	--
总计		329028	100.000	53710			

图66 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-68-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-40

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:31:42

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	340230	100.000	55649	3454	1.126	--
总计		340230	100.000	55649			

图67 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-69-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-49

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:35:06

处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	354409	100.000	57935	3452	1.126	--
总计		354409	100.000	57935			

图68 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-70-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P1-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-5
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 15:38:30 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:28:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	329233	100.000	53718	3445	1.126	--
总计		329233	100.000	53718			

图69 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-71-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P2-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-14 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 15:41:53 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	327622	100.000	53442	3442	1.125	--
总计		327622	100.000	53442			

图70 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.0ml/min

柱温：50℃

波长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-72-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：2-23

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 15:45:17

处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	334235	100.000	54586	3448	1.127	--
总计		334235	100.000	54586			

图71 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-73-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P4-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-32 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 15:48:41 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	329278	100.000	53800	3453	1.126	--
总计		329278	100.000	53800			

图72 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-74-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P5-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 15:52:05 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:10 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	343136	100.000	56038	3448	1.126	--
总计		343136	100.000	56038			

图73 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-75-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-P6-jxzs.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-50
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 15:55:29 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	349091	100.000	57020	3454	1.126	--
总计		349091	100.000	57020			

图74 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-76-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 15:58:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	308403	100.000	47939	3093	1.128	--
总计		308403	100.000	47939			

图75 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-77-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:02:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	308518	100.000	47919	3087	1.129	--
总计		308518	100.000	47919			

图76 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH1.0介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-78-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 16:05:41

处理时间(V2): 2025/03/11 13:29:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-79-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:09:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.356	307110	100.000	47697	3086	1.130	--
总计		307110	100.000	47697			

图78 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-80-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:12:26 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.355	306796	100.000	47740	3096	1.129	--
总计		306796	100.000	47740			

图79 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速：1.0ml/min
柱温：50 $^{\circ}$ C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-81-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μ l 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:15:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:30 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	306469	100.000	47652	3096	1.130	--
总计		306469	100.000	47652			

图80 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-82-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:19:12 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	307507	100.000	47702	3097	1.130	--
总计		307507	100.000	47702			

图81 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-83-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:22:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:35 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	307494	100.000	47571	3091	1.130	--
总计		307494	100.000	47571			

图82 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-84-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-1

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 16:25:56

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:38

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	290902	100.000	47193	3425	1.129	--
总计		290902	100.000	47193			

图83 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-85-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-10 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 16:29:18 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:41
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.371	306300	100.000	49762	3427	1.129	--
总计		306300	100.000	49762			

图84 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-86-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-19 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 16:32:41 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	311779	100.000	50650	3440	1.130	--
总计		311779	100.000	50650			

图85 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-87-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-28 版本号：6.115
进样体积：10 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/10 16:36:04 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.368	319664	100.000	51732	3425	1.131	--
总计		319664	100.000	51732			

图86 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-88-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:39:27

处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	314270	100.000	50950	3434	1.129	--
总计		314270	100.000	50950			

图87 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-89-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-46
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 16:42:50 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	318042	100.000	51771	3420	1.130	--
总计		318042	100.000	51771			

图88 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-90-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:46:13

处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	315365	100.000	51382	3427	1.129	--
总计		315365	100.000	51382			

图89 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-91-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-11

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:49:36

处理时间(V2)：2025/03/11 13:29:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	329348	100.000	53712	3432	1.128	--
总计		329348	100.000	53712			

图90 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-92-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:52:58

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	328800	100.000	53675	3435	1.128	--
总计		328800	100.000	53675			

图91 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-93-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-29

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:56:21

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	339540	100.000	55238	3419	1.129	--
总计		339540	100.000	55238			

图92 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-94-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-38

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 16:59:44

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	343393	100.000	55984	3431	1.129	--
总计		343393	100.000	55984			

图93 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-95-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:03:05

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338862	100.000	55200	3428	1.129	--
总计		338862	100.000	55200			

图94 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-96-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:06:27

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:13

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	326896	100.000	53251	3428	1.128	--
总计		326896	100.000	53251			

图95 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-97-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-12

版本号：6.115

进样体积：10 μl

实验者：xiechaojun

进样时间：2025/03/10 17:09:49


处理者：xiechaojun

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	329569	100.000	53704	3429	1.129	--
总计		329569	100.000	53704			

图96 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-98-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:13:12

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	327275	100.000	53321	3429	1.130	--
总计		327275	100.000	53321			

图97 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-99-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-30

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:16:34

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	337554	100.000	55020	3430	1.129	--
总计		337554	100.000	55020			

图98 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-100-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-39

版本号：6.115

进样体积：10 μl

实验者：xiechaojun

进样时间：2025/03/10 17:19:55


处理者：xiechaojun

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:24

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	338741	100.000	55215	3429	1.130	--
总计		338741	100.000	55215			

图99 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-101-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-48

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:23:17

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:27

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	337707	100.000	55020	3432	1.129	--
总计		337707	100.000	55020			

图100 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-102-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-4

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:26:38

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:30

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	331145	100.000	53886	3421	1.130	--
总计		331145	100.000	53886			

图101 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.0ml/min

柱温：50℃

波长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-103-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-13

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:30:00

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	327648	100.000	53330	3430	1.130	--
总计		327648	100.000	53330			

图102 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-104-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 17:33:21

处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	329277	100.000	53679	3429	1.129	--
总计		329277	100.000	53679			

图103 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-105-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 17:36:44

处理时间(V2): 2025/03/11 13:30:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	338919	100.000	55235	3430	1.130	--
总计		338919	100.000	55235			

图104 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-106-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-40

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:40:05

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	338210	100.000	55133	3431	1.129	--
总计		338210	100.000	55133			

图105 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名 : RC\$QTL-373 - 0-10/11-107-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/03/10 17:43:27

处理时间(V2) : 2025/03/11 13:30:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	338329	100.000	55072	3435	1.130	--
总计		338329	100.000	55072			

图106 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-108-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-5

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 17:46:48

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:47

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	326394	100.000	53184	3436	1.130	--
总计		326394	100.000	53184			

图107 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-109-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-14

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:50:11

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	328173	100.000	53343	3446	1.130	--
总计		328173	100.000	53343			

图108 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温: 50°C

波长: 207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-110-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-23

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:53:32

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.370	333571	100.000	54099	3428	1.131	--
总计		333571	100.000	54099			

图109 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：50°C

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-111-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-32

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 17:56:53

处理时间(V2)：2025/03/11 13:30:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min

波长：207nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	341107	100.000	55342	3442	1.129	--
总计		341107	100.000	55342			

图110 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-112-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-41

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 18:00:16

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:00

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.367	335491	100.000	54388	3430	1.131	--
总计		335491	100.000	54388			

图111 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-113-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：3-50

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:03:37

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.372	340380	100.000	55318	3439	1.129	--
总计		340380	100.000	55318			

图112 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-114-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:07:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.365	308429	100.000	47943	3117	1.129	--
总计		308429	100.000	47943			

图113 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-115-2 - cbzj-18G540Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:10:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.404	314672	100.000	48186	3122	1.127	--
总计		314672	100.000	48186			

图114 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18G540Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：50℃

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-116-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-rj.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-9

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:13:48

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：207nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-117-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:17:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.364	307967	100.000	47872	3113	1.129	--
总计		307967	100.000	47872			

图116 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-118-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:20:36 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	308681	100.000	47874	3183	1.133	--
总计		308681	100.000	47874			

图117 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-119-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:24:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	307828	100.000	47827	3178	1.129	--
总计		307828	100.000	47827			

图118 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-120-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:27:26 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.398	310666	100.000	47980	3172	1.125	--
总计		310666	100.000	47980			

图119 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-121-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 18:30:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.369	307076	100.000	47705	3130	1.128	--
总计		307076	100.000	47705			

图120 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-122-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10 μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/10 18:34:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	303199	100.000	48606	3422	1.127	--
总计		303199	100.000	48606			

图121 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-123-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-10

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:37:35

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.389	311150	100.000	50442	3467	1.129	--
总计		311150	100.000	50442			

图122 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速: 1.0ml/min

柱 温: 50°C

波 长: 207nm

数据文件名: RC\$QTL-373 - 0-10/11-124-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/03/10 18:40:59

处理时间(V2): 2025/03/11 13:31:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.399	315277	100.000	50681	3440	1.130	--
总计		315277	100.000	50681			

图123 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-125-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-28

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:44:21

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.400	322445	100.000	51810	3456	1.128	--
总计		322445	100.000	51810			

图124 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-126-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:47:44

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	315507	100.000	51213	3507	1.128	--
总计		315507	100.000	51213			

图125 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-127-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:51:06

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.374	325601	100.000	52882	3457	1.129	--
总计		325601	100.000	52882			

图126 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-128-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 18:54:29

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	319874	100.000	51889	3465	1.131	--
总计		319874	100.000	51889			

图127 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-129-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-11

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 18:57:54

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:50

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.375	333645	100.000	53847	3433	1.129	--
总计		333645	100.000	53847			

图128 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-130-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:01:18

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	332272	100.000	53588	3454	1.130	--
总计		332272	100.000	53588			

图129 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-131-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-29

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:04:42

处理时间(V2)：2025/03/11 13:31:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.378	332933	100.000	53988	3451	1.128	--
总计		332933	100.000	53988			

图130 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-132-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-38

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:08:06

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:00

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.379	333372	100.000	54110	3450	1.127	--
总计		333372	100.000	54110			

图131 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-133-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:11:29

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.393	336558	100.000	53631	3395	1.129	--
总计		336558	100.000	53631			

图132 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-134-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-3

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:14:52

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:08

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	323478	100.000	52311	3473	1.128	--
总计		323478	100.000	52311			

图133 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-135-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-12

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:18:18

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	334717	100.000	54369	3467	1.128	--
总计		334717	100.000	54369			

图134 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-136-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-21

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:21:42

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:14

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.380	330990	100.000	53667	3443	1.127	--
总计		330990	100.000	53667			

图135 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-137-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-30

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:25:04

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:18

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	337242	100.000	54394	3447	1.128	--
总计		337242	100.000	54394			

图136 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-138-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-39

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:28:28

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	335628	100.000	54390	3468	1.128	--
总计		335628	100.000	54390			

图137 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-139-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-48

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:31:51

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:24

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.382	334414	100.000	54143	3450	1.129	--
总计		334414	100.000	54143			

图138 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50°C 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-140-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-4
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 19:35:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	325645	100.000	52545	3454	1.129	--
总计		325645	100.000	52545			

图139 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-141-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-13

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:38:37

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.385	331070	100.000	53543	3466	1.127	--
总计		331070	100.000	53543			

图140 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-142-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-22

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:42:01

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	333841	100.000	53984	3484	1.129	--
总计		333841	100.000	53984			

图141 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-143-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-31

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:45:25

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.395	334622	100.000	54027	3472	1.128	--
总计		334622	100.000	54027			

图142 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-144-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-40

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:48:49

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	330344	100.000	53604	3481	1.128	--
总计		330344	100.000	53604			

图143 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-145-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-49

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 19:52:12

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	335262	100.000	54045	3446	1.130	--
总计		335262	100.000	54045			

图144 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-146-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P1-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-5

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:55:35

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:45

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.390	324093	100.000	52535	3475	1.128	--
总计		324093	100.000	52535			

图145 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-147-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P2-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-14

进样体积：10 μl

版本号：6.115

进样时间：2025/03/10 19:59:00

实验者：xiechaojun


处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:48

处理者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.384	326334	100.000	52701	3465	1.129	--
总计		326334	100.000	52701			

图146 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50℃

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-148-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P3-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-23

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 20:02:22

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.392	341112	100.000	54951	3466	1.129	--
总计		341112	100.000	54951			

图147 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：1.0ml/min

柱温：50℃

波长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-149-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P4-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-32

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 20:05:46

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	327337	100.000	53140	3473	1.128	--
总计		327337	100.000	53140			

图148 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-150-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P5-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-41

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 20:09:09

版本号：6.115

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:56


实验者：xiechaojun

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.394	332251	100.000	53462	3447	1.130	--
总计		332251	100.000	53462			

图149 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流 速：1.0ml/min

柱 温：50°C

波 长：207nm

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-151-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-P6-jxzs.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-50

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 20:12:32

处理时间(V2)：2025/03/11 13:32:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.391	326673	100.000	52831	3470	1.128	--
总计		326673	100.000	52831			

图150 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-浆法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU

LabSolutions


QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.0ml/min
柱温：50℃ 波长：207nm
数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-152-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb
样品瓶号：4-27
进样体积：10 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/10 20:15:55 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/11 13:33:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.387	309981	100.000	47880	3134	1.129	--
总计		309981	100.000	47880			

图151 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-373

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：50℃

数据文件名：RC\$QTL-373 - 0-10/11-153-2 - cbzj-18H550Zp-rcqx-pH4.5jz-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-373 - QTL-373-RC-FX260.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-373 - 20250310-FX260.lcb

样品瓶号：4-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/03/10 20:19:20

处理时间(V2)：2025/03/11 13:33:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min

波长：207nm


版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 207nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.383	309412	100.000	47844	3136	1.129	--
总计		309412	100.000	47844			

图152 奥司他韦干糖浆溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-18H550Z批-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2