



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 25-43/25-2426-1 - zzp-2023010711p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 11:19:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V1): 2025/03/11 11:24:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010711批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2539-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:35:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	2994148	100.000	365353	3007	1.032	--
总计		2994148	100.000	365353			

图2 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2540-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μl

进样时间:2025/03/11 19:39:24

处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	2995156	100.000	365228	3003	1.032	--
总计		2995156	100.000	365228			

图3 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2541-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 19:43:46
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:04:11
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	2993886	100.000	364585	2996	1.032	--
总计		2993886	100.000	364585			

图4 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2542-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:48:08

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:04:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.968	2995379	100.000	364275	2989	1.031	--
总计		2995379	100.000	364275			

图5 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2543-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:52:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.967	2996570	100.000	364284	2985	1.031	--
总计		2996570	100.000	364284			

图6 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2544-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:56:52

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:04:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	351415	100.000	44144	3199	1.020	--
总计		351415	100.000	44144			

图7 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2545-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:01:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	315612	100.000	39630	3194	1.020	--
总计		315612	100.000	39630			

图8 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2546-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:05:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	333882	100.000	41945	3194	1.021	--
总计		333882	100.000	41945			

图9 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2547-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 20:09:58
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:04:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	311911	100.000	39211	3197	1.022	--
总计		311911	100.000	39211			

图10 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2548-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:14:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	284923	100.000	35744	3188	1.021	--
总计		284923	100.000	35744			

图11 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2549-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:18:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	304866	100.000	38252	3188	1.022	--
总计		304866	100.000	38252			

图12 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2550-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:23:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	862111	100.000	107973	3179	1.023	--
总计		862111	100.000	107973			

图13 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2551-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:27:24

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/12 09:04:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	816754	100.000	102212	3175	1.022	--
总计		816754	100.000	102212			

图14 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2552-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:31:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	867574	100.000	108526	3166	1.022	--
总计		867574	100.000	108526			

图15 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2553-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:36:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	824348	100.000	103115	3167	1.022	--
总计		824348	100.000	103115			

图16 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2554-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:40:30

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/12 09:04:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	763536	100.000	95398	3158	1.022	--
总计		763536	100.000	95398			

图17 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2555-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 20:44:52
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:04:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	792561	100.000	98964	3149	1.021	--
总计		792561	100.000	98964			

图18 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2556-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:49:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	1326355	100.000	165325	3145	1.022	--
总计		1326355	100.000	165325			

图19 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2557-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:53:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1257610	100.000	156629	3137	1.021	--
总计		1257610	100.000	156629			

图20 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2558-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:57:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:04:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1333516	100.000	165980	3130	1.021	--
总计		1333516	100.000	165980			

图21 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2559-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:02:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1269809	100.000	158056	3127	1.021	--
总计		1269809	100.000	158056			

图22 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2560-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:06:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1206131	100.000	149996	3121	1.021	--
总计		1206131	100.000	149996			

图23 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2561-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:11:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1239034	100.000	153852	3115	1.020	--
总计		1239034	100.000	153852			

图24 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2562-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:15:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.978	1717195	100.000	213095	3107	1.021	--
总计		1717195	100.000	213095			

图25 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2563-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 21:19:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1644059	100.000	203889	3104	1.021	--
总计		1644059	100.000	203889			

图26 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2564-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:24:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1745364	100.000	215901	3092	1.023	--
总计		1745364	100.000	215901			

图27 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2565-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:28:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1652791	100.000	204602	3089	1.020	--
总计		1652791	100.000	204602			

图28 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2566-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:32:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1592236	100.000	196857	3082	1.020	--
总计		1592236	100.000	196857			

图29 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2567-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:37:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	1608008	100.000	198601	3074	1.019	--
总计		1608008	100.000	198601			

图30 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2568-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:41:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	2251370	100.000	277876	3070	1.020	--
总计		2251370	100.000	277876			

图31 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2569-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:45:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	2208077	100.000	272247	3062	1.020	--
总计		2208077	100.000	272247			

图32 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2570-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:50:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	2271308	100.000	279825	3057	1.020	--
总计		2271308	100.000	279825			

图33 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2571-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:54:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2203303	100.000	271161	3050	1.019	--
总计		2203303	100.000	271161			

图34 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2572-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:59:00

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	2141126	100.000	263273	3045	1.019	--
总计		2141126	100.000	263273			

图35 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2573-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:03:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.979	2141173	100.000	263026	3035	1.019	--
总计		2141173	100.000	263026			

图36 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2574-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:07:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:44

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2686343	100.000	329652	3031	1.019	--
总计		2686343	100.000	329652			

图37 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2575-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:12:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2663078	100.000	326564	3023	1.019	--
总计		2663078	100.000	326564			

图38 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2576-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:16:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2681062	100.000	328370	3018	1.019	--
总计		2681062	100.000	328370			

图39 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2577-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:20:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	2660294	100.000	325594	3015	1.018	--
总计		2660294	100.000	325594			

图40 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2578-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:25:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2622744	100.000	320741	3006	1.018	--
总计		2622744	100.000	320741			

图41 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2579-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:29:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:05:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2590809	100.000	316483	3000	1.018	--
总计		2590809	100.000	316483			

图42 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2580-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:33:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	2858504	100.000	348686	2993	1.018	--
总计		2858504	100.000	348686			

图43 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2581-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:38:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	2833905	100.000	345446	2988	1.018	--
总计		2833905	100.000	345446			

图44 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2582-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 22:42:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2842664	100.000	346322	2981	1.017	--
总计		2842664	100.000	346322			

图45 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2583-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:46:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.980	2823290	100.000	343619	2975	1.017	--
总计		2823290	100.000	343619			

图46 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2584-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:51:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	2808097	100.000	341349	2968	1.017	--
总计		2808097	100.000	341349			

图47 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2585-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 22:55:36 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.981	2807124	100.000	340794	2962	1.017	--
总计		2807124	100.000	340794			

图48 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2586-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:59:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	2904941	100.000	352237	2954	1.016	--
总计		2904941	100.000	352237			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2587-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:04:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	2928177	100.000	354776	2949	1.016	--
总计		2928177	100.000	354776			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2588-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:08:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	2907020	100.000	351794	2944	1.016	--
总计		2907020	100.000	351794			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2589-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:13:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	2889814	100.000	349365	2938	1.016	--
总计		2889814	100.000	349365			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2590-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:17:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	2885964	100.000	348544	2931	1.016	--
总计		2885964	100.000	348544			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2591-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:21:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	2885598	100.000	348101	2921	1.015	--
总计		2885598	100.000	348101			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2592-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:26:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	2980049	100.000	350585	2768	1.019	--
总计		2980049	100.000	350585			

图55 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2593-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:30:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	2980238	100.000	350168	2759	1.018	--
总计		2980238	100.000	350168			

图56 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2594-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:34:57

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2595-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:39:20

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	2981138	100.000	349858	2748	1.018	--
总计		2981138	100.000	349858			

图58 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2596-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:43:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	2977885	100.000	348998	2740	1.017	--
总计		2977885	100.000	348998			

图59 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2597-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:48:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	2979155	100.000	348792	2735	1.017	--
总计		2979155	100.000	348792			

图60 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2598-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:52:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.973	2980408	100.000	348864	2731	1.017	--
总计		2980408	100.000	348864			

图61 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2599-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:56:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:06:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.974	2985443	100.000	348828	2721	1.017	--
总计		2985443	100.000	348828			

图62 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2600-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 00:01:18
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:06:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	331875	100.000	39744	2868	1.008	--
总计		331875	100.000	39744			

图63 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2601-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 00:05:41
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:07:00
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	320744	100.000	38292	2844	1.007	--
总计		320744	100.000	38292			

图64 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2602-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:10:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	292986	100.000	34919	2846	1.007	--
总计		292986	100.000	34919			

图65 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2603-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:14:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	328101	100.000	39159	2848	1.011	--
总计		328101	100.000	39159			

图66 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2604-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:18:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	301993	100.000	35987	2846	1.010	--
总计		301993	100.000	35987			

图67 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2605-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:23:10

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	331740	100.000	39511	2843	1.010	--
总计		331740	100.000	39511			

图68 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2606-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:27:32

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/12 09:07:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	827320	100.000	98442	2837	1.011	--
总计		827320	100.000	98442			

图69 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2607-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:31:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	846000	100.000	100626	2831	1.011	--
总计		846000	100.000	100626			

图70 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2608-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:36:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	764997	100.000	90858	2830	1.011	--
总计		764997	100.000	90858			

图71 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2609-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:40:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	837494	100.000	99449	2824	1.010	--
总计		837494	100.000	99449			

图72 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2610-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:45:02

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/12 09:07:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	786632	100.000	93251	2819	1.010	--
总计		786632	100.000	93251			

图73 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2611-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:49:24

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2): 2025/03/12 09:07:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	801078	100.000	94836	2810	1.009	--
总计		801078	100.000	94836			

图74 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2612-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:53:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1276909	100.000	151207	2807	1.011	--
总计		1276909	100.000	151207			

图75 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2613-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:58:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1309801	100.000	154923	2805	1.010	--
总计		1309801	100.000	154923			

图76 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2614-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:02:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	1210354	100.000	143262	2793	1.010	--
总计		1210354	100.000	143262			

图77 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2615-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:06:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1290130	100.000	152547	2793	1.010	--
总计		1290130	100.000	152547			

图78 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2616-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:11:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.982	1212821	100.000	143372	2786	1.010	--
总计		1212821	100.000	143372			

图79 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2617-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:15:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1264234	100.000	149175	2779	1.009	--
总计		1264234	100.000	149175			

图80 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2618-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:20:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	1659121	100.000	195425	2772	1.010	--
总计		1659121	100.000	195425			

图81 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2619-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:24:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1683948	100.000	198148	2770	1.010	--
总计		1683948	100.000	198148			

图82 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2620-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:28:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1590884	100.000	187024	2766	1.009	--
总计		1590884	100.000	187024			

图83 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2621-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:33:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1686762	100.000	198232	2764	1.010	--
总计		1686762	100.000	198232			

图84 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2622-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:37:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1589873	100.000	186677	2759	1.010	--
总计		1589873	100.000	186677			

图85 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2623-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:41:54

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:07:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	1654041	100.000	194059	2753	1.010	--
总计		1654041	100.000	194059			

图86 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2624-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:46:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2229655	100.000	261444	2749	1.010	--
总计		2229655	100.000	261444			

图87 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2625-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:50:40

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:08:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2229449	100.000	261102	2743	1.010	--
总计		2229449	100.000	261102			

图88 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2626-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 01:55:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:08:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2131226	100.000	249470	2737	1.010	--
总计		2131226	100.000	249470			

图89 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2627-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:59:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:10

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2192663	100.000	256529	2736	1.010	--
总计		2192663	100.000	256529			

图90 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2628-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:03:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2143519	100.000	250432	2727	1.009	--
总计		2143519	100.000	250432			

图91 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2629-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:08:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.983	2178837	100.000	254659	2723	1.009	--
总计		2178837	100.000	254659			

图92 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2630-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:12:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2662912	100.000	310580	2716	1.009	--
总计		2662912	100.000	310580			

图93 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2631-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:16:59

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:08:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2662525	100.000	310495	2717	1.010	--
总计		2662525	100.000	310495			

图94 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2632-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:21:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2613321	100.000	304658	2713	1.010	--
总计		2613321	100.000	304658			

图95 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2633-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:25:46

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2655544	100.000	309236	2706	1.010	--
总计		2655544	100.000	309236			

图96 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2634-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:30:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	2608157	100.000	303838	2705	1.009	--
总计		2608157	100.000	303838			

图97 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2635-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:34:32

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.984	2627142	100.000	305654	2699	1.009	--
总计		2627142	100.000	305654			

图98 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2636-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-7

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:38:55

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	2818058	100.000	328111	2699	1.009	--
总计		2818058	100.000	328111			

图99 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2637-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:43:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	2812948	100.000	327042	2694	1.009	--
总计		2812948	100.000	327042			

图100 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

100




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2638-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 02:47:42
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:08:41
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	2804084	100.000	325883	2689	1.009	--
总计		2804084	100.000	325883			

图101 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2639-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:52:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	2796995	100.000	324676	2682	1.008	--
总计		2796995	100.000	324676			

图102 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2640-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:56:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2777608	100.000	322510	2681	1.009	--
总计		2777608	100.000	322510			

图103 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2641-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:00:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.985	2778555	100.000	322097	2674	1.008	--
总计		2778555	100.000	322097			

图104 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2642-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:05:16

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2882611	100.000	334274	2670	1.009	--
总计		2882611	100.000	334274			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2643-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm
 批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb
 样品瓶号: 4-17
 进样体积: 5 μl
 进样时间:2025/03/12 03:09:40
 处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:08:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

流速: 1.0ml/min
 波长: 256nm
 版本号: 6.115
 实验者: xiechaojun
 处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2890946	100.000	335087	2669	1.008	--
总计		2890946	100.000	335087			

图106 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
 自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-
 片2
 供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2644-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:14:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:08:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2854841	100.000	330453	2660	1.008	--
总计		2854841	100.000	330453			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2645-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:18:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2888968	100.000	334441	2662	1.008	--
总计		2888968	100.000	334441			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2646-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:22:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2830434	100.000	327463	2656	1.008	--
总计		2830434	100.000	327463			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2647-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:27:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.986	2861490	100.000	330643	2648	1.008	--
总计		2861490	100.000	330643			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2648-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:31:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	2982646	100.000	336390	2516	1.012	--
总计		2982646	100.000	336390			

图111 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-235/25-2649-2 - zzp-2023010811p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX274.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX274.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:36:02

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.977	2979280	100.000	335790	2514	1.011	--
总计		2979280	100.000	335790			

图112 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023010811批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1882-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-9

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 11:21:00

处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1883-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 11:25:23


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	2966176	100.000	350844	3003	1.210	--
总计		2966176	100.000	350844			

图114 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1884-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 11:29:46

处理时间(V2): 2025/03/12 09:09:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	2964928	100.000	350188	2993	1.213	--
总计		2964928	100.000	350188			

图115 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1885-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 11:34:09


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.008	2963910	100.000	349738	2980	1.215	--
总计		2963910	100.000	349738			

图116 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1886-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 11:38:34


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.009	2962445	100.000	350759	3005	1.213	--
总计		2962445	100.000	350759			

图117 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1887-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 11:42:56


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.009	2963288	100.000	350995	3008	1.214	--
总计		2963288	100.000	350995			

图118 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1888-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 11:47:18

处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	341811	100.000	41272	3157	1.226	--
总计		341811	100.000	41272			

图119 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1889-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 11:51:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	341807	100.000	41341	3151	1.224	--
总计		341807	100.000	41341			

图120 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

120




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1890-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 11:56:01 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	339562	100.000	41125	3162	1.234	--
总计		339562	100.000	41125			

图121 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

121




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1891-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 12:00:28
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:10:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	344178	100.000	41699	3165	1.232	--
总计		344178	100.000	41699			

图122 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1892-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 12:04:49
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:10:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	337084	100.000	40850	3161	1.233	--
总计		337084	100.000	40850			

图123 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1893-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-46

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 12:09:11

处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	306781	100.000	37222	3167	1.231	--
总计		306781	100.000	37222			

图124 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1894-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-2

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 12:13:32


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	857994	100.000	103893	3156	1.231	--
总计		857994	100.000	103893			

图125 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

125



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1895-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 12:17:53


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	821486	100.000	99879	3187	1.229	--
总计		821486	100.000	99879			

图126 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

126




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1896-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 12:22:14
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:10:33
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.024	860437	100.000	104450	3179	1.226	--
总计		860437	100.000	104450			

图127 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1897-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 12:26:35


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.024	835943	100.000	101232	3165	1.226	--
总计		835943	100.000	101232			

图128 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

128



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1898-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 12:30:58


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	857123	100.000	103700	3165	1.224	--
总计		857123	100.000	103700			

图129 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1899-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 12:35:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	820959	100.000	99270	3166	1.224	--
总计		820959	100.000	99270			

图130 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

130



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1900-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-3

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 12:39:40

处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.025	1319967	100.000	159633	3165	1.223	--
总计		1319967	100.000	159633			

图131 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

131




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1901-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 12:44:00
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:10:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.027	1257675	100.000	152214	3171	1.221	--
总计		1257675	100.000	152214			

图132 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1902-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 12:48:23
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:10:50
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.027	1342927	100.000	162376	3167	1.220	--
总计		1342927	100.000	162376			

图133 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1903-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 12:52:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.028	1293147	100.000	156665	3170	1.217	--
总计		1293147	100.000	156665			

图134 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1904-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 12:57:06
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:10:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.029	1340384	100.000	162413	3169	1.214	--
总计		1340384	100.000	162413			

图135 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1905-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:01:27


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:10:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.030	1293970	100.000	156909	3170	1.210	--
总计		1293970	100.000	156909			

图136 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1906-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:05:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.030	1706075	100.000	206868	3170	1.208	--
总计		1706075	100.000	206868			

图137 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1907-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:10:09


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.031	1617259	100.000	196242	3168	1.202	--
总计		1617259	100.000	196242			

图138 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1908-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 13:14:30
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:11:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.031	1733713	100.000	210006	3158	1.202	--
总计		1733713	100.000	210006			

图139 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1909-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:18:52


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.032	1674456	100.000	202746	3156	1.198	--
总计		1674456	100.000	202746			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1910-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:23:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:12

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.033	1712389	100.000	207195	3156	1.192	--
总计		1712389	100.000	207195			

图141 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

141



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1911-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:27:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.034	1711653	100.000	207192	3164	1.190	--
总计		1711653	100.000	207192			

图142 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

142

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1912-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-5

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 13:31:55


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.034	2261223	100.000	272793	3141	1.188	--
总计		2261223	100.000	272793			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1913-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 13:36:18
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:11:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.035	2149681	100.000	260561	3177	1.183	--
总计		2149681	100.000	260561			

图144 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1914-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 13:40:40 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.035	2274982	100.000	275681	3172	1.181	--
总计		2274982	100.000	275681			

图145 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

145



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1915-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:45:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	2237912	100.000	271438	3177	1.181	--
总计		2237912	100.000	271438			

图146 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

146

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1916-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:49:22

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	2252372	100.000	273326	3179	1.178	--
总计		2252372	100.000	273326			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1917-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 13:53:42

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	2247442	100.000	273012	3182	1.175	--
总计		2247442	100.000	273012			

图148 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1918-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 13:58:05
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:11:35
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	2672859	100.000	324255	3172	1.174	--
总计		2672859	100.000	324255			

图149 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1919-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 14:02:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:11:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.038	2604226	100.000	315861	3172	1.174	--
总计		2604226	100.000	315861			

图150 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

150



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1920-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:06:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:40

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.038	2674651	100.000	323603	3156	1.173	--
总计		2674651	100.000	323603			

图151 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1921-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 14:11:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:11:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.039	2671707	100.000	323110	3153	1.170	--
总计		2671707	100.000	323110			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1922-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:15:31


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	2646974	100.000	319954	3156	1.166	--
总计		2646974	100.000	319954			

图153 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

153




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1923-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 14:19:52
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:11:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	2657641	100.000	321316	3165	1.163	--
总计		2657641	100.000	321316			

图154 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1924-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 14:24:13 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	2798842	100.000	338400	3160	1.160	--
总计		2798842	100.000	338400			

图155 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

155

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1925-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:28:34

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	2787984	100.000	336455	3153	1.159	--
总计		2787984	100.000	336455			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1926-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-25

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 14:32:56

处理时间(V2): 2025/03/12 09:11:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.042	2801760	100.000	337620	3148	1.158	--
总计		2801760	100.000	337620			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1927-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-34

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 14:37:19


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.043	2807135	100.000	337877	3146	1.157	--
总计		2807135	100.000	337877			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1928-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:41:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:02

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.043	2788022	100.000	335595	3141	1.153	--
总计		2788022	100.000	335595			

图159 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1929-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:46:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	2791395	100.000	336279	3141	1.148	--
总计		2791395	100.000	336279			

图160 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

160



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1930-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:50:25


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.045	2846822	100.000	342756	3136	1.146	--
总计		2846822	100.000	342756			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1931-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:54:48


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.046	2860616	100.000	344142	3130	1.144	--
总计		2860616	100.000	344142			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1932-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 14:59:11


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:13

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.047	2854470	100.000	343203	3128	1.142	--
总计		2854470	100.000	343203			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1933-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-35

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 15:03:33


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:12:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.047	2853939	100.000	343668	3139	1.139	--
总计		2853939	100.000	343668			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1934-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:07:55

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:12:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.048	2842965	100.000	342355	3142	1.138	--
总计		2842965	100.000	342355			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1935-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:12:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.049	2841992	100.000	342049	3144	1.137	--
总计		2841992	100.000	342049			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1936-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:16:40


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.040	2958747	100.000	347885	2979	1.135	--
总计		2958747	100.000	347885			

图167 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1937-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 1-27

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 15:21:01


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.042	2955868	100.000	347141	2981	1.132	--
总计		2955868	100.000	347141			

图168 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1938-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:25:26


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1939-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:29:50


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.041	2949267	100.000	346912	2982	1.127	--
总计		2949267	100.000	346912			

图170 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1940-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:34:15


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.039	2958709	100.000	348451	2984	1.125	--
总计		2958709	100.000	348451			

图171 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1941-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:38:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	2942026	100.000	346603	2985	1.123	--
总计		2942026	100.000	346603			

图172 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1942-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:43:01


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.037	2945091	100.000	346904	2983	1.120	--
总计		2945091	100.000	346904			

图173 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1943-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-18

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 15:47:24

处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.036	2940951	100.000	346138	2984	1.118	--
总计		2940951	100.000	346138			

图174 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1944-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:51:45


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	340252	100.000	40990	3137	1.125	--
总计		340252	100.000	40990			

图175 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

175



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1945-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 15:56:09


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.043	341785	100.000	40987	3115	1.121	--
总计		341785	100.000	40987			

图176 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

176



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1946-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:00:31


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.044	323149	100.000	38727	3099	1.118	--
总计		323149	100.000	38727			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1947-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:04:55


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:12:55

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.046	339183	100.000	40612	3093	1.121	--
总计		339183	100.000	40612			

图178 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

178



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1948-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:09:19


实验者: xiechaojun

处理时间 (V2): 2025/03/12 09:12:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.048	338749	100.000	40465	3090	1.118	--
总计		338749	100.000	40465			

图179 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1949-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:13:42


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.050	323372	100.000	38553	3082	1.117	--
总计		323372	100.000	38553			

图180 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

180



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1950-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:18:05

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.050	834124	100.000	99202	3074	1.116	--
总计		834124	100.000	99202			

图181 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

181




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1951-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 16:22:28
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:13:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.052	844490	100.000	100286	3069	1.115	--
总计		844490	100.000	100286			

图182 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1952-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:26:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.054	839618	100.000	99774	3066	1.113	--
总计		839618	100.000	99774			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1953-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-29

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 16:31:14


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.055	843913	100.000	100228	3062	1.111	--
总计		843913	100.000	100228			

图184 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1954-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:35:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.057	844396	100.000	100170	3062	1.109	--
总计		844396	100.000	100170			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1955-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 16:39:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:13:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.058	841440	100.000	99593	3055	1.107	--
总计		841440	100.000	99593			

图186 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

186




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1956-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 16:44:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.058	1282595	100.000	151677	3052	1.104	--
总计		1282595	100.000	151677			

图187 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

187



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1957-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:48:44

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.059	1317366	100.000	155377	3042	1.102	--
总计		1317366	100.000	155377			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1958-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 16:53:07
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:13:25
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1314586	100.000	154691	3026	1.103	--
总计		1314586	100.000	154691			

图189 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1959-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 16:57:30

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:28

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.060	1301555	100.000	152985	3016	1.100	--
总计		1301555	100.000	152985			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1960-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:01:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:31

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1284993	100.000	151590	3036	1.099	--
总计		1284993	100.000	151590			

图191 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1961-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:06:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.063	1315010	100.000	154920	3029	1.096	--
总计		1315010	100.000	154920			

图192 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1962-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 17:10:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:13:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.062	1656400	100.000	195091	3031	1.097	--
总计		1656400	100.000	195091			

图193 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

193



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1963-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:15:00


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1704092	100.000	200348	3026	1.094	--
总计		1704092	100.000	200348			

图194 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1964-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:19:23

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.065	1708616	100.000	200591	3013	1.092	--
总计		1708616	100.000	200591			

图195 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

195



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1965-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:23:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.066	1686263	100.000	197578	3016	1.088	--
总计		1686263	100.000	197578			

图196 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

196




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1966-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 17:28:07
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:13:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.067	1669713	100.000	195118	3008	1.086	--
总计		1669713	100.000	195118			

图197 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1967-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:32:29

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.069	1720618	100.000	201011	3000	1.083	--
总计		1720618	100.000	201011			

图198 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1968-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 17:36:52 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.069	2205115	100.000	257294	2991	1.082	--
总计		2205115	100.000	257294			

图199 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

199

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1969-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:41:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.071	2255832	100.000	263288	2989	1.079	--
总计		2255832	100.000	263288			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1970-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:45:38

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:13:59

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.072	2250757	100.000	262376	2985	1.078	--
总计		2250757	100.000	262376			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1971-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 17:50:01

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.073	2255314	100.000	262238	2976	1.076	--
总计		2255314	100.000	262238			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1972-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 17:54:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:14:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.073	2198184	100.000	255160	2964	1.073	--
总计		2198184	100.000	255160			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1973-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-50

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 17:58:47


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.074	2261267	100.000	262305	2964	1.068	--
总计		2261267	100.000	262305			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1974-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-6

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 18:03:11


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.076	2650278	100.000	306539	2962	1.065	--
总计		2650278	100.000	306539			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1975-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 18:07:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:14:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.077	2675668	100.000	309504	2952	1.064	--
总计		2675668	100.000	309504			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1976-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 18:11:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	2649015	100.000	306855	2960	1.056	--
总计		2649015	100.000	306855			

图207 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

207



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1977-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 18:16:21

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	2673013	100.000	309184	2952	1.054	--
总计		2673013	100.000	309184			

图208 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

208




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1978-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 18:20:44 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	2614616	100.000	302784	2958	1.047	--
总计		2614616	100.000	302784			

图209 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

209

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1979-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-51

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 18:25:07

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.079	2658908	100.000	307559	2948	1.044	--
总计		2658908	100.000	307559			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1980-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-7

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 18:29:30


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.080	2789437	100.000	322426	2947	1.042	--
总计		2789437	100.000	322426			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1981-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-16

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 18:33:53

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	2788345	100.000	321621	2938	1.039	--
总计		2788345	100.000	321621			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1982-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-25

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 18:38:17


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:32

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.082	2786933	100.000	321234	2935	1.038	--
总计		2786933	100.000	321234			

图213 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

213

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1983-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-34

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 18:42:41


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.083	2809547	100.000	322985	2928	1.037	--
总计		2809547	100.000	322985			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1984-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-43

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 18:47:04

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:38

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	2781249	100.000	319133	2924	1.035	--
总计		2781249	100.000	319133			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1985-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 18:51:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.085	2784327	100.000	319005	2912	1.033	--
总计		2784327	100.000	319005			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1986-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 18:55:51

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.086	2842668	100.000	325760	2911	1.030	--
总计		2842668	100.000	325760			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1987-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:00:14

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.086	2858485	100.000	327506	2908	1.025	--
总计		2858485	100.000	327506			

图218 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱

自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片2

供试品溶液-1

218



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1988-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:04:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:49

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.087	2844085	100.000	325546	2900	1.023	--
总计		2844085	100.000	325546			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1989-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:09:01


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:52

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.088	2855940	100.000	326352	2892	1.019	--
总计		2855940	100.000	326352			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1990-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-44

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:13:24

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.088	2849245	100.000	325205	2883	1.017	--
总计		2849245	100.000	325205			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1991-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-53

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:17:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:14:57

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.088	2859337	100.000	326075	2878	1.013	--
总计		2859337	100.000	326075			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1992-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 19:22:10

处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:15:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.079	2959555	100.000	330551	2743	1.014	--
总计		2959555	100.000	330551			

图223 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1993-2 - zzp-2023011011p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 2-27

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 19:26:34


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:15:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	2962885	100.000	330465	2740	1.013	--
总计		2962885	100.000	330465			

图224 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011011批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1994-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:30:56


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂

225

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1995-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 19:35:19

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.077	2962346	100.000	329561	2727	1.007	--
总计		2962346	100.000	329561			

图226 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1996-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:39:41


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.074	2960619	100.000	329451	2716	1.003	--
总计		2960619	100.000	329451			

图227 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1997-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 19:44:02

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.071	2962826	100.000	329754	2708	1.002	--
总计		2962826	100.000	329754			

图228 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1998-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:48:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:17

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.069	2960137	100.000	329151	2703	1.000	--
总计		2960137	100.000	329151			

图229 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-1999-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 19:52:46

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.068	2957368	100.000	328053	2691	0.999	--
总计		2957368	100.000	328053			

图230 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2000-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 19:57:07

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:22

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.077	279910	100.000	31755	2823	0.998	--
总计		279910	100.000	31755			

图231 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2001-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:01:28


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:25

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.077	289727	100.000	32702	2787	0.997	--
总计		289727	100.000	32702			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2002-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:05:50


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.078	272696	100.000	30624	2764	0.998	--
总计		272696	100.000	30624			

图233 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2003-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:10:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	295673	100.000	33127	2747	0.995	--
总计		295673	100.000	33127			

图234 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

234




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2004-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 20:14:33 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.081	309440	100.000	34560	2729	0.994	--
总计		309440	100.000	34560			

图235 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

235



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2005-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:18:55


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:36

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.084	310610	100.000	34578	2724	0.994	--
总计		310610	100.000	34578			

图236 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

236



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2006-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:23:16


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:39

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.087	703656	100.000	78131	2710	0.994	--
总计		703656	100.000	78131			

图237 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

237



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2007-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-11

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/11 20:27:37

处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.087	772257	100.000	85734	2709	0.992	--
总计		772257	100.000	85734			

图238 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

238




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2008-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 20:31:58
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:15:44
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.089	711576	100.000	78851	2704	0.990	--
总计		711576	100.000	78851			

图239 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2009-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:36:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:47

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	738391	100.000	81609	2693	0.988	--
总计		738391	100.000	81609			

图240 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

240

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2010-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:40:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.091	757592	100.000	83611	2692	0.986	--
总计		757592	100.000	83611			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2011-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:45:00


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:53

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.093	755058	100.000	83275	2693	0.981	--
总计		755058	100.000	83275			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2012-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 20:49:21
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:15:56
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.093	1132185	100.000	124610	2682	0.982	--
总计		1132185	100.000	124610			

图243 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2013-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 20:53:43

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:15:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.095	1192965	100.000	131238	2675	0.979	--
总计		1192965	100.000	131238			

图244 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2014-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21 版本号: 6.115
进样体积: 5 μ l 实验者: xiechaojun
进样时间:2025/03/11 20:58:04 处理者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:16:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.096	1151013	100.000	126476	2667	0.978	--
总计		1151013	100.000	126476			

图245 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

245

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2015-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:02:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.096	1163032	100.000	127850	2669	0.975	--
总计		1163032	100.000	127850			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2016-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:06:45


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:06

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	1197188	100.000	131564	2670	0.975	--
总计		1197188	100.000	131564			

图247 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

247

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2017-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:11:06

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.098	1169677	100.000	128438	2669	0.975	--
总计		1169677	100.000	128438			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2018-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-4

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 21:15:27


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.098	1488430	100.000	163159	2659	0.974	--
总计		1488430	100.000	163159			

图249 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

249



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2019-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:19:48

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.098	1544922	100.000	169351	2660	0.972	--
总计		1544922	100.000	169351			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2020-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:24:09

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.098	1520578	100.000	166594	2658	0.971	--
总计		1520578	100.000	166594			

图251 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

251



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2021-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:28:30


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:20

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	1538199	100.000	168340	2654	0.971	--
总计		1538199	100.000	168340			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2022-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:32:50


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	1576737	100.000	172237	2647	0.970	--
总计		1576737	100.000	172237			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2023-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:37:11

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	1525603	100.000	166179	2640	0.969	--
总计		1525603	100.000	166179			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2024-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 21:41:33
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:16:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2054698	100.000	223445	2627	0.968	--
总计		2054698	100.000	223445			

图255 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2025-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 21:45:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:16:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	2097877	100.000	228704	2641	0.964	--
总计		2097877	100.000	228704			

图256 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

256



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2026-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:50:15

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:34

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.103	2093536	100.000	228061	2633	0.964	--
总计		2093536	100.000	228061			

图257 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

257



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2027-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 21:54:36

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:37

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	2080991	100.000	226807	2634	0.961	--
总计		2080991	100.000	226807			

图258 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

258

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2028-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-41

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 21:58:57


处理者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	2140936	100.000	232822	2621	0.960	--
总计		2140936	100.000	232822			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2029-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:03:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:43

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	2060760	100.000	223367	2603	0.960	--
总计		2060760	100.000	223367			

图260 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

260



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2030-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-6

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:07:39

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:45

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	2548395	100.000	276236	2602	0.959	--
总计		2548395	100.000	276236			

图261 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

261



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2031-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-15

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:11:59

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	2597462	100.000	280915	2591	0.957	--
总计		2597462	100.000	280915			

图262 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

262



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2032-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:16:19

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.105	2589754	100.000	279873	2584	0.957	--
总计		2589754	100.000	279873			

图263 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

263




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2033-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 22:20:39 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:16:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	2556420	100.000	275894	2576	0.956	--
总计		2556420	100.000	275894			

图264 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

264




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2034-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 22:25:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:16:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	2585243	100.000	278608	2571	0.955	--
总计		2585243	100.000	278608			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2035-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 22:29:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:16:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	2551629	100.000	274317	2556	0.955	--
总计		2551629	100.000	274317			

图266 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

266




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2036-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/11 22:33:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:17:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.106	2753325	100.000	295680	2550	0.953	--
总计		2753325	100.000	295680			

图267 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

267



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2037-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-16

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun

进样时间:2025/03/11 22:38:03


处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:17:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2784095	100.000	298492	2540	0.952	--
总计		2784095	100.000	298492			

图268 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

268




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2038-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/11 22:42:24
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:17:08
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2777183	100.000	297380	2534	0.950	--
总计		2777183	100.000	297380			

图269 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2039-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:46:45

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	2737973	100.000	292493	2523	0.949	--
总计		2737973	100.000	292493			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2040-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-43

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 22:51:06

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.108	2772579	100.000	295533	2516	0.947	--
总计		2772579	100.000	295533			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2041-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:55:26

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:16

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	2755263	100.000	293223	2511	0.945	--
总计		2755263	100.000	293223			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2042-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 22:59:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:19

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.110	2846055	100.000	302779	2506	0.944	--
总计		2846055	100.000	302779			

图273 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱

自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片1

供试品溶液-1

273



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2043-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-17

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:04:08

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:21

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	2862185	100.000	304514	2502	0.943	--
总计		2862185	100.000	304514			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2044-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:08:30


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:24

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	2865801	100.000	304444	2490	0.942	--
总计		2865801	100.000	304444			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2045-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-35

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:12:52

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:27

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	2836523	100.000	300968	2486	0.942	--
总计		2836523	100.000	300968			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2046-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-44

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:17:13

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:30

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	2850880	100.000	302021	2474	0.940	--
总计		2850880	100.000	302021			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2047-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:21:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:33

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	2834587	100.000	299956	2466	0.940	--
总计		2834587	100.000	299956			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2048-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:25:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	2952914	100.000	305861	2348	0.948	--
总计		2952914	100.000	305861			

图279 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

279

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2049-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 23:30:18

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.101	2952759	100.000	305048	2341	0.947	--
总计		2952759	100.000	305048			

图280 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2050-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-rj.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-9

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/11 23:34:41


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:41

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图281 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
溶剂

281

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2051-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 23:39:04

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	2947992	100.000	306014	2347	0.945	--
总计		2947992	100.000	306014			

图282 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2052-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 23:43:27

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.095	2954494	100.000	306477	2340	0.944	--
总计		2954494	100.000	306477			

图283 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2053-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 23:47:50

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min


波长: 256nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.093	2953011	100.000	306120	2336	0.944	--
总计		2953011	100.000	306120			

图284 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2054-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 23:52:13

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.090	2952273	100.000	305726	2322	0.946	--
总计		2952273	100.000	305726			

图285 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

285



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2055-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/11 23:56:36

处理时间(V2): 2025/03/12 09:17:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.089	2950385	100.000	305776	2317	0.945	--
总计		2950385	100.000	305776			

图286 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2056-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-1

版本号: 6.115

进样体积: 5 μ l

实验者: xiechaojun


进样时间:2025/03/12 00:00:57

处理者: xiechaojun

处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:17:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.098	284304	100.000	30002	2408	0.941	--
总计		284304	100.000	30002			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2057-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:05:19


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.097	283445	100.000	29690	2371	0.943	--
总计		283445	100.000	29690			

图288 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

288

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2058-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:09:41


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:03

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.099	307761	100.000	32094	2346	0.941	--
总计		307761	100.000	32094			

图289 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2059-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:14:03


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:05

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.102	275396	100.000	28570	2327	0.939	--
总计		275396	100.000	28570			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2060-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:18:25


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.104	299715	100.000	31065	2314	0.937	--
总计		299715	100.000	31065			

图291 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

291



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2061-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:22:47


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:11

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.107	301937	100.000	31165	2301	0.936	--
总计		301937	100.000	31165			

图292 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

292

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2062-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:27:09


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.109	731741	100.000	75159	2289	0.935	--
总计		731741	100.000	75159			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2063-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 00:31:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:18:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.111	722680	100.000	74259	2286	0.932	--
总计		722680	100.000	74259			

图294 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

294




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2064-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 00:35:53 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.112	751830	100.000	77092	2274	0.930	--
总计		751830	100.000	77092			

图295 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

295



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2065-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 00:40:15


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:23

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.113	707496	100.000	72519	2272	0.928	--
总计		707496	100.000	72519			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2066-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 00:44:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:18:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.114	758440	100.000	77837	2280	0.925	--
总计		758440	100.000	77837			

图297 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

297




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2067-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 00:48:59 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.115	748438	100.000	76654	2269	0.923	--
总计		748438	100.000	76654			

图298 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

298




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2068-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 00:53:21 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.116	1152035	100.000	118017	2271	0.920	--
总计		1152035	100.000	118017			

图299 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

299




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2069-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 00:57:43
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:18:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1154062	100.000	118012	2264	0.918	--
总计		1154062	100.000	118012			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2070-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 01:02:05
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:18:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.117	1179001	100.000	120275	2255	0.917	--
总计		1179001	100.000	120275			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2071-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 01:06:27
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:18:39
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1136205	100.000	115840	2246	0.916	--
总计		1136205	100.000	115840			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2072-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:10:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:42

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.119	1173995	100.000	119860	2255	0.915	--
总计		1173995	100.000	119860			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2073-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 01:15:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.120	1178381	100.000	120178	2248	0.913	--
总计		1178381	100.000	120178			

图304 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

304



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2074-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:19:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:48

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	1513404	100.000	154149	2238	0.913	--
总计		1513404	100.000	154149			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2075-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:23:56

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:50

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	1522120	100.000	154651	2227	0.912	--
总计		1522120	100.000	154651			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2076-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 01:28:18
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:18:53
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.122	1545982	100.000	156926	2220	0.910	--
总计		1545982	100.000	156926			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2077-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:32:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:56

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1502856	100.000	152220	2214	0.909	--
总计		1502856	100.000	152220			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2078-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:37:03

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:18:58

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.124	1530917	100.000	154677	2202	0.908	--
总计		1530917	100.000	154677			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2079-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-20min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:41:25


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:01

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	1550845	100.000	156342	2191	0.907	--
总计		1550845	100.000	156342			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2080-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:45:47

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:04

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.125	2063929	100.000	207660	2180	0.905	--
总计		2063929	100.000	207660			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2081-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:50:10

实验者: xiechaojun


处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:07

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	2085101	100.000	209245	2172	0.904	--
总计		2085101	100.000	209245			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30℃

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2082-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 5 μl

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 01:54:33

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:09

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.126	2091553	100.000	209899	2170	0.903	--
总计		2091553	100.000	209899			

图313 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

313




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2083-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 01:58:56
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:12
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	2070651	100.000	207475	2158	0.903	--
总计		2070651	100.000	207475			

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2084-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:03:18

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:15

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.127	2073031	100.000	207146	2141	0.903	--
总计		2073031	100.000	207146			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2085-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:07:41

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:18

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	2103817	100.000	210083	2133	0.902	--
总计		2103817	100.000	210083			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2086-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 02:12:04
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2557430	100.000	254711	2117	0.901	--
总计		2557430	100.000	254711			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m) 流速: 1.0ml/min
柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 256nm
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2087-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 5 μ l 版本号: 6.115
进样时间:2025/03/12 02:16:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2561125	100.000	254671	2106	0.900	--
总计		2561125	100.000	254671			

图318 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

318



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2088-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-24

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:20:49

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:26

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2558867	100.000	254199	2102	0.899	--
总计		2558867	100.000	254199			

图319 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

319



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2089-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-33

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:25:12

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:29

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2546276	100.000	252472	2090	0.898	--
总计		2546276	100.000	252472			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2090-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P5.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-42

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:29:35

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:32

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2570820	100.000	254457	2080	0.896	--
总计		2570820	100.000	254457			

图321 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

321

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2091-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-45min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-51

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:33:58

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:35

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2553490	100.000	253161	2084	0.895	--
总计		2553490	100.000	253161			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2092-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P1.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 02:38:21
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:37
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2751507	100.000	272339	2075	0.894	--
总计		2751507	100.000	272339			

图323 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2093-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 02:42:45
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:40
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2745070	100.000	271206	2063	0.893	--
总计		2745070	100.000	271206			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2094-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P3.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 02:47:08
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	2752010	100.000	270125	2034	0.890	--
总计		2752010	100.000	270125			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2095-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P4.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-34

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 02:51:31

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:46

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2760683	100.000	270670	2026	0.889	--
总计		2760683	100.000	270670			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2096-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P5.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 02:55:54
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:49
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.128	2752877	100.000	268920	2013	0.888	--
总计		2752877	100.000	268920			



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2097-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-60min-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-52

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:00:17

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:51

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.129	2759944	100.000	269066	2003	0.887	--
总计		2759944	100.000	269066			

图328 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

328



938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2098-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-8

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:04:40

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:19:54

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2851113	100.000	277725	1996	0.887	--
总计		2851113	100.000	277725			




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2099-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 5 μl
进样时间:2025/03/12 03:09:03
处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:19:57
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
波长: 256nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2836664	100.000	276250	1993	0.887	--
总计		2836664	100.000	276250			

图330 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2100-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-26

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:13:27

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:20:00

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2838418	100.000	276283	1991	0.886	--
总计		2838418	100.000	276283			

图331 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱

自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片3

供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2101-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-35
 进样体积: 5 μl
 进样时间:2025/03/12 03:17:51
 处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:20:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
 波长: 256nm
 版本号: 6.115
 实验者: xiechaojun
 处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.130	2850173	100.000	277026	1979	0.886	--
总计		2850173	100.000	277026			

图332 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




938

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2102-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-44
 进样体积: 5 μl
 进样时间:2025/03/12 03:22:14
 处理时间 (V2) : 2025/03/12 09:20:05
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min
 波长: 256nm
 版本号: 6.115
 实验者: xiechaojun
 处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.131	2845174	100.000	275924	1969	0.886	--
总计		2845174	100.000	275924			

图333 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2103-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-53

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:26:37

实验者: xiechaojun


处理时间(V2): 2025/03/12 09:20:08

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.132	2832091	100.000	274353	1963	0.885	--
总计		2832091	100.000	274353			

图334 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱

自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转-极限转速-片6

供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2104-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

进样时间:2025/03/12 03:31:00

处理时间(V2): 2025/03/12 09:20:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

流速: 1.0ml/min

波长: 256nm


版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.121	2928607	100.000	280677	1930	0.889	--
总计		2928607	100.000	280677			

图335 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C8(50*4.6mm,3 μ m)

流速: 1.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 256nm

数据文件名: RC\$938 - 0-236/26-2105-2 - zzp-2023011111p-zj24y-rcqx-pH1.0+0.5tw80jz-2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$938 - 938-rcqx-FX275.lcm

批处理文件名: RC\$938 - 938-20250311-FX275.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 5 μ l

版本号: 6.115

进样时间:2025/03/12 03:35:24


实验者: xiechaojun

处理时间(V2): 2025/03/12 09:20:14

处理者: xiechaojun

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 256nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	2925167	100.000	279527	1918	0.888	--
总计		2925167	100.000	279527			

图336 塞来昔布片溶出曲线测定中间条件24月HPLC图谱
自制品-2023011111批-pH1.0(内含0.5%Tween80)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2