




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-1-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:38:42 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:39:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-2-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:42:06 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:39:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47427	100.000	6600	1621	1.009	--
总计		47427	100.000	6600			

图2 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-3-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:45:29 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:39:56 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.906	46996	100.000	6587	1635	1.017	--
总计		46996	100.000	6587			

图3 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-4-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:48:53 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:39:59 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47306	100.000	6604	1625	1.019	--
总计		47306	100.000	6604			

图4 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-5-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:52:19 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47054	100.000	6604	1640	1.024	--
总计		47054	100.000	6604			

图5 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-6-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:55:42 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47071	100.000	6599	1641	1.022	--
总计		47071	100.000	6599			

图6 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-7-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 13:59:05 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	19006	100.000	3161	2704	1.289	--
总计		19006	100.000	3161			

图7 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-8-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:02:29 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:10 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	18570	100.000	3113	2758	1.377	--
总计		18570	100.000	3113			

图8 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-9-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:05:52 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	20134	100.000	3357	2694	1.341	--
总计		20134	100.000	3357			

图9 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-10-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:09:16 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	16066	100.000	2778	2701	1.052	--
总计		16066	100.000	2778			

图10 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-11-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:12:40 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	15084	100.000	2488	2699	1.396	--
总计		15084	100.000	2488			

图11 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-12-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:16:02 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	18766	100.000	3121	2713	1.389	--
总计		18766	100.000	3121			

图12 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-13-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:19:25 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	28223	100.000	4903	2727	1.042	--
总计		28223	100.000	4903			

图13 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-14-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:22:48 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:26 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	28376	100.000	4920	2741	1.043	--
总计		28376	100.000	4920			

图14 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-15-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:26:12 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	29393	100.000	5086	2722	1.030	--
总计		29393	100.000	5086			

图15 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-16-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:29:35 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	26573	100.000	4613	2725	1.017	--
总计		26573	100.000	4613			

图16 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-17-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:32:59 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	25669	100.000	4418	2735	1.052	--
总计		25669	100.000	4418			

图17 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-18-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:36:21 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	28459	100.000	4904	2718	1.046	--
总计		28459	100.000	4904			

图18 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-19-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 14:39:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:40:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	33278	100.000	5763	2722	1.027	--
总计		33278	100.000	5763			

图19 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-20-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:43:09 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	32996	100.000	5758	2737	1.029	--
总计		32996	100.000	5758			

图20 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-21-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:46:32 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	33957	100.000	5898	2720	1.015	--
总计		33957	100.000	5898			

图21 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-22-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:49:56 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:48 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	32230	100.000	5614	2718	1.020	--
总计		32230	100.000	5614			

图22 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-23-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 14:53:19 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:50 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	31706	100.000	5528	2712	1.028	--
总计		31706	100.000	5528			

图23 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-24-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 14:56:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:40:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	33762	100.000	5877	2697	1.028	--
总计		33762	100.000	5877			

图24 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-25-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:00:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:40:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	35935	100.000	6278	2717	1.017	--
总计		35935	100.000	6278			

图25 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-26-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:03:30 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:40:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	35919	100.000	6303	2717	1.022	--
总计		35919	100.000	6303			

图26 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-27-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:06:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	36689	100.000	6431	2727	1.020	--
总计		36689	100.000	6431			

图27 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-28-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:10:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	36043	100.000	6295	2713	1.020	--
总计		36043	100.000	6295			

图28 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-29-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:13:41 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	35112	100.000	6184	2718	1.025	--
总计		35112	100.000	6184			

图29 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-30-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:17:03 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	36794	100.000	6424	2713	1.024	--
总计		36794	100.000	6424			

图30 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-31-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:20:26 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	38839	100.000	6793	2710	1.027	--
总计		38839	100.000	6793			

图31 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-32-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:23:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	39052	100.000	6848	2721	1.016	--
总计		39052	100.000	6848			

图32 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-33-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:27:13 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	40148	100.000	7022	2723	1.024	--
总计		40148	100.000	7022			

图33 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-34-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:30:37 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:19 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	39367	100.000	6894	2713	1.022	--
总计		39367	100.000	6894			

图34 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-35-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:34:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	38937	100.000	6851	2723	1.020	--
总计		38937	100.000	6851			

图35 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-36-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:37:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	40076	100.000	7015	2708	1.023	--
总计		40076	100.000	7015			

图36 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-37-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:40:48 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	41319	100.000	7231	2723	1.019	--
总计		41319	100.000	7231			

图37 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-38-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-15
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:44:10 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:30 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	41719	100.000	7307	2734	1.021	--
总计		41719	100.000	7307			

图38 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-39-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-24
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:47:33 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	42044	100.000	7352	2723	1.014	--
总计		42044	100.000	7352			

图39 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-40-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:50:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	41781	100.000	7346	2749	1.028	--
总计		41781	100.000	7346			

图40 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-41-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 15:54:19 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	42228	100.000	7379	2715	1.028	--
总计		42228	100.000	7379			

图41 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-42-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 15:57:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	42615	100.000	7470	2712	1.026	--
总计		42615	100.000	7470			

图42 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-43-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 16:01:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	41965	100.000	7351	2728	1.022	--
总计		41965	100.000	7351			

图43 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-44-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:04:29 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:46 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	42778	100.000	7488	2717	1.022	--
总计		42778	100.000	7488			

图44 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-45-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-25
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:07:51 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	43144	100.000	7569	2727	1.021	--
总计		43144	100.000	7569			

图45 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-46-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:11:15 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:51 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	42966	100.000	7542	2723	1.024	--
总计		42966	100.000	7542			

图46 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-47-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:14:37 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:54 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	43589	100.000	7626	2722	1.021	--
总计		43589	100.000	7626			

图47 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-48-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-52
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:17:59 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:41:57 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	42901	100.000	7517	2733	1.026	--
总计		42901	100.000	7517			

图48 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-49-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 16:21:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:41:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	44363	100.000	7776	2720	1.025	--
总计		44363	100.000	7776			

图49 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-50-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 16:24:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:42:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	44753	100.000	7853	2726	1.024	--
总计		44753	100.000	7853			

图50 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-51-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-26
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:28:11 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	46098	100.000	8099	2712	1.023	--
总计		46098	100.000	8099			

图51 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-52-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 16:31:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:42:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	45220	100.000	7923	2715	1.032	--
总计		45220	100.000	7923			

图52 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-53-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-44
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:35:00 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	45293	100.000	7956	2727	1.023	--
总计		45293	100.000	7956			

图53 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-54-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-53
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:38:23 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	45352	100.000	7952	2723	1.015	--
总计		45352	100.000	7952			

图54 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-55-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:41:48 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	47743	100.000	6694	1632	1.035	--
总计		47743	100.000	6694			

图55 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-56-2 - zzp-25030601p-rcqx-jf50z-shuijz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:45:11 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:19 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.908	47687	100.000	6707	1640	1.034	--
总计		47687	100.000	6707			

图56 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030602批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-57-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:48:35 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-58-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:52:02 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47580	100.000	6649	1629	1.031	--
总计		47580	100.000	6649			

图58 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-59-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:55:26 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47244	100.000	6630	1634	1.035	--
总计		47244	100.000	6630			

图59 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-60-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 16:58:51 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47178	100.000	6620	1632	1.034	--
总计		47178	100.000	6620			

图60 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-61-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:02:16 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47325	100.000	6621	1626	1.035	--
总计		47325	100.000	6621			

图61 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-62-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:05:40 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.907	47146	100.000	6622	1637	1.032	--
总计		47146	100.000	6622			

图62 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-63-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:09:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:42:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	16696	100.000	2781	2723	1.349	--
总计		16696	100.000	2781			

图63 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-64-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:12:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:42:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	15673	100.000	2677	2700	1.128	--
总计		15673	100.000	2677			

图64 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-65-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:15:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:42:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	23183	100.000	3985	2708	1.072	--
总计		23183	100.000	3985			

图65 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-66-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:19:16 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	22028	100.000	3792	2730	1.079	--
总计		22028	100.000	3792			

图66 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-67-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:22:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:42:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	24973	100.000	4299	2708	1.059	--
总计		24973	100.000	4299			

图67 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-68-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:26:03 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:50 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	24189	100.000	4087	2696	1.170	--
总计		24189	100.000	4087			

图68 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-69-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:29:27 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:53 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	28972	100.000	4982	2707	1.058	--
总计		28972	100.000	4982			

图69 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-70-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:32:51 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	27564	100.000	4771	2712	1.050	--
总计		27564	100.000	4771			

图70 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-71-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-20
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:36:15 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:42:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	32504	100.000	5620	2711	1.042	--
总计		32504	100.000	5620			

图71 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-72-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-29
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:39:39 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:01 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	31237	100.000	5479	2721	1.043	--
总计		31237	100.000	5479			

图72 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-73-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 17:43:04 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	34586	100.000	5986	2714	1.041	--
总计		34586	100.000	5986			

图73 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-74-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:46:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	33160	100.000	5766	2724	1.043	--
总计		33160	100.000	5766			

图74 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-75-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:49:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	35281	100.000	6155	2718	1.033	--
总计		35281	100.000	6155			

图75 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-76-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:53:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	33793	100.000	5924	2740	1.044	--
总计		33793	100.000	5924			

图76 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-77-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 17:56:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	36150	100.000	6342	2723	1.036	--
总计		36150	100.000	6342			

图77 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-78-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:00:04 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:17 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	36065	100.000	6266	2715	1.044	--
总计		36065	100.000	6266			

图78 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-79-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:03:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	37575	100.000	6569	2714	1.037	--
总计		37575	100.000	6569			

图79 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-80-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:06:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	37299	100.000	6489	2709	1.041	--
总计		37299	100.000	6489			

图80 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-81-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:10:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.944	39356	100.000	6822	2702	1.039	--
总计		39356	100.000	6822			

图81 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-82-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:13:44 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	36791	100.000	6409	2721	1.039	--
总计		36791	100.000	6409			

图82 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-83-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:17:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	38243	100.000	6691	2731	1.031	--
总计		38243	100.000	6691			

图83 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-84-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:21:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	38319	100.000	6655	2716	1.030	--
总计		38319	100.000	6655			

图84 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-85-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:25:06 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:35 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	39524	100.000	6882	2709	1.039	--
总计		39524	100.000	6882			

图85 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-86-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:28:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	39023	100.000	6818	2714	1.037	--
总计		39023	100.000	6818			

图86 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-87-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-5
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:31:55 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:41 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	42652	100.000	7426	2706	1.041	--
总计		42652	100.000	7426			

图87 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-88-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-14
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:35:19 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:44 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	40181	100.000	7001	2704	1.029	--
总计		40181	100.000	7001			

图88 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-89-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:38:44 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:47 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	40365	100.000	7076	2733	1.029	--
总计		40365	100.000	7076			

图89 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-90-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 18:42:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:43:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	40868	100.000	7131	2709	1.038	--
总计		40868	100.000	7131			

图90 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-91-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:45:33 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	41726	100.000	7293	2719	1.033	--
总计		41726	100.000	7293			

图91 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-92-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-50
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:48:57 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	41378	100.000	7241	2707	1.039	--
总计		41378	100.000	7241			

图92 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-93-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:52:21 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:43:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	45182	100.000	7935	2717	1.037	--
总计		45182	100.000	7935			

图93 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-94-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-15
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:55:46 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:01 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	42130	100.000	7386	2721	1.031	--
总计		42130	100.000	7386			

图94 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-95-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 18:59:10 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	41796	100.000	7320	2715	1.025	--
总计		41796	100.000	7320			

图95 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-96-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-33
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:02:35 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	41948	100.000	7354	2708	1.029	--
总计		41948	100.000	7354			

图96 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-97-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:05:59 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	43285	100.000	7568	2712	1.035	--
总计		43285	100.000	7568			

图97 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-98-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-51
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:09:23 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	42742	100.000	7494	2710	1.035	--
总计		42742	100.000	7494			

图98 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-99-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-7
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:12:47 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	46377	100.000	8121	2713	1.033	--
总计		46377	100.000	8121			

图99 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-100-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-16
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:16:13 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:19 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	43347	100.000	7564	2719	1.033	--
总计		43347	100.000	7564			

图100 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-101-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-25
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:19:37 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	42471	100.000	7434	2700	1.030	--
总计		42471	100.000	7434			

图101 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-102-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-34
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:23:01 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	41974	100.000	7374	2727	1.033	--
总计		41974	100.000	7374			

图102 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-103-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-43
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:26:26 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:26 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	43448	100.000	7585	2699	1.036	--
总计		43448	100.000	7585			

图103 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-104-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-52
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:29:51 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	43464	100.000	7620	2725	1.032	--
总计		43464	100.000	7620			

图104 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-105-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p1-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:33:16 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	47248	100.000	8317	2717	1.028	--
总计		47248	100.000	8317			

图105 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-106-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p2-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-17
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:36:41 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	45289	100.000	7961	2721	1.030	--
总计		45289	100.000	7961			

图106 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-107-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p3-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-26
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:40:06 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	44719	100.000	7856	2728	1.032	--
总计		44719	100.000	7856			

图107 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-108-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p4-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-35
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:43:32 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	44051	100.000	7755	2722	1.035	--
总计		44051	100.000	7755			

图108 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-109-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p5-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-44
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:46:57 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	44935	100.000	7883	2716	1.033	--
总计		44935	100.000	7883			

图109 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-110-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-p6-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:50:22 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	44967	100.000	7880	2708	1.036	--
总计		44967	100.000	7880			

图110 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-1/11-111-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/11 19:53:47 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/12 10:44:48 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	47483	100.000	6655	1620	1.039	--
总计		47483	100.000	6655			

图111 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-1/11-112-2 - zzp-25030602p-rcqx-jf50z-shuijz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250311-FX260.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/11 19:57:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/12 10:44:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.901	47454	100.000	6649	1633	1.045	--
总计		47454	100.000	6649			

图112 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25030601批-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2