




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-275-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 11:26:51 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
溶剂




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-276-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 11:30:14 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:43 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	1173546	178952	100.000	1984	1.326	--
总计		1173546	178952	100.000			

图2 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-277-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:33:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.874	1172402	179249	100.000	1987	1.329	--
总计		1172402	179249	100.000			

图3 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-278-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:37:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	1172798	179739	100.000	1987	1.330	--
总计		1172798	179739	100.000			

图4 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-279-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:40:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.866	1170238	179972	100.000	1998	1.332	--
总计		1170238	179972	100.000			

图5 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-280-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:43:48

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.864	1170081	180481	100.000	2003	1.333	--
总计		1170081	180481	100.000			

图6 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-281-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:47:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:14:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	1266050	195474	100.000	2000	1.333	--
总计		1266050	195474	100.000			

图7 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-390


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-282-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/03/12 11:50:32
处理时间 (V2) : 2025/03/13 09:15:01
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1277428	197576	100.000	1998	1.333	--
总计		1277428	197576	100.000			

图8 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-283-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:53:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	1258714	194365	100.000	2007	1.334	--
总计		1258714	194365	100.000			

图9 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-284-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 11:57:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1302060	203946	100.000	2048	1.328	--
总计		1302060	203946	100.000			

图10 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-285-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:00:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1281878	198708	100.000	2008	1.333	--
总计		1281878	198708	100.000			

图11 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 1.0ml/min

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-286-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/03/12 12:04:00

处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	1278393	198699	100.000	2012	1.333	--
总计		1278393	198699	100.000			

图12 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-287-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:07:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	1273839	198224	100.000	2018	1.333	--
总计		1273839	198224	100.000			

图13 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-288-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:10:44

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	1284704	200241	100.000	2026	1.332	--
总计		1284704	200241	100.000			

图14 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-289-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:14:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:19

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	1271940	198354	100.000	2036	1.334	--
总计		1271940	198354	100.000			

图15 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-290-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:17:28

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1299745	203010	100.000	2031	1.334	--
总计		1299745	203010	100.000			

图16 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-291-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:20:50

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1287584	201439	100.000	2027	1.335	--
总计		1287584	201439	100.000			

图17 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-292-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:24:12

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1281029	200179	100.000	2027	1.333	--
总计		1281029	200179	100.000			

图18 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-293-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:27:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1271761	198898	100.000	2034	1.335	--
总计		1271761	198898	100.000			

图19 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-294-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:30:56

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1278873	199747	100.000	2029	1.333	--
总计		1278873	199747	100.000			

图20 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-295-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:34:18

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1271078	198912	100.000	2033	1.334	--
总计		1271078	198912	100.000			

图21 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-296-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:37:41

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1298202	203169	100.000	2032	1.334	--
总计		1298202	203169	100.000			

图22 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-297-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:41:03

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1288482	201896	100.000	2040	1.335	--
总计		1288482	201896	100.000			

图23 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-298-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:44:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:43

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1235199	193448	100.000	2043	1.336	--
总计		1235199	193448	100.000			

图24 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-299-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:47:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1269321	198469	100.000	2048	1.338	--
总计		1269321	198469	100.000			

图25 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-300-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:51:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1277509	199506	100.000	2045	1.338	--
总计		1277509	199506	100.000			

图26 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-301-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:54:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1265864	198498	100.000	2045	1.337	--
总计		1265864	198498	100.000			

图27 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-302-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 12:57:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1245695	195698	100.000	2046	1.336	--
总计		1245695	195698	100.000			

图28 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-303-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:01:14

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1287753	202468	100.000	2048	1.336	--
总计		1287753	202468	100.000			

图29 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-304-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:04:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:15:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1272803	200419	100.000	2051	1.337	--
总计		1272803	200419	100.000			

图30 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-305-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:07:58

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1265458	199045	100.000	2052	1.337	--
总计		1265458	199045	100.000			

图31 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-306-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:11:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1271862	200041	100.000	2051	1.337	--
总计		1271862	200041	100.000			

图32 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-307-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:14:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1258994	198510	100.000	2057	1.333	--
总计		1258994	198510	100.000			

图33 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-308-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:18:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1291216	204655	100.000	2082	1.334	--
总计		1291216	204655	100.000			

图34 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-309-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:21:28

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1278709	202246	100.000	2073	1.334	--
总计		1278709	202246	100.000			

图35 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-310-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:24:51

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.855	1276159	201343	100.000	2081	1.331	--
总计		1276159	201343	100.000			

图36 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-311-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:28:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.858	1166686	182771	100.000	2071	1.337	--
总计		1166686	182771	100.000			

图37 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-312-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:31:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	1167678	182591	100.000	2051	1.338	--
总计		1167678	182591	100.000			

图38 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-313-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 13:35:02 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:24 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-314-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:38:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1164861	182861	100.000	2072	1.336	--
总计		1164861	182861	100.000			

图40 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-315-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:41:50

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1164176	183625	100.000	2069	1.336	--
总计		1164176	183625	100.000			

图41 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-316-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:45:13

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:32

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.853	1163014	183715	100.000	2086	1.334	--
总计		1163014	183715	100.000			

图42 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-317-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:48:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1167473	184158	100.000	2064	1.335	--
总计		1167473	184158	100.000			

图43 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 1.0ml/min

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-318-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/03/12 13:52:02

处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.859	1163333	182803	100.000	2093	1.335	--
总计		1163333	182803	100.000			

图44 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-319-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:55:26

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:40

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	1271636	199829	100.000	2069	1.336	--
总计		1271636	199829	100.000			

图45 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-320-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 13:58:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:43

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1272599	199670	100.000	2085	1.336	--
总计		1272599	199670	100.000			

图46 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-321-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:02:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1281259	202584	100.000	2079	1.335	--
总计		1281259	202584	100.000			

图47 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-322-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:05:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	1307098	205979	100.000	2077	1.337	--
总计		1307098	205979	100.000			

图48 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-323-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:08:58

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.860	1283060	201232	100.000	2082	1.335	--
总计		1283060	201232	100.000			

图49 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-324-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:12:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1274213	201508	100.000	2080	1.335	--
总计		1274213	201508	100.000			

图50 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-325-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:15:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:57

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1279420	200575	100.000	2070	1.336	--
总计		1279420	200575	100.000			

图51 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-326-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:19:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:16:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.854	1276359	202037	100.000	2097	1.335	--
总计		1276359	202037	100.000			

图52 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-327-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:22:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1287213	202703	100.000	2087	1.337	--
总计		1287213	202703	100.000			

图53 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-328-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:25:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.856	1314805	206930	100.000	2076	1.337	--
总计		1314805	206930	100.000			

图54 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-329-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:29:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:08

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.857	1290352	203531	100.000	2089	1.335	--
总计		1290352	203531	100.000			

图55 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-330-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:32:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	1280665	202717	100.000	2103	1.336	--
总计		1280665	202717	100.000			

图56 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-331-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:36:02

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.852	1276544	201037	100.000	2080	1.336	--
总计		1276544	201037	100.000			

图57 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-332-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:39:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.851	1274271	200795	100.000	2091	1.338	--
总计		1274271	200795	100.000			

图58 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-333-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:42:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1290424	203361	100.000	2085	1.337	--
总计		1290424	203361	100.000			

图59 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-334-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:46:12

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1306140	205621	100.000	2085	1.338	--
总计		1306140	205621	100.000			

图60 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-335-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:49:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1290333	202790	100.000	2072	1.338	--
总计		1290333	202790	100.000			

图61 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-336-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:52:58

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1277097	202654	100.000	2098	1.336	--
总计		1277097	202654	100.000			

图62 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-337-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:56:22

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1271949	201106	100.000	2087	1.337	--
总计		1271949	201106	100.000			

图63 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-338-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 14:59:46

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1265378	200421	100.000	2089	1.336	--
总计		1265378	200421	100.000			

图64 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-339-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:03:08

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1280549	202546	100.000	2090	1.337	--
总计		1280549	202546	100.000			

图65 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-340-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:06:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1311875	207920	100.000	2093	1.337	--
总计		1311875	207920	100.000			

图66 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-341-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:09:57

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1281665	203028	100.000	2089	1.336	--
总计		1281665	203028	100.000			

图67 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-342-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:13:20

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1274128	202475	100.000	2097	1.336	--
总计		1274128	202475	100.000			

图68 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-343-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:16:44

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1267313	200698	100.000	2090	1.337	--
总计		1267313	200698	100.000			

图69 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-344-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:20:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1265171	200526	100.000	2089	1.336	--
总计		1265171	200526	100.000			

图70 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-345-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:23:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1278890	202477	100.000	2087	1.337	--
总计		1278890	202477	100.000			

图71 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-346-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:26:56

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1299106	206586	100.000	2101	1.337	--
总计		1299106	206586	100.000			

图72 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-347-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:30:19

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:17:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1278441	202458	100.000	2088	1.337	--
总计		1278441	202458	100.000			

图73 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-348-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:33:43

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:00

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1274074	201944	100.000	2088	1.336	--
总计		1274074	201944	100.000			

图74 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-349-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:37:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1160958	184154	100.000	2091	1.336	--
总计		1160958	184154	100.000			

图75 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30°C

流速: 1.0ml/min

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-350-2 - cbzj-NPA3080p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/03/12 15:40:31

处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1159167	183514	100.000	2089	1.338	--
总计		1159167	183514	100.000			

图76 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-NPA3080批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-351-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:43:53

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
溶剂



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-352-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:47:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1164221	184396	100.000	2095	1.336	--
总计		1164221	184396	100.000			

图78 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-353-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:50:37

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1163935	184263	100.000	2095	1.337	--
总计		1163935	184263	100.000			

图79 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-354-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:54:00

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1164477	184521	100.000	2097	1.337	--
总计		1164477	184521	100.000			

图80 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-355-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 15:57:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1165216	184568	100.000	2095	1.337	--
总计		1165216	184568	100.000			

图81 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-356-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:00:46

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:23

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1163326	184684	100.000	2099	1.337	--
总计		1163326	184684	100.000			

图82 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-357-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:04:08

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1327539	210114	100.000	2093	1.339	--
总计		1327539	210114	100.000			

图83 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-358-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:07:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1275998	202200	100.000	2090	1.339	--
总计		1275998	202200	100.000			

图84 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-359-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:10:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1231529	195199	100.000	2091	1.339	--
总计		1231529	195199	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-360-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:14:13

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1258722	199506	100.000	2091	1.340	--
总计		1258722	199506	100.000			

图86 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-361-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:17:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1284268	204187	100.000	2104	1.339	--
总计		1284268	204187	100.000			

图87 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-362-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:20:57

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1308814	207788	100.000	2099	1.339	--
总计		1308814	207788	100.000			

图88 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-363-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:24:19

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1324442	210188	100.000	2100	1.338	--
总计		1324442	210188	100.000			

图89 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-364-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:27:40

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1301148	206570	100.000	2101	1.338	--
总计		1301148	206570	100.000			

图90 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-365-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:31:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1271706	202217	100.000	2103	1.338	--
总计		1271706	202217	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-366-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:34:22

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1337359	212207	100.000	2095	1.337	--
总计		1337359	212207	100.000			

图92 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-367-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:37:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:53

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1301572	206627	100.000	2096	1.338	--
总计		1301572	206627	100.000			

图93 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-368-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:41:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1313424	208312	100.000	2094	1.338	--
总计		1313424	208312	100.000			

图94 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-369-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:44:27

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:18:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1328693	210701	100.000	2094	1.338	--
总计		1328693	210701	100.000			

图95 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-370-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:47:50

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1287852	204341	100.000	2097	1.338	--
总计		1287852	204341	100.000			

图96 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-371-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:51:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1283332	203289	100.000	2093	1.337	--
总计		1283332	203289	100.000			

图97 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-372-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:54:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1339398	212798	100.000	2103	1.338	--
总计		1339398	212798	100.000			

图98 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-373-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 16:57:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1299580	206555	100.000	2109	1.338	--
总计		1299580	206555	100.000			

图99 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-374-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:01:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1307972	208339	100.000	2110	1.338	--
总计		1307972	208339	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-375-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:04:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1324337	210359	100.000	2109	1.338	--
总计		1324337	210359	100.000			

图101 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-376-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:07:59

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1285919	204870	100.000	2113	1.337	--
总计		1285919	204870	100.000			

图102 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-377-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:11:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1270474	201678	100.000	2110	1.339	--
总计		1270474	201678	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-378-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:14:42

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1368413	217274	100.000	2101	1.337	--
总计		1368413	217274	100.000			

图104 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-379-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:18:04

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1294762	206282	100.000	2110	1.337	--
总计		1294762	206282	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-380-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:21:25

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1320170	209662	100.000	2104	1.338	--
总计		1320170	209662	100.000			

图106 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-381-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:24:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1338909	212586	100.000	2102	1.337	--
总计		1338909	212586	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-382-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:28:08

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1281053	204104	100.000	2114	1.337	--
总计		1281053	204104	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-383-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:31:29

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:37

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1272413	202820	100.000	2115	1.337	--
总计		1272413	202820	100.000			

图109 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-384-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:34:51

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1323089	210060	100.000	2101	1.338	--
总计		1323089	210060	100.000			

图110 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-385-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:38:12

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1293586	205502	100.000	2105	1.338	--
总计		1293586	205502	100.000			

图111 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-386-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:41:34

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1305194	207495	100.000	2108	1.338	--
总计		1305194	207495	100.000			

图112 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-387-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:44:56

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:47

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1158257	184810	100.000	2120	1.337	--
总计		1158257	184810	100.000			

图113 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-388-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx1-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:48:18

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1161994	184859	100.000	2106	1.337	--
总计		1161994	184859	100.000			

图114 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性1-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-389-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:51:41 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:53 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图115 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
溶剂



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-390-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:55:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1162254	185042	100.000	2109	1.337	--
总计		1162254	185042	100.000			

图116 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-391-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 17:58:28

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:19:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1158850	185127	100.000	2122	1.336	--
总计		1158850	185127	100.000			

图117 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-392-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:01:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1162415	185088	100.000	2115	1.336	--
总计		1162415	185088	100.000			

图118 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-393-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:05:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:03

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1163187	185342	100.000	2113	1.336	--
总计		1163187	185342	100.000			

图119 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-394-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:08:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:06

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1162059	185068	100.000	2115	1.336	--
总计		1162059	185068	100.000			

图120 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-395-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:12:02

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1254480	199582	100.000	2109	1.337	--
总计		1254480	199582	100.000			

图121 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-396-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:15:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1280500	204496	100.000	2124	1.337	--
总计		1280500	204496	100.000			

图122 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-397-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:18:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1262739	201386	100.000	2121	1.338	--
总计		1262739	201386	100.000			

图123 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-398-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:22:09

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1264775	201921	100.000	2125	1.337	--
总计		1264775	201921	100.000			

图124 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-399-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:25:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1315058	210048	100.000	2125	1.337	--
总计		1315058	210048	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-400-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:28:53

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1153453	184089	100.000	2121	1.339	--
总计		1153453	184089	100.000			

图126 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-401-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:32:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1263409	202052	100.000	2130	1.337	--
总计		1263409	202052	100.000			

图127 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-402-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:35:37

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1289188	206209	100.000	2130	1.337	--
总计		1289188	206209	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-403-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:38:59

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1281767	203799	100.000	2115	1.339	--
总计		1281767	203799	100.000			

图129 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-404-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:42:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1283914	204490	100.000	2120	1.338	--
总计		1283914	204490	100.000			

图130 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-405-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:45:44

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1337098	213857	100.000	2131	1.337	--
总计		1337098	213857	100.000			

图131 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-406-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:49:06

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1258794	201281	100.000	2131	1.337	--
总计		1258794	201281	100.000			

图132 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-407-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:52:28

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1263156	201736	100.000	2131	1.338	--
总计		1263156	201736	100.000			

图133 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-408-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:55:51

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1292363	206178	100.000	2128	1.337	--
总计		1292363	206178	100.000			

图134 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-409-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 18:59:14

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:48

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1268045	202203	100.000	2124	1.338	--
总计		1268045	202203	100.000			

图135 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-410-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:02:35

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1277529	204446	100.000	2133	1.337	--
总计		1277529	204446	100.000			

图136 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-411-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:05:58

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:53

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1338499	214077	100.000	2133	1.338	--
总计		1338499	214077	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-412-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:09:20

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:56

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1262499	201925	100.000	2138	1.338	--
总计		1262499	201925	100.000			

图138 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-413-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:12:44

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:20:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1257827	201330	100.000	2137	1.338	--
总计		1257827	201330	100.000			

图139 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-414-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:16:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1292813	205738	100.000	2120	1.339	--
总计		1292813	205738	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-415-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:19:30

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.850	1275716	203007	100.000	2130	1.340	--
总计		1275716	203007	100.000			

图141 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-416-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:22:52

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1278884	203947	100.000	2125	1.338	--
总计		1278884	203947	100.000			

图142 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-417-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:26:15

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1333279	213438	100.000	2139	1.338	--
总计		1333279	213438	100.000			

图143 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-418-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:29:38

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1261118	201798	100.000	2136	1.338	--
总计		1261118	201798	100.000			

图144 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-419-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:33:00

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1256548	201208	100.000	2141	1.337	--
总计		1256548	201208	100.000			

图145 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-420-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:36:24

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1285588	206010	100.000	2141	1.338	--
总计		1285588	206010	100.000			

图146 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-421-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:39:47

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:21

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1267606	203131	100.000	2142	1.338	--
总计		1267606	203131	100.000			

图147 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-422-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:43:10

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:24

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1273462	204038	100.000	2139	1.338	--
总计		1273462	204038	100.000			

图148 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-390


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30°C
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-423-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/03/12 19:46:33
处理时间 (V2) : 2025/03/13 09:21:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.0ml/min
波长: 222nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm							
峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1332632	213034	100.000	2136	1.338	--
总计		1332632	213034	100.000			

图149 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-424-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:49:56

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1260475	202002	100.000	2142	1.337	--
总计		1260475	202002	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-425-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:53:20

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:32

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.849	1160640	185002	100.000	2126	1.340	--
总计		1160640	185002	100.000			

图151 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-426-2 - zzp-2025020821p-rcqx-SHUIjz-jf50z-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 19:56:44

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1156113	185245	100.000	2141	1.339	--
总计		1156113	185245	100.000			

图152 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-水介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-427-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:00:07 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:38 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图153 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
溶剂




QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温:30°C 波长: 222nm
数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-428-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:03:31 实验者: jiangjinwei
处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:40 处理者: jiangjinwei
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1159111	185850	100.000	2144	1.338	--
总计		1159111	185850	100.000			

图154 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-429-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:06:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:43

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1159802	185970	100.000	2145	1.339	--
总计		1159802	185970	100.000			

图155 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-430-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:10:17

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1159953	185875	100.000	2144	1.339	--
总计		1159953	185875	100.000			

图156 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-431-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:13:40

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1160716	185977	100.000	2140	1.338	--
总计		1160716	185977	100.000			

图157 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-432-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:17:03

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.846	1158170	185789	100.000	2147	1.338	--
总计		1158170	185789	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-433-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:20:26

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1311522	204604	100.000	2023	1.338	--
总计		1311522	204604	100.000			

图159 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-434-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:23:48

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:57

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1275333	199389	100.000	2027	1.338	--
总计		1275333	199389	100.000			

图160 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-435-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:27:10

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:21:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1294569	201849	100.000	2030	1.337	--
总计		1294569	201849	100.000			

图161 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-436-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:30:32

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1301893	203408	100.000	2030	1.340	--
总计		1301893	203408	100.000			

图162 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-437-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:33:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:05

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1299353	203324	100.000	2033	1.339	--
总计		1299353	203324	100.000			

图163 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-438-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-5min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:37:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:08

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1322917	207642	100.000	2042	1.340	--
总计		1322917	207642	100.000			

图164 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-439-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:40:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1319756	207335	100.000	2045	1.340	--
总计		1319756	207335	100.000			

图165 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-440-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:44:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1290546	202541	100.000	2042	1.339	--
总计		1290546	202541	100.000			

图166 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-441-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:47:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1313006	206154	100.000	2044	1.339	--
总计		1313006	206154	100.000			

图167 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-442-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:50:45

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:19

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1310080	205690	100.000	2043	1.339	--
总计		1310080	205690	100.000			

图168 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-443-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:54:07

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.843	1309814	204549	100.000	2035	1.340	--
总计		1309814	204549	100.000			

图169 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-444-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-10min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 20:57:29

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:24

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1336272	208547	100.000	2031	1.340	--
总计		1336272	208547	100.000			

图170 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-445-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:00:51

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1321057	206464	100.000	2032	1.339	--
总计		1321057	206464	100.000			

图171 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-446-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:04:14

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1290274	202155	100.000	2038	1.339	--
总计		1290274	202155	100.000			

图172 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-447-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:07:36

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:33

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1316906	205208	100.000	2025	1.339	--
总计		1316906	205208	100.000			

图173 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-448-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:10:59

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:35

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1308824	205465	100.000	2044	1.340	--
总计		1308824	205465	100.000			

图174 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-449-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:14:21

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1306751	205298	100.000	2044	1.339	--
总计		1306751	205298	100.000			

图175 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-450-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-15min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:17:42

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1328921	208803	100.000	2046	1.338	--
总计		1328921	208803	100.000			

图176 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-451-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:21:05

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1318059	205727	100.000	2032	1.339	--
总计		1318059	205727	100.000			

图177 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-452-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:24:26

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1287127	202340	100.000	2046	1.338	--
总计		1287127	202340	100.000			

图178 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-453-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:27:49

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:49

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1309470	205878	100.000	2044	1.339	--
总计		1309470	205878	100.000			

图179 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-454-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:31:11

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1309631	204207	100.000	2029	1.339	--
总计		1309631	204207	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-455-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:34:33

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1306793	205336	100.000	2046	1.339	--
总计		1306793	205336	100.000			

图181 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-456-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-30min-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:37:55

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:22:58

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.840	1327600	208731	100.000	2048	1.339	--
总计		1327600	208731	100.000			

图182 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-457-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:41:16

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:01

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1310766	205963	100.000	2044	1.339	--
总计		1310766	205963	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-458-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:44:39

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1286304	201752	100.000	2042	1.340	--
总计		1286304	201752	100.000			

图184 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-459-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:48:01

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1309057	204862	100.000	2035	1.339	--
总计		1309057	204862	100.000			



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-460-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:51:23

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.843	1306554	203472	100.000	2029	1.339	--
总计		1306554	203472	100.000			

图186 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-461-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:54:46

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.842	1303119	204226	100.000	2043	1.339	--
总计		1303119	204226	100.000			

图187 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-462-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-jxzs-P6.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 21:58:08

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.841	1327718	208099	100.000	2040	1.339	--
总计		1327718	208099	100.000			

图188 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-463-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 22:01:31

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.847	1157650	186042	100.000	2156	1.339	--
总计		1157650	186042	100.000			

图189 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-390

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 1.0ml/min

柱温:30°C

波长: 222nm

数据文件名: RC\$QTL-390 - 30-7/30-464-2 - zzp-2025020821p-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jyx2-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-390 - QTL-390-rcqx-FX279-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-390 - 20250312-rcqx-FX279.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/03/12 22:04:54

实验者: jiangjinwei


处理时间(V2): 2025/03/13 09:23:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 222nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.848	1159159	185811	100.000	2149	1.340	--
总计		1159159	185811	100.000			

图190 洛索洛芬钠细粒剂溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2025020821批-pH6.8介质-均一性2-桨法-50转
对照品溶液-2-2