




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-183-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 15:48:19 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:03:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-184-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 15:51:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	63329	100.000	7547	1618	1.034	--
总计		63329	100.000	7547			

图2 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-185-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 15:55:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	63206	100.000	7550	1608	1.039	--
总计		63206	100.000	7550			

图3 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-186-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 15:58:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	63289	100.000	7544	1617	1.036	--
总计		63289	100.000	7544			

图4 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-187-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:01:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	63043	100.000	7535	1615	1.039	--
总计		63043	100.000	7535			

图5 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-188-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:05:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	63181	100.000	7527	1608	1.039	--
总计		63181	100.000	7527			

图6 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-189-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:08:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	15960	100.000	2516	2979	1.032	--
总计		15960	100.000	2516			

图7 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-190-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:12:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	21798	100.000	3403	2964	1.021	--
总计		21798	100.000	3403			

图8 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-191-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:15:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	20814	100.000	3272	2948	1.024	--
总计		20814	100.000	3272			

图9 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-192-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:18:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	18405	100.000	2872	2956	1.013	--
总计		18405	100.000	2872			

图10 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-193-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:22:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	20930	100.000	3276	2947	1.019	--
总计		20930	100.000	3276			

图11 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-194-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:25:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	21999	100.000	3450	2953	1.014	--
总计		21999	100.000	3450			

图12 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-195-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:28:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	27840	100.000	4360	2973	1.009	--
总计		27840	100.000	4360			

图13 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-196-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:32:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	35044	100.000	5483	2945	1.019	--
总计		35044	100.000	5483			

图14 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-197-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 16:35:45 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:04:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	35152	100.000	5501	2932	1.015	--
总计		35152	100.000	5501			

图15 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-198-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:39:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	32623	100.000	5087	2938	1.020	--
总计		32623	100.000	5087			

图16 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-199-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:42:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	34912	100.000	5452	2951	1.012	--
总计		34912	100.000	5452			

图17 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-200-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:45:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	35963	100.000	5627	2967	1.016	--
总计		35963	100.000	5627			

图18 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-201-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 16:49:16 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:04:51 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	35992	100.000	5598	2974	1.017	--
总计		35992	100.000	5598			

图19 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-202-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:52:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	42718	100.000	6687	2948	1.014	--
总计		42718	100.000	6687			

图20 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-203-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:56:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	43291	100.000	6754	2952	1.018	--
总计		43291	100.000	6754			

图21 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-204-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 16:59:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:04:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	40451	100.000	6323	2966	1.014	--
总计		40451	100.000	6323			

图22 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-205-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:02:47 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:02 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	43018	100.000	6716	2953	1.011	--
总计		43018	100.000	6716			

图23 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-206-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:06:10 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	43828	100.000	6828	2952	1.011	--
总计		43828	100.000	6828			

图24 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-207-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:09:34 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	39906	100.000	6239	2975	1.010	--
总计		39906	100.000	6239			

图25 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-208-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:12:57 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	47521	100.000	7387	2946	1.011	--
总计		47521	100.000	7387			

图26 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-209-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:16:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	48212	100.000	7516	2946	1.007	--
总计		48212	100.000	7516			

图27 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-210-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-31
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:19:42 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:17 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	45020	100.000	7027	2962	1.011	--
总计		45020	100.000	7027			

图28 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-211-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:23:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	48293	100.000	7480	2941	1.003	--
总计		48293	100.000	7480			

图29 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-212-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:26:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	49250	100.000	7639	2943	1.006	--
总计		49250	100.000	7639			

图30 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-213-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:29:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	46149	100.000	7213	2963	1.011	--
总计		46149	100.000	7213			

图31 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-214-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:33:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	52145	100.000	8143	2961	1.008	--
总计		52145	100.000	8143			

图32 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-215-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:36:37 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:31 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	54099	100.000	8414	2956	1.013	--
总计		54099	100.000	8414			

图33 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-216-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:39:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	51143	100.000	7991	2949	1.009	--
总计		51143	100.000	7991			

图34 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-217-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:43:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	54385	100.000	8464	2957	1.014	--
总计		54385	100.000	8464			

图35 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-218-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:46:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	54878	100.000	8550	2963	1.009	--
总计		54878	100.000	8550			

图36 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-219-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 17:50:09 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:05:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	52092	100.000	8110	2948	1.009	--
总计		52092	100.000	8110			

图37 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-220-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:53:33 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	57576	100.000	8968	2958	1.017	--
总计		57576	100.000	8968			

图38 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-221-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 17:56:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	58345	100.000	9085	2948	1.011	--
总计		58345	100.000	9085			

图39 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-222-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:00:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	56638	100.000	8829	2954	1.016	--
总计		56638	100.000	8829			

图40 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-223-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:03:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	59204	100.000	9231	2957	1.010	--
总计		59204	100.000	9231			

图41 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-224-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:07:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	59832	100.000	9317	2942	1.009	--
总计		59832	100.000	9317			

图42 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-225-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:10:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:05:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	55569	100.000	8676	2945	1.016	--
总计		55569	100.000	8676			

图43 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-226-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:13:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	60023	100.000	9372	2957	1.018	--
总计		60023	100.000	9372			

图44 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-227-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:17:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	60870	100.000	9472	2939	1.009	--
总计		60870	100.000	9472			

图45 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-228-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-34
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 18:20:35 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:06:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	59129	100.000	9269	2967	1.016	--
总计		59129	100.000	9269			

图46 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-229-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:23:58 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	62018	100.000	9674	2953	1.006	--
总计		62018	100.000	9674			

图47 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-230-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:27:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	62508	100.000	9726	2944	1.008	--
总计		62508	100.000	9726			

图48 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-231-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:30:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	59819	100.000	9308	2962	1.011	--
总计		59819	100.000	9308			

图49 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-232-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:34:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	62395	100.000	9772	2977	1.012	--
总计		62395	100.000	9772			

图50 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-233-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:37:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	63274	100.000	9872	2959	1.013	--
总计		63274	100.000	9872			

图51 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-234-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:40:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	62611	100.000	9773	2957	1.015	--
总计		62611	100.000	9773			

图52 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-235-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:44:19 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	64824	100.000	10132	2948	1.015	--
总计		64824	100.000	10132			

图53 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-236-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:47:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	65580	100.000	10206	2953	1.008	--
总计		65580	100.000	10206			

图54 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-237-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:51:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	61586	100.000	9588	2944	1.013	--
总计		61586	100.000	9588			

图55 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-238-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:54:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	63889	100.000	9955	2953	1.010	--
总计		63889	100.000	9955			

图56 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-239-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 18:57:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	64679	100.000	10133	2944	1.014	--
总计		64679	100.000	10133			

图57 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-240-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:01:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	64405	100.000	10075	2944	1.014	--
总计		64405	100.000	10075			

图58 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-241-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:04:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	66134	100.000	10366	2945	1.016	--
总计		66134	100.000	10366			

图59 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-242-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:08:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	66080	100.000	10365	2950	1.010	--
总计		66080	100.000	10365			

图60 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-243-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:11:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	62058	100.000	9681	2952	1.014	--
总计		62058	100.000	9681			

图61 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-244-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:14:48 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	64381	100.000	10044	2943	1.011	--
总计		64381	100.000	10044			

图62 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-245-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:18:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	65545	100.000	10234	2945	1.013	--
总计		65545	100.000	10234			

图63 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-246-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:21:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	64619	100.000	10141	2950	1.014	--
总计		64619	100.000	10141			

图64 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-247-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:24:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:06:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	66493	100.000	10408	2953	1.013	--
总计		66493	100.000	10408			

图65 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-248-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:28:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	67146	100.000	10462	2936	1.012	--
总计		67146	100.000	10462			

图66 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-249-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:31:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	63969	100.000	7653	1614	1.037	--
总计		63969	100.000	7653			

图67 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-250-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-shuijz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:35:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	63770	100.000	7658	1617	1.031	--
总计		63770	100.000	7658			

图68 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-水介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-251-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:38:34 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-252-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:41:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	63839	100.000	7667	1612	1.042	--
总计		63839	100.000	7667			

图70 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-253-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:45:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	64057	100.000	7660	1601	1.041	--
总计		64057	100.000	7660			

图71 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-254-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:48:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	64405	100.000	7683	1616	1.041	--
总计		64405	100.000	7683			

图72 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-255-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:52:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	64041	100.000	7670	1614	1.036	--
总计		64041	100.000	7670			

图73 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-256-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:55:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	64070	100.000	7666	1607	1.034	--
总计		64070	100.000	7666			

图74 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-257-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 19:59:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	5432	100.000	874	3028	1.044	--
总计		5432	100.000	874			

图75 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-258-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:02:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	6181	100.000	988	2973	0.985	--
总计		6181	100.000	988			

图76 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-259-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:05:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	6323	100.000	1000	2965	1.024	--
总计		6323	100.000	1000			

图77 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-260-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:09:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	6839	100.000	1081	3006	1.048	--
总计		6839	100.000	1081			

图78 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-261-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:12:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	6018	100.000	961	2928	1.072	--
总计		6018	100.000	961			

图79 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-262-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:16:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.273	5948	100.000	930	2967	1.004	--
总计		5948	100.000	930			

图80 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-263-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:19:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	12212	100.000	1905	2944	1.017	--
总计		12212	100.000	1905			

图81 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-264-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:22:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	12344	100.000	1952	2965	1.007	--
总计		12344	100.000	1952			

图82 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-265-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:26:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	13251	100.000	2096	2945	1.012	--
总计		13251	100.000	2096			

图83 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-266-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:29:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	12938	100.000	2045	2940	0.993	--
总计		12938	100.000	2045			

图84 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-267-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:33:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	12669	100.000	2008	3005	1.045	--
总计		12669	100.000	2008			

图85 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-268-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:36:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:07:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	12460	100.000	1970	2973	1.046	--
总计		12460	100.000	1970			

图86 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-269-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:39:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	17689	100.000	2796	2947	1.026	--
总计		17689	100.000	2796			

图87 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-270-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:43:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	17710	100.000	2775	2912	1.019	--
总计		17710	100.000	2775			

图88 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-271-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:46:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	17642	100.000	2806	2996	1.019	--
总计		17642	100.000	2806			

图89 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-272-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:50:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	17904	100.000	2849	2996	1.030	--
总计		17904	100.000	2849			

图90 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-273-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:53:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	17099	100.000	2714	2996	1.004	--
总计		17099	100.000	2714			

图91 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-274-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 20:56:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	17647	100.000	2776	2967	0.998	--
总计		17647	100.000	2776			

图92 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-275-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:00:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	21321	100.000	3334	2946	1.031	--
总计		21321	100.000	3334			

图93 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-276-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:03:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	21233	100.000	3352	2974	1.018	--
总计		21233	100.000	3352			

图94 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-277-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:07:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	21607	100.000	3428	2990	1.017	--
总计		21607	100.000	3428			

图95 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-278-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:10:27 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	21678	100.000	3431	2983	1.020	--
总计		21678	100.000	3431			

图96 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-279-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:13:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	20705	100.000	3266	2959	1.020	--
总计		20705	100.000	3266			

图97 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-280-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:17:15 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	20931	100.000	3305	2938	1.019	--
总计		20931	100.000	3305			

图98 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-281-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:20:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	26304	100.000	4134	2969	1.029	--
总计		26304	100.000	4134			

图99 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-282-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:24:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	26667	100.000	4187	2951	1.015	--
总计		26667	100.000	4187			

图100 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-283-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:27:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	27076	100.000	4256	2957	1.011	--
总计		27076	100.000	4256			

图101 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-284-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:30:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	26943	100.000	4252	2952	1.023	--
总计		26943	100.000	4252			

图102 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-285-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:34:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	26119	100.000	4096	2935	1.018	--
总计		26119	100.000	4096			

图103 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-286-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:37:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	26096	100.000	4086	2964	1.009	--
总计		26096	100.000	4086			

图104 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-287-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:41:05 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	31548	100.000	4974	2964	1.022	--
总计		31548	100.000	4974			

图105 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-288-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:44:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	32373	100.000	5040	2944	1.023	--
总计		32373	100.000	5040			

图106 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-289-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:47:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:08:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	32819	100.000	5135	2930	1.009	--
总计		32819	100.000	5135			

图107 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-290-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:51:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	32401	100.000	5080	2940	1.028	--
总计		32401	100.000	5080			

图108 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-291-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:54:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	30826	100.000	4851	2967	1.015	--
总计		30826	100.000	4851			

图109 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-292-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 21:58:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2): 2025/03/13 11:09:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	31119	100.000	4900	2979	1.019	--
总计		31119	100.000	4900			

图110 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-293-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:01:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	35549	100.000	5581	2960	1.015	--
总计		35549	100.000	5581			

图111 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-294-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:04:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	36209	100.000	5674	2952	1.010	--
总计		36209	100.000	5674			

图112 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-295-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:08:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	35982	100.000	5670	2981	1.016	--
总计		35982	100.000	5670			

图113 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-296-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:11:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	36148	100.000	5673	2949	1.013	--
总计		36148	100.000	5673			

图114 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-297-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:15:10 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	34926	100.000	5491	2961	1.022	--
总计		34926	100.000	5491			

图115 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-298-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:18:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	35750	100.000	5586	2958	1.006	--
总计		35750	100.000	5586			

图116 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-299-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:22:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	40411	100.000	6347	2944	1.010	--
总计		40411	100.000	6347			

图117 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-300-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:25:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	40816	100.000	6432	2955	1.014	--
总计		40816	100.000	6432			

图118 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-301-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:28:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	41632	100.000	6528	2970	1.018	--
总计		41632	100.000	6528			

图119 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-302-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:32:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	41167	100.000	6462	2942	1.011	--
总计		41167	100.000	6462			

图120 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-浆法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-303-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：2-44
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 22:35:41 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:09:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	40054	100.000	6277	2942	1.019	--
总计		40054	100.000	6277			

图121 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-304-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-90min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 22:39:06 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:09:43 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	40500	100.000	6354	2938	1.021	--
总计		40500	100.000	6354			

图122 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-305-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：4-3
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 22:42:29 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:09:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	43959	100.000	6908	2942	1.015	--
总计		43959	100.000	6908			

图123 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-306-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:45:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	44631	100.000	6980	2959	1.015	--
总计		44631	100.000	6980			

图124 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-307-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:49:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	44694	100.000	7037	2965	1.016	--
总计		44694	100.000	7037			

图125 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-308-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 22:52:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:09:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	44644	100.000	7001	2958	1.016	--
总计		44644	100.000	7001			

图126 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-309-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：4-39
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 22:56:03 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:09:57 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	43405	100.000	6782	2938	1.022	--
总计		43405	100.000	6782			

图127 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-310-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-120min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：4-48
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/12 22:59:26 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:10:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	43748	100.000	6841	2961	1.016	--
总计		43748	100.000	6841			

图128 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-311-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:02:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	45181	100.000	7082	2961	1.016	--
总计		45181	100.000	7082			

图129 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-312-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:06:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	45182	100.000	7096	2939	1.021	--
总计		45182	100.000	7096			

图130 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-313-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:09:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	46238	100.000	7238	2950	1.020	--
总计		46238	100.000	7238			

图131 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-314-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:13:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	46035	100.000	7182	2957	1.012	--
总计		46035	100.000	7182			

图132 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-315-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:16:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	45036	100.000	7042	2954	1.016	--
总计		45036	100.000	7042			

图133 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-316-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:19:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	45296	100.000	7079	2954	1.012	--
总计		45296	100.000	7079			

图134 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-317-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:23:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	64136	100.000	7677	1608	1.045	--
总计		64136	100.000	7677			

图135 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-318-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:26:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	63983	100.000	7668	1610	1.041	--
总计		63983	100.000	7668			

图136 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH1.2介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-319-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:30:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-320-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:33:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	64243	100.000	7685	1619	1.039	--
总计		64243	100.000	7685			

图138 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-321-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:36:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	64224	100.000	7683	1617	1.037	--
总计		64224	100.000	7683			

图139 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-322-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:40:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	63740	100.000	7667	1623	1.040	--
总计		63740	100.000	7667			

图140 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-323-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:43:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	63751	100.000	7629	1615	1.040	--
总计		63751	100.000	7629			

图141 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-324-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:46:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	63618	100.000	7613	1611	1.039	--
总计		63618	100.000	7613			

图142 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-325-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:50:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	9909	100.000	1580	2984	1.016	--
总计		9909	100.000	1580			

图143 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-326-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:53:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	10468	100.000	1657	2971	0.984	--
总计		10468	100.000	1657			

图144 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-327-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/12 23:57:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	9579	100.000	1527	2998	1.005	--
总计		9579	100.000	1527			

图145 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-328-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:00:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	8638	100.000	1359	2879	1.017	--
总计		8638	100.000	1359			

图146 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-329-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:03:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	9271	100.000	1481	2996	1.028	--
总计		9271	100.000	1481			

图147 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温：30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-330-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:07:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	8876	100.000	1421	3020	1.030	--
总计		8876	100.000	1421			

图148 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-331-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:10:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:10:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	19072	100.000	3036	2965	1.023	--
总计		19072	100.000	3036			

图149 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-332-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:13:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	19619	100.000	3116	2973	1.027	--
总计		19619	100.000	3116			

图150 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-333-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:17:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	19151	100.000	3038	2964	1.012	--
总计		19151	100.000	3038			

图151 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-334-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:20:37 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	18025	100.000	2844	2928	1.035	--
总计		18025	100.000	2844			

图152 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-335-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:24:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	18672	100.000	2939	2929	1.000	--
总计		18672	100.000	2939			

图153 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-336-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:27:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	18305	100.000	2878	2944	1.025	--
总计		18305	100.000	2878			

图154 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-337-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:30:45 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	25973	100.000	4095	2960	1.012	--
总计		25973	100.000	4095			

图155 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-338-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:34:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	26396	100.000	4135	2937	1.018	--
总计		26396	100.000	4135			

图156 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-339-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:37:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	25748	100.000	4063	2948	1.027	--
总计		25748	100.000	4063			

图157 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-340-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:40:55 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	25572	100.000	4001	2958	1.009	--
总计		25572	100.000	4001			

图158 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-341-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:44:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	25588	100.000	4025	2938	1.017	--
总计		25588	100.000	4025			

图159 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-342-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:47:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	25213	100.000	3957	2935	1.018	--
总计		25213	100.000	3957			

图160 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-343-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/13 00:51:02 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:11:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	30876	100.000	4822	2925	1.014	--
总计		30876	100.000	4822			

图161 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-344-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:54:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	31111	100.000	4903	2960	1.029	--
总计		31111	100.000	4903			

图162 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-345-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 00:57:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	31649	100.000	4937	2912	1.016	--
总计		31649	100.000	4937			

图163 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-346-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:01:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	30563	100.000	4791	2939	1.017	--
总计		30563	100.000	4791			

图164 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-347-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:04:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	30652	100.000	4794	2904	1.020	--
总计		30652	100.000	4794			

图165 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-348-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:07:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	30284	100.000	4755	2958	1.010	--
总计		30284	100.000	4755			

图166 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-349-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:11:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	37001	100.000	5816	2929	1.018	--
总计		37001	100.000	5816			

图167 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-350-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:14:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	37311	100.000	5859	2941	1.018	--
总计		37311	100.000	5859			

图168 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-351-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:17:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	37476	100.000	5891	2952	1.020	--
总计		37476	100.000	5891			

图169 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-352-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:21:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:11:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	37846	100.000	5923	2913	1.011	--
总计		37846	100.000	5923			

图170 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-353-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:24:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	37152	100.000	5839	2934	1.017	--
总计		37152	100.000	5839			

图171 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-354-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:28:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:06 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	37062	100.000	5810	2930	1.022	--
总计		37062	100.000	5810			

图172 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-355-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/13 01:31:29 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:12:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	43659	100.000	6835	2944	1.017	--
总计		43659	100.000	6835			

图173 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-356-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:34:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:12 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	43641	100.000	6840	2937	1.021	--
总计		43641	100.000	6840			

图174 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-357-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/13 01:38:13 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:12:15 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	43807	100.000	6850	2931	1.018	--
总计		43807	100.000	6850			

图175 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-358-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:41:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	44479	100.000	6955	2932	1.011	--
总计		44479	100.000	6955			

图176 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-359-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：3-42
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/13 01:44:56 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:12:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	44099	100.000	6902	2940	1.017	--
总计		44099	100.000	6902			

图177 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-360-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:48:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	43286	100.000	6791	2951	1.017	--
总计		43286	100.000	6791			

图178 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-361-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:51:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	47678	100.000	7493	2942	1.021	--
总计		47678	100.000	7493			

图179 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-362-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:55:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	47682	100.000	7483	2943	1.020	--
总计		47682	100.000	7483			

图180 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-363-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 01:58:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	47868	100.000	7514	2940	1.017	--
总计		47868	100.000	7514			

图181 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-364-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:01:46 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:34 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	48874	100.000	7671	2937	1.015	--
总计		48874	100.000	7671			

图182 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-365-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:05:07 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:37 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	48376	100.000	7534	2935	1.017	--
总计		48376	100.000	7534			

图183 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-366-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:08:29 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	47719	100.000	7470	2931	1.017	--
总计		47719	100.000	7470			

图184 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-367-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:11:51 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	53215	100.000	8322	2931	1.019	--
总计		53215	100.000	8322			

图185 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-368-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:15:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	52787	100.000	8283	2942	1.021	--
总计		52787	100.000	8283			

图186 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-369-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:18:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	53731	100.000	8351	2923	1.016	--
总计		53731	100.000	8351			

图187 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-浆法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-370-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:22:02 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:51 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	54709	100.000	8560	2933	1.014	--
总计		54709	100.000	8560			

图188 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-371-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:25:25 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	53333	100.000	8308	2928	1.019	--
总计		53333	100.000	8308			

图189 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-372-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:28:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	53169	100.000	8348	2937	1.017	--
总计		53169	100.000	8348			

图190 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-373-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:32:13 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:12:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	56591	100.000	8849	2934	1.015	--
总计		56591	100.000	8849			

图191 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-374-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:35:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	56463	100.000	8823	2930	1.017	--
总计		56463	100.000	8823			

图192 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-375-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:39:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	56309	100.000	8816	2940	1.018	--
总计		56309	100.000	8816			

图193 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-376-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:42:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	58110	100.000	9086	2938	1.018	--
总计		58110	100.000	9086			

图194 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-377-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:45:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	56506	100.000	8817	2916	1.015	--
总计		56506	100.000	8817			

图195 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-378-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:49:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	56026	100.000	8767	2930	1.016	--
总计		56026	100.000	8767			

图196 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-379-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:52:38 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:16 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	57841	100.000	9025	2935	1.016	--
总计		57841	100.000	9025			

图197 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-380-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:56:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	57636	100.000	8990	2934	1.020	--
总计		57636	100.000	8990			

图198 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-381-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 02:59:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	58099	100.000	9023	2926	1.016	--
总计		58099	100.000	9023			

图199 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-382-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:02:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	59237	100.000	9225	2932	1.017	--
总计		59237	100.000	9225			

图200 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-383-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:06:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	57709	100.000	8988	2918	1.012	--
总计		57709	100.000	8988			

图201 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-384-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:09:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:30 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	57261	100.000	8962	2935	1.017	--
总计		57261	100.000	8962			

图202 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-385-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:13:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	63450	100.000	7572	1604	1.039	--
总计		63450	100.000	7572			

图203 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-386-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH4.5jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:16:24 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	63327	100.000	7559	1597	1.040	--
总计		63327	100.000	7559			

图204 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH4.5介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名：RC\$QTL-4138 - 0-3/11-387-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：20μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/13 03:19:48 实验者：xiechaojun
处理时间（V2）：2025/03/13 11:13:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-388-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:23:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	63579	100.000	7581	1607	1.043	--
总计		63579	100.000	7581			

图206 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-389-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:26:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	63275	100.000	7547	1598	1.032	--
总计		63275	100.000	7547			

图207 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-390-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:30:00 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:47 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	63401	100.000	7560	1606	1.041	--
总计		63401	100.000	7560			

图208 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-391-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:33:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	63401	100.000	7538	1598	1.044	--
总计		63401	100.000	7538			

图209 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-392-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:36:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	63340	100.000	7565	1590	1.042	--
总计		63340	100.000	7565			

图210 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-393-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:40:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	60401	100.000	9470	2949	1.020	--
总计		60401	100.000	9470			

图211 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-394-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:43:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:13:58 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	61200	100.000	9583	2941	1.016	--
总计		61200	100.000	9583			

图212 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-395-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:46:56 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:01 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	64703	100.000	10149	2950	1.018	--
总计		64703	100.000	10149			

图213 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-396-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:50:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	63849	100.000	9973	2926	1.019	--
总计		63849	100.000	9973			

图214 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-397-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:53:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	61526	100.000	9641	2950	1.016	--
总计		61526	100.000	9641			

图215 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-398-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 03:57:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	65477	100.000	10257	2943	1.016	--
总计		65477	100.000	10257			

图216 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-399-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:00:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	61404	100.000	9598	2942	1.018	--
总计		61404	100.000	9598			

图217 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-400-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:03:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	66415	100.000	10390	2930	1.020	--
总计		66415	100.000	10390			

图218 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-401-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:07:11 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	66757	100.000	10434	2938	1.019	--
总计		66757	100.000	10434			

图219 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-402-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:10:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:22 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	66158	100.000	10334	2942	1.014	--
总计		66158	100.000	10334			

图220 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-403-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:13:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	66082	100.000	10314	2937	1.015	--
总计		66082	100.000	10314			

图221 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-404-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:17:20 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:28 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	66674	100.000	10426	2937	1.018	--
总计		66674	100.000	10426			

图222 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-405-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:20:42 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:31 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	62801	100.000	9814	2934	1.015	--
总计		62801	100.000	9814			

图223 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-406-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:24:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:33 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	68159	100.000	10668	2945	1.021	--
总计		68159	100.000	10668			

图224 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-407-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:27:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:36 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	67839	100.000	10597	2931	1.014	--
总计		67839	100.000	10597			

图225 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-408-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:30:50 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:39 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	67090	100.000	10458	2945	1.018	--
总计		67090	100.000	10458			

图226 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-409-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:34:14 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:42 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	67372	100.000	10513	2930	1.013	--
总计		67372	100.000	10513			

图227 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-410-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:37:36 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:45 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	67065	100.000	10524	2937	1.019	--
总计		67065	100.000	10524			

图228 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-411-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:40:59 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:48 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	63574	100.000	9940	2938	1.019	--
总计		63574	100.000	9940			

图229 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-412-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:44:22 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:50 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	68862	100.000	10743	2928	1.018	--
总计		68862	100.000	10743			

图230 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-413-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:47:44 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:53 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	68740	100.000	10719	2939	1.016	--
总计		68740	100.000	10719			

图231 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-414-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:51:08 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:56 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	67230	100.000	10509	2931	1.015	--
总计		67230	100.000	10509			

图232 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-415-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:54:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:14:59 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	68106	100.000	10603	2933	1.019	--
总计		68106	100.000	10603			

图233 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-416-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 04:57:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	67610	100.000	10561	2946	1.014	--
总计		67610	100.000	10561			

图234 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-417-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:01:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	63549	100.000	9957	2950	1.019	--
总计		63549	100.000	9957			

图235 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-418-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:04:39 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:07 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	69724	100.000	10886	2938	1.016	--
总计		69724	100.000	10886			

图236 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-419-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:08:01 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	69257	100.000	10799	2935	1.014	--
总计		69257	100.000	10799			

图237 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-420-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:11:23 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:13 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	67608	100.000	10556	2928	1.018	--
总计		67608	100.000	10556			

图238 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-421-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:14:47 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.269	68542	100.000	10700	2934	1.016	--
总计		68542	100.000	10700			

图239 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-422-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:18:09 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:18 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	68362	100.000	10662	2932	1.016	--
总计		68362	100.000	10662			

图240 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-423-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:21:32 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:21 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	63873	100.000	9995	2931	1.017	--
总计		63873	100.000	9995			

图241 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-424-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:24:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:24 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	70527	100.000	11041	2945	1.019	--
总计		70527	100.000	11041			

图242 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-425-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:28:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:27 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	69359	100.000	10830	2935	1.014	--
总计		69359	100.000	10830			

图243 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-426-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:31:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	67788	100.000	10630	2952	1.021	--
总计		67788	100.000	10630			

图244 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-427-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:35:03 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	68959	100.000	10778	2935	1.019	--
总计		68959	100.000	10778			

图245 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-428-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:38:26 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68459	100.000	10646	2931	1.018	--
总计		68459	100.000	10646			

图246 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-429-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:41:49 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	64120	100.000	10005	2925	1.016	--
总计		64120	100.000	10005			

图247 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-430-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:45:12 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:40 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	70393	100.000	11009	2944	1.013	--
总计		70393	100.000	11009			

图248 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-431-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:48:35 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:43 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	69131	100.000	10782	2937	1.015	--
总计		69131	100.000	10782			

图249 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-432-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:51:57 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	68046	100.000	10630	2938	1.013	--
总计		68046	100.000	10630			

图250 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-433-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:55:21 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68879	100.000	10768	2935	1.018	--
总计		68879	100.000	10768			

图251 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-434-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 05:58:43 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68086	100.000	10654	2938	1.018	--
总计		68086	100.000	10654			

图252 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-435-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:02:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:54 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	63950	100.000	10012	2935	1.017	--
总计		63950	100.000	10012			

图253 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-436-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:05:31 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:15:57 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	70407	100.000	11011	2933	1.017	--
总计		70407	100.000	11011			

图254 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-437-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:08:53 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:00 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	69117	100.000	10796	2930	1.018	--
总计		69117	100.000	10796			

图255 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-438-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:12:18 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:03 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68323	100.000	10684	2939	1.016	--
总计		68323	100.000	10684			

图256 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-439-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:15:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:05 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68758	100.000	10786	2948	1.014	--
总计		68758	100.000	10786			

图257 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-440-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-90min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:19:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:08 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68440	100.000	10702	2940	1.015	--
总计		68440	100.000	10702			

图258 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-90min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-441-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:22:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:11 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	63940	100.000	9983	2941	1.014	--
总计		63940	100.000	9983			

图259 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-442-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:25:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:14 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	70320	100.000	11010	2937	1.014	--
总计		70320	100.000	11010			

图260 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-443-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:29:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:17 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	69070	100.000	10788	2936	1.018	--
总计		69070	100.000	10788			

图261 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30℃ 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-444-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:32:40 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:20 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68435	100.000	10690	2934	1.015	--
总计		68435	100.000	10690			

图262 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-445-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:36:04 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:23 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68753	100.000	10751	2929	1.014	--
总计		68753	100.000	10751			

图263 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-446-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-120min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:39:28 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:26 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68356	100.000	10674	2934	1.015	--
总计		68356	100.000	10674			

图264 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-447-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:42:52 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:29 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	63606	100.000	9982	2939	1.013	--
总计		63606	100.000	9982			

图265 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-448-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p2-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:46:16 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:32 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	69990	100.000	10972	2946	1.019	--
总计		69990	100.000	10972			

图266 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-449-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p3-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:49:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:35 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68910	100.000	10767	2934	1.015	--
总计		68910	100.000	10767			

图267 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-450-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p4-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:53:06 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:38 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68741	100.000	10755	2951	1.016	--
总计		68741	100.000	10755			

图268 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱 : LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱 温 : 30°C 波长: 275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-451-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p5-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:56:30 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:41 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	69028	100.000	10761	2930	1.017	--
总计		69028	100.000	10761			

图269 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-452-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-p6-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 06:59:54 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:44 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	68762	100.000	10745	2941	1.019	--
总计		68762	100.000	10745			

图270 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-453-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 07:03:17 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	63639	100.000	7594	1601	1.044	--
总计		63639	100.000	7594			

图271 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱：LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：1.5ml/min
柱温：30°C 波长：275nm
数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-3/11-454-2 - cbzj-H046Rp-rcqx-2mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RC-FX260-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250312-FX260-2.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/13 07:06:41 实验者: xiechaojun
处理时间 (V2) : 2025/03/13 11:16:49 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 275nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	63568	100.000	7593	1605	1.040	--
总计		63568	100.000	7593			

图272 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-H046R批(2mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2