




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1801-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 11:43:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:22:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1802-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 11:47:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	42055	20.062	5638	794	0.959	--
2	2.992	167567	79.938	21730	3482	1.009	7.922
总计		209622	100.000	27368			

图2 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1803-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 11:51:50 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:23:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	41938	20.013	5646	803	0.960	--
2	2.990	167612	79.987	21787	3474	1.008	7.941
总计		209550	100.000	27433			

图3 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1804-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 11:56:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:23:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	42068	20.044	5649	796	0.961	--
2	2.990	167811	79.956	21819	3475	1.009	7.924
总计		209880	100.000	27468			

图4 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1805-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:00:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	41978	19.997	5648	800	0.958	--
2	2.989	167949	80.003	21843	3477	1.008	7.936
总计		209927	100.000	27491			

图5 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1806-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:05:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	41994	20.013	5651	796	0.958	--
2	2.988	167838	79.987	21838	3476	1.007	7.924
总计		209833	100.000	27490			

图6 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1807-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:09:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.403	46445	27.747	6277	805	0.941	--
2	2.989	120941	72.253	15796	3496	1.007	7.931
总计		167386	100.000	22073			

图7 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1808-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:13:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.402	47018	27.604	6330	808	0.948	--
2	2.987	123312	72.396	16146	3515	1.005	7.946
总计		170330	100.000	22476			

图8 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1809-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:18:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.402	47962	28.486	6459	804	0.950	--
2	2.987	120409	71.514	15761	3517	1.006	7.939
总计		168370	100.000	22220			

图9 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1810-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:22:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.402	46750	28.665	6326	808	0.953	--
2	2.986	116341	71.335	15215	3500	1.007	7.936
总计		163091	100.000	21541			

图10 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1811-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:26:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.402	46324	29.996	6236	804	0.951	--
2	2.986	108108	70.004	14143	3497	1.003	7.926
总计		154432	100.000	20379			

图11 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1812-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:31:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.402	46730	31.563	6303	806	0.948	--
2	2.986	101323	68.437	13267	3505	1.004	7.932
总计		148053	100.000	19569			

图12 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1813-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:35:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	47198	23.921	6363	805	0.950	--
2	2.984	150115	76.079	19587	3500	1.009	7.928
总计		197313	100.000	25949			

图13 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1814-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:40:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	47533	24.137	6403	807	0.946	--
2	2.983	149398	75.863	19531	3507	1.008	7.934
总计		196931	100.000	25934			

图14 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1815-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:44:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	47971	24.617	6467	803	0.950	--
2	2.983	146897	75.383	19206	3506	1.009	7.926
总计		194867	100.000	25673			

图15 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1816-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:48:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	47892	24.743	6460	809	0.944	--
2	2.982	145662	75.257	19075	3509	1.008	7.939
总计		193555	100.000	25535			

图16 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1817-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:53:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	48127	24.951	6497	810	0.945	--
2	2.982	144757	75.049	18961	3512	1.009	7.938
总计		192884	100.000	25459			

图17 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1818-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 12:57:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:23:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.401	47683	25.592	6414	807	0.949	--
2	2.981	138635	74.408	18166	3507	1.007	7.926
总计		186318	100.000	24580			

图18 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1819-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:01:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:23:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	47098	22.948	6342	804	0.945	--
2	2.980	158138	77.052	20742	3509	1.010	7.924
总计		205236	100.000	27084			

图19 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1820-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:06:22 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:23:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	47009	23.048	6351	809	0.948	--
2	2.980	156947	76.952	20605	3516	1.008	7.941
总计		203956	100.000	26956			

图20 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1821-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:10:45 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:23:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	47865	23.356	6457	807	0.949	--
2	2.979	157072	76.644	20580	3507	1.009	7.930
总计		204937	100.000	27037			

图21 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1822-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:15:08 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:23:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	47649	23.464	6446	809	0.947	--
2	2.980	155426	76.536	20368	3506	1.008	7.936
总计		203075	100.000	26814			

图22 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1823-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:19:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	47681	23.648	6420	808	0.950	--
2	2.979	153944	76.352	20188	3509	1.009	7.930
总计		201624	100.000	26608			

图23 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1824-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:23:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.400	47748	24.091	6464	805	0.945	--
2	2.979	150452	75.909	19763	3521	1.009	7.930
总计		198200	100.000	26227			

图24 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1825-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:28:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	45182	22.540	6087	800	0.952	--
2	2.977	155271	77.460	20240	3481	1.010	7.898
总计		200453	100.000	26327			

图25 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1826-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:32:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	46195	22.483	6233	807	0.945	--
2	2.977	159273	77.517	20846	3508	1.010	7.927
总计		205468	100.000	27080			

图26 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1827-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:37:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	47404	22.889	6409	805	0.945	--
2	2.976	159700	77.111	20939	3520	1.009	7.927
总计		207104	100.000	27348			

图27 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1828-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:42:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	46958	23.043	6349	805	0.945	--
2	2.976	156828	76.957	20535	3511	1.009	7.922
总计		203786	100.000	26885			

图28 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1829-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:46:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	47422	22.992	6422	807	0.948	--
2	2.976	158831	77.008	20844	3521	1.010	7.933
总计		206253	100.000	27266			

图29 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1830-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:51:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:24:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.399	46842	23.569	6349	809	0.949	--
2	2.975	151900	76.431	19924	3516	1.007	7.935
总计		198742	100.000	26273			

图30 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1831-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:55:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45037	22.213	6092	806	0.943	--
2	2.974	157716	77.787	20655	3494	1.009	7.916
总计		202752	100.000	26747			

图31 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1832-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 13:59:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:24:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45536	22.074	6156	805	0.950	--
2	2.974	160750	77.926	21067	3499	1.009	7.917
总计		206286	100.000	27223			

图32 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1833-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:04:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	46813	22.405	6340	805	0.947	--
2	2.974	162131	77.595	21276	3515	1.009	7.925
总计		208944	100.000	27616			

图33 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1834-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:08:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45968	22.538	6218	801	0.947	--
2	2.974	157992	77.462	20701	3498	1.008	7.905
总计		203961	100.000	26919			

图34 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1835-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:12:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	45567	22.479	6157	806	0.954	--
2	2.974	157137	77.521	20562	3485	1.007	7.914
总计		202704	100.000	26719			

图35 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1836-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:17:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45621	22.931	6172	804	0.949	--
2	2.973	153331	77.069	20105	3493	1.009	7.911
总计		198952	100.000	26277			

图36 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1837-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:21:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45077	21.766	6118	807	0.946	--
2	2.974	162020	78.234	21243	3501	1.010	7.921
总计		207096	100.000	27362			

图37 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1838-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:26:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	44977	21.748	6094	804	0.948	--
2	2.973	161835	78.252	21253	3508	1.009	7.922
总计		206812	100.000	27347			

图38 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1839-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:30:28 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:24:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	46027	21.996	6226	806	0.943	--
2	2.973	163222	78.004	21419	3508	1.010	7.921
总计		209249	100.000	27644			

图39 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1840-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:34:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	45282	22.121	6140	806	0.951	--
2	2.973	159423	77.879	20937	3497	1.010	7.916
总计		204706	100.000	27076			

图40 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1841-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:39:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	46084	22.131	6248	806	0.945	--
2	2.972	162150	77.869	21330	3513	1.008	7.925
总计		208233	100.000	27577			

图41 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1842-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:43:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	45288	22.522	6127	804	0.945	--
2	2.972	155798	77.478	20471	3500	1.008	7.914
总计		201086	100.000	26598			

图42 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1843-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:47:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:24:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	44949	21.377	6111	810	0.947	--
2	2.972	165323	78.623	21717	3516	1.010	7.934
总计		210272	100.000	27828			

图43 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1844-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:52:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:24:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45126	21.221	6105	808	0.947	--
2	2.972	167523	78.779	22044	3515	1.009	7.929
总计		212649	100.000	28149			

图44 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1845-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 14:56:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.398	45985	21.654	6212	804	0.946	--
2	2.972	166380	78.346	21893	3522	1.007	7.922
总计		212364	100.000	28105			

图45 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1846-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:01:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	45470	21.630	6142	802	0.948	--
2	2.971	164748	78.370	21646	3501	1.011	7.906
总计		210217	100.000	27788			

图46 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1847-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:05:30 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	45628	21.470	6179	804	0.950	--
2	2.971	166891	78.530	21936	3509	1.009	7.916
总计		212519	100.000	28115			

图47 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1848-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:09:53 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.397	45152	21.848	6116	803	0.947	--
2	2.972	161511	78.152	21213	3502	1.009	7.913
总计		206664	100.000	27329			

图48 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1849-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:14:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42294	20.074	5691	793	0.958	--
2	2.971	168400	79.926	22013	3468	1.010	7.896
总计		210694	100.000	27704			

图49 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1850-2 - zzp-2022081201p-tj1-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:18:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42123	20.059	5667	795	0.958	--
2	2.971	167878	79.941	21952	3475	1.010	7.907
总计		210001	100.000	27618			

图50 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1851-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:23:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1852-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:27:30 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42011	20.034	5658	796	0.954	--
2	2.970	167682	79.966	21936	3477	1.008	7.906
总计		209692	100.000	27594			

图52 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1853-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:31:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42129	20.060	5678	796	0.958	--
2	2.971	167888	79.940	21982	3482	1.010	7.910
总计		210017	100.000	27659			

图53 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1854-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:36:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42216	20.081	5683	797	0.958	--
2	2.971	168011	79.919	21982	3477	1.009	7.908
总计		210226	100.000	27665			

图54 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1855-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:40:45 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42084	20.050	5677	794	0.961	--
2	2.971	167817	79.950	21949	3476	1.007	7.903
总计		209901	100.000	27626			

图55 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1856-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:45:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	42060	20.028	5664	797	0.956	--
2	2.971	167944	79.972	21966	3473	1.008	7.905
总计		210004	100.000	27631			

图56 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1857-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:49:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	43511	31.511	5315	644	0.920	--
2	2.972	94569	68.489	12354	3456	1.006	7.551
总计		138079	100.000	17669			

图57 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-
片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1858-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:54:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44646	30.068	5451	644	0.924	--
2	2.973	103839	69.932	13571	3468	1.003	7.552
总计		148485	100.000	19022			

图58 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1859-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 15:58:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44043	30.595	5367	639	0.919	--
2	2.973	99913	69.405	13045	3456	1.006	7.529
总计		143956	100.000	18412			

图59 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1860-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:02:48 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45679	31.079	5556	638	0.916	--
2	2.972	101299	68.921	13246	3471	1.005	7.539
总计		146979	100.000	18802			

图60 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1861-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:07:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44594	31.778	5430	639	0.920	--
2	2.973	95738	68.222	12495	3462	1.006	7.534
总计		140332	100.000	17925			

图61 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1862-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:11:34 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:25:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44594	31.847	5419	639	0.923	--
2	2.973	95434	68.153	12431	3433	1.006	7.522
总计		140028	100.000	17850			

图62 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1863-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:15:58 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44459	24.269	5425	643	0.922	--
2	2.972	138736	75.731	18080	3451	1.005	7.542
总计		183195	100.000	23505			

图63 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1864-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:20:22 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44189	24.243	5382	642	0.918	--
2	2.973	138086	75.757	17978	3447	1.005	7.537
总计		182275	100.000	23360			

图64 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1865-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:24:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	44638	23.960	5427	637	0.918	--
2	2.972	141663	76.040	18449	3452	1.005	7.525
总计		186301	100.000	23876			

图65 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1866-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:29:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	46288	24.144	5667	648	0.918	--
2	2.973	145433	75.856	19014	3477	1.003	7.571
总计		191721	100.000	24682			

图66 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1867-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:33:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:25:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	45249	24.419	5526	640	0.919	--
2	2.972	140054	75.581	18281	3460	1.005	7.541
总计		185303	100.000	23806			

图67 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1868-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:37:59 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	44970	25.067	5472	640	0.917	--
2	2.971	134427	74.933	17522	3451	1.005	7.535
总计		179397	100.000	22994			

图68 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-
片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1869-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:42:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.385	43826	22.506	5347	639	0.914	--
2	2.972	150905	77.494	19681	3453	1.006	7.528
总计		194731	100.000	25028			

图69 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-
片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1870-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:46:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	43816	22.650	5340	638	0.917	--
2	2.972	149630	77.350	19492	3445	1.007	7.529
总计		193446	100.000	24832			

图70 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1871-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:51:11 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.384	44710	22.221	5448	639	0.921	--
2	2.972	156495	77.779	20411	3458	1.007	7.536
总计		201205	100.000	25859			

图71 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1872-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:55:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	45662	22.489	5572	636	0.918	--
2	2.973	157379	77.511	20530	3460	1.006	7.521
总计		203041	100.000	26102			

图72 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1873-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 16:59:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44842	22.686	5451	635	0.919	--
2	2.973	152822	77.314	19942	3462	1.006	7.523
总计		197664	100.000	25393			

图73 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1874-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:04:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.386	44205	23.226	5378	637	0.919	--
2	2.983	146118	76.774	18802	3393	1.005	7.525
总计		190324	100.000	24180			

图74 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1875-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:08:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	44428	22.064	5374	643	0.910	--
2	2.999	156937	77.936	20315	3473	1.003	7.590
总计		201365	100.000	25689			

图75 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1876-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:13:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	43877	22.082	5283	639	0.917	--
2	2.998	154825	77.918	19983	3452	1.006	7.567
总计		198702	100.000	25266			

图76 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1877-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:17:37 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	43723	21.799	5294	635	0.914	--
2	2.997	156846	78.201	20231	3438	1.005	7.554
总计		200569	100.000	25525			




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1878-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:22:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	44648	21.860	5386	636	0.912	--
2	2.998	159603	78.140	20549	3438	1.004	7.552
总计		204251	100.000	25935			

图78 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1879-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:26:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	44807	21.919	5421	646	0.913	--
2	2.999	159610	78.081	20631	3459	1.005	7.595
总计		204417	100.000	26053			

图79 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1880-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:30:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	45159	22.527	5444	639	0.912	--
2	2.999	155305	77.473	20086	3468	1.003	7.574
总计		200464	100.000	25530			

图80 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1881-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:35:14 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	42934	21.420	5179	638	0.914	--
2	2.997	157504	78.580	20331	3441	1.005	7.554
总计		200438	100.000	25509			

图81 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1882-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:39:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	42699	21.437	5159	639	0.913	--
2	2.998	156487	78.563	20180	3439	1.005	7.559
总计		199185	100.000	25339			

图82 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1883-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:44:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	43946	21.113	5303	641	0.918	--
2	2.997	164205	78.887	21245	3456	1.005	7.572
总计		208151	100.000	26549			

图83 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1884-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:48:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	44724	21.225	5406	639	0.915	--
2	2.997	165990	78.775	21451	3444	1.006	7.554
总计		210714	100.000	26857			

图84 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1885-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:52:51 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	43797	21.181	5305	643	0.916	--
2	2.997	162975	78.819	21085	3450	1.004	7.576
总计		206772	100.000	26391			

图85 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1886-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 17:57:15 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	44124	21.686	5336	636	0.918	--
2	2.996	159346	78.314	20600	3453	1.005	7.553
总计		203471	100.000	25936			

图86 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1887-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:01:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.391	42437	20.955	5130	642	0.916	--
2	2.995	160079	79.045	20669	3443	1.007	7.566
总计		202516	100.000	25799			

图87 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-
片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1888-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:06:05 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.392	43090	21.103	5211	641	0.916	--
2	2.996	161093	78.897	20861	3459	1.003	7.569
总计		204182	100.000	26073			

图88 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1889-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:10:29 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:26:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.393	44084	20.730	5354	645	0.908	--
2	2.996	168573	79.270	21901	3489	1.005	7.594
总计		212657	100.000	27255			

图89 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1890-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:14:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:26:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.402	45063	21.413	6065	829	0.899	--
2	3.042	165385	78.587	21027	3452	1.006	8.162
总计		210447	100.000	27092			




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1891-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:19:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	44979	21.365	6444	955	0.905	--
2	3.046	165551	78.635	21120	3475	1.005	8.429
总计		210530	100.000	27564			

图91 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1892-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:23:41 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	45618	22.063	6579	965	0.910	--
2	3.046	161143	77.937	20600	3491	1.002	8.463
总计		206761	100.000	27180			

图92 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1893-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:28:06 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	43459	21.022	6305	975	0.916	--
2	3.045	163268	78.978	20867	3474	1.005	8.464
总计		206727	100.000	27171			

图93 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1894-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:32:31 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	44123	21.454	6331	963	0.909	--
2	3.045	161537	78.546	20677	3493	1.003	8.453
总计		205660	100.000	27008			

图94 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1895-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:36:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	44719	21.185	6423	959	0.906	--
2	3.044	166367	78.815	21257	3484	1.006	8.442
总计		211085	100.000	27681			

图95 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1896-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:41:20 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	45652	21.176	6559	960	0.907	--
2	3.044	169932	78.824	21750	3493	1.005	8.451
总计		215584	100.000	28309			

图96 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1897-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:45:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	45073	20.988	6471	956	0.904	--
2	3.044	169681	79.012	21724	3498	1.004	8.446
总计		214754	100.000	28195			

图97 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片5
供试品溶液-1




J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1898-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:50:09 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	45434	21.466	6514	958	0.909	--
2	3.044	166223	78.534	21263	3498	1.003	8.450
总计		211657	100.000	27776			

图98 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1899-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:54:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	42142	20.076	6813	1185	1.012	--
2	3.042	167772	79.924	21438	3492	1.005	8.838
总计		209915	100.000	28251			

图99 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1900-2 - zzp-2022081201p-tj2-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 18:58:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.409	42215	20.108	6823	1178	1.009	--
2	3.042	167726	79.892	21450	3497	1.004	8.830
总计		209941	100.000	28273			

图100 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品只加前置不加前置-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1901-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:03:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1902-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:07:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	42201	20.105	6846	1184	1.010	--
2	3.040	167702	79.895	21506	3499	1.006	8.843
总计		209904	100.000	28352			

图102 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1903-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:12:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.408	42354	20.161	6855	1184	1.006	--
2	3.040	167721	79.839	21524	3502	1.006	8.846
总计		210075	100.000	28379			

图103 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1904-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:16:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	42247	20.110	6852	1184	1.009	--
2	3.040	167826	79.890	21523	3497	1.006	8.843
总计		210072	100.000	28374			

图104 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1905-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:20:55 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	42205	20.100	6852	1179	1.007	--
2	3.040	167770	79.900	21519	3493	1.006	8.831
总计		209975	100.000	28371			

图105 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1906-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:25:19 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	42124	20.059	6848	1188	1.008	--
2	3.039	167872	79.941	21534	3496	1.006	8.848
总计		209996	100.000	28381			

图106 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1907-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:29:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	45561	35.297	7450	1227	0.954	--
2	3.056	83518	64.703	11144	3813	0.994	9.080
总计		129079	100.000	18594			




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1908-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:34:04 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	48729	37.546	7951	1229	0.955	--
2	3.056	81057	62.454	10843	3826	0.994	9.091
总计		129786	100.000	18795			

图108 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1909-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:38:27 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:27:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	45616	35.196	7458	1231	0.958	--
2	3.056	83989	64.804	11207	3829	0.992	9.097
总计		129606	100.000	18665			

图109 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1910-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:42:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	47076	36.148	7695	1224	0.951	--
2	3.056	83154	63.852	11107	3823	0.995	9.083
总计		130230	100.000	18803			

图110 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1911-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:47:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	47052	35.474	7699	1229	0.951	--
2	3.056	85585	64.526	11434	3825	0.996	9.091
总计		132636	100.000	19133			

图111 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-
片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1912-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:51:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	46337	36.625	7562	1225	0.955	--
2	3.056	80183	63.375	10685	3820	0.992	9.082
总计		126520	100.000	18247			

图112 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1913-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 19:55:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:27:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	45402	27.698	7459	1240	0.955	--
2	3.055	118519	72.302	15807	3819	0.994	9.099
总计		163921	100.000	23266			

图113 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1914-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:00:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	48788	27.613	7980	1230	0.953	--
2	3.054	127898	72.387	17078	3819	0.995	9.082
总计		176686	100.000	25059			

图114 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1915-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:04:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47366	28.216	7707	1222	0.956	--
2	3.055	120506	71.784	16059	3812	0.994	9.068
总计		167871	100.000	23765			

图115 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1916-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:09:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	48341	27.838	7881	1221	0.953	--
2	3.054	125310	72.162	16737	3819	0.994	9.068
总计		173651	100.000	24618			

图116 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1917-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:13:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47683	28.200	7796	1227	0.950	--
2	3.054	121406	71.800	16220	3820	0.996	9.077
总计		169089	100.000	24016			

图117 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1918-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:17:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47631	28.342	7770	1226	0.952	--
2	3.054	120429	71.658	16064	3822	0.995	9.080
总计		168060	100.000	23834			

图118 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1919-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:22:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45909	25.245	7513	1224	0.953	--
2	3.053	135945	74.755	18131	3825	0.996	9.075
总计		181854	100.000	25644			

图119 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1920-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:26:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	49244	25.414	8045	1223	0.953	--
2	3.053	144527	74.586	19269	3822	0.997	9.070
总计		193771	100.000	27314			

图120 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-
片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1921-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:30:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	46533	25.625	7590	1224	0.950	--
2	3.052	135057	74.375	17989	3818	0.996	9.067
总计		181590	100.000	25579			

图121 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1922-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:35:21 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:28:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	48317	25.541	7877	1224	0.953	--
2	3.052	140853	74.459	18774	3819	0.996	9.068
总计		189170	100.000	26652			

图122 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1923-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:39:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:28:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47379	25.503	7741	1226	0.955	--
2	3.051	138399	74.497	18455	3834	0.996	9.078
总计		185778	100.000	26196			

图123 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1924-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:44:07 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47446	25.768	7740	1223	0.951	--
2	3.051	136678	74.232	18243	3828	0.999	9.068
总计		184124	100.000	25983			

图124 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1925-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:48:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	46078	24.117	7526	1226	0.957	--
2	3.051	144982	75.883	19318	3833	0.996	9.075
总计		191061	100.000	26844			

图125 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1926-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:52:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	49065	24.406	8010	1228	0.953	--
2	3.050	151970	75.594	20312	3833	0.998	9.074
总计		201035	100.000	28322			

图126 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1927-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 20:57:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45920	24.406	7517	1228	0.958	--
2	3.050	142228	75.594	18994	3834	0.999	9.076
总计		188148	100.000	26511			

图127 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1928-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:01:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	46959	24.499	7668	1229	0.952	--
2	3.049	144717	75.501	19356	3834	0.997	9.076
总计		191675	100.000	27024			

图128 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1929-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:05:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47389	24.381	7741	1225	0.953	--
2	3.049	146979	75.619	19657	3833	0.997	9.069
总计		194368	100.000	27398			

图129 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1930-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:10:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47008	24.612	7673	1225	0.952	--
2	3.049	143986	75.388	19247	3833	0.999	9.069
总计		190994	100.000	26920			

图130 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1931-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:14:44 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:28:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45139	22.956	7415	1230	0.960	--
2	3.049	151493	77.044	20274	3841	1.000	9.080
总计		196632	100.000	27688			

图131 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1932-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:19:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	48567	23.353	7937	1231	0.956	--
2	3.048	159405	76.647	21358	3841	0.998	9.080
总计		207971	100.000	29295			

图132 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1933-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:23:28 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45329	23.338	7428	1233	0.953	--
2	3.048	148898	76.662	19947	3842	0.997	9.085
总计		194227	100.000	27375			

图133 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-
片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1934-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:27:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:28:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	46700	23.451	7640	1234	0.955	--
2	3.048	152437	76.549	20425	3832	0.999	9.080
总计		199138	100.000	28065			

图134 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1935-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:32:13 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:28:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47150	23.332	7714	1234	0.960	--
2	3.047	154933	76.668	20739	3831	0.997	9.079
总计		202083	100.000	28453			

图135 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1936-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:36:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:28:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	46981	23.460	7677	1227	0.954	--
2	3.047	153275	76.540	20542	3837	0.997	9.070
总计		200256	100.000	28219			

图136 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-30min-
片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1937-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:40:58 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	44751	22.445	7311	1228	0.958	--
2	3.047	154628	77.555	20750	3848	0.999	9.078
总计		199379	100.000	28061			

图137 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-
片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1938-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:45:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	48288	22.744	7905	1228	0.957	--
2	3.048	164020	77.256	21968	3837	0.998	9.068
总计		212308	100.000	29873			

图138 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1939-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:49:42 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	44865	22.771	7339	1232	0.952	--
2	3.048	152163	77.229	20355	3839	0.999	9.076
总计		197027	100.000	27693			

图139 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-
片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1940-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:54:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	46015	22.721	7523	1231	0.958	--
2	3.048	156504	77.279	20992	3843	1.000	9.079
总计		202519	100.000	28515			

图140 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-
片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1941-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 21:58:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45950	22.800	7501	1232	0.958	--
2	3.047	155586	77.200	20873	3839	0.999	9.075
总计		201535	100.000	28375			

图141 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1942-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:02:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45519	22.827	7442	1226	0.954	--
2	3.047	153893	77.173	20608	3836	0.998	9.068
总计		199412	100.000	28050			

图142 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-45min-
片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1943-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:07:11 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.421	44404	21.831	7291	1239	0.957	--
2	3.048	158999	78.169	21336	3852	0.997	9.094
总计		203404	100.000	28626			

图143 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1944-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:11:33 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	48567	22.283	7954	1232	0.952	--
2	3.047	169388	77.717	22715	3852	0.999	9.085
总计		217954	100.000	30669			

图144 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1945-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:15:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	44973	22.208	7375	1233	0.955	--
2	3.048	157539	77.792	21112	3842	0.999	9.080
总计		202511	100.000	28486			

图145 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1946-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:20:17 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47537	22.305	7736	1220	0.951	--
2	3.048	165585	77.695	22196	3850	0.999	9.065
总计		213122	100.000	29932			

图146 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1947-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:24:39 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45568	22.246	7434	1231	0.956	--
2	3.046	159273	77.754	21347	3845	0.999	9.075
总计		204842	100.000	28782			

图147 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1948-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:29:01 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45857	22.478	7494	1234	0.959	--
2	3.046	158154	77.522	21211	3844	0.998	9.083
总计		204011	100.000	28705			

图148 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质-
极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1949-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:33:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.407	42297	20.103	6891	1190	1.013	--
2	3.031	168109	79.897	21717	3522	1.008	8.841
总计		210405	100.000	28608			

图149 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1950-2 - zzp-2022081201p-tj3-rcqx-10mg10mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:37:47 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	42245	20.059	6890	1191	1.011	--
2	3.030	168358	79.941	21748	3526	1.010	8.845
总计		210603	100.000	28638			

图150 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品不加前置不脱气-2022081201批(10mg/10mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1951-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:42:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1952-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:46:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42324	20.115	6891	1185	1.013	--
2	3.029	168083	79.885	21730	3523	1.008	8.838
总计		210407	100.000	28621			

图152 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1953-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:51:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42189	20.051	6893	1189	1.010	--
2	3.029	168225	79.949	21744	3525	1.008	8.845
总计		210415	100.000	28637			

图153 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1954-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:55:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42362	20.118	6900	1191	1.006	--
2	3.029	168204	79.882	21720	3516	1.011	8.842
总计		210566	100.000	28620			

图154 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1955-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 22:59:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42305	20.099	6902	1189	1.009	--
2	3.029	168177	79.901	21733	3523	1.008	8.843
总计		210482	100.000	28635			

图155 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1956-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:04:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42438	20.145	6908	1189	1.009	--
2	3.029	168223	79.855	21737	3520	1.009	8.840
总计		210661	100.000	28646			

图156 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1957-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:08:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47328	33.689	7751	1234	0.957	--
2	3.046	93159	66.311	12530	3857	0.997	9.095
总计		140487	100.000	20281			

图157 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1958-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:13:00 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:29:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47745	33.328	7798	1227	0.955	--
2	3.047	95514	66.672	12844	3849	0.998	9.081
总计		143259	100.000	20642			

图158 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1959-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:17:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:29:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47056	31.615	7713	1231	0.958	--
2	3.046	101785	68.385	13660	3852	0.996	9.086
总计		148840	100.000	21373			

图159 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1960-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:21:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47390	31.920	7772	1232	0.956	--
2	3.046	101076	68.080	13594	3858	0.995	9.094
总计		148466	100.000	21366			

图160 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1961-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:26:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:04 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47085	35.331	7697	1227	0.954	--
2	3.047	86185	64.669	11597	3856	0.994	9.083
总计		133270	100.000	19294			

图161 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1962-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:30:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:07 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	45897	33.219	7519	1234	0.953	--
2	3.047	92267	66.781	12419	3863	0.995	9.098
总计		138163	100.000	19937			

图162 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1963-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:34:55 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:30:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	49295	26.315	8040	1233	0.956	--
2	3.046	138031	73.685	18527	3843	0.997	9.080
总计		187326	100.000	26567			

图163 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1964-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:39:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:12 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47732	25.895	7820	1234	0.954	--
2	3.046	136600	74.105	18369	3860	0.998	9.091
总计		184332	100.000	26189			

图164 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1965-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:43:40 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:15 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47812	25.398	7819	1230	0.953	--
2	3.046	140439	74.602	18849	3850	0.999	9.079
总计		188251	100.000	26668			

图165 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1966-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:48:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47549	25.547	7802	1241	0.958	--
2	3.046	138572	74.453	18625	3853	0.997	9.099
总计		186121	100.000	26426			

图166 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1967-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:52:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:20 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	48553	26.888	7923	1225	0.955	--
2	3.046	132026	73.112	17725	3851	0.997	9.071
总计		180579	100.000	25648			

图167 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1968-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/14 23:56:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46582	25.984	7608	1229	0.954	--
2	3.046	132686	74.016	17816	3846	1.000	9.076
总计		179268	100.000	25424			

图168 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1969-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:01:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	49345	24.165	8090	1233	0.955	--
2	3.046	154856	75.835	20818	3849	1.000	9.083
总计		204201	100.000	28908			

图169 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1970-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:05:34 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:28 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47120	23.678	7718	1230	0.958	--
2	3.045	151887	76.322	20363	3848	0.999	9.075
总计		199008	100.000	28081			

图170 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1971-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:09:57 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.420	47461	23.575	7766	1232	0.955	--
2	3.045	153860	76.425	20637	3850	0.997	9.080
总计		201321	100.000	28403			

图171 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1972-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:14:20 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:33 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47198	23.722	7733	1234	0.959	--
2	3.045	151766	76.278	20387	3857	0.998	9.088
总计		198964	100.000	28120			

图172 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1973-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:18:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:36 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	48180	24.353	7848	1226	0.954	--
2	3.044	149661	75.647	20110	3852	0.999	9.078
总计		197841	100.000	27958			

图173 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1974-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:23:05 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46232	23.991	7540	1226	0.954	--
2	3.045	146472	76.009	19677	3855	0.998	9.075
总计		192704	100.000	27216			

图174 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1975-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:27:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:41 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47821	23.446	7820	1234	0.954	--
2	3.044	156143	76.554	20929	3841	0.997	9.081
总计		203964	100.000	28749			

图175 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1976-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:31:52 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:30:44 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46821	23.006	7650	1230	0.959	--
2	3.044	156694	76.994	21012	3839	0.999	9.074
总计		203515	100.000	28662			

图176 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1977-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:36:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47071	22.902	7689	1229	0.955	--
2	3.044	158458	77.098	21275	3851	0.998	9.080
总计		205529	100.000	28963			

图177 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1978-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:40:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:49 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47229	22.930	7718	1235	0.956	--
2	3.044	158744	77.070	21281	3848	0.999	9.087
总计		205974	100.000	28999			

图178 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1979-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:45:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:52 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47938	23.377	7783	1221	0.950	--
2	3.044	157128	76.623	21092	3849	1.000	9.067
总计		205067	100.000	28874			

图179 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1980-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:49:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46542	23.039	7574	1223	0.955	--
2	3.045	155470	76.961	20886	3848	0.999	9.068
总计		202013	100.000	28460			

图180 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1981-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:53:52 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:30:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46644	22.760	7640	1238	0.959	--
2	3.044	158296	77.240	21208	3843	0.998	9.088
总计		204940	100.000	28848			

图181 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1982-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 00:58:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45758	22.216	7527	1241	0.961	--
2	3.045	160209	77.784	21487	3845	0.998	9.091
总计		205967	100.000	29014			

图182 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1983-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:02:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46130	22.344	7539	1231	0.952	--
2	3.044	160322	77.656	21492	3844	0.998	9.079
总计		206452	100.000	29030			

图183 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1984-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:07:03 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:31:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46533	22.383	7630	1236	0.955	--
2	3.045	161363	77.617	21650	3855	0.997	9.090
总计		207896	100.000	29280			

图184 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1985-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:11:26 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47313	22.556	7705	1220	0.948	--
2	3.045	162450	77.444	21791	3848	0.998	9.066
总计		209764	100.000	29496			

图185 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1986-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:15:49 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:31:10 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45150	22.315	7382	1233	0.953	--
2	3.045	157181	77.685	21099	3850	0.998	9.085
总计		202330	100.000	28481			

图186 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1987-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:20:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46472	22.289	7615	1236	0.957	--
2	3.045	162024	77.711	21733	3850	0.997	9.085
总计		208496	100.000	29348			

图187 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1988-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:24:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45115	21.912	7393	1232	0.958	--
2	3.045	160778	78.088	21575	3851	0.998	9.082
总计		205894	100.000	28968			

图188 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1989-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:29:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:18 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47032	22.013	7669	1225	0.954	--
2	3.045	166627	77.987	22357	3848	0.999	9.068
总计		213659	100.000	30026			

图189 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1990-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:33:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46231	22.006	7564	1230	0.953	--
2	3.045	163856	77.994	21999	3851	0.998	9.077
总计		210087	100.000	29563			

图190 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1991-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:37:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:23 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45861	21.892	7485	1227	0.954	--
2	3.044	163628	78.108	21925	3840	1.000	9.071
总计		209489	100.000	29410			

图191 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1992-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:42:12 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:31:26 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	44917	21.887	7323	1228	0.956	--
2	3.045	160306	78.113	21534	3855	0.998	9.077
总计		205223	100.000	28858			

图192 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1993-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:46:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46564	21.919	7621	1235	0.952	--
2	3.044	165871	78.081	22256	3850	0.998	9.086
总计		212435	100.000	29877			

图193 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1994-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:51:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:31 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45401	21.571	7424	1232	0.952	--
2	3.044	165068	78.429	22132	3845	0.998	9.076
总计		210469	100.000	29557			

图194 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1995-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:55:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:34 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	44744	21.588	7329	1240	0.960	--
2	3.044	162518	78.412	21801	3852	0.999	9.096
总计		207262	100.000	29129			

图195 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1996-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 01:59:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	45707	21.677	7466	1229	0.953	--
2	3.044	165152	78.323	22181	3850	0.997	9.077
总计		210859	100.000	29647			

图196 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1997-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:04:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:39 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46007	21.609	7507	1227	0.951	--
2	3.045	166901	78.391	22423	3852	0.999	9.074
总计		212907	100.000	29930			

图197 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1998-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:08:36 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:31:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	44346	21.474	7237	1229	0.957	--
2	3.045	162162	78.526	21751	3848	0.997	9.077
总计		206508	100.000	28988			

图198 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温: 50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-1999-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:13:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	42350	20.106	6922	1196	1.011	--
2	3.029	168285	79.894	21763	3531	1.007	8.858
总计		210635	100.000	28686			

图199 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2000-2 - zzp-2022081901p-rcqx-1-5mg5mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:17:24 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:47 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.406	42352	20.105	6910	1196	1.008	--
2	3.029	168300	79.895	21762	3522	1.005	8.854
总计		210652	100.000	28672			

图200 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-1-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2001-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:21:48 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图201 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
溶剂




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2002-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:26:12 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42512	20.093	6959	1198	1.013	--
2	3.028	169067	79.907	21859	3526	1.008	8.860
总计		211579	100.000	28818			

图202 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2003-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:30:36 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:55 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.404	42554	20.093	6943	1189	1.014	--
2	3.027	169233	79.907	21848	3525	1.008	8.846
总计		211786	100.000	28790			

图203 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-2




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2004-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:35:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:31:58 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.404	42571	20.098	6946	1190	1.011	--
2	3.027	169243	79.902	21867	3528	1.008	8.849
总计		211813	100.000	28813			

图204 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2005-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:39:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:01 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42640	20.144	6949	1191	1.013	--
2	3.028	169038	79.856	21868	3531	1.009	8.851
总计		211679	100.000	28817			

图205 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2006-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:43:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:03 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42591	20.133	6962	1192	1.012	--
2	3.027	168960	79.867	21870	3538	1.010	8.855
总计		211551	100.000	28832			

图206 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-1-5




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2007-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:48:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:06 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46581	33.748	7640	1240	0.957	--
2	3.045	91443	66.252	12295	3862	0.993	9.106
总计		138024	100.000	19935			

图207 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2008-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:52:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:09 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47660	32.693	7778	1235	0.957	--
2	3.044	98120	67.307	13204	3862	0.996	9.101
总计		145780	100.000	20982			

图208 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2009-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 02:56:53 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	48260	32.107	7900	1235	0.950	--
2	3.045	102048	67.893	13735	3870	0.994	9.103
总计		150308	100.000	21635			

图209 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2010-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:01:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:14 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46692	32.544	7656	1239	0.958	--
2	3.045	96781	67.456	13014	3845	0.994	9.093
总计		143473	100.000	20670			

图210 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2011-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:05:39 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:17 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46475	35.082	7584	1229	0.958	--
2	3.045	86000	64.918	11561	3848	0.994	9.081
总计		132475	100.000	19145			

图211 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2012-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:10:02 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46708	34.794	7623	1229	0.954	--
2	3.045	87535	65.206	11761	3855	0.993	9.086
总计		134244	100.000	19384			

图212 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-5min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2013-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:14:25 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:22 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46850	26.467	7665	1239	0.958	--
2	3.044	130162	73.533	17472	3848	0.996	9.095
总计		177012	100.000	25136			

图213 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2014-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:18:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:25 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	48729	26.268	7956	1232	0.954	--
2	3.045	136781	73.732	18376	3851	0.997	9.087
总计		185511	100.000	26332			

图214 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2015-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:23:10 实验者: xiexinhui
处理时间 (V2): 2025/03/17 08:32:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	49202	25.827	8065	1235	0.954	--
2	3.045	141304	74.173	19017	3874	0.996	9.106
总计		190506	100.000	27083			

图215 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2016-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:27:33 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:30 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	47133	26.234	7731	1236	0.953	--
2	3.044	132529	73.766	17799	3858	0.999	9.095
总计		179662	100.000	25530			

图216 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2017-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:31:56 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	48492	26.835	7908	1226	0.951	--
2	3.044	132211	73.165	17722	3846	0.996	9.072
总计		180703	100.000	25629			

图217 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2018-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:36:18 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	48227	26.524	7840	1220	0.952	--
2	3.043	133598	73.476	17924	3860	0.997	9.075
总计		181824	100.000	25765			

图218 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-10min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2019-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:40:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:38 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46676	24.282	7636	1234	0.956	--
2	3.044	145550	75.718	19531	3856	0.998	9.089
总计		192226	100.000	27167			

图219 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2020-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:45:04 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47523	24.063	7779	1232	0.958	--
2	3.043	149969	75.937	20092	3847	0.996	9.081
总计		197492	100.000	27871			

图220 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片2
供试品溶液-1

220




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2021-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:49:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:43 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	48329	24.044	7881	1232	0.954	--
2	3.043	152677	75.956	20442	3844	0.997	9.081
总计		201006	100.000	28322			

图221 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片3
供试品溶液-1

221




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2022-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:53:50 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:46 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.419	46973	24.408	7696	1239	0.956	--
2	3.044	145474	75.592	19488	3844	0.997	9.091
总计		192447	100.000	27184			

图222 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2023-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 03:58:13 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	46796	24.634	7637	1224	0.956	--
2	3.043	143171	75.366	19172	3840	0.996	9.070
总计		189967	100.000	26809			

图223 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2024-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:02:35 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:51 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47573	24.113	7746	1230	0.957	--
2	3.044	149717	75.887	20070	3846	0.998	9.081
总计		197289	100.000	27816			

图224 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-15min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2025-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:06:59 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:54 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46566	23.413	7604	1234	0.956	--
2	3.044	152324	76.587	20440	3847	0.996	9.086
总计		198890	100.000	28045			

图225 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2026-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:11:21 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:32:57 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47275	23.302	7734	1235	0.955	--
2	3.044	155606	76.698	20857	3841	0.998	9.082
总计		202881	100.000	28590			

图226 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2027-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:15:43 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:00 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47586	23.247	7781	1229	0.957	--
2	3.044	157111	76.753	21030	3832	0.998	9.069
总计		204697	100.000	28811			

图227 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2028-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:20:06 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46594	23.521	7623	1238	0.959	--
2	3.044	151502	76.479	20304	3842	0.998	9.092
总计		198096	100.000	27927			

图228 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2029-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:24:29 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:05 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47293	23.562	7704	1225	0.951	--
2	3.044	153425	76.438	20573	3848	0.998	9.074
总计		200718	100.000	28277			

图229 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2030-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:28:51 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:08 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.417	47224	23.187	7701	1226	0.952	--
2	3.043	156439	76.813	20959	3841	0.997	9.073
总计		203663	100.000	28659			

图230 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-20min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2031-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:33:14 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:11 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45403	22.927	7415	1233	0.951	--
2	3.044	152627	77.073	20482	3851	0.997	9.086
总计		198029	100.000	27897			

图231 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2032-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:37:37 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:13 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46839	22.634	7667	1235	0.951	--
2	3.044	160098	77.366	21465	3838	0.997	9.083
总计		206937	100.000	29132			

图232 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2033-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:42:00 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:16 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	48883	22.639	7956	1222	0.955	--
2	3.045	167043	77.361	22379	3841	0.998	9.068
总计		215925	100.000	30335			

图233 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2034-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:46:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:19 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	48051	22.807	7845	1229	0.951	--
2	3.044	162634	77.193	21803	3848	0.998	9.082
总计		210684	100.000	29648			

图234 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2035-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:50:47 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:21 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46503	22.828	7573	1224	0.952	--
2	3.044	157209	77.172	21063	3840	0.997	9.067
总计		203712	100.000	28636			

图235 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2036-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:55:10 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:24 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46066	22.713	7524	1229	0.953	--
2	3.044	156748	77.287	20990	3839	0.998	9.072
总计		202814	100.000	28514			

图236 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-30min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2037-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 04:59:32 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:27 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45405	22.266	7419	1230	0.953	--
2	3.044	158512	77.734	21242	3847	0.998	9.082
总计		203916	100.000	28662			

图237 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2038-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:03:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:29 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46147	22.275	7534	1231	0.953	--
2	3.044	161026	77.725	21554	3830	0.997	9.071
总计		207173	100.000	29089			

图238 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2039-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:08:16 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:32 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	47278	22.317	7696	1227	0.954	--
2	3.044	164567	77.683	22052	3845	0.997	9.076
总计		211844	100.000	29748			

图239 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2040-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:12:38 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:35 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45701	22.329	7463	1231	0.955	--
2	3.044	158971	77.671	21309	3845	0.996	9.082
总计		204672	100.000	28773			

图240 培哌普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2041-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:17:01 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:37 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46350	22.408	7526	1218	0.948	--
2	3.044	160496	77.592	21529	3847	0.995	9.067
总计		206846	100.000	29054			

图241 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2042-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-45min-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:21:23 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:40 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46068	21.818	7517	1225	0.949	--
2	3.044	165083	78.182	22122	3839	0.996	9.070
总计		211151	100.000	29639			

图242 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-45min-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2043-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:25:46 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:42 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45301	21.886	7398	1229	0.951	--
2	3.044	161682	78.114	21632	3832	0.997	9.071
总计		206983	100.000	29030			

图243 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片1
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2044-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:30:09 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:45 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45328	21.991	7411	1231	0.956	--
2	3.044	160794	78.009	21514	3834	0.996	9.073
总计		206122	100.000	28925			

图244 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2045-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P3.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:34:31 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:48 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46593	21.992	7614	1230	0.953	--
2	3.044	165273	78.008	22142	3841	1.000	9.078
总计		211866	100.000	29756			

图245 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片3
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2046-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P4.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:38:54 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:50 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	45385	22.125	7413	1231	0.953	--
2	3.045	159746	77.875	21423	3838	0.997	9.079
总计		205131	100.000	28836			

图246 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片4
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50 $^{\circ}$ C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2047-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P5.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:43:17 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:53 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46147	21.806	7505	1222	0.952	--
2	3.045	165481	78.194	22164	3840	0.996	9.068
总计		211628	100.000	29670			

图247 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片5
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2048-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-Jx-P6.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:47:41 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:56 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.418	46063	21.696	7528	1232	0.958	--
2	3.045	166244	78.304	22300	3846	0.997	9.085
总计		212307	100.000	29829			

图248 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质-极限转速-片6
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2049-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:52:03 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:33:59 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42497	20.080	6936	1193	1.008	--
2	3.028	169144	79.920	21839	3521	1.005	8.852
总计		211642	100.000	28775			

图249 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-1




SHIMADZU
LabSolutions

J468

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
柱温:50°C 波长: 215nm
数据文件名: RC\$J468 - 7-52/7-2050-2 - zzp-2022081901p-rcqx-2-5mg5mg-pH6.8jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$J468 - J468-rcqx-FX256.lcm
批处理文件名: RC\$J468 - 20250314-rcqx-FX256.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/15 05:56:27 实验者: xiexinhui
处理时间(V2): 2025/03/17 08:34:02 处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX256)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 215nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.405	42482	20.067	6944	1193	1.009	--
2	3.028	169216	79.933	21848	3523	1.006	8.855
总计		211698	100.000	28792			

图250 培哚普利氨氯地平片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品均一性-2-2022081901批(5mg/5mg规格)-pH6.8介质
对照品溶液-2-2

250