



奥利司他胶囊项目信息

介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	520027-202102	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	120	供试品稀释倍数	2	系数	1


对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.47	454027	454010	454021	453669	453481	453842	0.06
2	13.49	455538	454387				454962	0.18

单位质量响应值		RSD%	判断
33692.80	33725.87	0.07	数据可信

溶出曲线测定

奥利司他胶囊



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024102421批-pH6.8(内含3%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	21610	-	21610	4.784	11.06	43.86	4.78	11.06	43.87
	2	72055	-	72055	15.951			15.95		
	3	36030	-	36030	7.976			7.98		
	4	59365	-	59365	13.142			13.14		
	5	74934	-	74934	16.589			16.59		
	6	35747	-	35747	7.914			7.91		
10min	1	140431	-	140431	31.088	37.41	12.61	31.14	37.53	12.71
	2	194887	-	194887	43.144			43.32		
	3	159832	-	159832	35.383			35.47		
	4	176514	-	176514	39.076			39.22		
	5	188899	-	188899	41.818			42.00		
	6	153335	-	153335	33.945			34.03		
15min	1	233821	-	233821	51.763	57.23	6.50	52.16	57.77	6.63
	2	275103	-	275103	60.902			61.56		
	3	251750	-	251750	55.732			56.21		
	4	261840	-	261840	57.966			58.55		
	5	278483	-	278483	61.650			62.30		
	6	250099	-	250099	55.366			55.83		
20min	1	302475	-	302475	66.961	70.70	3.27	67.94	71.88	3.42
	2	329736	-	329736	72.996			74.33		
	3	316739	-	316739	70.119			71.22		
	4	321392	-	321392	71.149			72.37		
	5	330550	-	330550	73.176			74.51		
	6	315422	-	315422	69.827			70.91		
30min	1	366729	-	366729	81.186	85.21	2.54	82.90	87.17	2.64
	2	385824	-	385824	85.413			87.56		
	3	383138	-	383138	84.818			86.70		
	4	390340	-	390340	86.413			88.43		
	5	394900	-	394900	87.422			89.57		
	6	388402	-	388402	85.984			87.84		
45min	1	427152	-	427152	94.562	94.76	1.12	97.18	97.67	1.06
	2	420945	-	420945	93.188			96.28		
	3	426110	-	426110	94.331			97.15		
	4	428418	-	428418	94.842			97.82		
	5	430353	-	430353	95.271			98.39		
	6	435369	-	435369	96.381			99.19		
60min	1	432812	-	432812	95.815	96.92	1.00	99.49	100.88	1.01
	2	434735	-	434735	96.241			100.37		
	3	440793	-	440793	97.582			101.45		
	4	434414	-	434414	96.170			100.20		
	5	440529	-	440529	97.523			101.70		
	6	443584	-	443584	98.200			102.08		
极限	1	449787	-	449787	99.573	98.82	1.62	104.31	103.86	1.43
	2	433989	-	433989	96.076			101.27		
	3	447943	-	447943	99.165			104.12		
	4	446744	-	446744	98.899			104.00		
	5	444159	-	444159	98.327			103.59		
	6	455647	-	455647	100.870			105.84		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



奥利司他胶囊项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	520027-202102	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	120	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.47	462101	461237	461314	462325	460824	461560	0.14
2	13.49	460602	460441				460522	0.03
单位质量响应值				RSD%	判断			
34265.78		34138.03		0.27	数据可信			

溶出曲线测定

奥利司他胶囊



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024102421批-pH6.8(内含3%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	45721	-	45721	9.976	8.34	48.93	9.98	8.34	48.92
	2	12814	-	12814	2.796			2.80		
	3	51792	-	51792	11.301			11.30		
	4	51352	-	51352	11.205			11.20		
	5	15769	-	15769	3.441			3.44		
	6	51860	-	51860	11.315			11.32		
10min	1	155555	-	155555	33.941	31.44	24.78	34.05	31.53	24.85
	2	85881	-	85881	18.738			18.77		
	3	172193	-	172193	37.571			37.70		
	4	168277	-	168277	36.716			36.84		
	5	114281	-	114281	24.935			24.97		
	6	168341	-	168341	36.730			36.86		
15min	1	243428	-	243428	53.114	50.80	12.88	53.60	51.24	13.02
	2	184650	-	184650	40.289			40.53		
	3	260949	-	260949	56.937			57.48		
	4	248115	-	248115	54.136			54.67		
	5	207310	-	207310	45.233			45.55		
	6	252413	-	252413	55.074			55.61		
20min	1	305490	-	305490	66.655	65.18	7.76	67.73	66.18	7.95
	2	260666	-	260666	56.875			57.56		
	3	316729	-	316729	69.107			70.28		
	4	316678	-	316678	69.096			70.23		
	5	280070	-	280070	61.109			61.93		
	6	312623	-	312623	68.211			69.36		
30min	1	378364	-	378364	82.555	82.32	2.03	84.37	84.05	2.28
	2	367285	-	367285	80.138			81.46		
	3	380251	-	380251	82.967			84.91		
	4	384220	-	384220	83.833			85.73		
	5	368692	-	368692	80.445			81.94		
	6	384964	-	384964	83.995			85.90		
45min	1	432744	-	432744	94.421	93.39	1.35	97.16	96.04	1.26
	2	434129	-	434129	94.723			96.93		
	3	419780	-	419780	91.592			94.46		
	4	431731	-	431731	94.200			97.03		
	5	423233	-	423233	92.345			94.74		
	6	426537	-	426537	93.066			95.90		
60min	1	441133	-	441133	96.251	96.74	1.73	100.04	100.43	1.43
	2	452021	-	452021	98.627			101.89		
	3	434514	-	434514	94.807			98.69		
	4	443241	-	443241	96.711			100.59		
	5	452780	-	452780	98.792			102.21		
	6	436622	-	436622	95.267			99.14		
极限	1	450225	-	450225	98.235	98.82	2.20	103.09	103.58	1.89
	2	469607	-	469607	102.464			106.82		
	3	439205	-	439205	95.830			100.77		
	4	451489	-	451489	98.511			103.46		
	5	456492	-	456492	99.602			104.12		
	6	450455	-	450455	98.285			103.21		



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



奥利司他胶囊项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	520027-202102	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	120	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.47	462022	461556	461961	463124	462883	462309	0.15
2	13.49	462377	461032				461704	0.21
单位质量响应值				RSD%	判断			
34321.38				0.20	数据可信			

溶出曲线测定

奥利司他胶囊



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024102521批-pH6.8(内含3%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	6840	-	6840	1.489	11.02	55.91	1.49	11.02	55.90
	2	79616	-	79616	17.335			17.34		
	3	25471	-	25471	5.546			5.55		
	4	57253	-	57253	12.466			12.47		
	5	64391	-	64391	14.020			14.02		
	6	70047	-	70047	15.252			15.25		
10min	1	119582	-	119582	26.037	35.09	16.12	26.05	35.21	16.26
	2	186591	-	186591	40.627			40.82		
	3	139224	-	139224	30.314			30.38		
	4	170360	-	170360	37.093			37.23		
	5	172836	-	172836	37.632			37.79		
	6	178342	-	178342	38.831			39.00		
15min	1	218794	-	218794	47.639	53.12	6.01	47.94	53.63	6.19
	2	259568	-	259568	56.517			57.16		
	3	235180	-	235180	51.207			51.61		
	4	249217	-	249217	54.263			54.81		
	5	249034	-	249034	54.223			54.80		
	6	252025	-	252025	54.874			55.48		
20min	1	281315	-	281315	61.252	65.16	3.72	62.09	66.27	3.90
	2	313075	-	313075	68.167			69.44		
	3	292321	-	292321	63.648			64.62		
	4	305933	-	305933	66.612			67.77		
	5	300688	-	300688	65.470			66.65		
	6	302324	-	302324	65.826			67.04		
30min	1	375850	-	375850	81.835	81.84	1.49	83.35	83.67	1.52
	2	379906	-	379906	82.719			84.75		
	3	372578	-	372578	81.123			82.80		
	4	384660	-	384660	83.754			85.65		
	5	369468	-	369468	80.446			82.35		
	6	372773	-	372773	81.165			83.11		
45min	1	420501	-	420501	91.557	91.77	1.26	93.98	94.50	1.19
	2	416373	-	416373	90.659			93.61		
	3	425062	-	425062	92.551			95.13		
	4	428591	-	428591	93.319			96.14		
	5	423506	-	423506	92.212			95.01		
	6	414749	-	414749	90.305			93.15		
60min	1	450515	-	450515	98.093	95.47	1.86	101.53	99.23	1.69
	2	438081	-	438081	95.385			99.34		
	3	436827	-	436827	95.112			98.72		
	4	444548	-	444548	96.793			100.65		
	5	427503	-	427503	93.082			96.90		
	6	433460	-	433460	94.379			98.23		
极限	1	451676	-	451676	98.345	97.22	1.80	102.88	102.03	1.65
	2	432388	-	432388	94.146			99.16		
	3	446521	-	446521	97.223			101.88		
	4	456043	-	456043	99.296			104.23		
	5	444506	-	444506	96.784			101.64		
	6	447878	-	447878	97.518			102.41		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



奥利司他胶囊项目信息


介质体积(ml)	900	取样体积(ml)	10	补液体积(ml)	10
对照品批号	520027-202102	对照品来源	中检所	对照品使用方法	直接使用
对照品含量(%)	99.5	对照品水分(%)	0	对照品稀释倍数	200
标示量(mg)	120	供试品稀释倍数	2	系数	1

对照品溶液

序号	称样量(mg)	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	A ₅	A _{平均}	RSD%
1	13.47	459975	459386	460070	460867	460928	460245	0.15
2	13.49	461716	459467				460592	0.35
单位质量响应值				RSD%	判断			
34168.15		34143.22		0.06	数据可信			

溶出曲线测定

奥利司他胶囊



操作者: 谢超君

日期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本



供试品溶液-2024102521批-pH6.8(内含3%SDS)

时间 (分钟)	样品	A ₁	A ₂	A _{平均}	溶出量(%)	平均(%)	RSD%	累计溶 出量(%)	平均(%)	RSD%
5min	1	23012	-	23012	5.028	8.12	50.44	5.03	8.12	50.41
	2	19485	-	19485	4.257			4.26		
	3	60976	-	60976	13.322			13.32		
	4	51434	-	51434	11.238			11.24		
	5	18975	-	18975	4.146			4.15		
	6	49077	-	49077	10.723			10.72		
10min	1	131497	-	131497	28.730	31.94	13.86	28.79	32.03	13.94
	2	115175	-	115175	25.164			25.21		
	3	163428	-	163428	35.707			35.85		
	4	164587	-	164587	35.960			36.08		
	5	141489	-	141489	30.913			30.96		
	6	160900	-	160900	35.154			35.27		
15min	1	219221	-	219221	47.896	50.70	6.65	48.27	51.15	6.76
	2	208743	-	208743	45.607			45.93		
	3	243619	-	243619	53.227			53.77		
	4	247808	-	247808	54.142			54.67		
	5	231129	-	231129	50.498			50.89		
	6	241893	-	241893	52.850			53.36		
20min	1	288877	-	288877	63.115	63.94	4.31	64.02	64.94	4.43
	2	271558	-	271558	59.331			60.16		
	3	300493	-	300493	65.653			66.79		
	4	301902	-	301902	65.961			67.09		
	5	287630	-	287630	62.843			63.79		
	6	305386	-	305386	66.722			67.82		
30min	1	361210	-	361210	78.919	80.13	1.37	80.53	81.84	1.51
	2	359646	-	359646	78.577			80.07		
	3	369695	-	369695	80.773			82.64		
	4	371389	-	371389	81.143			83.00		
	5	368468	-	368468	80.505			82.15		
	6	369991	-	369991	80.837			82.68		
45min	1	407127	-	407127	88.951	91.34	1.67	91.44	93.95	1.71
	2	414476	-	414476	90.557			92.92		
	3	415904	-	415904	90.869			93.63		
	4	421588	-	421588	92.111			94.87		
	5	426086	-	426086	93.093			95.64		
	6	423291	-	423291	92.483			95.22		
60min	1	425388	-	425388	92.941	94.55	1.60	96.41	98.18	1.47
	2	442390	-	442390	96.656			100.03		
	3	426243	-	426243	93.128			96.90		
	4	428954	-	428954	93.720			97.50		
	5	437613	-	437613	95.612			99.19		
	6	435988	-	435988	95.257			99.02		
极限	1	428400	-	428400	93.599	96.32	2.15	98.11	101.00	2.04
	2	453767	-	453767	99.141			103.59		
	3	431764	-	431764	94.334			99.14		
	4	447093	-	447093	97.683			102.51		
	5	442007	-	442007	96.572			101.21		
	6	442196	-	442196	96.613			101.44		



操作者: 谢超君

日 期: 2025-03-21

复核者:

未审阅版本




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2311-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 00:13:03
处理时间(V2)：2025/03/21 09:11:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2312-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:16:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:11:57 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	454027	100.000	67034	2574	1.221	--
总计		454027	100.000	67034			

图2 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2313-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:19:51 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	454010	100.000	67549	2607	1.208	--
总计		454010	100.000	67549			

图3 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2314-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:23:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	454021	100.000	67377	2577	1.186	--
总计		454021	100.000	67377			

图4 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2315-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:26:39 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	453669	100.000	66840	2513	1.176	--
总计		453669	100.000	66840			

图5 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2316-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:30:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	453481	100.000	66336	2464	1.169	--
总计		453481	100.000	66336			

图6 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2317-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 00:33:26
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	21610	100.000	3469	2963	1.157	--
总计		21610	100.000	3469			

图7 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2318-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:36:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	72055	100.000	11301	2912	1.159	--
总计		72055	100.000	11301			

图8 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2319-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 00:40:12
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	36030	100.000	5724	2923	1.147	--
总计		36030	100.000	5724			

图9 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-164/25-2320-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 00:43:35 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:12:19 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	59365	100.000	9415	2931	1.139	--
总计		59365	100.000	9415			

图10 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2321-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-37
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:46:59 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:22 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	74934	100.000	11756	2915	1.157	--
总计		74934	100.000	11756			

图11 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-164/25-2322-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P6.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 00:50:22 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:12:25 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	35747	100.000	5704	2939	1.131	--
总计		35747	100.000	5704			

图12 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2323-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-2
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:53:46 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	140431	100.000	21825	2882	1.173	--
总计		140431	100.000	21825			

图13 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2324-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:57:08 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:30 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	194887	100.000	30193	2875	1.177	--
总计		194887	100.000	30193			

图14 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温：30°C

波长: 195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2325-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-20

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:00:32

处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:33


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	159832	100.000	24725	2869	1.178	--
总计		159832	100.000	24725			

图15 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2326-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-29
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:03:55 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	176514	100.000	27184	2850	1.186	--
总计		176514	100.000	27184			

图16 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2327-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-38
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:07:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	188899	100.000	29039	2835	1.189	--
总计		188899	100.000	29039			

图17 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2328-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-47
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:10:41 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:41 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	153335	100.000	23610	2830	1.180	--
总计		153335	100.000	23610			

图18 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2329-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:14:04 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:44 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	233821	100.000	35756	2810	1.192	--
总计		233821	100.000	35756			

图19 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2330-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:17:28 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:46 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	275103	100.000	41894	2797	1.198	--
总计		275103	100.000	41894			

图20 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2331-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:20:51 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	251750	100.000	38413	2806	1.197	--
总计		251750	100.000	38413			

图21 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2332-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:24:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	261840	100.000	39891	2799	1.199	--
总计		261840	100.000	39891			

图22 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2333-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-39
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:27:38 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	278483	100.000	42386	2790	1.201	--
总计		278483	100.000	42386			

图23 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2334-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P6.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-48

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:31:01

处理时间(V2)：2025/03/21 09:12:57


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	250099	100.000	37924	2774	1.205	--
总计		250099	100.000	37924			

图24 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2335-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:34:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	302475	100.000	45754	2764	1.212	--
总计		302475	100.000	45754			

图25 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2336-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:37:47 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:03 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	329736	100.000	49863	2763	1.210	--
总计		329736	100.000	49863			

图26 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2337-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-22
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 01:41:10
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	316739	100.000	47836	2762	1.212	--
总计		316739	100.000	47836			

图27 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30°C

波长：195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2338-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:44:33

处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:08


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	321392	100.000	48439	2757	1.218	--
总计		321392	100.000	48439			

图28 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2339-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:47:56 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:11 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	330550	100.000	49946	2764	1.216	--
总计		330550	100.000	49946			

图29 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2340-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:51:19 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	315422	100.000	47562	2756	1.218	--
总计		315422	100.000	47562			

图30 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2341-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 01:54:42
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	366729	100.000	55150	2749	1.226	--
总计		366729	100.000	55150			

图31 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2342-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-14
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:58:05 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:19 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	385824	100.000	57994	2740	1.225	--
总计		385824	100.000	57994			

图32 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2343-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-23

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:01:28

处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	383138	100.000	57603	2747	1.228	--
总计		383138	100.000	57603			

图33 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温：30℃

波长: 195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2344-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-32

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:04:51

处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:25


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	390340	100.000	58599	2737	1.231	--
总计		390340	100.000	58599			

图34 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2345-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-41
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:08:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:28 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	394900	100.000	59126	2730	1.232	--
总计		394900	100.000	59126			

图35 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2346-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:11:38 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:30 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	388402	100.000	58059	2725	1.240	--
总计		388402	100.000	58059			

图36 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2347-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:15:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	427152	100.000	63527	2704	1.244	--
总计		427152	100.000	63527			

图37 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2348-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-15
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:18:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	420945	100.000	62727	2712	1.245	--
总计		420945	100.000	62727			

图38 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2349-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-24
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:21:47 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	426110	100.000	63395	2708	1.247	--
总计		426110	100.000	63395			

图39 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2350-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-33

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:25:10

处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	428418	100.000	63682	2691	1.247	--
总计		428418	100.000	63682			

图40 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2351-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:28:33 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	430353	100.000	63816	2691	1.251	--
总计		430353	100.000	63816			

图41 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2352-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 02:31:56
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	435369	100.000	64533	2687	1.252	--
总计		435369	100.000	64533			

图42 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2353-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-7
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 02:35:19
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	432812	100.000	63869	2667	1.256	--
总计		432812	100.000	63869			

图43 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2354-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:38:42 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:53 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	434735	100.000	64061	2664	1.260	--
总计		434735	100.000	64061			

图44 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2355-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-25

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:42:06

处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:56

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	440793	100.000	64834	2648	1.260	--
总计		440793	100.000	64834			

图45 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2356-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-34

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:45:30

处理时间(V2)：2025/03/21 09:13:59

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	434414	100.000	63974	2654	1.261	--
总计		434414	100.000	63974			

图46 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2357-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:48:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:01 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	440529	100.000	64592	2638	1.262	--
总计		440529	100.000	64592			

图47 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2358-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-52
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 02:52:16
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	443584	100.000	64995	2639	1.263	--
总计		443584	100.000	64995			

图48 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2359-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-8
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:55:40 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	449787	100.000	65743	2627	1.268	--
总计		449787	100.000	65743			

图49 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2360-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-17
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:59:04 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	433989	100.000	63502	2631	1.267	--
总计		433989	100.000	63502			



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2361-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 03:02:29

处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	447943	100.000	65401	2622	1.267	--
总计		447943	100.000	65401			

图51 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2362-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-35

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 03:05:52

处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	446744	100.000	65051	2618	1.272	--
总计		446744	100.000	65051			

图52 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2363-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 03:09:16

处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:18

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	444159	100.000	64711	2618	1.272	--
总计		444159	100.000	64711			

图53 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2364-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-53
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 03:12:40
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	455647	100.000	66194	2608	1.274	--
总计		455647	100.000	66194			

图54 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2365-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:16:05 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:23 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	455538	100.000	66244	2511	1.234	--
总计		455538	100.000	66244			

图55 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-164/25-2366-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-274.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250320-rcqx-FX274.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:19:29 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:14:26 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX274)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	454387	100.000	64908	2355	1.192	--
总计		454387	100.000	64908			

图56 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2479-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-9
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 21:29:36
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2480-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 21:33:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	462101	100.000	62340	2106	0.978	--
总计		462101	100.000	62340			

图58 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2481-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 21:36:22 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:32 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	461237	100.000	62078	2097	0.978	--
总计		461237	100.000	62078			

图59 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2482-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 21:39:46 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	461314	100.000	62165	2097	0.977	--
总计		461314	100.000	62165			

图60 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2483-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 21:43:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	462325	100.000	62377	2109	0.976	--
总计		462325	100.000	62377			

图61 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2484-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 21:46:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:41 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	460824	100.000	62294	2118	0.980	--
总计		460824	100.000	62294			

图62 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2485-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-1
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 21:49:58
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	45721	100.000	6631	2382	1.022	--
总计		45721	100.000	6631			

图63 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2486-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-10
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 21:53:22
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	12814	100.000	1948	2497	1.097	--
总计		12814	100.000	1948			

图64 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2487-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-19
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 21:56:45 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:50 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	51792	100.000	7251	2228	1.030	--
总计		51792	100.000	7251			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2488-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-28
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 22:00:07 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:53 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	51352	100.000	7123	2202	1.035	--
总计		51352	100.000	7123			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-165/24-2489-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/20 22:03:30 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:18:55 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	15769	100.000	2271	2250	1.052	--
总计		15769	100.000	2271			

图67 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2490-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-46
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 22:06:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:18:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	51860	100.000	7193	2207	1.042	--
总计		51860	100.000	7193			



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2491-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-2

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 22:10:16

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	155555	100.000	21222	2170	1.031	--
总计		155555	100.000	21222			

图69 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2492-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-11
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 22:13:39
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	85881	100.000	11823	2181	1.032	--
总计		85881	100.000	11823			

图70 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2493-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-20
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 22:17:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	172193	100.000	23421	2164	1.030	--
总计		172193	100.000	23421			

图71 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2494-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-29

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 22:20:24

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	168277	100.000	22833	2143	1.028	--
总计		168277	100.000	22833			

图72 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2495-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-38

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 22:23:47

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	114281	100.000	15628	2172	1.036	--
总计		114281	100.000	15628			

图73 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温：30℃

波长: 195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2496-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P6.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-47

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 22:27:10

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:14


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	168341	100.000	22784	2136	1.030	--
总计		168341	100.000	22784			

图74 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2497-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-3
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 22:30:33 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:17 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	243428	100.000	32782	2125	1.038	--
总计		243428	100.000	32782			

图75 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2498-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-12
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 22:33:55 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	184650	100.000	24981	2133	1.032	--
总计		184650	100.000	24981			

图76 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2499-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-21
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 22:37:19
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	260949	100.000	35002	2110	1.036	--
总计		260949	100.000	35002			

图77 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2500-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-30
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 22:40:41 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:26 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	248115	100.000	33252	2100	1.039	--
总计		248115	100.000	33252			

图78 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30°C

波长：195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2501-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-39

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 22:44:04

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:29


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	207310	100.000	27834	2108	1.041	--
总计		207310	100.000	27834			

图79 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2502-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-48
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 22:47:27
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	252413	100.000	33737	2089	1.039	--
总计		252413	100.000	33737			

图80 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2503-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-4
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 22:50:49
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	305490	100.000	40573	2073	1.042	--
总计		305490	100.000	40573			

图81 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2504-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-13
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 22:54:12
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	260666	100.000	34635	2068	1.043	--
总计		260666	100.000	34635			

图82 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2505-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-22

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 22:57:35

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	316729	100.000	41970	2055	1.043	--
总计		316729	100.000	41970			

图83 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温：30℃

波长: 195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2506-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-31

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 23:00:58

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:43


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	316678	100.000	41909	2056	1.047	--
总计		316678	100.000	41909			

图84 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2507-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-40
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:04:21 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	280070	100.000	37058	2047	1.043	--
总计		280070	100.000	37058			

图85 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2508-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-49
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:07:43 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:48 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	312623	100.000	41229	2032	1.045	--
总计		312623	100.000	41229			

图86 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2509-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-5
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:11:07 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:51 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	378364	100.000	49571	2015	1.049	--
总计		378364	100.000	49571			

图87 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2510-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-14

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 23:14:30

处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	367285	100.000	48201	2011	1.048	--
总计		367285	100.000	48201			

图88 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2511-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-23
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 23:17:53
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	380251	100.000	49851	2003	1.050	--
总计		380251	100.000	49851			

图89 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2512-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-32
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:21:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:19:59 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	384220	100.000	50192	1991	1.052	--
总计		384220	100.000	50192			

图90 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2513-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-41
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 23:24:38
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	368692	100.000	48126	1991	1.054	--
总计		368692	100.000	48126			

图91 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2514-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-50
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:28:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:04 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	384964	100.000	50160	1985	1.056	--
总计		384964	100.000	50160			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2515-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-6
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:31:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	432744	100.000	56307	1979	1.057	--
总计		432744	100.000	56307			

图93 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-165/24-2516-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/20 23:34:47 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:20:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	434129	100.000	56452	1970	1.060	--
总计		434129	100.000	56452			

图94 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2517-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-24
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:38:10 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	419780	100.000	54419	1963	1.059	--
总计		419780	100.000	54419			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2518-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-33 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/20 23:41:34 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	431731	100.000	55849	1955	1.064	--
总计		431731	100.000	55849			

图96 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2519-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-42
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:44:56 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	423233	100.000	54868	1955	1.065	--
总计		423233	100.000	54868			

图97 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2520-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-51
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 23:48:18
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:21
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	426537	100.000	55192	1948	1.067	--
总计		426537	100.000	55192			

图98 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2521-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-7
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/20 23:51:42 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	441133	100.000	56819	1936	1.065	--
总计		441133	100.000	56819			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2522-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-16
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/20 23:55:04
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	452021	100.000	58314	1938	1.070	--
总计		452021	100.000	58314			

图100 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2523-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-25

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/20 23:58:27

处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	434514	100.000	55812	1927	1.070	--
总计		434514	100.000	55812			

图101 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2524-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-34

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 00:01:49

处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	443241	100.000	56868	1924	1.069	--
总计		443241	100.000	56868			

图102 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2525-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-43
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:05:12 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:35 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	452780	100.000	58024	1919	1.071	--
总计		452780	100.000	58024			

图103 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2526-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-52
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:08:35 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:37 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	436622	100.000	56085	1920	1.072	--
总计		436622	100.000	56085			

图104 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2527-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-8

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 00:11:58

处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	450225	100.000	57602	1911	1.073	--
总计		450225	100.000	57602			

图105 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2528-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-17

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 00:15:22

处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	469607	100.000	60018	1907	1.073	--
总计		469607	100.000	60018			

图106 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2529-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-26

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 00:18:46

处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	439205	100.000	56094	1901	1.074	--
总计		439205	100.000	56094			

图107 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2530-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-35 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 00:22:09 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	451489	100.000	57505	1896	1.076	--
总计		451489	100.000	57505			



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2531-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：1-44

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 00:25:33

处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	456492	100.000	58215	1899	1.078	--
总计		456492	100.000	58215			

图109 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2532-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-53
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 00:28:56
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:54
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	450455	100.000	57397	1898	1.081	--
总计		450455	100.000	57397			

图110 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2533-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:32:21 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:56 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	460602	100.000	53308	1525	1.039	--
总计		460602	100.000	53308			

图111 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2534-2 - zzp-2024102421p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：1-27
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:35:45 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:20:59 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	460441	100.000	53427	1537	1.025	--
总计		460441	100.000	53427			

图112 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102421批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-165/24-2535-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 00:39:10 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:21:02 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2536-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:42:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:21:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	462022	100.000	53806	1550	1.017	--
总计		462022	100.000	53806			

图114 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2537-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:45:59 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:21:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	461556	100.000	54021	1566	1.008	--
总计		461556	100.000	54021			

图115 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-165/24-2538-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 00:49:24 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:21:10 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	461961	100.000	54273	1583	0.999	--
总计		461961	100.000	54273			

图116 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2539-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:52:50 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:21:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	463124	100.000	54552	1590	0.995	--
总计		463124	100.000	54552			

图117 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-165/24-2540-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 00:56:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:21:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	462883	100.000	54759	1605	0.991	--
总计		462883	100.000	54759			

图118 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-166/24-2541-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 00:59:38
处理时间(V2)：2025/03/21 09:28:35
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	6840	100.000	974	2205	1.207	--
总计		6840	100.000	974			

图119 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2542-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:03:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:30 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	79616	100.000	10370	1938	1.043	--
总计		79616	100.000	10370			

图120 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2543-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-19
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:06:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:33 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	25471	100.000	3408	1997	1.076	--
总计		25471	100.000	3408			

图121 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2544-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:09:51 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:35 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	57253	100.000	7499	1963	1.046	--
总计		57253	100.000	7499			

图122 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2545-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 01:13:15
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	64391	100.000	8449	1953	1.039	--
总计		64391	100.000	8449			

图123 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2546-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-46
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 01:16:38
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:42
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	70047	100.000	9171	1945	1.052	--
总计		70047	100.000	9171			

图124 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2547-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-2
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:20:02 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:45 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	119582	100.000	15586	1936	1.049	--
总计		119582	100.000	15586			

图125 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2548-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:23:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:48 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	186591	100.000	24113	1929	1.042	--
总计		186591	100.000	24113			

图126 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2549-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-20 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 01:26:50 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:51
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	139224	100.000	18088	1932	1.053	--
总计		139224	100.000	18088			

图127 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2550-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-29

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:30:14

处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:53

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	170360	100.000	22004	1928	1.048	--
总计		170360	100.000	22004			

图128 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2551-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-38
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:33:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:56 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	172836	100.000	22434	1940	1.060	--
总计		172836	100.000	22434			

图129 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2552-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-47
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:37:01 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:29:59 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	178342	100.000	23115	1937	1.047	--
总计		178342	100.000	23115			

图130 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2553-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:40:26

处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	218794	100.000	28187	1924	1.053	--
总计		218794	100.000	28187			

图131 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2554-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-12
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:43:50 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:05 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	259568	100.000	33468	1923	1.057	--
总计		259568	100.000	33468			

图132 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2555-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-21
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:47:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:08 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	235180	100.000	30219	1916	1.060	--
总计		235180	100.000	30219			

图133 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2556-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-30

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:50:38

处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	249217	100.000	32102	1922	1.058	--
总计		249217	100.000	32102			

图134 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30℃

波长：195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2557-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-39

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 01:54:02

处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:13


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	249034	100.000	32149	1926	1.063	--
总计		249034	100.000	32149			

图135 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2558-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-48
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 01:57:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:16 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	252025	100.000	32502	1928	1.062	--
总计		252025	100.000	32502			

图136 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2559-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:00:50

处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	281315	100.000	36119	1923	1.064	--
总计		281315	100.000	36119			

图137 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2560-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:04:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:22 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	313075	100.000	40202	1916	1.064	--
总计		313075	100.000	40202			

图138 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2561-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-22
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 02:07:37
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	292321	100.000	37556	1924	1.069	--
总计		292321	100.000	37556			

图139 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2562-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-31

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:11:02

处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	305933	100.000	39284	1925	1.070	--
总计		305933	100.000	39284			

图140 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2563-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-40
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:14:24 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:30 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	300688	100.000	38583	1928	1.073	--
总计		300688	100.000	38583			

图141 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2564-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-20min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-49
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:17:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:33 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	302324	100.000	38765	1926	1.074	--
总计		302324	100.000	38765			

图142 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2565-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-5
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:21:13 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:36 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	375850	100.000	48119	1924	1.074	--
总计		375850	100.000	48119			

图143 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2566-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-14
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:24:38 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:39 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	379906	100.000	48633	1921	1.077	--
总计		379906	100.000	48633			

图144 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2567-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:28:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	372578	100.000	47665	1923	1.079	--
总计		372578	100.000	47665			

图145 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2568-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-32 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 02:31:27 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:45
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	384660	100.000	49229	1929	1.081	--
总计		384660	100.000	49229			

图146 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2569-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-41
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:34:51 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:48 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	369468	100.000	47334	1930	1.078	--
总计		369468	100.000	47334			

图147 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2570-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-30min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-50
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:38:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:51 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	372773	100.000	47787	1934	1.083	--
总计		372773	100.000	47787			

图148 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2571-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-6
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:41:40 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:54 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	420501	100.000	53877	1934	1.089	--
总计		420501	100.000	53877			

图149 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2572-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-15

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:45:04

处理时间(V2)：2025/03/21 09:30:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	416373	100.000	53362	1932	1.086	--
总计		416373	100.000	53362			

图150 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2573-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-24
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:48:28 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:00 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	425062	100.000	54372	1929	1.088	--
总计		425062	100.000	54372			

图151 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2574-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-33

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:51:53

处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	428591	100.000	54944	1934	1.093	--
总计		428591	100.000	54944			

图152 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2575-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 02:55:17 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:06 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	423506	100.000	54211	1936	1.092	--
总计		423506	100.000	54211			

图153 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2576-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-45min-P6.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-51

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 02:58:41

处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	414749	100.000	53194	1940	1.096	--
总计		414749	100.000	53194			

图154 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2577-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-7
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 03:02:05
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	450515	100.000	57702	1934	1.097	--
总计		450515	100.000	57702			

图155 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2578-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-16
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:05:29 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:14 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	438081	100.000	56238	1938	1.099	--
总计		438081	100.000	56238			

图156 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2579-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-25
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:08:54 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:17 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	436827	100.000	55817	1936	1.100	--
总计		436827	100.000	55817			

图157 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2580-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-34
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:12:17 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:20 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	444548	100.000	56874	1941	1.101	--
总计		444548	100.000	56874			

图158 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2581-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-43
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:15:41 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:23 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	427503	100.000	54644	1936	1.102	--
总计		427503	100.000	54644			

图159 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2582-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-60min-P6.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：2-52

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 03:19:06

处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	433460	100.000	55654	1946	1.106	--
总计		433460	100.000	55654			

图160 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2583-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-8
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:22:30 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	451676	100.000	57736	1944	1.107	--
总计		451676	100.000	57736			

图161 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2584-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-17
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 03:25:54
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	432388	100.000	55426	1950	1.112	--
总计		432388	100.000	55426			

图162 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2585-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-26
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:29:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:34 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	446521	100.000	57185	1951	1.109	--
总计		446521	100.000	57185			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2586-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-35 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 03:32:43 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	456043	100.000	58433	1952	1.110	--
总计		456043	100.000	58433			

图164 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2587-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-44
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:36:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:40 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	444506	100.000	56903	1953	1.112	--
总计		444506	100.000	56903			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2588-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-jxzs-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 03:39:31
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:43
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	447878	100.000	57399	1957	1.116	--
总计		447878	100.000	57399			

图166 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-167/24-2589-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 03:42:55 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:31:46 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	462377	100.000	52855	1518	1.109	--
总计		462377	100.000	52855			

图167 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2590-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-1-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:46:18 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:49 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	461032	100.000	52861	1519	1.096	--
总计		461032	100.000	52861			

图168 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-167/24-2591-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 03:49:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:31:52 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2592-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:53:03 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	459975	100.000	52740	1535	1.092	--
总计		459975	100.000	52740			

图170 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2593-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:56:27 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:31:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	459386	100.000	52885	1538	1.082	--
总计		459386	100.000	52885			

图171 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2594-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 03:59:50 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:01 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	460070	100.000	53047	1544	1.071	--
总计		460070	100.000	53047			

图172 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-167/24-2595-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 04:03:12 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:32:04 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	460867	100.000	53101	1542	1.066	--
总计		460867	100.000	53101			

图173 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2596-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:06:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	460928	100.000	53168	1540	1.059	--
总计		460928	100.000	53168			

图174 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-167/24-2597-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 04:09:57 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:32:09 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	23012	100.000	3127	2019	1.140	--
总计		23012	100.000	3127			

图175 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2598-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-10 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 04:13:21 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	19485	100.000	2694	2132	1.102	--
总计		19485	100.000	2694			

图176 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
柱温: 30°C 波长: 195nm
数据文件名: RC\$QTL-486 - 0-167/24-2599-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/03/21 04:16:42 实验者: xiechaojun
处理时间(V2): 2025/03/21 09:32:15 处理者: xiechaojun
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	60976	100.000	8070	2003	1.082	--
总计		60976	100.000	8070			

图177 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2600-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-28
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:20:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:18 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	51434	100.000	6815	2008	1.098	--
总计		51434	100.000	6815			

图178 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2601-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-37
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:23:28 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:21 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	18975	100.000	2637	2158	1.116	--
总计		18975	100.000	2637			

图179 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2602-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-5min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-46
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:26:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	49077	100.000	6541	2004	1.085	--
总计		49077	100.000	6541			

图180 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2603-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-2
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:30:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:26 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	131497	100.000	17096	1979	1.087	--
总计		131497	100.000	17096			

图181 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2604-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:33:33 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:29 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	115175	100.000	15030	1980	1.088	--
总计		115175	100.000	15030			

图182 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2605-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-20 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 04:36:55 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	163428	100.000	21216	1970	1.084	--
总计		163428	100.000	21216			

图183 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2606-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:40:17 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:35 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	164587	100.000	21368	1976	1.091	--
总计		164587	100.000	21368			

图184 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2607-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:43:39 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:38 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	141489	100.000	18351	1976	1.092	--
总计		141489	100.000	18351			

图185 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2608-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-10min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-47
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:47:00 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:41 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	160900	100.000	20919	1973	1.093	--
总计		160900	100.000	20919			

图186 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2609-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-3
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 04:50:23 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:43 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	219221	100.000	28374	1969	1.091	--
总计		219221	100.000	28374			

图187 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2610-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-12

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 04:53:46

处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	208743	100.000	26964	1968	1.099	--
总计		208743	100.000	26964			

图188 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

流速：2.0ml/min

柱温：30°C

波长：195nm

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2611-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-21

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 04:57:08

处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:49


仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	243619	100.000	31333	1960	1.100	--
总计		243619	100.000	31333			

图189 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2612-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-30 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 05:00:30 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:52
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	247808	100.000	31894	1959	1.097	--
总计		247808	100.000	31894			

图190 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2613-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-39
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:03:53 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:55 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	231129	100.000	29749	1960	1.100	--
总计		231129	100.000	29749			

图191 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2614-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-15min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-48
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:07:15 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:32:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	241893	100.000	31183	1964	1.095	--
总计		241893	100.000	31183			

图192 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2615-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:10:37 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:01 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	288877	100.000	37041	1956	1.097	--
总计		288877	100.000	37041			

图193 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2616-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-13
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 05:14:00
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	271558	100.000	34951	1966	1.106	--
总计		271558	100.000	34951			

图194 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片2
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2617-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P3.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-22

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 05:17:22

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:07

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	300493	100.000	38516	1958	1.107	--
总计		300493	100.000	38516			

图195 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2618-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:20:44 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:10 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	301902	100.000	38717	1963	1.106	--
总计		301902	100.000	38717			

图196 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2619-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:24:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:13 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	287630	100.000	37047	1969	1.110	--
总计		287630	100.000	37047			

图197 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2620-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-20min-P6.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-49

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 05:27:28

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	305386	100.000	39084	1957	1.107	--
总计		305386	100.000	39084			

图198 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-20min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2621-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-5
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:30:51 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:19 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	361210	100.000	46100	1955	1.108	--
总计		361210	100.000	46100			

图199 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2622-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-14
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:34:12 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:22 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	359646	100.000	45970	1965	1.108	--
总计		359646	100.000	45970			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2623-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:37:34 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:25 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	369695	100.000	47331	1967	1.116	--
总计		369695	100.000	47331			

图201 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2624-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-32 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 05:40:54 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	371389	100.000	47493	1966	1.115	--
总计		371389	100.000	47493			



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2625-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-41

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 05:44:17

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	368468	100.000	47114	1963	1.112	--
总计		368468	100.000	47114			

图203 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2626-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-30min-P6.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-50

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 05:47:38

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	369991	100.000	47325	1967	1.114	--
总计		369991	100.000	47325			

图204 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2627-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-6

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 05:50:59

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	407127	100.000	52001	1963	1.116	--
总计		407127	100.000	52001			

图205 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2628-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-15 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 05:54:22 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	414476	100.000	52951	1965	1.115	--
总计		414476	100.000	52951			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2629-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-24
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 05:57:44 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:42 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	415904	100.000	53194	1965	1.119	--
总计		415904	100.000	53194			

图207 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2630-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-33
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:01:06 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:46 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	421588	100.000	54056	1977	1.120	--
总计		421588	100.000	54056			

图208 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2631-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P5.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-42

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 06:04:27

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	426086	100.000	54626	1978	1.119	--
总计		426086	100.000	54626			

图209 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2632-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-45min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-51
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:07:47 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:52 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	423291	100.000	54307	1979	1.118	--
总计		423291	100.000	54307			



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2633-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-7

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 06:11:10

处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	425388	100.000	54588	1980	1.122	--
总计		425388	100.000	54588			

图211 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2634-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-16
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:14:32 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:33:58 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	442390	100.000	56653	1982	1.119	--
总计		442390	100.000	56653			

图212 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2635-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-25 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 06:17:53 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	426243	100.000	54612	1983	1.125	--
总计		426243	100.000	54612			

图213 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2636-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-34
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:21:14 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:04 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	428954	100.000	54921	1986	1.124	--
总计		428954	100.000	54921			

图214 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2637-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-43
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:24:35 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:07 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	437613	100.000	56086	1991	1.126	--
总计		437613	100.000	56086			

图215 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2638-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-60min-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-52
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:27:56 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:09 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	435988	100.000	55877	1992	1.119	--
总计		435988	100.000	55877			

图216 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-
桨法-75转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2639-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-8

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 06:31:19

处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min


波长: 195nm

版本号: 6.115

实验者: xiechaojun

处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	428400	100.000	55296	1998	1.123	--
总计		428400	100.000	55296			

图217 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2640-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-17 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 06:34:42 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	453767	100.000	58547	2001	1.123	--
总计		453767	100.000	58547			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2641-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-26
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 06:38:05
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速: 2.0ml/min
波长: 195nm
版本号: 6.115
实验者: xiechaojun
处理者: xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	431764	100.000	55539	1997	1.118	--
总计		431764	100.000	55539			

图219 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30°C

数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2642-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm

批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb

样品瓶号：3-35

进样体积：20 μl

进样时间：2025/03/21 06:41:27

处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min


波长：195nm

版本号：6.115

实验者：xiechaojun

处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	447093	100.000	57473	1996	1.125	--
总计		447093	100.000	57473			

图220 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转-
极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2643-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:44:49 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:24 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	442007	100.000	56997	2000	1.127	--
总计		442007	100.000	56997			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2644-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-jxzs-P6.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-53
进样体积：20 μl 版本号：6.115
进样时间：2025/03/21 06:48:11 实验者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:27 处理者：xiechaojun
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	442196	100.000	57127	2005	1.123	--
总计		442196	100.000	57127			




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速：2.0ml/min
柱温：30°C 波长：195nm
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2645-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-27 版本号：6.115
进样体积：20 μl 实验者：xiechaojun
进样时间：2025/03/21 06:51:33 处理者：xiechaojun
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:29
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	461716	100.000	52279	1586	1.223	--
总计		461716	100.000	52279			

图223 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30°C
数据文件名：RC\$QTL-486 - 0-167/24-2646-2 - zzp-2024102521p-120mg-rcqx-pH6.8+3sdsjz-2-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-486 - QTL-486-rcqx-FX273.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-486 - 20250319-rcqx-FX273-2.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：20 μl
进样时间：2025/03/21 06:54:57
处理时间(V2)：2025/03/21 09:34:32
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX273)

流速：2.0ml/min
波长：195nm
版本号：6.115
实验者：xiechaojun
处理者：xiechaojun

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	459467	100.000	52179	1589	1.208	--
总计		459467	100.000	52179			

图224 奥利司他胶囊溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-2024102521批(120mg规格)-pH6.8(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2