



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-579-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 15:55:07

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:28

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-580-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 15:58:31

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	100851	100.000	15332	2621	1.102	--
总计		100851	100.000	15332			

图2 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-581-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:01:55

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:36

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	100617	100.000	14875	2461	1.097	--
总计		100617	100.000	14875			

图3 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-582-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:05:19

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:39

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	100848	100.000	14895	2468	1.091	--
总计		100848	100.000	14895			

图4 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-583-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:08:42

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:42

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	100944	100.000	15060	2528	1.088	--
总计		100944	100.000	15060			

图5 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-浆法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-584-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:12:06

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:45

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	100627	100.000	14860	2451	1.090	--
总计		100627	100.000	14860			

图6 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-585-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:15:29

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:48

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	75462	100.000	11013	2405	1.086	--
总计		75462	100.000	11013			

图7 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-586-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:18:52

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:51

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	59299	100.000	8726	2450	1.088	--
总计		59299	100.000	8726			

图8 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-587-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:22:13

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:54

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	62297	100.000	9533	2649	1.088	--
总计		62297	100.000	9533			

图9 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-588-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:25:35

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:39:57

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	69836	100.000	10707	2674	1.095	--
总计		69836	100.000	10707			

图10 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-589-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:28:59

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	68328	100.000	10663	2749	1.081	--
总计		68328	100.000	10663			

图11 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-590-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:32:21

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	68281	100.000	10414	2633	1.078	--
总计		68281	100.000	10414			

图12 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-5min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-591-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:35:45

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	89833	100.000	13435	2529	1.085	--
总计		89833	100.000	13435			

图13 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-592-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:39:08

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	75316	100.000	11481	2631	1.084	--
总计		75316	100.000	11481			

图14 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-593-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:42:31

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	76484	100.000	11643	2629	1.085	--
总计		76484	100.000	11643			

图15 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-594-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:45:54

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	82492	100.000	12855	2736	1.079	--
总计		82492	100.000	12855			

图16 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-595-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:49:16

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	83095	100.000	13261	2890	1.084	--
总计		83095	100.000	13261			

图17 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-596-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:52:38

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	82074	100.000	13145	2906	1.080	--
总计		82074	100.000	13145			

图18 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-10min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-597-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:56:01

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	95103	100.000	14954	2811	1.078	--
总计		95103	100.000	14954			

图19 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-598-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 16:59:23

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	83314	100.000	13128	2806	1.078	--
总计		83314	100.000	13128			

图20 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-599-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:02:46

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	86500	100.000	13559	2781	1.070	--
总计		86500	100.000	13559			

图21 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-600-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:06:09

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	89550	100.000	14094	2808	1.070	--
总计		89550	100.000	14094			

图22 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-601-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:09:31

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	89720	100.000	14069	2784	1.070	--
总计		89720	100.000	14069			

图23 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-602-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:12:54

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	90595	100.000	14081	2743	1.085	--
总计		90595	100.000	14081			

图24 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-15min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-603-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:16:16

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	94142	100.000	14925	2853	1.082	--
总计		94142	100.000	14925			

图25 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-604-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:19:39

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	90770	100.000	14514	2896	1.082	--
总计		90770	100.000	14514			

图26 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-605-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:23:01

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	91191	100.000	14593	2918	1.082	--
总计		91191	100.000	14593			

图27 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-606-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:26:24

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	91460	100.000	14541	2883	1.077	--
总计		91460	100.000	14541			

图28 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-607-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:29:47

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	94578	100.000	15369	3006	1.081	--
总计		94578	100.000	15369			

图29 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-608-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:33:10

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:40:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	93633	100.000	15235	3018	1.083	--
总计		93633	100.000	15235			

图30 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-20min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-609-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:36:33

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:00

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	95606	100.000	15416	2957	1.080	--
总计		95606	100.000	15416			

图31 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-610-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:39:56

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:03

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	95438	100.000	15276	2913	1.082	--
总计		95438	100.000	15276			

图32 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-611-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:43:18

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:06

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	96970	100.000	15298	2824	1.080	--
总计		96970	100.000	15298			

图33 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-612-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:46:41

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:09

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	95491	100.000	14958	2785	1.077	--
总计		95491	100.000	14958			

图34 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-613-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:50:04

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	95144	100.000	14880	2779	1.075	--
总计		95144	100.000	14880			

图35 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-614-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:53:26

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	96058	100.000	14836	2700	1.084	--
总计		96058	100.000	14836			

图36 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-30min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-615-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 17:56:50

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	95865	100.000	14847	2720	1.082	--
总计		95865	100.000	14847			

图37 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-616-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:00:12

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	95541	100.000	15103	2841	1.081	--
总计		95541	100.000	15103			

图38 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-617-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:03:35

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	100404	100.000	15849	2834	1.085	--
总计		100404	100.000	15849			

图39 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-618-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:06:57

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	95019	100.000	15173	2889	1.084	--
总计		95019	100.000	15173			

图40 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-619-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:10:21

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	96369	100.000	15373	2885	1.084	--
总计		96369	100.000	15373			

图41 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-620-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:13:43

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	97111	100.000	15526	2912	1.086	--
总计		97111	100.000	15526			

图42 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-45min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-621-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:17:06

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	95110	100.000	15392	2976	1.081	--
总计		95110	100.000	15392			

图43 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-622-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:20:28

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	95839	100.000	15364	2927	1.075	--
总计		95839	100.000	15364			

图44 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-623-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:23:50

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	97469	100.000	15745	2977	1.079	--
总计		97469	100.000	15745			

图45 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-624-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:27:12

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	95452	100.000	15451	2971	1.079	--
总计		95452	100.000	15451			

图46 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-625-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:30:36

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	96426	100.000	15509	2970	1.087	--
总计		96426	100.000	15509			

图47 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-626-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:33:58

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	94579	100.000	15313	2982	1.083	--
总计		94579	100.000	15313			

图48 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-60min-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-627-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:37:21

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	95346	100.000	15454	2994	1.085	--
总计		95346	100.000	15454			

图49 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-628-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:40:45

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	95090	100.000	15419	2991	1.087	--
总计		95090	100.000	15419			

图50 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-629-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:44:08

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:41:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	96811	100.000	15605	2962	1.084	--
总计		96811	100.000	15605			



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-630-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:47:31

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	94752	100.000	15185	2921	1.080	--
总计		94752	100.000	15185			

图52 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-631-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:50:55

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	95239	100.000	15189	2896	1.077	--
总计		95239	100.000	15189			

图53 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片5
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-632-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P6.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:54:18

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	96254	100.000	15336	2882	1.082	--
总计		96254	100.000	15336			

图54 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-极限转速-片6
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-633-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 18:57:41

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	100423	100.000	15567	2728	1.076	--
总计		100423	100.000	15567			

图55 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-634-2 - zzp-25011701-SF1p-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:01:04

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	101026	100.000	15805	2796	1.077	--
总计		101026	100.000	15805			

图56 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-635-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-rj.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:04:28

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
溶剂



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-636-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:07:53

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	101316	100.000	15788	2774	1.073	--
总计		101316	100.000	15788			

图58 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-637-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:11:18

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	101184	100.000	15860	2805	1.075	--
总计		101184	100.000	15860			

图59 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-2



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-638-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:14:43

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	101506	100.000	15837	2784	1.073	--
总计		101506	100.000	15837			

图60 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-3



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-639-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:18:07

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	101357	100.000	15785	2763	1.075	--
总计		101357	100.000	15785			

图61 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-4



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-640-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz1-5.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:21:31

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	101284	100.000	15955	2826	1.075	--
总计		101284	100.000	15955			

图62 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-1-5



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-641-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P1.lcc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:24:54

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	85515	100.000	13815	2980	1.077	--
总计		85515	100.000	13815			

图63 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-5min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-642-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P2.lcc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:28:18

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	90378	100.000	14550	2949	1.066	--
总计		90378	100.000	14550			

图64 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-5min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-643-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P3.lcc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:31:41

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	86671	100.000	13936	2942	1.071	--
总计		86671	100.000	13936			

图65 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-5min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-644-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-5min-P4.lcc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:35:05

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	85890	100.000	13819	2936	1.068	--
总计		85890	100.000	13819			

图66 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-5min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-645-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P1.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:38:29

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	92070	100.000	14733	2915	1.071	--
总计		92070	100.000	14733			

图67 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-10min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-646-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P2.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:41:53

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	92529	100.000	14795	2906	1.067	--
总计		92529	100.000	14795			

图68 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-10min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-647-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P3.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:45:16

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	91479	100.000	14564	2882	1.075	--
总计		91479	100.000	14564			

图69 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-10min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-648-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-10min-P4.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:48:39

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	88835	100.000	14252	2926	1.073	--
总计		88835	100.000	14252			

图70 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-10min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-649-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P1.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:52:02

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:42:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	93792	100.000	15059	2930	1.073	--
总计		93792	100.000	15059			

图71 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-15min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-650-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P2.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:55:26

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	94246	100.000	15265	2989	1.074	--
总计		94246	100.000	15265			

图72 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-15min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-651-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P3.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 19:58:51

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	90753	100.000	14650	2976	1.075	--
总计		90753	100.000	14650			

图73 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-15min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-652-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-15min-P4.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:02:15

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	89956	100.000	14595	2987	1.075	--
总计		89956	100.000	14595			

图74 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-15min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-653-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P1.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:05:39

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	91648	100.000	14771	2948	1.074	--
总计		91648	100.000	14771			

图75 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-20min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-654-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P2.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:09:03

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:14

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	92978	100.000	14983	2955	1.077	--
总计		92978	100.000	14983			

图76 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-20min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-655-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P3.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:12:27

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:17

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	90203	100.000	14524	2947	1.073	--
总计		90203	100.000	14524			

图77 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-20min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-656-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-20min-P4.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:15:52

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:20

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	92262	100.000	14880	2961	1.073	--
总计		92262	100.000	14880			

图78 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-20min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-657-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P1.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:19:16

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:23

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	92500	100.000	14881	2942	1.072	--
总计		92500	100.000	14881			

图79 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-30min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-658-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P2.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:22:40

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:26

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	92152	100.000	14816	2927	1.070	--
总计		92152	100.000	14816			

图80 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-30min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-659-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P3.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:26:04

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:29

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	90354	100.000	14376	2869	1.070	--
总计		90354	100.000	14376			

图81 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-30min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-660-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-30min-P4.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:29:28

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:32

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	90692	100.000	14349	2841	1.071	--
总计		90692	100.000	14349			

图82 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-30min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-661-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P1.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:32:53

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:35

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	92806	100.000	14700	2859	1.067	--
总计		92806	100.000	14700			

图83 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-45min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-662-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P2.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:36:17

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:38

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	92512	100.000	14611	2839	1.067	--
总计		92512	100.000	14611			

图84 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-45min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-663-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P3.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:39:42

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:41

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	89339	100.000	14051	2821	1.069	--
总计		89339	100.000	14051			

图85 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-45min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-664-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-45min-P4.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:43:06

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:44

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	88936	100.000	14026	2826	1.069	--
总计		88936	100.000	14026			

图86 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-45min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-665-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P1.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:46:30

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:47

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	91100	100.000	14120	2742	1.070	--
总计		91100	100.000	14120			

图87 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-60min-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-666-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P2.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名 : RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:49:54

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:50

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	92094	100.000	14285	2736	1.076	--
总计		92094	100.000	14285			

图88 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-60min-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-667-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P3.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:53:19

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:53

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	87931	100.000	13489	2669	1.071	--
总计		87931	100.000	13489			

图89 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-60min-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-668-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-60min-P4.lc

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 20:56:43

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:56

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	87500	100.000	13397	2652	1.072	--
总计		87500	100.000	13397			

图90 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-
桨法-25转-60min-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-669-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 21:00:08

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:43:59

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	91936	100.000	14023	2647	1.072	--
总计		91936	100.000	14023			

图91 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-670-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 21:03:33

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:44:02

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	92396	100.000	14260	2725	1.075	--
总计		92396	100.000	14260			

图92 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-671-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P3.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 21:06:57

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:44:05

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	90835	100.000	14099	2740	1.076	--
总计		90835	100.000	14099			

图93 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-672-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-jxzs-P4.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 21:10:21

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:44:08

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	90482	100.000	13948	2697	1.083	--
总计		90482	100.000	13948			

图94 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-673-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-1.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 21:13:46

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:44:11

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	100649	100.000	14846	2459	1.086	--
总计		100649	100.000	14846			

图95 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-1



HJE-4126

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 35°C

数据文件名 : RC\$HJE-4126 - 0-27/30-674-2 - zzp-25011701-SF1p-js3y-rcqx-pH6.8+0.16CTABjz-jf25z-dz2-2.lcd

方法文件名 : RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX279.lcm

批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250414-RC-FX279.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 20 μl

进样时间 : 2025/04/14 21:17:10

处理时间 (V2) : 2025/04/15 11:44:13

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C(FX279)

流速: 1.5ml/min


波长: 259nm

版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	100884	100.000	14886	2467	1.082	--
总计		100884	100.000	14886			

图96 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-25011701-SF1批-加速3月-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-25转
对照品溶液-2-2