




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1497-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:30:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:19:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1498-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:33:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	189687	100.000	43057	6734	1.138	--
总计		189687	100.000	43057			

图2 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1499-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:37:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	189749	100.000	43296	6778	1.133	--
总计		189749	100.000	43296			

图3 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1500-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:40:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	189415	100.000	43037	6755	1.135	--
总计		189415	100.000	43037			

图4 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1501-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:43:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	189520	100.000	43008	6749	1.134	--
总计		189520	100.000	43008			

图5 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1502-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:47:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	189490	100.000	42972	6757	1.136	--
总计		189490	100.000	42972			

图6 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1503-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:50:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	42114	100.000	9615	6804	1.133	--
总计		42114	100.000	9615			

图7 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1504-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:54:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	54255	100.000	12418	6830	1.132	--
总计		54255	100.000	12418			

图8 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1505-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 13:57:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	53520	100.000	12250	6838	1.133	--
总计		53520	100.000	12250			

图9 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1506-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:00:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	38834	100.000	8850	6791	1.136	--
总计		38834	100.000	8850			

图10 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1507-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:04:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	45898	100.000	10478	6808	1.134	--
总计		45898	100.000	10478			

图11 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1508-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:07:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	47131	100.000	10797	6827	1.135	--
总计		47131	100.000	10797			

图12 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1509-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:10:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	84914	100.000	19369	6806	1.135	--
总计		84914	100.000	19369			

图13 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1510-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:14:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	98366	100.000	22418	6804	1.137	--
总计		98366	100.000	22418			

图14 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1511-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:17:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	100366	100.000	22902	6823	1.139	--
总计		100366	100.000	22902			

图15 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1512-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:21:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	92052	100.000	21009	6828	1.140	--
总计		92052	100.000	21009			

图16 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1513-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:24:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	98762	100.000	22527	6816	1.141	--
总计		98762	100.000	22527			

图17 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1514-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:27:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	92563	100.000	21115	6826	1.140	--
总计		92563	100.000	21115			

图18 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1515-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:31:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	108956	100.000	24903	6835	1.136	--
总计		108956	100.000	24903			

图19 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1516-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:34:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	118336	100.000	26978	6822	1.139	--
总计		118336	100.000	26978			

图20 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1517-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:37:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:20:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	122306	100.000	27895	6810	1.136	--
总计		122306	100.000	27895			

图21 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1518-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:41:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	114683	100.000	26202	6826	1.135	--
总计		114683	100.000	26202			

图22 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1519-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:44:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	119965	100.000	27329	6797	1.138	--
总计		119965	100.000	27329			

图23 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1520-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:47:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;



## &lt;峰表&gt;


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	114166	100.000	25987	6793	1.139	--
总计		114166	100.000	25987			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1521-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:51:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	125434	100.000	28569	6805	1.138	--
总计		125434	100.000	28569			

图25 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1522-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:54:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	131762	100.000	29956	6789	1.139	--
总计		131762	100.000	29956			

图26 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1523-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 14:58:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	133407	100.000	30332	6802	1.141	--
总计		133407	100.000	30332			

图27 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1524-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:01:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	128727	100.000	29298	6815	1.137	--
总计		128727	100.000	29298			

图28 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1525-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:04:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	132320	100.000	30125	6795	1.138	--
总计		132320	100.000	30125			

图29 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1526-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:08:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	128195	100.000	29188	6818	1.136	--
总计		128195	100.000	29188			

图30 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1527-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:11:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	144919	100.000	33117	6825	1.136	--
总计		144919	100.000	33117			

图31 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1528-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:14:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	146306	100.000	33348	6813	1.140	--
总计		146306	100.000	33348			

图32 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1529-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:18:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	145823	100.000	33222	6811	1.140	--
总计		145823	100.000	33222			

图33 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1530-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:21:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	144898	100.000	33068	6846	1.138	--
总计		144898	100.000	33068			

图34 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1531-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:25:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	145232	100.000	33096	6824	1.139	--
总计		145232	100.000	33096			

图35 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1532-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:28:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	143572	100.000	32737	6821	1.140	--
总计		143572	100.000	32737			

图36 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1533-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:31:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	159394	100.000	36396	6835	1.141	--
总计		159394	100.000	36396			

图37 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1534-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:35:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	157648	100.000	36001	6832	1.139	--
总计		157648	100.000	36001			

图38 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1535-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:38:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	155665	100.000	35592	6841	1.138	--
总计		155665	100.000	35592			

图39 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1536-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:41:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	158096	100.000	36101	6848	1.138	--
总计		158096	100.000	36101			

图40 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1537-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:45:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	155539	100.000	35542	6851	1.139	--
总计		155539	100.000	35542			

图41 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1538-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:48:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	156439	100.000	35697	6849	1.140	--
总计		156439	100.000	35697			

图42 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1539-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:52:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:21:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	166440	100.000	38042	6842	1.141	--
总计		166440	100.000	38042			

图43 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1540-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:55:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	163536	100.000	37438	6842	1.138	--
总计		163536	100.000	37438			

图44 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1541-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 15:58:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	160980	100.000	36790	6836	1.140	--
总计		160980	100.000	36790			

图45 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1542-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:02:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	165116	100.000	37712	6834	1.138	--
总计		165116	100.000	37712			

图46 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1543-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:05:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:10      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	160601	100.000	36641	6825	1.140	--
总计		160601	100.000	36641			

图47 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1544-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:08:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	163533	100.000	37297	6822	1.140	--
总计		163533	100.000	37297			

图48 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1545-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:12:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	171835	100.000	39217	6821	1.139	--
总计		171835	100.000	39217			

图49 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-  
 片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1546-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:15:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	170028	100.000	38827	6818	1.137	--
总计		170028	100.000	38827			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1547-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:19:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	168952	100.000	38614	6844	1.139	--
总计		168952	100.000	38614			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1548-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:22:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	171131	100.000	39020	6818	1.142	--
总计		171131	100.000	39020			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1549-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:25:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	170011	100.000	38687	6792	1.143	--
总计		170011	100.000	38687			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1550-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:29:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	170466	100.000	38873	6808	1.140	--
总计		170466	100.000	38873			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1551-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:32:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	188775	100.000	42752	6758	1.142	--
总计		188775	100.000	42752			

图55 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1552-2 - zzp-2025060821p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:35:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	188398	100.000	42747	6761	1.145	--
总计		188398	100.000	42747			

图56 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060821批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1553-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:39:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1554-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:42:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	188623	100.000	42851	6757	1.142	--
总计		188623	100.000	42851			

图58 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1555-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:46:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	188646	100.000	42751	6754	1.145	--
总计		188646	100.000	42751			

图59 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1556-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:49:34      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	188726	100.000	42837	6756	1.141	--
总计		188726	100.000	42837			

图60 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1557-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:52:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	188478	100.000	42740	6752	1.143	--
总计		188478	100.000	42740			

图61 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1558-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:56:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	188665	100.000	42742	6740	1.144	--
总计		188665	100.000	42742			

图62 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1559-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 16:59:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	43679	100.000	9985	6833	1.143	--
总计		43679	100.000	9985			

图63 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1560-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:03:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	37244	100.000	8484	6795	1.145	--
总计		37244	100.000	8484			

图64 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1561-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:06:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:22:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	38444	100.000	8777	6798	1.135	--
总计		38444	100.000	8777			

图65 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1562-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:09:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	30566	100.000	6998	6822	1.138	--
总计		30566	100.000	6998			

图66 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1563-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:13:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	39150	100.000	8952	6793	1.136	--
总计		39150	100.000	8952			

图67 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1564-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:16:42      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	37006	100.000	8456	6816	1.136	--
总计		37006	100.000	8456			

图68 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1565-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:20:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	93615	100.000	21356	6808	1.140	--
总计		93615	100.000	21356			

图69 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1566-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:23:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	92562	100.000	21114	6798	1.141	--
总计		92562	100.000	21114			

图70 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1567-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:26:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	84787	100.000	19335	6800	1.138	--
总计		84787	100.000	19335			

图71 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1568-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:30:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:18      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	84011	100.000	19148	6786	1.139	--
总计		84011	100.000	19148			

图72 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1569-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:33:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:21      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	84561	100.000	19261	6778	1.139	--
总计		84561	100.000	19261			

图73 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1570-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:37:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	94207	100.000	21444	6782	1.140	--
总计		94207	100.000	21444			

图74 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1571-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:40:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	115479	100.000	26299	6775	1.137	--
总计		115479	100.000	26299			

图75 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1572-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:43:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	114934	100.000	26141	6761	1.141	--
总计		114934	100.000	26141			

图76 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1573-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:47:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	108170	100.000	24586	6761	1.141	--
总计		108170	100.000	24586			

图77 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1574-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:50:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	109245	100.000	24858	6768	1.141	--
总计		109245	100.000	24858			

图78 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1575-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:53:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	107768	100.000	24477	6742	1.141	--
总计		107768	100.000	24477			

图79 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1576-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 17:57:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	116042	100.000	26380	6752	1.142	--
总计		116042	100.000	26380			

图80 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1577-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:00:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	129246	100.000	29400	6758	1.137	--
总计		129246	100.000	29400			

图81 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1578-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:04:07      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	128423	100.000	29169	6743	1.140	--
总计		128423	100.000	29169			

图82 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1579-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:07:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	122538	100.000	27883	6761	1.137	--
总计		122538	100.000	27883			

图83 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1580-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:10:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	124735	100.000	28411	6767	1.137	--
总计		124735	100.000	28411			

图84 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1581-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:14:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	121568	100.000	27694	6768	1.136	--
总计		121568	100.000	27694			

图85 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1582-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:17:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:23:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	128740	100.000	29245	6750	1.138	--
总计		128740	100.000	29245			

图86 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1583-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:21:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.363	144630	100.000	32834	6734	1.141	--
总计		144630	100.000	32834			

图87 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1584-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:24:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	144821	100.000	32856	6749	1.138	--
总计		144821	100.000	32856			

图88 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1585-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:27:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	141200	100.000	31979	6733	1.140	--
总计		141200	100.000	31979			

图89 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1586-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:31:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	144643	100.000	32822	6754	1.138	--
总计		144643	100.000	32822			

图90 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1587-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:34:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	137861	100.000	31249	6743	1.138	--
总计		137861	100.000	31249			

图91 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1588-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:38:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	143735	100.000	32588	6741	1.135	--
总计		143735	100.000	32588			

图92 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1589-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:41:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	155952	100.000	35368	6729	1.140	--
总计		155952	100.000	35368			

图93 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1590-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:44:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	156930	100.000	35584	6725	1.141	--
总计		156930	100.000	35584			

图94 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1591-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:48:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	156828	100.000	35553	6717	1.140	--
总计		156828	100.000	35553			

图95 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1592-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:51:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	160331	100.000	36334	6732	1.140	--
总计		160331	100.000	36334			

图96 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1593-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:54:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	152033	100.000	34520	6739	1.137	--
总计		152033	100.000	34520			

图97 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1594-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 18:58:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	155041	100.000	35240	6755	1.132	--
总计		155041	100.000	35240			

图98 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1595-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:01:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	163110	100.000	37052	6748	1.135	--
总计		163110	100.000	37052			

图99 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1596-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:05:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	163508	100.000	36982	6703	1.140	--
总计		163508	100.000	36982			

图100 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1597-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:08:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	165344	100.000	37435	6713	1.141	--
总计		165344	100.000	37435			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1598-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:12:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	167910	100.000	38040	6720	1.139	--
总计		167910	100.000	38040			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1599-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:15:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:44      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	159629	100.000	36169	6727	1.139	--
总计		159629	100.000	36169			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1600-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:18:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	160823	100.000	36509	6742	1.139	--
总计		160823	100.000	36509			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1601-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:22:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	168216	100.000	38180	6742	1.139	--
总计		168216	100.000	38180			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1602-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:25:36      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	165457	100.000	37526	6732	1.139	--
总计		165457	100.000	37526			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1603-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:28:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	170153	100.000	38612	6737	1.137	--
总计		170153	100.000	38612			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1604-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:32:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:24:58      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	173563	100.000	39421	6744	1.137	--
总计		173563	100.000	39421			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1605-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-44  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:35:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.362	167449	100.000	38043	6751	1.136	--
总计		167449	100.000	38043			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1606-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-53  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:39:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	167165	100.000	37932	6752	1.137	--
总计		167165	100.000	37932			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1607-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:42:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:06      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	187884	100.000	42470	6706	1.138	--
总计		187884	100.000	42470			

图111 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1608-2 - zzp-2025060921p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:45:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	187396	100.000	42278	6688	1.141	--
总计		187396	100.000	42278			

图112 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1609-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:49:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1610-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:52:43      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	188188	100.000	42777	6752	1.130	--
总计		188188	100.000	42777			

图114 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1611-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:56:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	188173	100.000	42687	6737	1.136	--
总计		188173	100.000	42687			

图115 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1612-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 19:59:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	187859	100.000	42499	6730	1.138	--
总计		187859	100.000	42499			

图116 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1613-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:02:50      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187970	100.000	42152	6716	1.144	--
总计		187970	100.000	42152			

图117 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1614-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:06:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187693	100.000	42237	6721	1.139	--
总计		187693	100.000	42237			

图118 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1615-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:09:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	31862	100.000	7194	6771	1.142	--
总计		31862	100.000	7194			

图119 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1616-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:12:57      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	33504	100.000	7606	6796	1.136	--
总计		33504	100.000	7606			

图120 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1617-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:16:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	54387	100.000	12339	6769	1.139	--
总计		54387	100.000	12339			

图121 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1618-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 10 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:19:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	37954	100.000	8594	6768	1.139	--
总计		37954	100.000	8594			

图122 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1619-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:23:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	27679	100.000	6255	6769	1.138	--
总计		27679	100.000	6255			

图123 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1620-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:26:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	36325	100.000	8225	6789	1.138	--
总计		36325	100.000	8225			

图124 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1621-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:29:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	85867	100.000	19421	6758	1.138	--
总计		85867	100.000	19421			

图125 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1622-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:33:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:48      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	91277	100.000	20595	6742	1.139	--
总计		91277	100.000	20595			

图126 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1623-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:36:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	95743	100.000	21624	6747	1.141	--
总计		95743	100.000	21624			

图127 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1624-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:39:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	85373	100.000	19307	6739	1.137	--
总计		85373	100.000	19307			

图128 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1625-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:43:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	77758	100.000	17536	6741	1.138	--
总计		77758	100.000	17536			

图129 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1626-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:46:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:25:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	86569	100.000	19541	6755	1.138	--
总计		86569	100.000	19541			

图130 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1627-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:49:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	107764	100.000	24438	6755	1.135	--
总计		107764	100.000	24438			

图131 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1628-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:53:20      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	114441	100.000	25984	6782	1.136	--
总计		114441	100.000	25984			

图132 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1629-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 20:56:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	115654	100.000	26211	6750	1.139	--
总计		115654	100.000	26211			

图133 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1630-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:00:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	108384	100.000	24579	6763	1.139	--
总计		108384	100.000	24579			

图134 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1631-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:03:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	101655	100.000	23017	6761	1.138	--
总计		101655	100.000	23017			

图135 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1632-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:06:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	110889	100.000	25161	6768	1.136	--
总计		110889	100.000	25161			

图136 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1633-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:10:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	120439	100.000	27289	6778	1.134	--
总计		120439	100.000	27289			

图137 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1634-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:13:29      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.361	127751	100.000	28909	6742	1.139	--
总计		127751	100.000	28909			

图138 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1635-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:16:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	128916	100.000	29113	6753	1.136	--
总计		128916	100.000	29113			

图139 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1636-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:20:11      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:26      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	122950	100.000	27845	6778	1.131	--
总计		122950	100.000	27845			

图140 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1637-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:23:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:29      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	116193	100.000	26263	6758	1.136	--
总计		116193	100.000	26263			

图141 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1638-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:26:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	126815	100.000	28552	6725	1.137	--
总计		126815	100.000	28552			

图142 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1639-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:30:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	137622	100.000	31042	6749	1.137	--
总计		137622	100.000	31042			

图143 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1640-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:33:37      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	146465	100.000	33035	6763	1.135	--
总计		146465	100.000	33035			

图144 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1641-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:36:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	145072	100.000	32831	6776	1.130	--
总计		145072	100.000	32831			

图145 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1642-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:40:19      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	141172	100.000	31872	6716	1.138	--
总计		141172	100.000	31872			

图146 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1643-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:43:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	133735	100.000	30069	6704	1.137	--
总计		133735	100.000	30069			

图147 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1644-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:47:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	144482	100.000	32548	6730	1.135	--
总计		144482	100.000	32548			

图148 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1645-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:50:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	154194	100.000	34741	6720	1.138	--
总计		154194	100.000	34741			

图149 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1646-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:53:45      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	159314	100.000	35914	6729	1.136	--
总计		159314	100.000	35914			

图150 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1647-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 21:57:06      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	156382	100.000	35257	6739	1.136	--
总计		156382	100.000	35257			

图151 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1648-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:00:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:26:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	156318	100.000	35418	6762	1.133	--
总计		156318	100.000	35418			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1649-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:03:48      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	148712	100.000	33663	6750	1.135	--
总计		148712	100.000	33663			

图153 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1650-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:07:09      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	157357	100.000	35565	6745	1.135	--
总计		157357	100.000	35565			

图154 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1651-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:10:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	162388	100.000	36815	6785	1.128	--
总计		162388	100.000	36815			

图155 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1652-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:13:51      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	167045	100.000	37842	6784	1.129	--
总计		167045	100.000	37842			

图156 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1653-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:17:13      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	163141	100.000	36859	6754	1.134	--
总计		163141	100.000	36859			

图157 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1654-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:20:35 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:18 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	164059	100.000	37093	6759	1.134	--
总计		164059	100.000	37093			

图158 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1655-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:23:56      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	156844	100.000	35533	6772	1.134	--
总计		156844	100.000	35533			

图159 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1656-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:27:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	164228	100.000	37154	6763	1.135	--
总计		164228	100.000	37154			

图160 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1657-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-8  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:30:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	169013	100.000	38086	6746	1.138	--
总计		169013	100.000	38086			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1658-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-17  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:34:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	171741	100.000	38863	6756	1.134	--
总计		171741	100.000	38863			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1659-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:37:25      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	168128	100.000	37978	6759	1.135	--
总计		168128	100.000	37978			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1660-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:40:47      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:37      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	170562	100.000	38540	6761	1.135	--
总计		170562	100.000	38540			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1661-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:44:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:40      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	164105	100.000	37042	6763	1.137	--
总计		164105	100.000	37042			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1662-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:47:32      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	169654	100.000	38323	6757	1.135	--
总计		169654	100.000	38323			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1663-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:50:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187690	100.000	42296	6706	1.137	--
总计		187690	100.000	42296			

图167 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1664-2 - zzp-2025061021p-pH6.8jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:54:16      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187890	100.000	42325	6715	1.138	--
总计		187890	100.000	42325			

图168 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025061021批(10mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1665-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-9  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 22:57:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:51      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1666-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:01:04      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:54      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187442	100.000	41888	6656	1.143	--
总计		187442	100.000	41888			

图170 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1667-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:04:27      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:27:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187318	100.000	41954	6674	1.144	--
总计		187318	100.000	41954			

图171 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1668-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:07:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187451	100.000	41967	6668	1.142	--
总计		187451	100.000	41967			

图172 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1669-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:11:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:02      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187453	100.000	42099	6693	1.140	--
总计		187453	100.000	42099			

图173 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1670-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-18  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:14:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	187409	100.000	42114	6698	1.139	--
总计		187409	100.000	42114			

图174 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1671-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:18:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	47718	100.000	10794	6758	1.134	--
总计		47718	100.000	10794			

图175 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1672-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:21:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	57761	100.000	13035	6755	1.138	--
总计		57761	100.000	13035			

图176 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1673-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:24:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:13      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	44312	100.000	10010	6766	1.139	--
总计		44312	100.000	10010			

图177 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1674-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:28:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	58342	100.000	13173	6762	1.138	--
总计		58342	100.000	13173			

图178 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1675-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:31:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	43351	100.000	9777	6740	1.137	--
总计		43351	100.000	9777			

图179 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1676-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:34:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:22      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	17377	100.000	3950	6795	1.130	--
总计		17377	100.000	3950			

图180 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1677-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:38:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:24      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	130798	100.000	29420	6739	1.138	--
总计		130798	100.000	29420			

图181 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1678-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:41:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:27      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	139651	100.000	31448	6750	1.138	--
总计		139651	100.000	31448			

图182 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1679-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:45:00      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:30      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	122636	100.000	27578	6746	1.137	--
总计		122636	100.000	27578			

图183 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1680-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:48:23      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:33      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	129981	100.000	29265	6746	1.136	--
总计		129981	100.000	29265			

图184 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1681-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:51:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:35      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	119926	100.000	27008	6750	1.136	--
总计		119926	100.000	27008			

图185 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1682-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:55:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:38      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	79240	100.000	17843	6750	1.139	--
总计		79240	100.000	17843			

图186 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1683-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/01 23:58:30      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:41      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	155793	100.000	35137	6748	1.136	--
总计		155793	100.000	35137			

图187 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1684-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:01:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:43      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	156527	100.000	35263	6754	1.136	--
总计		156527	100.000	35263			

图188 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1685-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:05:17      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:46      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	149300	100.000	33581	6729	1.139	--
总计		149300	100.000	33581			

图189 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1686-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:08:39      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:49      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	150505	100.000	34069	6771	1.133	--
总计		150505	100.000	34069			

图190 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1687-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:12:01      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:52      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.360	149532	100.000	33679	6723	1.139	--
总计		149532	100.000	33679			

图191 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1688-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:15:24      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:55      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	120846	100.000	27215	6753	1.134	--
总计		120846	100.000	27215			

图192 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1689-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:18:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:28:57      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	163384	100.000	36913	6738	1.135	--
总计		163384	100.000	36913			

图193 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1690-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:22:10      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:00      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	162543	100.000	36508	6734	1.139	--
总计		162543	100.000	36508			

图194 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1691-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:25:33      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:03      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	157684	100.000	35468	6738	1.138	--
总计		157684	100.000	35468			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5µm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1692-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 10 µl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:28:55      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:05      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	158064	100.000	35634	6756	1.136	--
总计		158064	100.000	35634			

图196 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1693-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:32:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:08      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	160586	100.000	36174	6746	1.137	--
总计		160586	100.000	36174			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1694-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:35:40      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:11      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	135087	100.000	30488	6775	1.135	--
总计		135087	100.000	30488			

图198 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1695-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:39:03      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:14      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	170765	100.000	38405	6719	1.139	--
总计		170765	100.000	38405			

图199 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1696-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:42:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:16      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	168670	100.000	38055	6736	1.137	--
总计		168670	100.000	38055			

图200 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1697-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:45:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:19      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	166832	100.000	37547	6721	1.138	--
总计		166832	100.000	37547			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm) 流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C 波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1698-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:49:12 实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:22 处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	165500	100.000	37271	6743	1.136	--
总计		165500	100.000	37271			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1699-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:52:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:25      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	169798	100.000	38140	6728	1.138	--
总计		169798	100.000	38140			

图203 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1700-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:55:58      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:28      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	148168	100.000	33363	6744	1.135	--
总计		148168	100.000	33363			

图204 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1701-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 00:59:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:31      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	174883	100.000	39344	6734	1.138	--
总计		174883	100.000	39344			

图205 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1702-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:02:44      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:34      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	173541	100.000	39072	6750	1.136	--
总计		173541	100.000	39072			

图206 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1703-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:06:08      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:36      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	171886	100.000	38610	6719	1.139	--
总计		171886	100.000	38610			

图207 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1704-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:09:31      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:39      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	171223	100.000	38530	6736	1.137	--
总计		171223	100.000	38530			

图208 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1705-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:12:54      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:42      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	175114	100.000	39397	6733	1.136	--
总计		175114	100.000	39397			

图209 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1706-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:16:18      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:45      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	156806	100.000	35285	6735	1.136	--
总计		156806	100.000	35285			

图210 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1707-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-7  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:19:41      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:47      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	177414	100.000	39910	6734	1.136	--
总计		177414	100.000	39910			

图211 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1708-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-16  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:23:05      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:50      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	175138	100.000	39445	6731	1.135	--
总计		175138	100.000	39445			

图212 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1709-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-25  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:26:28      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:53      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	174846	100.000	39311	6731	1.138	--
总计		174846	100.000	39311			

图213 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1710-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-34  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:29:52      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:56      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	173918	100.000	39070	6720	1.139	--
总计		173918	100.000	39070			

图214 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1711-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-43  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:33:15      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:29:59      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	177929	100.000	39976	6729	1.139	--
总计		177929	100.000	39976			

图215 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1712-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-52  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:36:38      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:01      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	161025	100.000	36312	6748	1.135	--
总计		161025	100.000	36312			

图216 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-浆法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1713-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-8  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:40:02      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:04      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	182183	100.000	41062	6742	1.136	--
总计		182183	100.000	41062			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1714-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-17  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:43:26      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:07      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.358	180329	100.000	40681	6733	1.139	--
总计		180329	100.000	40681			

### <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1715-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-26  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:46:49      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:09      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	180612	100.000	40643	6740	1.140	--
总计		180612	100.000	40643			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1716-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-35  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:50:12      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:12      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	179418	100.000	40365	6759	1.141	--
总计		179418	100.000	40365			




# SMF-4099

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1717-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-44  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:53:35      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:15      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>



## <峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	183364	100.000	41312	6749	1.139	--
总计		183364	100.000	41312			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1718-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-53  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 01:56:59      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:17      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>


检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.359	178857	100.000	40429	6775	1.136	--
总计		178857	100.000	40429			

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40 $^{\circ}$ C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1719-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 10  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 02:00:22      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:20      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	187560	100.000	42479	6708	1.139	--
总计		187560	100.000	42479			

图223 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(150mm\*4.6mm,5μm)      流速:1.8ml/min  
 柱温 : 40°C      波长:250nm  
 数据文件名: RC\$SMF-4099 - 29-41/18-1720-2 - zzp-2025060921p-pH4.5jz-jf50z-10mg-jyx1-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$SMF-4099 - SMF-4099-RCQX-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$SMF-4099 - 20250701-rc-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-27  
 进样体积: 10 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/02 02:03:46      实验者: jiangjinwei  
 处理时间 (V2) : 2025/07/02 09:30:23      处理者: jiangjinwei  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.357	187385	100.000	42327	6694	1.140	--
总计		187385	100.000	42327			

图224 非奈利酮片溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025060921批(10mg规格)-均一性1-pH4.5介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2