




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2295-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 11:48:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	457862	100.000	71671	2901	1.166	--
总计		457862	100.000	71671			

图6 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2296-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 11:51:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	60509	100.000	10023	3242	1.141	--
总计		60509	100.000	10023			

图7 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2297-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 11:54:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	59722	100.000	9886	3219	1.128	--
总计		59722	100.000	9886			

图8 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2298-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 11:58:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	61222	100.000	9949	3171	1.170	--
总计		61222	100.000	9949			

图9 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2299-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:01:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	69194	100.000	11254	3162	1.151	--
总计		69194	100.000	11254			

图10 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2301-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:08:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	59871	100.000	9728	3159	1.156	--
总计		59871	100.000	9728			

图12 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2302-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:11:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	148366	100.000	23805	3142	1.174	--
总计		148366	100.000	23805			

图13 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2303-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:15:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	153373	100.000	24511	3136	1.177	--
总计		153373	100.000	24511			

图14 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2304-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:18:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	147938	100.000	23729	3120	1.169	--
总计		147938	100.000	23729			

图15 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2305-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:21:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	153923	100.000	24783	3135	1.174	--
总计		153923	100.000	24783			

图16 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2306-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:25:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	98925	100.000	16003	3156	1.171	--
总计		98925	100.000	16003			

图17 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2307-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:28:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	144380	100.000	23366	3153	1.172	--
总计		144380	100.000	23366			

图18 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2308-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:32:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	204916	100.000	32998	3140	1.177	--
总计		204916	100.000	32998			

图19 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2309-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:35:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	214149	100.000	34379	3131	1.180	--
总计		214149	100.000	34379			

图20 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2310-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:38:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:11:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	214694	100.000	34500	3132	1.174	--
总计		214694	100.000	34500			

图21 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2311-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:42:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	207643	100.000	33436	3135	1.182	--
总计		207643	100.000	33436			

图22 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2312-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:45:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	164022	100.000	26496	3133	1.178	--
总计		164022	100.000	26496			

图23 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2313-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:48:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	200455	100.000	32322	3115	1.176	--
总计		200455	100.000	32322			

图24 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2314-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:52:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	252873	100.000	40773	3114	1.183	--
总计		252873	100.000	40773			

图25 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2315-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:55:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	257233	100.000	41277	3101	1.186	--
总计		257233	100.000	41277			

图26 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2316-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 12:59:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	263721	100.000	42291	3094	1.189	--
总计		263721	100.000	42291			

图27 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2317-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:02:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	256519	100.000	41242	3104	1.188	--
总计		256519	100.000	41242			

图28 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2318-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:05:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	212351	100.000	34180	3080	1.190	--
总计		212351	100.000	34180			

图29 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2319-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:09:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	250097	100.000	40117	3085	1.189	--
总计		250097	100.000	40117			

图30 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2320-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:12:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	326065	100.000	52315	3091	1.193	--
总计		326065	100.000	52315			

图31 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2321-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:15:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	315593	100.000	50717	3087	1.195	--
总计		315593	100.000	50717			

图32 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2322-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:19:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	323526	100.000	51971	3083	1.198	--
总计		323526	100.000	51971			

图33 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2323-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:22:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	307434	100.000	49630	3104	1.191	--
总计		307434	100.000	49630			

图34 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2324-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:26:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	280432	100.000	44950	3060	1.195	--
总计		280432	100.000	44950			

图35 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2325-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:29:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	308178	100.000	49375	3054	1.199	--
总计		308178	100.000	49375			

图36 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2326-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:32:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	385609	100.000	61328	3029	1.206	--
总计		385609	100.000	61328			

图37 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2327-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:36:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	353845	100.000	56287	3027	1.204	--
总计		353845	100.000	56287			

图38 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2328-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:39:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	372961	100.000	59325	3032	1.201	--
总计		372961	100.000	59325			

图39 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2329-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:42:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	366671	100.000	58248	3022	1.202	--
总计		366671	100.000	58248			

图40 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2330-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:46:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	341629	100.000	54210	3013	1.202	--
总计		341629	100.000	54210			

图41 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2331-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:49:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	350768	100.000	55746	3023	1.204	--
总计		350768	100.000	55746			

图42 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2332-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:53:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	401444	100.000	63331	2989	1.205	--
总计		401444	100.000	63331			

图43 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2333-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:56:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	391115	100.000	62190	3012	1.202	--
总计		391115	100.000	62190			

图44 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2334-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 13:59:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:12:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	391141	100.000	62184	3013	1.206	--
总计		391141	100.000	62184			

图45 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2335-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:03:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	389063	100.000	61868	3006	1.204	--
总计		389063	100.000	61868			

图46 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2336-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:06:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	370384	100.000	58917	3005	1.206	--
总计		370384	100.000	58917			

图47 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2337-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:09:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	371962	100.000	59091	3003	1.206	--
总计		371962	100.000	59091			

图48 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2338-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:13:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	432184	100.000	68473	2979	1.208	--
总计		432184	100.000	68473			

图49 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2340-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:20:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	433630	100.000	68187	2929	1.210	--
总计		433630	100.000	68187			

图51 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2341-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:23:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	421921	100.000	66391	2937	1.209	--
总计		421921	100.000	66391			

图52 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2342-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:26:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	407116	100.000	63985	2938	1.213	--
总计		407116	100.000	63985			

图53 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2343-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:30:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	390078	100.000	60905	2902	1.213	--
总计		390078	100.000	60905			

图54 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2346-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:40:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2350-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:54:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	457477	100.000	69991	2698	1.202	--
总计		457477	100.000	69991			

图61 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2351-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 14:57:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	457265	100.000	70090	2707	1.200	--
总计		457265	100.000	70090			

图62 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2352-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:00:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	61123	100.000	9850	3035	1.178	--
总计		61123	100.000	9850			

图63 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2353-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:04:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	63588	100.000	10234	3048	1.191	--
总计		63588	100.000	10234			

图64 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2354-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:07:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	53053	100.000	8596	3070	1.178	--
总计		53053	100.000	8596			

图65 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2355-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:11:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	53402	100.000	8581	3011	1.198	--
总计		53402	100.000	8581			

图66 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2356-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:14:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:13:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	58131	100.000	9335	3013	1.175	--
总计		58131	100.000	9335			

图67 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2358-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:21:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	149848	100.000	23830	2988	1.198	--
总计		149848	100.000	23830			

图69 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2359-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:24:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	150449	100.000	23792	2950	1.193	--
总计		150449	100.000	23792			

图70 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2360-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:28:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.194	136695	100.000	21583	2932	1.191	--
总计		136695	100.000	21583			

图71 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2361-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:31:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	137692	100.000	21766	2936	1.192	--
总计		137692	100.000	21766			

图72 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2362-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:34:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.193	142193	100.000	22300	2920	1.203	--
总计		142193	100.000	22300			

图73 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2363-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:38:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	135009	100.000	21293	2924	1.193	--
总计		135009	100.000	21293			

图74 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2364-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:41:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.191	218931	100.000	34188	2890	1.208	--
总计		218931	100.000	34188			

图75 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2365-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:45:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	208880	100.000	32696	2878	1.205	--
总计		208880	100.000	32696			

图76 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2366-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:48:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	206425	100.000	32255	2861	1.206	--
总计		206425	100.000	32255			

图77 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2367-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:51:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.189	203989	100.000	31652	2821	1.207	--
总计		203989	100.000	31652			

图78 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2368-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:55:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	200309	100.000	31294	2854	1.207	--
总计		200309	100.000	31294			

图79 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2369-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 15:58:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.187	204293	100.000	31760	2826	1.213	--
总计		204293	100.000	31760			

图80 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2370-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:02:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.187	268161	100.000	41804	2854	1.212	--
总计		268161	100.000	41804			

图81 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2371-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:05:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.185	250359	100.000	38913	2843	1.215	--
总计		250359	100.000	38913			

图82 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2372-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:08:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	257692	100.000	40089	2851	1.213	--
总计		257692	100.000	40089			

图83 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2373-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:12:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	248407	100.000	38591	2852	1.218	--
总计		248407	100.000	38591			

图84 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2374-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:15:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.184	252439	100.000	39201	2848	1.215	--
总计		252439	100.000	39201			

图85 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2375-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:19:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.183	254244	100.000	39240	2791	1.217	--
总计		254244	100.000	39240			

图86 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2376-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:22:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	333171	100.000	51144	2757	1.222	--
总计		333171	100.000	51144			

图87 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2377-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:25:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.182	320449	100.000	49280	2768	1.222	--
总计		320449	100.000	49280			

图88 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2378-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:29:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.181	318459	100.000	48939	2751	1.218	--
总计		318459	100.000	48939			

图89 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2379-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:32:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.180	306957	100.000	47357	2766	1.213	--
总计		306957	100.000	47357			

图90 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2380-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:36:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	316198	100.000	48370	2726	1.221	--
总计		316198	100.000	48370			

图91 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2381-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:39:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:14:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.179	318487	100.000	48987	2748	1.214	--
总计		318487	100.000	48987			

图92 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2382-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:43:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	380329	100.000	58586	2762	1.222	--
总计		380329	100.000	58586			

图93 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2383-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:46:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.178	375454	100.000	57863	2776	1.224	--
总计		375454	100.000	57863			

图94 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2384-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:49:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	370240	100.000	57095	2786	1.225	--
总计		370240	100.000	57095			

图95 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2385-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:53:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.177	358822	100.000	55085	2753	1.222	--
总计		358822	100.000	55085			

图96 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2386-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 16:56:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	355095	100.000	54301	2730	1.221	--
总计		355095	100.000	54301			

图97 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2387-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:00:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.175	367496	100.000	56208	2729	1.222	--
总计		367496	100.000	56208			

图98 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2388-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:03:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	412456	100.000	62747	2693	1.231	--
总计		412456	100.000	62747			

图99 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2389-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:06:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	403361	100.000	61819	2738	1.227	--
总计		403361	100.000	61819			

图100 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2390-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:10:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	380204	100.000	58364	2745	1.225	--
总计		380204	100.000	58364			

图101 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2391-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:13:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	388537	100.000	60845	2856	1.220	--
总计		388537	100.000	60845			

图102 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2392-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:17:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	392025	100.000	60937	2815	1.225	--
总计		392025	100.000	60937			

图103 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2393-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:20:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	388255	100.000	60349	2809	1.224	--
总计		388255	100.000	60349			

图104 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2394-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:23:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	436113	100.000	67375	2766	1.226	--
总计		436113	100.000	67375			

图105 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2395-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:27:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	423899	100.000	65115	2738	1.226	--
总计		423899	100.000	65115			

图106 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2396-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:30:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.170	421915	100.000	64431	2696	1.233	--
总计		421915	100.000	64431			

图107 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2397-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:34:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	415691	100.000	62949	2660	1.236	--
总计		415691	100.000	62949			

图108 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2399-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:40:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	411742	100.000	62986	2725	1.234	--
总计		411742	100.000	62986			

图110 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2400-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:44:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	460701	100.000	68388	2473	1.219	--
总计		460701	100.000	68388			

图111 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2401-2 - cbzj-M2449M1p-cq6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:47:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	460799	100.000	68372	2481	1.220	--
总计		460799	100.000	68372			

图112 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2402-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:51:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2403-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:54:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	463047	100.000	68809	2491	1.217	--
总计		463047	100.000	68809			

图114 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2404-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 17:57:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	462596	100.000	68804	2498	1.217	--
总计		462596	100.000	68804			

图115 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2405-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:01:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:15:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	463383	100.000	68857	2497	1.222	--
总计		463383	100.000	68857			

图116 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2406-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:04:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	462826	100.000	68945	2495	1.222	--
总计		462826	100.000	68945			

图117 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2407-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:08:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	462557	100.000	69041	2501	1.220	--
总计		462557	100.000	69041			

图118 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2408-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:11:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	35554	100.000	5558	2812	1.216	--
总计		35554	100.000	5558			

图119 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2409-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:14:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	42930	100.000	6807	2811	1.191	--
总计		42930	100.000	6807			

图120 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2410-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:18:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	39640	100.000	6325	2870	1.179	--
总计		39640	100.000	6325			

图121 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2411-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:21:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	47711	100.000	7500	2811	1.205	--
总计		47711	100.000	7500			

图122 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2412-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:24:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	48306	100.000	7679	2870	1.187	--
总计		48306	100.000	7679			

图123 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2413-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:28:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.173	48639	100.000	7725	2867	1.189	--
总计		48639	100.000	7725			

图124 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2414-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:31:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.174	107305	100.000	16908	2860	1.217	--
总计		107305	100.000	16908			

图125 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2417-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:41:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	118731	100.000	18695	2868	1.214	--
总计		118731	100.000	18695			

图128 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2418-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:45:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.172	118609	100.000	18645	2852	1.215	--
总计		118609	100.000	18645			

图129 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2419-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:48:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.171	114409	100.000	18083	2877	1.217	--
总计		114409	100.000	18083			

图130 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2421-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:55:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.169	163334	100.000	25481	2812	1.223	--
总计		163334	100.000	25481			

图132 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2422-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 18:58:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.168	174178	100.000	26996	2795	1.232	--
总计		174178	100.000	26996			

图133 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2423-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:02:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	172909	100.000	26689	2751	1.232	--
总计		172909	100.000	26689			

图134 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2424-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:05:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.165	178397	100.000	27759	2783	1.223	--
总计		178397	100.000	27759			

图135 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2425-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:08:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.166	171423	100.000	26499	2757	1.234	--
总计		171423	100.000	26499			

图136 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2426-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:12:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	210635	100.000	32663	2760	1.234	--
总计		210635	100.000	32663			

图137 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2428-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:18:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:16:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	222317	100.000	34532	2775	1.232	--
总计		222317	100.000	34532			

图139 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2430-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:25:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	220900	100.000	34078	2740	1.235	--
总计		220900	100.000	34078			

图141 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2432-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:32:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	276855	100.000	43100	2796	1.233	--
总计		276855	100.000	43100			

图143 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2433-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:35:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	269872	100.000	41769	2771	1.242	--
总计		269872	100.000	41769			

图144 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2434-2 - cbzj-M2449M1p-zztj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:39:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	282568	100.000	43653	2751	1.243	--
总计		282568	100.000	43653			

图145 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2435-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:42:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	280918	100.000	43442	2742	1.238	--
总计		280918	100.000	43442			

图146 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2436-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 19:45:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	283702	100.000	43397	2675	1.240	--
总计		283702	100.000	43397			

图147 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2441-2 - cbzj-M2449M1p-zztj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:02:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	340060	100.000	51312	2597	1.244	--
总计		340060	100.000	51312			

图152 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2442-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:06:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	336570	100.000	50516	2585	1.253	--
总计		336570	100.000	50516			

图153 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2444-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:12:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	359133	100.000	53417	2508	1.260	--
总计		359133	100.000	53417			

图155 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2445-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:16:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	359640	100.000	54458	2595	1.247	--
总计		359640	100.000	54458			

图156 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2446-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:19:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	360915	100.000	55275	2665	1.245	--
总计		360915	100.000	55275			

图157 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2448-2 - cbzj-M2449M1p-zztj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:26:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	363120	100.000	53901	2496	1.270	--
总计		363120	100.000	53901			

图159 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2450-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:32:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	401421	100.000	60359	2567	1.261	--
总计		401421	100.000	60359			

图161 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2451-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:36:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	407822	100.000	60491	2500	1.263	--
总计		407822	100.000	60491			

图162 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2452-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:39:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:17:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	392180	100.000	58561	2533	1.254	--
总计		392180	100.000	58561			

图163 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2453-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:43:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	410563	100.000	60993	2514	1.261	--
总计		410563	100.000	60993			

图164 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2454-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:46:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.141	397738	100.000	58558	2441	1.257	--
总计		397738	100.000	58558			

图165 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2456-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:53:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	466766	100.000	65594	2148	1.237	--
总计		466766	100.000	65594			

图167 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2457-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:56:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	466613	100.000	65673	2151	1.236	--
总计		466613	100.000	65673			

图168 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2458-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 20:59:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2463-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 21:16:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.114	465617	100.000	66171	2198	1.231	--
总计		465617	100.000	66171			

图174 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2465-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 21:23:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	50645	100.000	7714	2561	1.203	--
总计		50645	100.000	7714			

图176 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2468-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 21:33:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	49725	100.000	7636	2600	1.205	--
总计		49725	100.000	7636			

图179 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2469-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 21:37:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	61166	100.000	9230	2552	1.225	--
总计		61166	100.000	9230			

图180 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2470-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 21:40:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	106133	100.000	15797	2492	1.240	--
总计		106133	100.000	15797			

图181 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2476-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:00:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:18:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	160687	100.000	24035	2501	1.250	--
总计		160687	100.000	24035			

图187 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2478-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:07:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.134	175362	100.000	25895	2458	1.242	--
总计		175362	100.000	25895			

图189 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2480-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:14:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	178567	100.000	26553	2469	1.259	--
总计		178567	100.000	26553			

图191 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2481-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:17:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	199139	100.000	29552	2451	1.261	--
总计		199139	100.000	29552			

图192 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2482-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:21:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	196742	100.000	28793	2376	1.239	--
总计		196742	100.000	28793			

图193 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2483-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:24:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.130	216776	100.000	31240	2301	1.232	--
总计		216776	100.000	31240			

图194 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2485-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:31:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	213950	100.000	31429	2393	1.248	--
总计		213950	100.000	31429			

图196 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2486-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:34:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	217273	100.000	31915	2395	1.251	--
总计		217273	100.000	31915			

图197 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2487-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:38:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	239550	100.000	35085	2388	1.251	--
总计		239550	100.000	35085			

图198 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2488-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:41:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.125	248666	100.000	36198	2354	1.252	--
总计		248666	100.000	36198			

图199 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2490-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:48:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	283013	100.000	42028	2433	1.253	--
总计		283013	100.000	42028			

图201 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2491-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:51:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.121	272615	100.000	40246	2405	1.260	--
总计		272615	100.000	40246			

图202 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2492-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 22:55:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	288408	100.000	42159	2356	1.261	--
总计		288408	100.000	42159			

图203 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2494-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:01:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.122	304717	100.000	43030	2189	1.253	--
总计		304717	100.000	43030			

图205 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2496-2 - cbzj-M2449M1p-zztj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:08:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	338970	100.000	47726	2180	1.248	--
总计		338970	100.000	47726			

图207 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2497-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:12:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.119	332571	100.000	46529	2150	1.238	--
总计		332571	100.000	46529			

图208 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2498-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:15:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:19:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.118	338608	100.000	47073	2132	1.247	--
总计		338608	100.000	47073			

图209 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2501-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:25:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.115	372273	100.000	50820	2034	1.237	--
总计		372273	100.000	50820			

图212 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2504-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:35:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	385112	100.000	51107	1906	1.217	--
总计		385112	100.000	51107			

图215 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2505-2 - cbzj-M2449M1p-zztj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:39:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.111	381297	100.000	50286	1882	1.215	--
总计		381297	100.000	50286			

图216 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2506-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:42:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.112	398735	100.000	51588	1811	1.200	--
总计		398735	100.000	51588			

图217 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2507-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:46:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.113	398341	100.000	50762	1747	1.188	--
总计		398341	100.000	50762			

图218 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2508-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:49:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.110	405111	100.000	51656	1755	1.193	--
总计		405111	100.000	51656			

图219 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2509-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/08 23:52:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	410385	100.000	51764	1714	1.200	--
总计		410385	100.000	51764			

图220 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-浆法-75转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2512-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/09 00:03:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	469088	100.000	56989	1536	1.186	--
总计		469088	100.000	56989			

图223 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-44/7-2513-2 - cbzj-M2449M1p-zjtj6y-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jf75z-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX256.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250708-rc-FX256.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/09 00:06:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/09 09:20:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX256)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.082	469246	100.000	57122	1546	1.188	--
总计		469246	100.000	57122			

图224 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-M2449M1批-pH6.0(内含3%SDS)介质-桨法-75转
对照品溶液-2-2