SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3069-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:21:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:42:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm）　　流速:1.0ml/min
柱 温:40℃　　波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3070-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:26:45　　实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:42:58　　处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.882	2035287	100.000	207270	3575	1.145	--
总计		2035287	100.000	207270			

图2 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3071-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:32:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.883	2034244	100.000	207126	3580	1.145	--
总计		2034244	100.000	207126			

图3 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3072-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:37:31 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.883	2033912	100.000	206965	3580	1.144	--
总计		2033912	100.000	206965			

图4 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3073-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:42:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.881	2032102	100.000	207107	3574	1.144	--
总计		2032102	100.000	207107			

图5 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3074-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:48:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:11 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.882	2037617	100.000	207498	3577	1.144	--
总计		2037617	100.000	207498			

图6 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3075-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:53:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	1538150	100.000	156619	3564	1.157	--
总计		1538150	100.000	156619			

图7 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3076-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 11:59:02 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.852	1894538	100.000	192222	3526	1.173	--
总计		1894538	100.000	192222			

图8 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3077-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:04:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	1654585	100.000	168288	3540	1.166	--
总计		1654585	100.000	168288			

图9 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3078-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:09:45 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	1423439	100.000	144552	3541	1.158	--
总计		1423439	100.000	144552			

图10 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3079-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:15:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	1863633	100.000	189258	3535	1.174	--
总计		1863633	100.000	189258			

图11 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3080-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:20:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	1329895	100.000	135345	3558	1.154	--
总计		1329895	100.000	135345			

图12 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3081-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:25:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2100080	100.000	213728	3550	1.179	--
总计		2100080	100.000	213728			

图13 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3082-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:31:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.852	2157298	100.000	218957	3535	1.184	--
总计		2157298	100.000	218957			

图14 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3083-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:36:36 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.852	2127386	100.000	215841	3532	1.183	--
总计		2127386	100.000	215841			

图15 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3084-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:41:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.853	1987940	100.000	202017	3544	1.179	--
总计		1987940	100.000	202017			

图16 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3085-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:47:20 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.852	2148513	100.000	218107	3537	1.184	--
总计		2148513	100.000	218107			

图17 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3086-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:52:42 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.853	2016706	100.000	205017	3544	1.179	--
总计		2016706	100.000	205017			

图18 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3087-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 12:58:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.853	2175980	100.000	222319	3580	1.182	--
总计		2175980	100.000	222319			

图19 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3088-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:03:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.852	2178031	100.000	221569	3556	1.185	--
总计		2178031	100.000	221569			

图20 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3089-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:08:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:43:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.853	2158571	100.000	219984	3564	1.184	--
总计		2158571	100.000	219984			

图21 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3090-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:14:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2083260	100.000	212271	3566	1.182	--
总计		2083260	100.000	212271			

图22 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3091-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:19:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2172573	100.000	221189	3559	1.186	--
总计		2172573	100.000	221189			

图23 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3092-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:24:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2167189	100.000	220940	3566	1.185	--
总计		2167189	100.000	220940			

图24 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3093-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:30:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2177826	100.000	222912	3598	1.183	--
总计		2177826	100.000	222912			

图25 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3094-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:35:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2178439	100.000	222263	3572	1.185	--
总计		2178439	100.000	222263			

图26 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3095-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:40:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2159355	100.000	220094	3559	1.184	--
总计		2159355	100.000	220094			

图27 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3096-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:46:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2088634	100.000	212806	3563	1.182	--
总计		2088634	100.000	212806			

图28 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3097-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:51:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2169654	100.000	221058	3558	1.184	--
总计		2169654	100.000	221058			

图29 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3098-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 13:57:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2177927	100.000	221718	3555	1.185	--
总计		2177927	100.000	221718			

图30 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3099-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:02:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2177092	100.000	222315	3584	1.182	--
总计		2177092	100.000	222315			

图31 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3100-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:07:49 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2176010	100.000	221833	3565	1.184	--
总计		2176010	100.000	221833			

图32 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3101-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:13:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2157656	100.000	219742	3557	1.184	--
总计		2157656	100.000	219742			

图33 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3102-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:18:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2085666	100.000	212691	3570	1.181	--
总计		2085666	100.000	212691			

图34 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3103-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:23:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2166420	100.000	221069	3567	1.184	--
总计		2166420	100.000	221069			

图35 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3104-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:29:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2174644	100.000	221624	3565	1.184	--
总计		2174644	100.000	221624			

图36 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3105-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:34:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	2174590	100.000	221917	3592	1.182	--
总计		2174590	100.000	221917			

图37 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3106-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:39:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2172589	100.000	221469	3561	1.184	--
总计		2172589	100.000	221469			

图38 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3107-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:45:20 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2156123	100.000	219660	3564	1.183	--
总计		2156123	100.000	219660			

图39 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3108-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:50:42 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:44:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2083589	100.000	212479	3569	1.181	--
总计		2083589	100.000	212479			

图40 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3109-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 14:56:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2164174	100.000	220159	3555	1.185	--
总计		2164174	100.000	220159			

图41 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3110-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:01:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2174699	100.000	221364	3556	1.185	--
总计		2174699	100.000	221364			

图42 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3111-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:06:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	2169742	100.000	221661	3595	1.183	--
总计		2169742	100.000	221661			

图43 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3112-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:12:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2169294	100.000	221152	3569	1.184	--
总计		2169294	100.000	221152			

图44 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3113-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:17:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2152804	100.000	219271	3565	1.183	--
总计		2152804	100.000	219271			

图45 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3114-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:22:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:16 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2079700	100.000	211435	3546	1.183	--
总计		2079700	100.000	211435			

图46 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3115-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:28:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:19 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2160165	100.000	219750	3554	1.184	--
总计		2160165	100.000	219750			

图47 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3116-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:33:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:22 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2169564	100.000	220456	3543	1.186	--
总计		2169564	100.000	220456			

图48 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3117-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:39:01 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2164789	100.000	220831	3576	1.183	--
总计		2164789	100.000	220831			

图49 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3118-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:44:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:29 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2164488	100.000	220282	3555	1.186	--
总计		2164488	100.000	220282			

图50 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3119-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:49:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.854	2151825	100.000	219009	3555	1.185	--
总计		2151825	100.000	219009			

图51 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3120-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 15:55:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:35 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.855	2076702	100.000	211338	3557	1.182	--
总计		2076702	100.000	211338			

图52 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3121-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:00:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2153423	100.000	218812	3547	1.184	--
总计		2153423	100.000	218812			

图53 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3122-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:05:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:41 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2163784	100.000	220250	3563	1.182	--
总计		2163784	100.000	220250			

图54 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3123-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:11:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:44 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.890	2025248	100.000	207259	3629	1.144	--
总计		2025248	100.000	207259			

图55 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3124-2 - 250601p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:16:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.890	2025209	100.000	207106	3625	1.143	--
总计		2025209	100.000	207106			

图56 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3125-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:22:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3126-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:27:28 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	2055382	100.000	210845	3638	1.143	--
总计		2055382	100.000	210845			

图58 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3127-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:32:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:45:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	2056252	100.000	211000	3640	1.143	--
总计		2056252	100.000	211000			

图59 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3128-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:38:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	2055657	100.000	210884	3640	1.143	--
总计		2055657	100.000	210884			

图60 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3129-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:43:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	2053284	100.000	210888	3646	1.143	--
总计		2053284	100.000	210888			

图61 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3130-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:49:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	2057395	100.000	211020	3644	1.143	--
总计		2057395	100.000	211020			

图62 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3131-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:54:28 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	1617148	100.000	165391	3600	1.162	--
总计		1617148	100.000	165391			

图63 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3132-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 16:59:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.862	1728267	100.000	176608	3594	1.167	--
总计		1728267	100.000	176608			

图64 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3133-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:05:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	1485821	100.000	152096	3609	1.158	--
总计		1485821	100.000	152096			

图65 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3134-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:10:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	1563951	100.000	159968	3608	1.161	--
总计		1563951	100.000	159968			

图66 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3135-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:16:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	1192504	100.000	121910	3615	1.147	--
总计		1192504	100.000	121910			

图67 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3136-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:21:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	1426727	100.000	146000	3613	1.155	--
总计		1426727	100.000	146000			

图68 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3137-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:26:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2119940	100.000	215961	3583	1.181	--
总计		2119940	100.000	215961			

图69 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3138-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:32:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:34 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2078874	100.000	211936	3585	1.181	--
总计		2078874	100.000	211936			

图70 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3139-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:37:35 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:37 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	2116633	100.000	216212	3593	1.182	--
总计		2116633	100.000	216212			

图71 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3140-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:42:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	2063545	100.000	210836	3597	1.180	--
总计		2063545	100.000	210836			

图72 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3141-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:48:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2025071	100.000	206808	3597	1.179	--
总计		2025071	100.000	206808			

图73 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3142-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:53:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2096418	100.000	214063	3596	1.180	--
总计		2096418	100.000	214063			

图74 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3143-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 17:59:08 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2159485	100.000	220548	3591	1.182	--
总计		2159485	100.000	220548			

图75 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3144-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:04:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2108475	100.000	214890	3584	1.181	--
总计		2108475	100.000	214890			

图76 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3145-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:09:55 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.856	2153663	100.000	219903	3581	1.181	--
总计		2153663	100.000	219903			

图77 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3146-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:15:18 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:46:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2098730	100.000	213938	3584	1.181	--
总计		2098730	100.000	213938			

图78 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3147-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:20:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2119106	100.000	216096	3587	1.181	--
总计		2119106	100.000	216096			

图79 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3148-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:26:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2133124	100.000	217654	3590	1.182	--
总计		2133124	100.000	217654			

图80 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3149-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:31:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2159101	100.000	220083	3586	1.183	--
总计		2159101	100.000	220083			

图81 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3150-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:36:51 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2106049	100.000	215105	3581	1.182	--
总计		2106049	100.000	215105			

图82 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3151-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:42:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:16 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	2156458	100.000	220093	3584	1.183	--
总计		2156458	100.000	220093			

图83 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3152-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:47:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:19 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	2099223	100.000	213977	3580	1.182	--
总计		2099223	100.000	213977			

图84 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3153-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:53:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:22 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.858	2123542	100.000	216437	3580	1.183	--
总计		2123542	100.000	216437			

图85 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3154-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 18:58:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2138481	100.000	218022	3583	1.183	--
总计		2138481	100.000	218022			

图86 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3155-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:03:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:29 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2163780	100.000	220292	3582	1.184	--
总计		2163780	100.000	220292			

图87 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3156-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:09:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2107287	100.000	214730	3585	1.182	--
总计		2107287	100.000	214730			

图88 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3157-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:14:34 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:35 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2153954	100.000	219437	3579	1.184	--
总计		2153954	100.000	219437			

图89 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3158-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:19:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2096427	100.000	213538	3581	1.182	--
总计		2096427	100.000	213538			

图90 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3159-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:25:20 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.861	2124000	100.000	216448	3577	1.183	--
总计		2124000	100.000	216448			

图91 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3160-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:30:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2135159	100.000	217392	3577	1.182	--
总计		2135159	100.000	217392			

图92 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3161-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:36:08 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2155405	100.000	219442	3575	1.183	--
总计		2155405	100.000	219442			

图93 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3162-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:41:31 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2102790	100.000	214092	3575	1.181	--
总计		2102790	100.000	214092			

图94 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3163-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:46:55 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2149309	100.000	218681	3569	1.183	--
总计		2149309	100.000	218681			

图95 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3164-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:52:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:47:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2094012	100.000	213064	3572	1.181	--
总计		2094012	100.000	213064			

图96 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3165-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 19:57:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2125319	100.000	216357	3573	1.183	--
总计		2125319	100.000	216357			

图97 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3166-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:03:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.861	2135326	100.000	217521	3576	1.182	--
总计		2135326	100.000	217521			

图98 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3167-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:08:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2154376	100.000	218985	3567	1.183	--
总计		2154376	100.000	218985			

图99 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3168-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:13:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2100301	100.000	213646	3566	1.180	--
总计		2100301	100.000	213646			

图100 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3169-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:19:18 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:14 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2152639	100.000	218892	3569	1.183	--
总计		2152639	100.000	218892			

图101 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3170-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:24:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2089935	100.000	212377	3563	1.180	--
总计		2089935	100.000	212377			

图102 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3171-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:30:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2121231	100.000	215578	3566	1.181	--
总计		2121231	100.000	215578			

图103 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3172-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:35:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	2128500	100.000	216427	3569	1.182	--
总计		2128500	100.000	216427			

图104 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3173-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:40:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2150037	100.000	218771	3570	1.182	--
总计		2150037	100.000	218771			

图105 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3174-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:46:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2095850	100.000	213082	3565	1.180	--
总计		2095850	100.000	213082			

图106 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3175-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:51:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.860	2144520	100.000	218050	3563	1.183	--
总计		2144520	100.000	218050			

图107 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3176-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 20:57:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:37 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.861	2086781	100.000	211927	3555	1.180	--
总计		2086781	100.000	211927			

图108 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3177-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:02:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.862	2116879	100.000	215121	3560	1.180	--
总计		2116879	100.000	215121			

图109 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3178-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:07:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.861	2127739	100.000	216131	3557	1.180	--
总计		2127739	100.000	216131			

图110 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3179-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:13:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.892	2087592	100.000	213144	3629	1.146	--
总计		2087592	100.000	213144			

图111 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3180-2 - 250601p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:18:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.893	2087417	100.000	213435	3635	1.144	--
总计		2087417	100.000	213435			

图112 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250601批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3181-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:24:03 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3182-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:29:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.894	2061984	100.000	210614	3626	1.144	--
总计		2061984	100.000	210614			

图114 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3183-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:34:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:48:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.894	2062863	100.000	210709	3624	1.144	--
总计		2062863	100.000	210709			

图115 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3184-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:40:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.893	2064525	100.000	210810	3625	1.144	--
总计		2064525	100.000	210810			

图116 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3185-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:45:31 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.894	2064981	100.000	210850	3625	1.144	--
总计		2064981	100.000	210850			

图117 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3186-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:50:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.893	2063578	100.000	210650	3626	1.144	--
总计		2063578	100.000	210650			

图118 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3187-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 21:56:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	1590146	100.000	162225	3598	1.159	--
总计		1590146	100.000	162225			

图119 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3188-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:01:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	1846457	100.000	188429	3596	1.168	--
总计		1846457	100.000	188429			

图120 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3189-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:06:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	1787197	100.000	182267	3595	1.167	--
总计		1787197	100.000	182267			

图121 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3190-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:12:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	1733121	100.000	176793	3603	1.164	--
总计		1733121	100.000	176793			

图122 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3191-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:17:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	1646287	100.000	167778	3597	1.163	--
总计		1646287	100.000	167778			

图123 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3192-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:23:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	1939023	100.000	198075	3598	1.174	--
总计		1939023	100.000	198075			

图124 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3193-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:28:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2084105	100.000	212579	3588	1.179	--
总计		2084105	100.000	212579			

图125 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3194-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:33:49 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2185357	100.000	223076	3585	1.181	--
总计		2185357	100.000	223076			

图126 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3195-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:39:11 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2139264	100.000	218431	3590	1.180	--
总计		2139264	100.000	218431			

图127 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3196-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:44:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2126700	100.000	216961	3586	1.179	--
总计		2126700	100.000	216961			

图128 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3197-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:49:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2113557	100.000	215379	3578	1.179	--
总计		2113557	100.000	215379			

图129 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3198-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 22:55:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2150126	100.000	219226	3581	1.180	--
总计		2150126	100.000	219226			

图130 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3199-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:00:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2115530	100.000	215524	3571	1.179	--
总计		2115530	100.000	215524			

图131 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3200-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:05:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:49:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2214110	100.000	225455	3570	1.181	--
总计		2214110	100.000	225455			

图132 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3201-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:11:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2169733	100.000	221070	3575	1.179	--
总计		2169733	100.000	221070			

图133 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3202-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:16:42 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2173445	100.000	221613	3582	1.180	--
总计		2173445	100.000	221613			

图134 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3203-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:22:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2147851	100.000	218879	3577	1.180	--
总计		2147851	100.000	218879			

图135 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3204-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:27:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2157603	100.000	220043	3583	1.179	--
总计		2157603	100.000	220043			

图136 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3205-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:32:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:14 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2119249	100.000	216313	3589	1.178	--
总计		2119249	100.000	216313			

图137 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3206-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:38:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2214490	100.000	225982	3587	1.182	--
总计		2214490	100.000	225982			

图138 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3207-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:43:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2171229	100.000	221414	3580	1.179	--
总计		2171229	100.000	221414			

图139 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3208-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:48:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2180011	100.000	222343	3581	1.180	--
总计		2180011	100.000	222343			

图140 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3209-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:54:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2146048	100.000	218679	3578	1.180	--
总计		2146048	100.000	218679			

图141 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3210-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/10 23:59:36 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2157582	100.000	219609	3566	1.181	--
总计		2157582	100.000	219609			

图142 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3211-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:04:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:34 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2116919	100.000	215220	3560	1.179	--
总计		2116919	100.000	215220			

图143 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3212-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:10:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:37 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2214997	100.000	225351	3560	1.182	--
总计		2214997	100.000	225351			

图144 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3213-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:15:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2169407	100.000	220958	3577	1.181	--
总计		2169407	100.000	220958			

图145 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3214-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:21:02 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2179549	100.000	222238	3580	1.181	--
总计		2179549	100.000	222238			

图146 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3215-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:26:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2139514	100.000	218064	3580	1.180	--
总计		2139514	100.000	218064			

图147 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3216-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:31:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2150795	100.000	218710	3568	1.181	--
总计		2150795	100.000	218710			

图148 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3217-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:37:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2119890	100.000	215723	3574	1.180	--
总计		2119890	100.000	215723			

图149 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3218-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:42:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:50:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2215381	100.000	225600	3574	1.182	--
总计		2215381	100.000	225600			

图150 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3219-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:47:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2167857	100.000	220364	3560	1.182	--
总计		2167857	100.000	220364			

图151 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3220-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:53:08 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:03 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2174836	100.000	221402	3569	1.181	--
总计		2174836	100.000	221402			

图152 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3221-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 00:58:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2140046	100.000	217461	3559	1.181	--
总计		2140046	100.000	217461			

图153 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3222-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:03:50 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2155246	100.000	219300	3571	1.181	--
总计		2155246	100.000	219300			

图154 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3223-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:09:11 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2113759	100.000	214776	3557	1.180	--
总计		2113759	100.000	214776			

图155 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3224-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:14:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.862	2212842	100.000	224798	3550	1.183	--
总计		2212842	100.000	224798			

图156 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3225-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:19:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:18 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2159090	100.000	219720	3567	1.181	--
总计		2159090	100.000	219720			

图157 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3226-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:25:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.862	2172273	100.000	221103	3572	1.182	--
总计		2172273	100.000	221103			

图158 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3227-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:30:35 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:25 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2133764	100.000	218018	3597	1.183	--
总计		2133764	100.000	218018			

图159 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3228-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:35:56 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:28 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.863	2139758	100.000	218789	3597	1.182	--
总计		2139758	100.000	218789			

图160 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3229-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:41:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:31 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2113494	100.000	214397	3545	1.181	--
总计		2113494	100.000	214397			

图161 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3230-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:46:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:34 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2209242	100.000	224743	3565	1.183	--
总计		2209242	100.000	224743			

图162 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3231-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:52:01 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:37 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2159363	100.000	219282	3556	1.182	--
总计		2159363	100.000	219282			

图163 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3232-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 01:57:23 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:41 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2167914	100.000	220433	3562	1.183	--
总计		2167914	100.000	220433			

图164 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3233-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:02:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:44 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2124622	100.000	215913	3563	1.181	--
总计		2124622	100.000	215913			

图165 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3234-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:08:05 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2143319	100.000	217672	3555	1.182	--
总计		2143319	100.000	217672			

图166 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3235-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:13:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.897	2056292	100.000	209284	3600	1.145	--
总计		2056292	100.000	209284			

图167 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3236-2 - 250602p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:18:49 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.896	2056558	100.000	209282	3596	1.144	--
总计		2056558	100.000	209282			

图168 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3237-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:24:13 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:51:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3238-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:29:36 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.895	2089773	100.000	212899	3601	1.145	--
总计		2089773	100.000	212899			

图170 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3239-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:35:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.895	2092082	100.000	212871	3598	1.144	--
总计		2092082	100.000	212871			

图171 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3240-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:40:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.896	2086493	100.000	212737	3608	1.144	--
总计		2086493	100.000	212737			

图172 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3241-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:45:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.895	2080263	100.000	212282	3614	1.143	--
总计		2080263	100.000	212282			

图173 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3242-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:51:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.896	2078291	100.000	211877	3609	1.143	--
总计		2078291	100.000	211877			

图174 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3243-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 02:56:35 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.869	1633062	100.000	166923	3614	1.165	--
总计		1633062	100.000	166923			

图175 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3244-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:01:57 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	1484411	100.000	151228	3597	1.162	--
总计		1484411	100.000	151228			

图176 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3245-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:07:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	1773584	100.000	180522	3590	1.172	--
总计		1773584	100.000	180522			

图177 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3246-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:12:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.871	1611315	100.000	164701	3615	1.165	--
总计		1611315	100.000	164701			

图178 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3247-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:18:03 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	1746188	100.000	178070	3599	1.170	--
总计		1746188	100.000	178070			

图179 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3248-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:23:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.870	1674837	100.000	170929	3601	1.169	--
总计		1674837	100.000	170929			

图180 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3249-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:28:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2150818	100.000	219319	3587	1.186	--
总计		2150818	100.000	219319			

图181 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3250-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:34:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2037659	100.000	207487	3592	1.181	--
总计		2037659	100.000	207487			

图182 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3251-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:39:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2160187	100.000	219848	3579	1.183	--
总计		2160187	100.000	219848			

图183 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3252-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:44:56 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:47 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2120194	100.000	215510	3578	1.184	--
总计		2120194	100.000	215510			

图184 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3253-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:50:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2076108	100.000	210642	3566	1.183	--
总计		2076108	100.000	210642			

图185 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3254-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 03:55:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2079860	100.000	211691	3579	1.182	--
总计		2079860	100.000	211691			

图186 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3255-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:01:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:52:57 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2195497	100.000	223598	3581	1.184	--
总计		2195497	100.000	223598			

图187 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3256-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:06:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:00 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2109835	100.000	214662	3577	1.183	--
总计		2109835	100.000	214662			

图188 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3257-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:11:49 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2179484	100.000	221824	3570	1.185	--
总计		2179484	100.000	221824			

图189 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3258-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:17:11 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2151562	100.000	218807	3574	1.184	--
总计		2151562	100.000	218807			

图190 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3259-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:22:34 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2099970	100.000	213751	3571	1.183	--
总计		2099970	100.000	213751			

图191 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3260-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:27:56 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2101543	100.000	213303	3557	1.183	--
总计		2101543	100.000	213303			

图192 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3261-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:33:18 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:16 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2188031	100.000	222321	3565	1.185	--
总计		2188031	100.000	222321			

图193 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3262-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:38:41 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2113508	100.000	214750	3566	1.181	--
总计		2113508	100.000	214750			

图194 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3263-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:44:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2183478	100.000	221621	3562	1.185	--
总计		2183478	100.000	221621			

图195 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3264-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:49:27 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2152741	100.000	218268	3552	1.181	--
总计		2152741	100.000	218268			

图196 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3265-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 04:54:50 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:29 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2098599	100.000	212511	3540	1.178	--
总计		2098599	100.000	212511			

图197 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3266-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:00:12 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2099304	100.000	212382	3540	1.179	--
总计		2099304	100.000	212382			

图198 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3267-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:05:35 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:35 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2191333	100.000	222117	3548	1.182	--
总计		2191333	100.000	222117			

图199 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3268-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:10:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2109974	100.000	214049	3548	1.179	--
总计		2109974	100.000	214049			

图200 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3269-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:16:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.864	2180248	100.000	221494	3558	1.180	--
总计		2180248	100.000	221494			

图201 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3270-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:21:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	2145388	100.000	217971	3569	1.181	--
总计		2145388	100.000	217971			

图202 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3271-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:27:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2093545	100.000	211577	3527	1.177	--
总计		2093545	100.000	211577			

图203 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3272-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:32:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2093489	100.000	211294	3520	1.178	--
总计		2093489	100.000	211294			

图204 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3273-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:37:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2190268	100.000	221096	3519	1.180	--
总计		2190268	100.000	221096			

图205 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3274-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:43:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:53:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2106862	100.000	212746	3521	1.177	--
总计		2106862	100.000	212746			

图206 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3275-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:48:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2178543	100.000	219774	3520	1.179	--
总计		2178543	100.000	219774			

图207 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3276-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:54:01 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.866	2147444	100.000	216790	3521	1.178	--
总计		2147444	100.000	216790			

图208 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3277-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 05:59:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2092687	100.000	211135	3517	1.175	--
总计		2092687	100.000	211135			

图209 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3278-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:04:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:10 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	2097610	100.000	211269	3513	1.178	--
总计		2097610	100.000	211269			

图210 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3279-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:10:11 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:13 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2182965	100.000	220219	3527	1.179	--
总计		2182965	100.000	220219			

图211 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3280-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:15:34 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:16 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	2108406	100.000	212618	3526	1.178	--
总计		2108406	100.000	212618			

图212 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3281-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:20:58 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:19 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2174823	100.000	219300	3521	1.180	--
总计		2174823	100.000	219300			

图213 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3282-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:26:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2144387	100.000	216634	3529	1.178	--
总计		2144387	100.000	216634			

图214 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3283-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:31:45 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2087204	100.000	210363	3531	1.178	--
总计		2087204	100.000	210363			

图215 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3284-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:37:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:29 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2094883	100.000	211140	3516	1.178	--
总计		2094883	100.000	211140			

图216 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3285-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:42:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	2185393	100.000	220548	3528	1.179	--
总计		2185393	100.000	220548			

图217 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3286-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:47:55 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2105233	100.000	212699	3531	1.178	--
总计		2105233	100.000	212699			

图218 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3287-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:53:19 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2171996	100.000	218939	3520	1.180	--
总计		2171996	100.000	218939			

图219 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3288-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 06:58:43 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	2133137	100.000	215562	3537	1.179	--
总计		2133137	100.000	215562			

图220 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3289-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 07:04:07 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.867	2088699	100.000	210983	3535	1.178	--
总计		2088699	100.000	210983			

图221 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3290-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 07:09:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	2093280	100.000	211240	3528	1.180	--
总计		2093280	100.000	211240			

图222 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3291-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 07:14:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:52 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.898	2102450	100.000	213891	3595	1.144	--
总计		2102450	100.000	213891			

图223 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3292-2 - 250602p-zzp-2-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 07:20:17 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.899	2103802	100.000	213879	3598	1.144	--
总计		2103802	100.000	213879			

图224 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250602批(20mg规格)-均一性2-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3331-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 14:39:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:54:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图225 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3332-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 14:44:46 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.900	2086010	100.000	212165	3610	1.145	--
总计		2086010	100.000	212165			

图226 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3333-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 14:50:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:05 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.900	2082892	100.000	211762	3602	1.145	--
总计		2082892	100.000	211762			

图227 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3334-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 14:55:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:08 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.900	2079970	100.000	210869	3586	1.146	--
总计		2079970	100.000	210869			

图228 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3335-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:00:55 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.900	2079525	100.000	211461	3604	1.144	--
总计		2079525	100.000	211461			

图229 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3336-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:06:18 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:15 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.901	2078390	100.000	210949	3597	1.144	--
总计		2078390	100.000	210949			

图230 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3337-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:11:40 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:19 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	1770778	100.000	180298	3594	1.168	--
总计		1770778	100.000	180298			

图231 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3338-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:17:02 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:22 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.875	1522660	100.000	154858	3594	1.166	--
总计		1522660	100.000	154858			

图232 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3339-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:22:24 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:25 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.875	1632402	100.000	166018	3590	1.164	--
总计		1632402	100.000	166018			

图233 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3340-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:27:47 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:28 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	1804254	100.000	183791	3589	1.171	--
总计		1804254	100.000	183791			

图234 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3341-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:33:09 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:32 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	1603749	100.000	163124	3588	1.163	--
总计		1603749	100.000	163124			

图235 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3342-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-5min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:38:31 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:35 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	1683044	100.000	171062	3583	1.166	--
总计		1683044	100.000	171062			

图236 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3343-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:43:53 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:38 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.871	2117412	100.000	214550	3550	1.177	--
总计		2117412	100.000	214550			

图237 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3344-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:49:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:42 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.870	2106138	100.000	213263	3541	1.177	--
总计		2106138	100.000	213263			

图238 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3345-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 15:54:37 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:45 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.869	2097008	100.000	212349	3547	1.177	--
总计		2097008	100.000	212349			

图239 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3346-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:00:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:48 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.871	2142270	100.000	216945	3546	1.179	--
总计		2142270	100.000	216945			

图240 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3347-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:05:21 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:51 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.870	2128663	100.000	215403	3543	1.179	--
总计		2128663	100.000	215403			

图241 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3348-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-10min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:10:42 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:54 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.871	2119178	100.000	214624	3545	1.177	--
总计		2119178	100.000	214624			

图242 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3349-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:16:04 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:55:58 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2153608	100.000	218035	3543	1.178	--
总计		2153608	100.000	218035			

图243 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3350-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:21:26 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:01 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.870	2200094	100.000	222586	3538	1.179	--
总计		2200094	100.000	222586			

图244 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3351-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:26:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:04 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2169176	100.000	219617	3544	1.179	--
总计		2169176	100.000	219617			

图245 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3352-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:32:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:07 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2174700	100.000	220416	3551	1.179	--
总计		2174700	100.000	220416			

图246 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3353-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:37:32 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:11 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.871	2171447	100.000	219826	3543	1.178	--
总计		2171447	100.000	219826			

图247 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3354-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-15min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:42:54 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:14 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2144059	100.000	216990	3539	1.178	--
总计		2144059	100.000	216990			

图248 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3355-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:48:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:17 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2154007	100.000	218147	3547	1.177	--
总计		2154007	100.000	218147			

图249 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3356-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:53:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:21 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2186949	100.000	221275	3540	1.179	--
总计		2186949	100.000	221275			

图250 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3357-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 16:59:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:24 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2185254	100.000	221031	3532	1.179	--
总计		2185254	100.000	221031			

图251 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3358-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:04:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:27 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2183381	100.000	220853	3541	1.179	--
总计		2183381	100.000	220853			

图252 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3359-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:09:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2170740	100.000	219529	3540	1.179	--
总计		2170740	100.000	219529			

图253 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3360-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-20min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:15:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2147615	100.000	217238	3536	1.178	--
总计		2147615	100.000	217238			

图254 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3361-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:20:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2157778	100.000	218227	3539	1.179	--
总计		2157778	100.000	218227			

图255 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3362-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:25:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:39 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.871	2191555	100.000	221488	3531	1.180	--
总计		2191555	100.000	221488			

图256 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3363-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:31:15 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2179058	100.000	220346	3540	1.180	--
总计		2179058	100.000	220346			

图257 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3364-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:36:38 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.870	2179714	100.000	220675	3545	1.180	--
总计		2179714	100.000	220675			

图258 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3365-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:42:00 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:50 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2170512	100.000	219447	3537	1.179	--
总计		2170512	100.000	219447			

图259 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3366-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-30min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:47:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:53 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2143211	100.000	216838	3537	1.178	--
总计		2143211	100.000	216838			

图260 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3367-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:52:44 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2150518	100.000	217691	3543	1.178	--
总计		2150518	100.000	217691			

图261 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3368-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 17:58:06 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:56:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2187372	100.000	221469	3545	1.180	--
总计		2187372	100.000	221469			

图262 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3369-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:03:29 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:02 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2185632	100.000	220988	3537	1.179	--
总计		2185632	100.000	220988			

图263 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3370-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:08:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:06 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2177363	100.000	220187	3540	1.180	--
总计		2177363	100.000	220187			

图264 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3371-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:14:14 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:09 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2163286	100.000	218911	3544	1.180	--
总计		2163286	100.000	218911			

图265 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3372-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-45min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:19:36 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:12 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2141864	100.000	216533	3545	1.179	--
总计		2141864	100.000	216533			

图266 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3373-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:24:59 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:16 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2144458	100.000	216682	3538	1.181	--
总计		2144458	100.000	216682			

图267 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3374-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:30:22 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:20 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.872	2181548	100.000	220682	3539	1.180	--
总计		2181548	100.000	220682			

图268 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3375-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:35:45 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:23 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	2175892	100.000	219872	3537	1.180	--
总计		2175892	100.000	219872			

图269 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3376-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:41:08 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:26 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2173583	100.000	219373	3535	1.181	--
总计		2173583	100.000	219373			

图270 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3377-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:46:30 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:30 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2162983	100.000	218450	3536	1.180	--
总计		2162983	100.000	218450			

图271 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3378-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-60min.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:51:52 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:33 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2177605	100.000	220084	3537	1.181	--
总计		2177605	100.000	220084			

图272 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3379-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p1-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 18:57:16 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:36 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2158677	100.000	217837	3526	1.179	--
总计		2158677	100.000	217837			

图273 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3380-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p2-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:02:39 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:40 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2197519	100.000	221614	3526	1.181	--
总计		2197519	100.000	221614			

图274 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3381-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p3-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:08:02 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:43 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2176668	100.000	219871	3534	1.180	--
总计		2176668	100.000	219871			

图275 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3382-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p4-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:13:25 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:46 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2163253	100.000	218301	3532	1.180	--
总计		2163253	100.000	218301			

图276 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3383-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p5-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:18:48 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:49 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	2161843	100.000	218145	3529	1.180	--
总计		2161843	100.000	218145			

图277 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3384-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-p6-jx.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:24:10 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:52 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.875	2132572	100.000	215094	3534	1.180	--
总计		2132572	100.000	215094			

图278 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3385-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:29:33 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:56 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.906	2122845	100.000	216074	3616	1.146	--
总计		2122845	100.000	216074			

图279 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

999非布司他片

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm） 流速:1.0ml/min
柱 温:40℃ 波长:317nm
数据文件名: RC$999 - 0-143/26-3386-2 - 250603p-zzp-1-rcqx-pH6.8jz-20mg-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$999 - 20250710-999-fbst-rcqx-FX275.lcm
批处理文件名: RC$999 - 20250710-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/07/11 19:34:55 实验者: wangdan
处理时间（V2）: 2025/07/14 08:57:59 处理者: wangdan
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 317nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.906	2121854	100.000	215973	3617	1.146	--
总计		2121854	100.000	215973			

图280 非布司他片溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-250603批(20mg规格)-均一性1-pH6.8介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2