



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359 - 0-136/11-2359-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-rj.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-9

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:27:38

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:27

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2360-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 17:30:31
处理时间(V2): 2025/07/22 09:50:31
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	196507	100.000	37677	2251	1.166	--
总计		196507	100.000	37677			

图2 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2361-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-2.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-18

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:33:24

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:34

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	196427	100.000	37656	2248	1.167	--
总计		196427	100.000	37656			

图3 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2362-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-3.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-18

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:36:18

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:38

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	196603	100.000	37694	2250	1.165	--
总计		196603	100.000	37694			

图4 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2363-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-4.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-18

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:39:11

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:41

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	196446	100.000	37654	2248	1.166	--
总计		196446	100.000	37654			

图5 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2364-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-5.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-18

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:42:05

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:44

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	196154	100.000	37635	2252	1.166	--
总计		196154	100.000	37635			

图6 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2365-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/07/21 17:44:57

处理时间(V2): 2025/07/22 09:50:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	186376	100.000	40191	2923	1.154	--
总计		186376	100.000	40191			

图7 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359 - 0-136/11-2366-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-5min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-10

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:47:49

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:50

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	190487	100.000	40983	2928	1.155	--
总计		190487	100.000	40983			

图8 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2367-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-5min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-19

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:50:41

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:52

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.292	2758	1.470	685	2345	1.189	--
2	1.648	184945	98.530	39782	2925	1.155	3.118
总计		187703	100.000	40466			

图9 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2368-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-5min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 17:53:33
处理时间(V2): 2025/07/22 09:50:55
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	193127	100.000	41622	2928	1.154	--
总计		193127	100.000	41622			

图10 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2369-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-5min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-37

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:56:26

处理时间(V2):2025/07/22 09:50:58

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	189273	100.000	40833	2931	1.154	--
总计		189273	100.000	40833			

图11 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2370-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-5min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-46

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 17:59:17

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:01

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	186324	100.000	40187	2926	1.153	--
总计		186324	100.000	40187			

图12 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2371-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 18:02:10
处理时间(V2): 2025/07/22 09:51:04
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	195487	100.000	42157	2926	1.153	--
总计		195487	100.000	42157			

图13 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2372-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 18:05:03
处理时间(V2): 2025/07/22 09:51:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	196158	100.000	42298	2927	1.153	--
总计		196158	100.000	42298			

图14 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30℃ 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2373-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/21 18:07:55 实验者: lvtingting
处理时间(V2): 2025/07/22 09:51:09 处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	192742	100.000	41582	2929	1.153	--
总计		192742	100.000	41582			

图15 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2374-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-10min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-29
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:10:47
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.647	199274	100.000	43072	2936	1.152	--
总计		199274	100.000	43072			

图16 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2375-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-10min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-38
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:13:38
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:15
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	196341	100.000	42260	2931	1.153	--
总计		196341	100.000	42260			

图17 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2376-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-10min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-47

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 18:16:30

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:18

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	195722	100.000	42237	2939	1.152	--
总计		195722	100.000	42237			

图18 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2377-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 18:19:22
处理时间(V2): 2025/07/22 09:51:21
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	196103	100.000	42331	2943	1.152	--
总计		196103	100.000	42331			

图19 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2378-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-15min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-12
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:22:15
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:23
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	197498	100.000	42482	2932	1.153	--
总计		197498	100.000	42482			

图20 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2379-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-15min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-21

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 18:25:07

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	193647	100.000	41751	2945	1.154	--
总计		193647	100.000	41751			

图21 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2380-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-15min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-30

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 18:27:59

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:29

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	200026	100.000	43211	2949	1.152	--
总计		200026	100.000	43211			

图22 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2381-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-15min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-39
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:30:51
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:32
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	197160	100.000	42486	2936	1.153	--
总计		197160	100.000	42486			

图23 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2382-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 18:33:43
处理时间(V2): 2025/07/22 09:51:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	196976	100.000	42433	2939	1.153	--
总计		196976	100.000	42433			

图24 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2383-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-20min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-4

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 18:36:35

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:37

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	196602	100.000	42420	2932	1.153	--
总计		196602	100.000	42420			

图25 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2384-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-20min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-13
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:39:29
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:40
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	198622	100.000	42787	2926	1.153	--
总计		198622	100.000	42787			

图26 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2385-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 18:42:21
处理时间(V2): 2025/07/22 09:51:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	193995	100.000	41866	2932	1.154	--
总计		193995	100.000	41866			

图27 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2386-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-20min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-31

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 18:45:13

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:46

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	201042	100.000	43376	2938	1.154	--
总计		201042	100.000	43376			

图28 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2387-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-20min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-40
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:48:06
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:49
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	198234	100.000	42750	2936	1.153	--
总计		198234	100.000	42750			

图29 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2388-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-20min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-49
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:50:59
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:52
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	197051	100.000	42505	2935	1.153	--
总计		197051	100.000	42505			

图30 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2389-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-30min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-5

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 18:53:51

处理时间(V2):2025/07/22 09:51:55

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	197166	100.000	42517	2935	1.151	--
总计		197166	100.000	42517			

图31 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2390-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-30min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-14
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 18:56:44
处理时间(V2):2025/07/22 09:51:58
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	198665	100.000	42808	2941	1.153	--
总计		198665	100.000	42808			

图32 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30℃ 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2391-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/21 18:59:37 实验者: lvtingting
处理时间(V2): 2025/07/22 09:52:01 处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	194607	100.000	41995	2938	1.153	--
总计		194607	100.000	41995			

图33 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2392-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-30min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-32

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:02:29

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:04

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	201435	100.000	43342	2940	1.153	--
总计		201435	100.000	43342			

图34 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2393-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-30min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-41
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 19:05:21
处理时间(V2):2025/07/22 09:52:06
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	198758	100.000	42944	2940	1.152	--
总计		198758	100.000	42944			

图35 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2394-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-30min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-50

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:08:13

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:09

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	198440	100.000	42848	2940	1.152	--
总计		198440	100.000	42848			

图36 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2395-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-45min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-6
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 19:11:05
处理时间(V2):2025/07/22 09:52:12
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	197432	100.000	42620	2939	1.152	--
总计		197432	100.000	42620			

图37 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359 - 0-136/11-2396-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-45min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-15

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:13:57

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:15

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	199543	100.000	43034	2931	1.152	--
总计		199543	100.000	43034			

图38 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2397-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-45min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-24

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:16:49

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:17

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	196423	100.000	42386	2933	1.151	--
总计		196423	100.000	42386			

图39 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359 - 0-136/11-2398-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-45min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-33

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:19:41

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:20

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	202683	100.000	43588	2934	1.153	--
总计		202683	100.000	43588			

图40 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2399-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-45min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-42

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:22:33

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:23

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	199705	100.000	43007	2930	1.152	--
总计		199705	100.000	43007			

图41 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2400-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-45min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-51

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:25:25

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:26

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	199208	100.000	42865	2933	1.152	--
总计		199208	100.000	42865			

图42 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2401-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-60min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-7
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 19:28:17
处理时间(V2):2025/07/22 09:52:28
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	198070	100.000	42621	2931	1.152	--
总计		198070	100.000	42621			

图43 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱 温 :30℃

数据文件名 : RC\$QTL-359 - 0-136/11-2402-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-60min.lcd

方法文件名 : RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 10 μl

进样时间 : 2025/07/21 19:31:10

处理时间(V2) : 2025/07/22 09:52:31

仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流 速: 1.0ml/min


波 长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	200011	100.000	43049	2933	1.153	--
总计		200011	100.000	43049			

图44 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2403-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 19:34:03
处理时间(V2): 2025/07/22 09:52:34
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	195711	100.000	42105	2932	1.152	--
总计		195711	100.000	42105			

图45 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2404-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-60min.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-34
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 19:36:56
处理时间(V2):2025/07/22 09:52:37
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	202074	100.000	43504	2931	1.154	--
总计		202074	100.000	43504			

图46 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2405-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-60min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-43

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:39:49

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:40

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	199461	100.000	42892	2933	1.153	--
总计		199461	100.000	42892			

图47 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2406-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-60min.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-52

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:42:40

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:42

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	198468	100.000	42759	2927	1.152	--
总计		198468	100.000	42759			

图48 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2407-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-jx.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/21 19:45:33
处理时间(V2): 2025/07/22 09:52:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	198233	100.000	42694	2927	1.152	--
总计		198233	100.000	42694			

图49 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2408-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-jx.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-17
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 19:48:27
处理时间(V2):2025/07/22 09:52:48
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	200180	100.000	43148	2930	1.152	--
总计		200180	100.000	43148			

图50 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2409-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-jx.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260.lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-26

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:51:21

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:51

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	194596	100.000	41937	2926	1.152	--
总计		194596	100.000	41937			

图51 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-浆法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2410-2 - zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号: 1-35

进样体积: 10 μl

进样时间: 2025/07/21 19:54:13

处理时间(V2): 2025/07/22 09:52:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	203270	100.000	43720	2934	1.153	--
总计		203270	100.000	43720			

图52 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2411-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-jx.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-44

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:57:06

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:56

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	199953	100.000	43027	2935	1.154	--
总计		199953	100.000	43027			

图53 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2412-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-jx.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-53

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 19:59:59

处理时间(V2):2025/07/22 09:52:59

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	200223	100.000	43097	2933	1.152	--
总计		200223	100.000	43097			

图54 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2413-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-1.lcd

方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号:1-27

进样体积:10 μl

进样时间:2025/07/21 20:02:53

处理时间(V2):2025/07/22 09:53:02

仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min


波长:254nm

版本号:6.115

实验者:lvtingting

处理者:lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	198101	100.000	38046	2256	1.165	--
总计		198101	100.000	38046			

图55 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名:RC\$QTL-359-0-136/11-2414-2-zzp-25011302-2p-js6-rcqx-7.5mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-2.lcd
方法文件名:RC\$QTL-359-QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名:RC\$QTL-359-20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号:1-27
进样体积:10 μl
进样时间:2025/07/21 20:05:47
处理时间(V2):2025/07/22 09:53:05
仪器型号:SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速:1.0ml/min
波长:254nm
版本号:6.115
实验者:lvtingting
处理者:lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	198756	100.000	38165	2254	1.165	--
总计		198756	100.000	38165			

图56 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-2批-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2415-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-9
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:08:42
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2416-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-1.
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:11:37
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	396342	100.000	76052	2253	1.165	--
总计		396342	100.000	76052			

图58 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2417-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-2.
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:14:33
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	396672	100.000	76154	2257	1.164	--
总计		396672	100.000	76154			

图59 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2418-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-3.

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:17:27

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	396607	100.000	76101	2252	1.163	--
总计		396607	100.000	76101			

图60 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2419-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-4.
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:20:21
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	396687	100.000	76121	2253	1.163	--
总计		396687	100.000	76121			

图61 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2420-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-5.
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:23:15
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	396195	100.000	76069	2255	1.163	--
总计		396195	100.000	76069			

图62 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2421-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-5m
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-1
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:26:10
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	357658	100.000	76833	2925	1.151	--
总计		357658	100.000	76833			

图63 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2422-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-5m
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-10
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:29:04
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	363555	100.000	78031	2924	1.151	--
总计		363555	100.000	78031			

图64 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2423-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-5m

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-19

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:31:57

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	379117	100.000	81390	2925	1.151	--
总计		379117	100.000	81390			

图65 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2424-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-5m
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-28
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:34:51
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	361732	100.000	77721	2926	1.150	--
总计		361732	100.000	77721			

图66 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2425-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-5m
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-37
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:37:44
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	369319	100.000	79329	2926	1.151	--
总计		369319	100.000	79329			

图67 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2426-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-5m

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:40:37

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:38

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	365912	100.000	78615	2927	1.151	--
总计		365912	100.000	78615			

图68 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2427-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-10i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:43:30

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	381878	100.000	82091	2931	1.150	--
总计		381878	100.000	82091			

图69 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2428-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-10i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-11
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 20:46:25
处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	381912	100.000	82080	2927	1.150	--
总计		381912	100.000	82080			

图70 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2429-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-10i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:49:18

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	398492	100.000	85615	2926	1.150	--
总计		398492	100.000	85615			

图71 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2430-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-10i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-29

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:52:11

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:49

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	378094	100.000	81268	2930	1.151	--
总计		378094	100.000	81268			

图72 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2431-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-10i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-38

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:55:04

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	385607	100.000	82835	2929	1.150	--
总计		385607	100.000	82835			

图73 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2432-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-10i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 20:57:57

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	382618	100.000	82226	2927	1.150	--
总计		382618	100.000	82226			

图74 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2433-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-15i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-3

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:00:51

处理时间(V2)：2025/07/22 09:53:58

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	384347	100.000	82618	2928	1.150	--
总计		384347	100.000	82618			

图75 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2434-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-15i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-12

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:03:44

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	381290	100.000	81951	2929	1.151	--
总计		381290	100.000	81951			

图76 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2435-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-15i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-21
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:06:38
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	400933	100.000	86147	2924	1.150	--
总计		400933	100.000	86147			

图77 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2436-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-15i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-30
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:09:32
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:07
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	380260	100.000	81823	2933	1.149	--
总计		380260	100.000	81823			

图78 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2437-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-15i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-39

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:12:26

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	386724	100.000	83147	2929	1.149	--
总计		386724	100.000	83147			

图79 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2438-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-15i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-48

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:15:19

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	386719	100.000	83153	2929	1.150	--
总计		386719	100.000	83153			

图80 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2439-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-20i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-4

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:18:13

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:15

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	383575	100.000	82570	2927	1.149	--
总计		383575	100.000	82570			

图81 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2440-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-20i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-13
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:21:07
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	382143	100.000	82268	2925	1.150	--
总计		382143	100.000	82268			

图82 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2441-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-20i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-22
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:24:00
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	401222	100.000	86422	2930	1.150	--
总计		401222	100.000	86422			

图83 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2442-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-20i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-31
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:26:54
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:23
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	381642	100.000	82123	2925	1.149	--
总计		381642	100.000	82123			

图84 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2443-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-20i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-40

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:29:47

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	388309	100.000	83608	2926	1.150	--
总计		388309	100.000	83608			

图85 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2444-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-20i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-49
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:32:41
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:29
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	388461	100.000	83677	2929	1.149	--
总计		388461	100.000	83677			

图86 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2445-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-30i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-5

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:35:35

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	384505	100.000	82648	2928	1.149	--
总计		384505	100.000	82648			

图87 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2446-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-30i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-14

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:38:30

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	382418	100.000	82333	2927	1.149	--
总计		382418	100.000	82333			

图88 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2447-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-30i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-23
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 21:41:23
处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:37
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	402655	100.000	86679	2927	1.149	--
总计		402655	100.000	86679			

图89 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2448-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-30i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-32

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:44:16

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:40

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	383113	100.000	82410	2925	1.149	--
总计		383113	100.000	82410			

图90 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2449-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-30i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-41

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:47:10

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	390606	100.000	83920	2929	1.150	--
总计		390606	100.000	83920			

图91 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2450-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-30i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-50

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:50:04

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:46

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	391190	100.000	84206	2928	1.150	--
总计		391190	100.000	84206			

图92 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2451-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-45i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-6

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:52:59

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	385688	100.000	83081	2928	1.150	--
总计		385688	100.000	83081			

图93 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2452-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-45i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-15

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:55:53

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	384056	100.000	82666	2926	1.151	--
总计		384056	100.000	82666			

图94 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2453-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-45i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-24

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 21:58:47

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	402843	100.000	86719	2926	1.150	--
总计		402843	100.000	86719			

图95 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2454-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-45i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-33

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:01:41

处理时间(V2)：2025/07/22 09:54:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	386746	100.000	83305	2927	1.149	--
总计		386746	100.000	83305			

图96 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2455-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-45i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-42
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:04:35
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	390208	100.000	84023	2930	1.152	--
总计		390208	100.000	84023			

图97 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2456-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-45i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-51

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:07:28

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:02

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	390239	100.000	83936	2932	1.151	--
总计		390239	100.000	83936			

图98 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2457-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-60i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-7

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:10:22

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:05

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	385916	100.000	83116	2929	1.151	--
总计		385916	100.000	83116			

图99 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2458-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-60i
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-16
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:13:17
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	384881	100.000	82798	2923	1.150	--
总计		384881	100.000	82798			

图100 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2459-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-60i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-25

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:16:11

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:11

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	405798	100.000	87282	2923	1.149	--
总计		405798	100.000	87282			

图101 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2460-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-60i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-34

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:19:05

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:14

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	384050	100.000	82600	2924	1.150	--
总计		384050	100.000	82600			

图102 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2461-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-60i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-43

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:22:00

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	391144	100.000	84155	2924	1.149	--
总计		391144	100.000	84155			

图103 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2462-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-60i

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-52

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:24:53

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	391119	100.000	84133	2922	1.149	--
总计		391119	100.000	84133			

图104 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2463-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-jx.]

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-8

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:27:47

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:22

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	388486	100.000	83421	2925	1.150	--
总计		388486	100.000	83421			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2464-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-jx.]

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-17

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:30:41

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	385969	100.000	83051	2925	1.149	--
总计		385969	100.000	83051			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2465-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-jx.]

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-26

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:33:36

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:28

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	405435	100.000	87195	2925	1.149	--
总计		405435	100.000	87195			



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2466-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-jx.]

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-35

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:36:30

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:30

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	385520	100.000	82924	2924	1.150	--
总计		385520	100.000	82924			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2467-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-jx.]

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-44

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:39:26

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	390940	100.000	84050	2922	1.150	--
总计		390940	100.000	84050			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2468-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-jx.
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-53
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:42:19
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	391869	100.000	84194	2919	1.150	--
总计		391869	100.000	84194			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2469-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-1.
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：2-27
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:45:13
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	398181	100.000	76476	2256	1.162	--
总计		398181	100.000	76476			

图111 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2470-2 - zzp-25011301-1p-js6-rcqx-15mg-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-2.

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：2-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 22:48:07

处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	397633	100.000	76355	2255	1.163	--
总计		397633	100.000	76355			

图112 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011301-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2471-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-9
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:51:00
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:44
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2472-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:53:53
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	399962	100.000	76873	2261	1.163	--
总计		399962	100.000	76873			

图114 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2473-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:56:45
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	399900	100.000	76909	2262	1.162	--
总计		399900	100.000	76909			

图115 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2474-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-3.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 22:59:38
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	399946	100.000	76926	2264	1.163	--
总计		399946	100.000	76926			

图116 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温：30℃ 波长: 254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2475-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-4.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-18
进样体积：10 μl 版本号: 6.115
进样时间：2025/07/21 23:02:31 实验者: lvtingting
处理时间(V2)：2025/07/22 09:55:55 处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	400461	100.000	76995	2262	1.162	--
总计		400461	100.000	76995			

图117 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温: 30℃ 波长: 254nm
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2476-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
进样时间: 2025/07/21 23:05:24 实验者: lvtingting
处理时间(V2): 2025/07/22 09:55:58 处理者: lvtingting
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	400080	100.000	76929	2260	1.161	--
总计		400080	100.000	76929			

图118 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2477-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-1

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:08:15

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:01

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	379873	100.000	81666	2922	1.151	--
总计		379873	100.000	81666			

图119 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2478-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-10
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:11:07
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	371391	100.000	79887	2924	1.151	--
总计		371391	100.000	79887			



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2479-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-19

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:13:59

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:08

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	390654	100.000	83824	2925	1.152	--
总计		390654	100.000	83824			

图121 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2480-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-28
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:16:51
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	376008	100.000	80608	2923	1.152	--
总计		376008	100.000	80608			

图122 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2481-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-37
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:19:43
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	383362	100.000	82423	2921	1.151	--
总计		383362	100.000	82423			

图123 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2482-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:22:36

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:16

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	343459	100.000	73692	2924	1.151	--
总计		343459	100.000	73692			

图124 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2483-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-2

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:25:28

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:19

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	395482	100.000	84981	2922	1.150	--
总计		395482	100.000	84981			

图125 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359


<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2484-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-11
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:28:19
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	396822	100.000	85371	2928	1.149	--
总计		396822	100.000	85371			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2485-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-20

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:31:13

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:25

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	407469	100.000	87591	2924	1.150	--
总计		407469	100.000	87591			

图127 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2486-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-29
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:34:05
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:27
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	392984	100.000	84513	2925	1.150	--
总计		392984	100.000	84513			

图128 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2487-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-38
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:36:56
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:30
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	401101	100.000	86239	2924	1.150	--
总计		401101	100.000	86239			

图129 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2488-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-10min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-47

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:39:48

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:33

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	384854	100.000	82761	2925	1.150	--
总计		384854	100.000	82761			

图130 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2489-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-3

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:42:41

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:36

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	398228	100.000	85609	2925	1.150	--
总计		398228	100.000	85609			

图131 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2490-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-12

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:45:33

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	399712	100.000	85958	2925	1.149	--
总计		399712	100.000	85958			

图132 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2491-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:48:24

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	411753	100.000	88483	2925	1.150	--
总计		411753	100.000	88483			

图133 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2492-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-30

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:51:16

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:44

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	394941	100.000	84894	2924	1.149	--
总计		394941	100.000	84894			

图134 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2493-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-39
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:54:09
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:47
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	403831	100.000	86852	2926	1.149	--
总计		403831	100.000	86852			

图135 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2494-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-48

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/21 23:57:01

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:50

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	388097	100.000	83439	2925	1.150	--
总计		388097	100.000	83439			

图136 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2495-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-4
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/21 23:59:52
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	399324	100.000	85865	2924	1.149	--
总计		399324	100.000	85865			

图137 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2496-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-13

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:02:44

处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	402162	100.000	86293	2925	1.150	--
总计		402162	100.000	86293			

图138 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2497-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-22
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:05:37
处理时间(V2)：2025/07/22 09:56:58
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	412150	100.000	88351	2927	1.150	--
总计		412150	100.000	88351			

图139 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2498-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-31
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:08:30
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:01
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	396857	100.000	85359	2925	1.150	--
总计		396857	100.000	85359			

图140 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2499-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-40
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:11:21
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:04
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	404106	100.000	86915	2924	1.149	--
总计		404106	100.000	86915			

图141 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2500-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-49
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:14:12
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	389849	100.000	83824	2924	1.149	--
总计		389849	100.000	83824			

图142 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2501-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-5

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:17:04

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:09

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	405872	100.000	87041	2925	1.149	--
总计		405872	100.000	87041			

图143 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2502-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-14

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:19:56

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:12

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	402166	100.000	86505	2924	1.149	--
总计		402166	100.000	86505			

图144 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2503-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-23
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:22:48
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	413203	100.000	88694	2922	1.149	--
总计		413203	100.000	88694			

图145 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2504-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-32
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:25:39
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	398691	100.000	85808	2928	1.148	--
总计		398691	100.000	85808			

图146 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2505-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-41
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:28:30
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:20
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	406048	100.000	87064	2923	1.150	--
总计		406048	100.000	87064			

图147 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2506-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-50

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:31:22

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:23

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	390209	100.000	83707	2923	1.150	--
总计		390209	100.000	83707			

图148 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱

自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6

供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2507-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-6
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:34:13
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:26
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	402814	100.000	86416	2926	1.150	--
总计		402814	100.000	86416			

图149 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2508-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-15

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:37:06

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:29

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	404770	100.000	86859	2920	1.149	--
总计		404770	100.000	86859			

图150 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2509-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-24

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:39:56

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:32

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	412980	100.000	88838	2924	1.149	--
总计		412980	100.000	88838			

图151 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2510-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-33

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:42:47

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:34

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	399074	100.000	85647	2921	1.149	--
总计		399074	100.000	85647			

图152 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2511-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-42

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:45:38

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:37

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	411256	100.000	88318	2925	1.149	--
总计		411256	100.000	88318			

图153 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2512-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-51
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:48:29
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:40
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	392156	100.000	84272	2924	1.149	--
总计		392156	100.000	84272			

图154 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2513-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-7

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 00:51:21

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:43

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	402597	100.000	86598	2923	1.149	--
总计		402597	100.000	86598			

图155 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2514-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-16
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:54:12
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:46
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	404763	100.000	86955	2926	1.149	--
总计		404763	100.000	86955			

图156 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2515-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-25
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 00:57:04
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	413347	100.000	88794	2926	1.149	--
总计		413347	100.000	88794			

图157 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2516-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/22 00:59:55
处理时间(V2): 2025/07/22 09:57:52
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	399456	100.000	85803	2922	1.149	--
总计		399456	100.000	85803			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2517-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-43
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:02:46
处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:55
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	408021	100.000	87767	2923	1.149	--
总计		408021	100.000	87767			

图159 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2518-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-52

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:05:37

处理时间(V2)：2025/07/22 09:57:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	393087	100.000	84579	2925	1.149	--
总计		393087	100.000	84579			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2519-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-8
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:08:29
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	402960	100.000	86703	2925	1.149	--
总计		402960	100.000	86703			



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2520-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-17

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:11:22

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:03

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	404252	100.000	86814	2922	1.149	--
总计		404252	100.000	86814			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2521-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-26

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:14:13

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:06

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	414137	100.000	89122	2925	1.148	--
总计		414137	100.000	89122			



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2522-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-35

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:17:05

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:10

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	399647	100.000	85776	2924	1.148	--
总计		399647	100.000	85776			




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2523-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-44
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:19:57
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:12
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	407650	100.000	87732	2924	1.148	--
总计		407650	100.000	87732			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2524-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-53
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:22:50
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:15
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	394103	100.000	84633	2924	1.148	--
总计		394103	100.000	84633			



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2525-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-1.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：3-27
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:25:42
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:18
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	401205	100.000	77228	2268	1.162	--
总计		401205	100.000	77228			

图167 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2526-2 - zzp-25011302-1p-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-2.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：3-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:28:33

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:21

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	400909	100.000	77202	2268	1.162	--
总计		400909	100.000	77202			

图168 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2527-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-rj.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-9
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:31:27
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:24
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
溶剂



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2528-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:34:20

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:26

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	394223	100.000	75631	2251	1.162	--
总计		394223	100.000	75631			

图170 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1




SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
柱温：30℃ 波长: 254nm
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2529-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl 版本号: 6.115
进样时间：2025/07/22 01:37:14 实验者: lvtingting
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:29 处理者: lvtingting
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	395416	100.000	75829	2250	1.162	--
总计		395416	100.000	75829			

图171 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

〈样品信息〉

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2530-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/22 01:40:07
处理时间(V2): 2025/07/22 09:58:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

〈色谱图〉



〈峰表〉

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	395437	100.000	75853	2250	1.162	--
总计		395437	100.000	75853			

图172 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2531-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-4.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-18

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:43:04

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:35

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.630	395349	100.000	75803	2247	1.162	--
总计		395349	100.000	75803			

图173 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2532-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz1-5.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-18
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:45:56
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:38
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.629	395394	100.000	75827	2249	1.161	--
总计		395394	100.000	75827			

图174 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2533-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-1

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 01:48:49

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:41

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	366893	100.000	78804	2918	1.149	--
总计		366893	100.000	78804			

图175 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2534-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-10
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:51:42
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:43
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	360645	100.000	77484	2918	1.149	--
总计		360645	100.000	77484			

图176 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2535-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-19
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:54:34
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:46
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	311885	100.000	66834	2916	1.149	--
总计		311885	100.000	66834			

图177 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2536-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-5min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-28
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 01:57:25
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:49
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	371295	100.000	79817	2919	1.148	--
总计		371295	100.000	79817			

图178 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2537-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-37

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 02:00:18

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:52

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	342036	100.000	73371	2918	1.149	--
总计		342036	100.000	73371			

图179 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2538-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-5min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-46

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 02:03:10

处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:55

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.648	364573	100.000	78328	2917	1.148	--
总计		364573	100.000	78328			

图180 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2539-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-2
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:06:02
处理时间(V2)：2025/07/22 09:58:57
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	397455	100.000	85401	2920	1.148	--
总计		397455	100.000	85401			

图181 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2540-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-11
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:08:55
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:00
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	391345	100.000	83939	2922	1.149	--
总计		391345	100.000	83939			

图182 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2541-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-20
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:11:47
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:03
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	378502	100.000	81371	2922	1.148	--
总计		378502	100.000	81371			

图183 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2542-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-29
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:14:40
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:06
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	395007	100.000	84880	2921	1.149	--
总计		395007	100.000	84880			

图184 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2543-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-38
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:17:32
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:08
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	385766	100.000	82921	2921	1.149	--
总计		385766	100.000	82921			

图185 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2544-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-10min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-47
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:20:24
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:11
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	384141	100.000	82580	2921	1.148	--
总计		384141	100.000	82580			

图186 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2545-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-3
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:23:16
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:14
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	401704	100.000	86214	2925	1.149	--
总计		401704	100.000	86214			

图187 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2546-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-12
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:26:09
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:17
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	393745	100.000	84501	2926	1.149	--
总计		393745	100.000	84501			

图188 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2547-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-15min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-21

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 02:29:02

处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:20

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	391511	100.000	84060	2927	1.149	--
总计		391511	100.000	84060			

图189 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2548-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-30
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:31:55
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:22
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	397689	100.000	85487	2924	1.148	--
总计		397689	100.000	85487			

图190 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2549-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-39
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:34:47
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	390939	100.000	84044	2923	1.148	--
总计		390939	100.000	84044			

图191 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2550-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-15min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-48
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:37:40
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	387119	100.000	83224	2924	1.148	--
总计		387119	100.000	83224			

图192 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2551-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-4
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:40:32
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:31
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	403797	100.000	86579	2924	1.148	--
总计		403797	100.000	86579			

图193 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2552-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-13
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:43:25
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:33
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	393931	100.000	84445	2926	1.149	--
总计		393931	100.000	84445			

图194 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2553-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-20min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-22
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 02:46:19
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	393173	100.000	84324	2927	1.148	--
总计		393173	100.000	84324			

图195 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2554-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-31

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 02:49:11

处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:39

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	398261	100.000	85440	2927	1.149	--
总计		398261	100.000	85440			

图196 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2555-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/22 02:52:05
处理时间(V2): 2025/07/22 09:59:42
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	393854	100.000	84505	2929	1.149	--
总计		393854	100.000	84505			

图197 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2556-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-20min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-49

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 02:54:57

处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	388299	100.000	83327	2926	1.148	--
总计		388299	100.000	83327			

图198 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2557-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-30min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-5

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 02:57:51

处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:48

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	405117	100.000	86891	2925	1.148	--
总计		405117	100.000	86891			

图199 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2558-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-14
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:00:44
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:50
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	396002	100.000	84813	2925	1.149	--
总计		396002	100.000	84813			

图200 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2559-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-23
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:03:36
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:53
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	395073	100.000	84702	2927	1.149	--
总计		395073	100.000	84702			

图201 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2560-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-32
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:06:29
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:56
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	400849	100.000	85943	2924	1.148	--
总计		400849	100.000	85943			

图202 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2561-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-41
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:09:21
处理时间(V2)：2025/07/22 09:59:59
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	393259	100.000	84258	2926	1.149	--
总计		393259	100.000	84258			

图203 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2562-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-30min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-50
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:12:14
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:02
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	388749	100.000	83308	2924	1.150	--
总计		388749	100.000	83308			

图204 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2563-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-45min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-6

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 03:15:08

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:04

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	407839	100.000	87381	2924	1.149	--
总计		407839	100.000	87381			

图205 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

样品信息

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2564-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-45min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/22 03:18:01
处理时间(V2): 2025/07/22 10:00:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

色谱图



峰表

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	395624	100.000	84840	2926	1.150	--
总计		395624	100.000	84840			

图206 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2565-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-24
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:20:56
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:10
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	396531	100.000	85012	2928	1.149	--
总计		396531	100.000	85012			

图207 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2566-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-33
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:23:49
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:13
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	401881	100.000	86158	2927	1.149	--
总计		401881	100.000	86158			

图208 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2567-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-42
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:26:42
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:16
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	396353	100.000	85011	2927	1.148	--
总计		396353	100.000	85011			

图209 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2568-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-45min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-51
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:29:35
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:19
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	390853	100.000	83831	2928	1.150	--
总计		390853	100.000	83831			

图210 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

样品信息

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温: 30℃
数据文件名: RC\$QTL-359 - 0-136/11-2569-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-60min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 10 μl
进样时间: 2025/07/22 03:32:29
处理时间(V2): 2025/07/22 10:00:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

色谱图



峰表

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	406027	100.000	87274	2925	1.148	--
总计		406027	100.000	87274			

图211 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1




QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2570-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-16
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:35:22
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:25
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	396423	100.000	85218	2925	1.149	--
总计		396423	100.000	85218			

图212 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2571-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-25
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:38:15
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:28
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	396314	100.000	85205	2926	1.149	--
总计		396314	100.000	85205			

图213 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2572-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-60min.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-34

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 03:41:09

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:31

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min


波长：254nm

版本号：6.115

实验者：lvtingting

处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	402191	100.000	86496	2928	1.149	--
总计		402191	100.000	86496			

图214 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2573-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260.lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-43
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:44:03
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:34
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	394702	100.000	84763	2931	1.150	--
总计		394702	100.000	84763			

图215 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2574-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-60min.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-52
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:46:56
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:36
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速：1.0ml/min
波长：254nm
版本号：6.115
实验者：lvtingting
处理者：lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	392124	100.000	83970	2931	1.150	--
总计		392124	100.000	83970			

图216 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-
桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2575-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p1-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-8
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:49:50
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:39
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	406393	100.000	87299	2925	1.149	--
总计		406393	100.000	87299			

图217 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片1
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2576-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p2-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-17

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 03:52:43

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:42

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	395740	100.000	84979	2921	1.150	--
总计		395740	100.000	84979			

图218 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片2
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2577-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p3-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-26

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 03:55:37

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:45

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	395779	100.000	84968	2926	1.150	--
总计		395779	100.000	84968			

图219 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片3
供试品溶液-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2578-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p4-jx.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-35
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 03:58:29
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:48
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	402781	100.000	86509	2922	1.150	--
总计		402781	100.000	86509			

图220 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片4
供试品溶液-1



QTL-359

＜样品信息＞

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2579-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p5-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-44

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 04:01:23

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:51

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

＜色谱图＞



＜峰表＞

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.649	396116	100.000	85087	2925	1.150	--
总计		396116	100.000	85087			

图221 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片5
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2580-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-p6-jx.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-53

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 04:04:17

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:54

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.650	394215	100.000	83974	2928	1.152	--
总计		394215	100.000	83974			

图222 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转-
极限转速-片6
供试品溶液-1



QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)

柱温：30℃

数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2581-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-1.lcd

方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm

批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb

样品瓶号：4-27

进样体积：10 μl

进样时间：2025/07/22 04:07:10

处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:57

仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min


波长: 254nm

版本号: 6.115

实验者: lvtingting

处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.631	402515	100.000	77395	2268	1.162	--
总计		402515	100.000	77395			

图223 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1



SHIMADZU
LabSolutions


QTL-359

<样品信息>

色谱柱：XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)
柱温：30℃
数据文件名：RC\$QTL-359 - 0-136/11-2582-2 - zzp-25011302-1p-gzj-js6-rcqx-15mg-jf50z-shui-sdsjz-dz2-2.lcd
方法文件名：RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX260..lcm
批处理文件名：RC\$QTL-359 - 20250721-rcqx-FX260.lcb
样品瓶号：4-27
进样体积：10 μl
进样时间：2025/07/22 04:10:04
处理时间(V2)：2025/07/22 10:00:59
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C (FX260)

流速: 1.0ml/min
波长: 254nm
版本号: 6.115
实验者: lvtingting
处理者: lvtingting

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.631	402116	100.000	77272	2264	1.163	--
总计		402116	100.000	77272			

图224 托伐普坦口崩片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25011302-1批-干燥剂(15mg规格)-shui(内含%SDS)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2