


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-485-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 13:51:04 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:01:36 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-486-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 13:56:27 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:01:40 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.941	573177	100.000	50990	2823	1.042	--
总计		573177	100.000	50990			


图2 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-487-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:01:50 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:01:43 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.933	572651	100.000	50951	2821	1.043	--
总计		572651	100.000	50951			


图3 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-488-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:07:13 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:01:46 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.932	569576	100.000	50893	2834	1.044	--
总计		569576	100.000	50893			


图4 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-489-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:12:36 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:01:49 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.930	570514	100.000	50932	2818	1.043	--
总计		570514	100.000	50932			


图5 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-490-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:17:59 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:01:52 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.928	573895	100.000	50940	2792	1.043	--
总计		573895	100.000	50940			


图6 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-491-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:23:21 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:01:55 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.930	455701	100.000	40729	2831	1.026	--
总计		455701	100.000	40729			


图7 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-492-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:28:44 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:01:58 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.933	462345	100.000	41136	2817	1.029	--
总计		462345	100.000	41136			


图8 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-493-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:34:06 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:02:01 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.940	451217	100.000	40227	2825	1.035	--
总计		451217	100.000	40227			


图9 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-494-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:39:28 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:03 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.933	473141	100.000	42016	2810	1.034	--
总计		473141	100.000	42016			

图10 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-495-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:44:50 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:06 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.935	473255	100.000	42058	2805	1.038	--
总计		473255	100.000	42058			

图11 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-496-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:50:12 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:09 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.936	466280	100.000	41591	2819	1.034	--
总计		466280	100.000	41591			


图12 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-497-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 14:55:35 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:12 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.937	489951	100.000	43318	2776	1.035	--
总计		489951	100.000	43318			

图13 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-498-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:00:57 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:14 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.935	493671	100.000	43539	2767	1.038	--
总计		493671	100.000	43539			

图14 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-499-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:06:19 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:17 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.936	472947	100.000	41839	2784	1.036	--
总计		472947	100.000	41839			

图15 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-500-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:11:42 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:20 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.929	487496	100.000	43375	2792	1.034	--
总计		487496	100.000	43375			

图16 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-501-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:17:04 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:23 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.930	490537	100.000	43609	2797	1.037	--
总计		490537	100.000	43609			


图17 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-502-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:22:25 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:25 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.928	487728	100.000	43343	2788	1.037	--
总计		487728	100.000	43343			

图18 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-503-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:27:48 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:28 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.929	496247	100.000	43926	2769	1.039	--
总计		496247	100.000	43926			

图19 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-504-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:33:10 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:31 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.938	497200	100.000	43782	2756	1.042	--
总计		497200	100.000	43782			

图20 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-505-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:38:32 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:34 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	473924	100.000	41804	2757	1.045	--
总计		473924	100.000	41804			

图21 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-506-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:43:54 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:36 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.930	497881	100.000	43731	2740	1.048	--
总计		497881	100.000	43731			

图22 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-507-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:49:16 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:39 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.928	498879	100.000	43736	2721	1.050	--
总计		498879	100.000	43736			

图23 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-508-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 15:54:38 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:42 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.929	497545	100.000	43531	2716	1.054	--
总计		497545	100.000	43531			

图24 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-509-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:00:00 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:44 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	497627	100.000	43734	2739	1.049	--
总计		497627	100.000	43734			

图25 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-510-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:05:22 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:47 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.926	499921	100.000	43702	2713	1.053	--
总计		499921	100.000	43702			


图26 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-511-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:10:45 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:50 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	477802	100.000	41959	2721	1.054	--
总计		477802	100.000	41959			

图27 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-512-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:16:07 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:53 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.926	497917	100.000	43664	2725	1.056	--
总计		497917	100.000	43664			

图28 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-513-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:21:30 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:55 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	501788	100.000	43957	2730	1.057	--
总计		501788	100.000	43957			


图29 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-514-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:26:52 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:02:58 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.923	499847	100.000	43912	2732	1.061	--
总计		499847	100.000	43912			


图30 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-515-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:32:14 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:01 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.929	502014	100.000	44076	2738	1.055	--
总计		502014	100.000	44076			

图31 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-516-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:37:36 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:04 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.931	502524	100.000	44058	2731	1.057	--
总计		502524	100.000	44058			


图32 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-517-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:42:57 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:07 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.927	480219	100.000	42386	2762	1.053	--
总计		480219	100.000	42386			


图33 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-518-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:48:18 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:10 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.924	500339	100.000	43980	2729	1.055	--
总计		500339	100.000	43980			

图34 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-519-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:53:40 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:12 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.915	502941	100.000	44257	2726	1.058	--
总计		502941	100.000	44257			


图35 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-520-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 16:59:01 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:15 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	502916	100.000	44128	2729	1.064	--
总计		502916	100.000	44128			


图36 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-521-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:04:23 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:18 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	506422	100.000	44436	2726	1.061	--
总计		506422	100.000	44436			


图37 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-522-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:09:45 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:20 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	505489	100.000	44410	2732	1.060	--
总计		505489	100.000	44410			

图38 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-523-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:15:07 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:23 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.915	488021	100.000	42977	2737	1.060	--
总计		488021	100.000	42977			


图39 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-524-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:20:29 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:26 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.919	506787	100.000	44487	2723	1.062	--
总计		506787	100.000	44487			

图40 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-525-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:25:50 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:29 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	509623	100.000	44839	2735	1.058	--
总计		509623	100.000	44839			

图41 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-526-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:31:12 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:31 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.922	506039	100.000	44434	2724	1.060	--
总计		506039	100.000	44434			


图42 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-527-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:36:34 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:34 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.917	504962	100.000	44322	2722	1.062	--
总计		504962	100.000	44322			


图43 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-528-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:41:56 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:37 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.916	508161	100.000	44603	2720	1.062	--
总计		508161	100.000	44603			


图44 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-529-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:47:18 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:40 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.916	490360	100.000	42936	2710	1.063	--
总计		490360	100.000	42936			


图45 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-530-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:52:40 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:43 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.914	506791	100.000	44538	2717	1.062	--
总计		506791	100.000	44538			


图46 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-531-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 17:58:02 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.915	510999	100.000	44806	2699	1.061	--
总计		510999	100.000	44806			


图47 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-532-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:03:23 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:48 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.911	506392	100.000	44371	2697	1.059	--
总计		506392	100.000	44371			


图48 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-533-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:08:46 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:51 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.915	507750	100.000	44778	2740	1.061	--
总计		507750	100.000	44778			

图49 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-534-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:14:08 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:03:53 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.917	513662	100.000	45166	2732	1.060	--
总计		513662	100.000	45166			

图50 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-535-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:19:30 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:56 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.917	489961	100.000	43097	2726	1.061	--
总计		489961	100.000	43097			


图51 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-536-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:24:52 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:03:59 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.912	510374	100.000	44792	2706	1.061	--
总计		510374	100.000	44792			

图52 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-537-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:30:15 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:02 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.910	513874	100.000	45074	2705	1.061	--
总计		513874	100.000	45074			

图53 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-538-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:35:38 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:04:04 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.909	506218	100.000	44573	2728	1.062	--
总计		506218	100.000	44573			

图54 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-539-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:41:01 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:04:07 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.902	580195	100.000	51071	2726	1.075	--
总计		580195	100.000	51071			

图55 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-2-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-540-2 - zzp-25072102p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:46:23 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2): 2025/07/26 14:04:10 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.900	581025	100.000	51212	2722	1.054	--
总计		581025	100.000	51212			

图56 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072102批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-2-2




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-541-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:51:47 实验者: lvtingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:13 处理者: lvtingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 溶剂




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-542-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 18:57:11 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:16 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.899	584165	100.000	51928	2767	1.050	--
总计		584165	100.000	51928			

图58 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-543-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:02:34 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:19 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.899	584376	100.000	51896	2770	1.049	--
总计		584376	100.000	51896			

图59 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-2




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-544-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:07:58 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:22 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.894	580657	100.000	51693	2769	1.054	--
总计		580657	100.000	51693			

图60 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-3




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-545-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:13:21 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:24 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.893	580015	100.000	51491	2752	1.047	--
总计		580015	100.000	51491			

图61 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-4




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-546-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:18:45 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:27 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	579648	100.000	51393	2738	1.050	--
总计		579648	100.000	51393			


图62 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-547-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:24:08 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:30 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.895	460109	100.000	41176	2793	1.027	--
总计		460109	100.000	41176			


图63 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-548-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:29:31 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:33 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.887	462355	100.000	41401	2777	1.028	--
总计		462355	100.000	41401			


图64 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-549-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:34:53 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:35 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.891	479641	100.000	42926	2783	1.030	--
总计		479641	100.000	42926			

图65 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-550-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:40:16 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:38 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.890	462157	100.000	41236	2760	1.036	--
总计		462157	100.000	41236			

图66 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-551-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:45:39 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:41 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.889	452745	100.000	40176	2723	1.039	--
总计		452745	100.000	40176			


图67 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-552-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:51:02 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:43 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.885	459712	100.000	40961	2748	1.046	--
总计		459712	100.000	40961			


图68 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-553-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 19:56:25 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:46 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.881	475906	100.000	42505	2749	1.048	--
总计		475906	100.000	42505			

图69 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-554-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:01:48 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:49 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.879	482686	100.000	43133	2749	1.054	--
总计		482686	100.000	43133			


图70 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-555-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:07:11 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:51 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.877	499609	100.000	44324	2711	1.058	--
总计		499609	100.000	44324			

图71 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-556-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:12:34 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:54 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.875	488698	100.000	43290	2703	1.063	--
总计		488698	100.000	43290			

图72 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-557-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:17:57 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:04:57 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.874	480263	100.000	42429	2697	1.063	--
总计		480263	100.000	42429			

图73 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-558-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:23:20 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:00 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.873	483455	100.000	42765	2685	1.067	--
总计		483455	100.000	42765			

图74 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-559-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:28:43 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:03 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.868	484053	100.000	42739	2685	1.068	--
总计		484053	100.000	42739			

图75 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-560-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:34:06 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:06 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.865	490506	100.000	43515	2690	1.065	--
总计		490506	100.000	43515			

图76 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-561-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:39:29 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:08 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.862	505357	100.000	44762	2679	1.065	--
总计		505357	100.000	44762			


图77 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-562-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:44:52 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:11 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.859	496106	100.000	44024	2692	1.064	--
总计		496106	100.000	44024			

图78 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-563-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:50:15 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:14 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.857	487939	100.000	43005	2661	1.071	--
总计		487939	100.000	43005			

图79 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-564-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 20:55:38 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:16 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.851	489281	100.000	43159	2653	1.070	--
总计		489281	100.000	43159			


图80 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-565-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:01:01 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:19 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.849	483462	100.000	42394	2611	1.075	--
总计		483462	100.000	42394			

图81 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-566-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:06:25 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:22 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.847	490798	100.000	43246	2636	1.077	--
总计		490798	100.000	43246			

图82 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-567-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:11:47 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:25 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.846	509992	100.000	44845	2625	1.078	--
总计		509992	100.000	44845			


图83 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-568-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:17:10 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:27 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.843	499324	100.000	43814	2615	1.079	--
总计		499324	100.000	43814			

图84 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-569-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:22:33 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:30 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.839	491230	100.000	43396	2637	1.074	--
总计		491230	100.000	43396			

图85 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-570-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:27:56 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:33 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.836	492437	100.000	43292	2608	1.080	--
总计		492437	100.000	43292			

图86 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-571-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:33:19 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:36 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.834	488396	100.000	42965	2617	1.080	--
总计		488396	100.000	42965			

图87 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-572-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:38:43 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:38 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.829	499310	100.000	43655	2574	1.082	--
总计		499310	100.000	43655			

图88 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-573-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:44:06 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:41 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.828	514579	100.000	44942	2569	1.086	--
总计		514579	100.000	44942			


图89 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-574-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:49:29 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:44 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.820	504613	100.000	44021	2554	1.088	--
总计		504613	100.000	44021			

图90 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-575-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 21:54:52 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:47 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.817	495072	100.000	42985	2524	1.091	--
总计		495072	100.000	42985			


图91 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-576-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:00:15 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:49 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.817	504600	100.000	43765	2529	1.095	--
总计		504600	100.000	43765			

图92 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-577-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:05:39 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:52 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.813	496346	100.000	43045	2509	1.091	--
总计		496346	100.000	43045			


图93 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-578-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:11:03 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:55 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.816	501790	100.000	43537	2523	1.090	--
总计		501790	100.000	43537			

图94 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-579-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:16:27 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:05:58 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.808	522010	100.000	45198	2503	1.092	--
总计		522010	100.000	45198			

图95 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-580-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:21:51 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:00 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.804	515169	100.000	44445	2482	1.090	--
总计		515169	100.000	44445			


图96 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-581-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:27:15 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:03 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.800	507799	100.000	44039	2503	1.089	--
总计		507799	100.000	44039			

图97 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-582-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:32:38 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:06 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.799	512901	100.000	44370	2485	1.092	--
总计		512901	100.000	44370			


图98 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-583-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:38:02 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:09 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.798	500638	100.000	43256	2476	1.095	--
总计		500638	100.000	43256			


图99 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-584-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:43:26 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:12 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.791	507389	100.000	43533	2442	1.101	--
总计		507389	100.000	43533			


图100 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-585-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:48:50 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:14 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.792	524519	100.000	45164	2459	1.101	--
总计		524519	100.000	45164			


图101 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-586-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:54:14 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:17 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.785	521706	100.000	44357	2380	1.100	--
总计		521706	100.000	44357			


图102 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-587-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 22:59:37 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:20 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.781	512235	100.000	42868	2295	1.096	--
总计		512235	100.000	42868			


图103 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-588-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:05:01 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:23 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	517619	100.000	43913	2351	1.106	--
总计		517619	100.000	43913			


图104 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-589-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:10:24 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:25 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.775	511825	100.000	43079	2316	1.105	--
总计		511825	100.000	43079			


图105 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-590-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:15:47 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:28 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.773	519381	100.000	43932	2343	1.102	--
总计		519381	100.000	43932			

图106 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-591-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:21:10 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:31 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.776	531161	100.000	45060	2365	1.108	--
总计		531161	100.000	45060			


图107 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-592-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:26:33 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:34 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	526961	100.000	43901	2262	1.118	--
总计		526961	100.000	43901			


图108 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-593-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:31:57 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:36 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.772	515099	100.000	43145	2291	1.116	--
总计		515099	100.000	43145			


图109 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-594-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:37:21 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:39 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.769	520498	100.000	44055	2345	1.110	--
总计		520498	100.000	44055			


图110 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-595-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:42:45 实验者: lvtngting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:42 处理者: lvtngting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.773	592868	100.000	49191	2289	1.152	--
总计		592868	100.000	49191			


图111 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 0-20/24-596-2 - zzp-25072301p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-RCQX-20250709-FX273.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250725-rcqx-FX273.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/07/25 23:48:09 实验者: lvttingting
 处理时间 (V2) : 2025/07/26 14:06:45 处理者: lvttingting
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX273)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.771	588997	100.000	49581	2333	1.124	--
总计		588997	100.000	49581			

图112 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25072301批-pH6.8(内含2%SDS)介质
 对照品溶液-2-2