




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1555-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 10:48:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1556-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 10:51:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	453872	100.000	70529	2858	1.073	--
总计		453872	100.000	70529			

图2 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1557-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 10:55:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	452413	100.000	70362	2861	1.074	--
总计		452413	100.000	70362			

图3 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1558-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:00:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	452817	100.000	70499	2864	1.074	--
总计		452817	100.000	70499			

图4 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1559-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:03:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	453766	100.000	70624	2864	1.073	--
总计		453766	100.000	70624			

图5 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1560-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:07:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	453696	100.000	70623	2865	1.073	--
总计		453696	100.000	70623			

图6 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1561-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:10:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	51379	100.000	8248	3108	1.064	--
总计		51379	100.000	8248			

图7 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1562-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:14:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	63608	100.000	10161	3083	1.079	--
总计		63608	100.000	10161			

图8 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1563-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:17:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	36757	100.000	5935	3136	1.083	--
总计		36757	100.000	5935			

图9 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1564-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:20:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	69966	100.000	11006	3061	1.066	--
总计		69966	100.000	11006			

图10 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片4
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1565-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:24:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	64812	100.000	10380	3135	1.071	--
总计		64812	100.000	10380			

图11 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1566-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:27:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	60679	100.000	9738	3133	1.074	--
总计		60679	100.000	9738			

图12 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1567-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:30:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	150216	100.000	24009	3123	1.072	--
总计		150216	100.000	24009			

图13 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1568-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:34:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	161255	100.000	25827	3120	1.078	--
总计		161255	100.000	25827			

图14 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1569-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:37:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	149272	100.000	23897	3119	1.074	--
总计		149272	100.000	23897			

图15 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1570-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:41:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	180804	100.000	28826	3098	1.078	--
总计		180804	100.000	28826			

图16 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1571-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:44:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	167789	100.000	26692	3088	1.079	--
总计		167789	100.000	26692			

图17 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1572-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:47:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	166955	100.000	26595	3083	1.078	--
总计		166955	100.000	26595			

图18 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1573-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:51:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	215130	100.000	34208	3071	1.089	--
总计		215130	100.000	34208			

图19 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1574-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:54:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:23:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	223830	100.000	35621	3075	1.084	--
总计		223830	100.000	35621			

图20 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1575-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 11:57:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	225188	100.000	35815	3073	1.087	--
总计		225188	100.000	35815			

图21 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1576-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:01:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	254268	100.000	40534	3085	1.086	--
总计		254268	100.000	40534			

图22 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1577-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:04:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	233379	100.000	37275	3100	1.086	--
总计		233379	100.000	37275			

图23 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1578-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:08:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	227916	100.000	36544	3106	1.087	--
总计		227916	100.000	36544			

图24 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1579-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:11:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	260191	100.000	41620	3107	1.090	--
总计		260191	100.000	41620			

图25 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1580-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:14:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	266947	100.000	42643	3098	1.090	--
总计		266947	100.000	42643			

图26 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1581-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:18:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	277507	100.000	44151	3087	1.095	--
总计		277507	100.000	44151			

图27 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1582-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:21:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	301487	100.000	47860	3072	1.093	--
总计		301487	100.000	47860			

图28 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1583-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:24:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.288	280872	100.000	44560	3067	1.095	--
总计		280872	100.000	44560			

图29 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1584-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:28:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	273151	100.000	43429	3069	1.095	--
总计		273151	100.000	43429			

图30 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1585-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:31:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	319951	100.000	50479	3055	1.101	--
总计		319951	100.000	50479			

图31 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1586-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:35:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	323308	100.000	51240	3064	1.099	--
总计		323308	100.000	51240			

图32 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1587-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:38:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:32		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	337615	100.000	53423	3061	1.102	--
总计		337615	100.000	53423			

图33 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1588-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:41:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.287	354042	100.000	56071	3057	1.103	--
总计		354042	100.000	56071			

图34 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1589-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:45:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	339025	100.000	53611	3058	1.103	--
总计		339025	100.000	53611			

图35 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1590-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:48:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	328310	100.000	51933	3052	1.104	--
总计		328310	100.000	51933			

图36 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1591-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:51:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	365641	100.000	57781	3055	1.107	--
总计		365641	100.000	57781			

图37 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1592-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:55:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	375641	100.000	59203	3047	1.109	--
总计		375641	100.000	59203			

图38 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1593-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 12:58:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	388487	100.000	61104	3038	1.109	--
总计		388487	100.000	61104			

图39 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1594-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:02:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	402334	100.000	63272	3045	1.110	--
总计		402334	100.000	63272			

图40 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1595-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:05:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	385070	100.000	60661	3043	1.109	--
总计		385070	100.000	60661			

图41 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1596-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:08:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	377113	100.000	59267	3037	1.111	--
总计		377113	100.000	59267			

图42 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1597-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:12:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	390775	100.000	61492	3039	1.110	--
总计		390775	100.000	61492			

图43 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1598-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:15:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:24:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	402234	100.000	63597	3049	1.109	--
总计		402234	100.000	63597			

图44 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1599-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:18:57	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	414560	100.000	65204	3034	1.114	--
总计		414560	100.000	65204			

图45 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1600-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:22:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	421302	100.000	66360	3030	1.113	--
总计		421302	100.000	66360			

图46 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1601-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:25:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	409660	100.000	64572	3021	1.114	--
总计		409660	100.000	64572			

图47 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1602-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:29:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	397397	100.000	62605	3020	1.115	--
总计		397397	100.000	62605			

图48 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1603-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:32:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	413394	100.000	64891	3006	1.117	--
总计		413394	100.000	64891			

图49 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1604-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:35:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	428108	100.000	67349	3002	1.116	--
总计		428108	100.000	67349			

图50 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1605-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:39:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	446778	100.000	69821	2985	1.121	--
总计		446778	100.000	69821			

图51 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1606-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:42:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	443868	100.000	69521	2984	1.119	--
总计		443868	100.000	69521			

图52 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1607-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:46:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:21		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	429878	100.000	67375	2978	1.120	--
总计		429878	100.000	67375			

图53 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1608-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:49:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	428344	100.000	67079	2979	1.122	--
总计		428344	100.000	67079			

图54 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1610-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:56:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	449186	100.000	68895	2781	1.112	--
总计		449186	100.000	68895			

图56 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1611-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 13:59:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1612-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:03:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.252	450194	100.000	69435	2797	1.106	--
总计		450194	100.000	69435			

图58 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1613-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:06:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	449413	100.000	69222	2796	1.110	--
总计		449413	100.000	69222			

图59 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1614-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:09:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	448984	100.000	69338	2803	1.107	--
总计		448984	100.000	69338			

图60 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1615-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:13:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	449818	100.000	69509	2810	1.107	--
总计		449818	100.000	69509			

图61 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1616-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:16:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	450010	100.000	69529	2808	1.108	--
总计		450010	100.000	69529			

图62 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1617-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:20:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	82523	100.000	13032	3038	1.099	--
总计		82523	100.000	13032			

图63 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片1
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1618-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:23:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	60565	100.000	9584	3030	1.102	--
总计		60565	100.000	9584			

图64 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片2
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1619-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:26:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	86472	100.000	13738	3055	1.097	--
总计		86472	100.000	13738			

图65 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1621-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:33:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	54710	100.000	8706	3035	1.100	--
总计		54710	100.000	8706			

图67 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1622-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:37:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:25:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	76556	100.000	12115	3000	1.104	--
总计		76556	100.000	12115			

图68 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1623-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:40:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	195624	100.000	30853	3011	1.109	--
总计		195624	100.000	30853			

图69 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1624-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:43:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	159451	100.000	25152	3007	1.115	--
总计		159451	100.000	25152			

图70 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1625-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:47:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	188151	100.000	29672	3000	1.114	--
总计		188151	100.000	29672			

图71 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1626-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:50:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	155755	100.000	24499	2989	1.109	--
总计		155755	100.000	24499			

图72 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1627-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:54:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	173059	100.000	27187	2984	1.114	--
总计		173059	100.000	27187			

图73 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1628-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 14:57:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	177255	100.000	27785	2977	1.115	--
总计		177255	100.000	27785			

图74 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1629-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:00:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	264529	100.000	41396	2962	1.118	--
总计		264529	100.000	41396			

图75 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1630-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:04:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	221067	100.000	34519	2951	1.116	--
总计		221067	100.000	34519			

图76 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1631-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:07:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	247755	100.000	38556	2939	1.120	--
总计		247755	100.000	38556			

图77 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1632-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:11:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.274	220558	100.000	34448	2948	1.120	--
总计		220558	100.000	34448			

图78 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1633-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:14:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	244868	100.000	38279	2932	1.124	--
总计		244868	100.000	38279			

图79 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1634-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:17:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	240849	100.000	37565	2925	1.124	--
总计		240849	100.000	37565			

图80 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1635-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:21:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	308655	100.000	47940	2899	1.128	--
总计		308655	100.000	47940			

图81 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1636-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:24:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.270	265957	100.000	41511	2926	1.122	--
总计		265957	100.000	41511			

图82 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1637-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:28:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	285279	100.000	44264	2875	1.126	--
总计		285279	100.000	44264			

图83 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1638-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:31:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.268	264472	100.000	41127	2918	1.119	--
总计		264472	100.000	41127			

图84 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1639-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:34:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	292256	100.000	45612	2916	1.119	--
总计		292256	100.000	45612			

图85 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1640-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:38:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	284324	100.000	44489	2907	1.124	--
总计		284324	100.000	44489			

图86 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1641-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:41:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	364664	100.000	56928	2903	1.123	--
总计		364664	100.000	56928			

图87 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1642-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:45:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	326890	100.000	50816	2886	1.120	--
总计		326890	100.000	50816			

图88 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1643-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:48:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	333666	100.000	51952	2894	1.123	--
总计		333666	100.000	51952			

图89 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1644-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:51:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	323970	100.000	50312	2869	1.127	--
总计		323970	100.000	50312			

图90 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1645-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:55:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	347058	100.000	54129	2891	1.117	--
总计		347058	100.000	54129			

图91 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1646-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 15:58:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.261	339971	100.000	52682	2871	1.120	--
总计		339971	100.000	52682			

图92 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1647-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:02:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:26:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	406285	100.000	62789	2873	1.123	--
总计		406285	100.000	62789			

图93 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1648-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:05:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	372028	100.000	57533	2852	1.123	--
总计		372028	100.000	57533			

图94 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1649-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:08:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	373954	100.000	58238	2881	1.120	--
总计		373954	100.000	58238			

图95 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1650-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:12:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	372757	100.000	58133	2890	1.118	--
总计		372757	100.000	58133			

图96 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1651-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:15:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.257	391289	100.000	60616	2863	1.122	--
总计		391289	100.000	60616			

图97 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1652-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:19:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.256	385287	100.000	60109	2889	1.121	--
总计		385287	100.000	60109			

图98 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1653-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:22:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	429793	100.000	67153	2894	1.120	--
总计		429793	100.000	67153			

图99 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1654-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:26:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	393838	100.000	61666	2895	1.115	--
总计		393838	100.000	61666			

图100 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1655-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:29:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.253	397707	100.000	61451	2843	1.122	--
总计		397707	100.000	61451			

图101 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1656-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:32:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	401407	100.000	61903	2811	1.122	--
总计		401407	100.000	61903			

图102 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1657-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:36:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	417379	100.000	64282	2806	1.124	--
总计		417379	100.000	64282			

图103 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1658-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:39:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	408845	100.000	62806	2787	1.124	--
总计		408845	100.000	62806			

图104 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1659-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:43:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:29		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	448428	100.000	68408	2740	1.126	--
总计		448428	100.000	68408			

图105 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1660-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:46:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	418136	100.000	63286	2709	1.125	--
总计		418136	100.000	63286			

图106 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1661-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:49:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:34		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	432931	100.000	65167	2686	1.133	--
总计		432931	100.000	65167			

图107 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1662-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:53:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	435027	100.000	65590	2697	1.132	--
总计		435027	100.000	65590			

图108 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1663-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 16:56:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	438649	100.000	66490	2702	1.125	--
总计		438649	100.000	66490			

图109 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1664-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:00:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:41		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	431388	100.000	65596	2725	1.125	--
总计		431388	100.000	65596			

图110 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1665-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:03:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	447270	100.000	64452	2326	1.117	--
总计		447270	100.000	64452			

图111 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1666-2 - cbzj-6000597p-cq6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 2-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:06:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	449682	100.000	64501	2322	1.123	--
总计		449682	100.000	64501			

图112 奥利司他胶囊溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1667-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:10:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1668-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:13:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	450532	100.000	65267	2392	1.123	--
总计		450532	100.000	65267			

图114 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1669-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:17:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	447743	100.000	65662	2448	1.122	--
总计		447743	100.000	65662			

图115 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1670-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:20:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	448439	100.000	66089	2473	1.120	--
总计		448439	100.000	66089			

图116 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1671-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:23:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:27:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	448501	100.000	66431	2497	1.118	--
总计		448501	100.000	66431			

图117 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1672-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:27:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	447805	100.000	66692	2521	1.115	--
总计		447805	100.000	66692			

图118 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1673-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:30:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	61157	100.000	9616	2916	1.097	--
总计		61157	100.000	9616			

图119 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1674-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:33:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.259	65286	100.000	10255	2902	1.095	--
总计		65286	100.000	10255			

图120 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1675-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:37:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.258	66557	100.000	10448	2914	1.100	--
总计		66557	100.000	10448			

图121 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1676-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:40:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.255	70117	100.000	11043	2894	1.098	--
总计		70117	100.000	11043			

图122 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1677-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:44:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.254	68971	100.000	10827	2870	1.095	--
总计		68971	100.000	10827			

图123 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1678-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:47:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	7878	100.000	1317	3093	1.100	--
总计		7878	100.000	1317			

图124 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1679-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:50:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	156969	100.000	24509	2854	1.103	--
总计		156969	100.000	24509			

图125 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1680-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:54:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	155804	100.000	24414	2860	1.105	--
总计		155804	100.000	24414			

图126 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1681-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 17:57:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	153891	100.000	24123	2903	1.107	--
总计		153891	100.000	24123			

图127 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1682-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:00:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	157502	100.000	24733	2893	1.106	--
总计		157502	100.000	24733			

图128 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1683-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:04:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	163565	100.000	25578	2856	1.115	--
总计		163565	100.000	25578			

图129 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1684-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:07:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	102184	100.000	16018	2874	1.105	--
总计		102184	100.000	16018			

图130 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1685-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:11:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	221343	100.000	34822	2893	1.115	--
总计		221343	100.000	34822			

图131 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1686-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:14:23	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	222749	100.000	34851	2869	1.117	--
总计		222749	100.000	34851			

图132 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1687-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:17:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	217062	100.000	33883	2879	1.118	--
总计		217062	100.000	33883			

图133 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1688-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:21:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.250	214811	100.000	33466	2867	1.117	--
总计		214811	100.000	33466			

图134 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1689-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:24:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	226111	100.000	35329	2872	1.118	--
总计		226111	100.000	35329			

图135 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1690-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:27:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	175364	100.000	27593	2895	1.115	--
总计		175364	100.000	27593			

图136 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片6
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1691-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:31:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	263875	100.000	41221	2862	1.122	--
总计		263875	100.000	41221			

图137 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1692-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:34:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	269848	100.000	41952	2830	1.125	--
总计		269848	100.000	41952			

图138 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1693-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:37:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	263542	100.000	41096	2832	1.124	--
总计		263542	100.000	41096			

图139 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1694-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:41:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	258914	100.000	40039	2793	1.126	--
总计		258914	100.000	40039			

图140 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1695-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:44:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:28:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	270162	100.000	41578	2778	1.125	--
总计		270162	100.000	41578			

图141 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1696-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:48:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	232506	100.000	35935	2793	1.124	--
总计		232506	100.000	35935			

图142 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1697-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:51:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	321578	100.000	49782	2796	1.127	--
总计		321578	100.000	49782			

图143 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1698-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:54:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	324888	100.000	49875	2770	1.130	--
总计		324888	100.000	49875			

图144 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1699-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 18:58:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	322180	100.000	49754	2795	1.124	--
总计		322180	100.000	49754			

图145 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1700-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:01:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	317333	100.000	48751	2766	1.123	--
总计		317333	100.000	48751			

图146 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1701-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:04:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	326308	100.000	49838	2734	1.124	--
总计		326308	100.000	49838			

图147 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片5
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1702-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:08:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	303625	100.000	46250	2725	1.123	--
总计		303625	100.000	46250			

图148 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1703-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:11:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	369585	100.000	56465	2744	1.121	--
总计		369585	100.000	56465			

图149 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1704-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:14:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	373553	100.000	57147	2756	1.120	--
总计		373553	100.000	57147			

图150 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1705-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:18:20	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	370596	100.000	56595	2736	1.122	--
总计		370596	100.000	56595			

图151 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1706-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:21:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	364204	100.000	55808	2755	1.118	--
总计		364204	100.000	55808			

图152 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1707-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:25:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	371943	100.000	57138	2754	1.115	--
总计		371943	100.000	57138			

图153 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1708-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:28:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	362721	100.000	56065	2782	1.115	--
总计		362721	100.000	56065			

图154 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1709-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:31:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	394401	100.000	60661	2783	1.117	--
总计		394401	100.000	60661			

图155 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1710-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:35:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	398618	100.000	61392	2774	1.116	--
总计		398618	100.000	61392			

图156 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1711-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:38:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	397966	100.000	61295	2776	1.120	--
总计		397966	100.000	61295			

图157 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1712-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:41:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	389510	100.000	59832	2755	1.116	--
总计		389510	100.000	59832			

图158 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1713-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:45:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	396462	100.000	61296	2778	1.113	--
总计		396462	100.000	61296			

图159 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1714-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:48:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	394540	100.000	61074	2797	1.117	--
总计		394540	100.000	61074			

图160 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1715-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:51:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	416658	100.000	64285	2779	1.114	--
总计		416658	100.000	64285			

图161 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温 : 30°C 波长: 195nm
 数据文件名 : RC\$QTL-486 - 7-68/31-1716-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P2.lcd
 方法文件名 : RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/07/29 19:55:23 实验者: xiexinhui
 处理时间(V2) : 2025/07/30 09:29:50 处理者: xiexinhui
 仪器型号 : SHIMADZU LC-2050C (FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	425748	100.000	65655	2777	1.116	--
总计		425748	100.000	65655			

图162 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1717-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 19:58:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	418435	100.000	65051	2808	1.113	--
总计		418435	100.000	65051			

图163 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1719-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-44	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:05:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:29:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	416380	100.000	64515	2794	1.116	--
总计		416380	100.000	64515			

图165 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1720-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:08:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	421666	100.000	64551	2752	1.126	--
总计		421666	100.000	64551			

图166 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1721-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:12:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	452531	100.000	65442	2335	1.119	--
总计		452531	100.000	65442			

图167 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1722-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-1-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 3-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:15:37	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	452014	100.000	65265	2311	1.124	--
总计		452014	100.000	65265			

图168 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1723-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-rj.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-9	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:19:01	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:08		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图169 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
溶剂




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1724-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:22:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	455512	100.000	66195	2349	1.122	--
总计		455512	100.000	66195			

图170 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1725-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:25:50	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	454090	100.000	65939	2353	1.126	--
总计		454090	100.000	65939			

图171 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-2




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1726-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:29:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:16		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	454072	100.000	66269	2379	1.120	--
总计		454072	100.000	66269			

图172 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-3




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1727-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:32:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	454327	100.000	66323	2390	1.121	--
总计		454327	100.000	66323			

图173 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-4




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1728-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz1-5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:36:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	453854	100.000	66367	2399	1.120	--
总计		453854	100.000	66367			

图174 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-1-5




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1729-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:39:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.243	13929	100.000	2292	3075	1.085	--
总计		13929	100.000	2292			

图175 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1730-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:42:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.249	58186	100.000	9159	2905	1.111	--
总计		58186	100.000	9159			

图176 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1731-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:46:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.248	48265	100.000	7643	2928	1.104	--
总计		48265	100.000	7643			

图177 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1732-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:49:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.246	50551	100.000	8019	2921	1.099	--
总计		50551	100.000	8019			

图178 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1733-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:52:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	78150	100.000	12362	2926	1.107	--
总计		78150	100.000	12362			

图179 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1734-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-5min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:56:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	86459	100.000	13640	2908	1.107	--
总计		86459	100.000	13640			

图180 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1735-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 20:59:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	127368	100.000	20234	2926	1.109	--
总计		127368	100.000	20234			

图181 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1736-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:03:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	142230	100.000	22511	2912	1.113	--
总计		142230	100.000	22511			

图182 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1737-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:06:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.240	138943	100.000	21974	2893	1.113	--
总计		138943	100.000	21974			

图183 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1738-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:09:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.239	152219	100.000	24028	2896	1.118	--
总计		152219	100.000	24028			

图184 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1740-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-10min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:16:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	183517	100.000	28768	2855	1.123	--
总计		183517	100.000	28768			

图186 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1741-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:19:59	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:53		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.237	209806	100.000	32820	2850	1.125	--
总计		209806	100.000	32820			

图187 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1742-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:23:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	200432	100.000	31153	2821	1.125	--
总计		200432	100.000	31153			

图188 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1743-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:26:45	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:30:58		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	206439	100.000	31863	2796	1.130	--
总计		206439	100.000	31863			

图189 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片3
供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1744-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:30:08	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:00		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	218473	100.000	33660	2771	1.128	--
总计		218473	100.000	33660			

图190 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1745-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:33:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:03		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	249337	100.000	38478	2783	1.123	--
总计		249337	100.000	38478			

图191 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1746-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-15min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:36:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	248145	100.000	38028	2743	1.132	--
总计		248145	100.000	38028			

图192 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1747-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:40:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	264237	100.000	40418	2719	1.139	--
总计		264237	100.000	40418			

图193 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1748-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:43:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	243525	100.000	37180	2703	1.142	--
总计		243525	100.000	37180			

图194 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1749-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:47:02	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	253661	100.000	38798	2717	1.142	--
总计		253661	100.000	38798			

图195 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1750-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:50:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	268584	100.000	41027	2714	1.145	--
总计		268584	100.000	41027			

图196 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1751-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:53:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	295792	100.000	45085	2693	1.153	--
总计		295792	100.000	45085			

图197 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1752-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-20min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 21:57:11	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	294943	100.000	44737	2680	1.152	--
总计		294943	100.000	44737			

图198 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1753-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:00:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	327143	100.000	49790	2695	1.150	--
总计		327143	100.000	49790			

图199 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1754-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:03:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	305393	100.000	46445	2682	1.146	--
总计		305393	100.000	46445			

图200 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1755-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:07:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	318418	100.000	48120	2651	1.146	--
总计		318418	100.000	48120			

图201 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1756-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:10:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	334775	100.000	50460	2644	1.150	--
总计		334775	100.000	50460			

图202 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1757-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:14:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	355226	100.000	53822	2658	1.143	--
总计		355226	100.000	53822			

图203 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1758-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-30min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:17:33	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	353000	100.000	53497	2652	1.141	--
总计		353000	100.000	53497			

图204 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1759-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:20:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	375067	100.000	56619	2643	1.142	--
总计		375067	100.000	56619			

图205 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1760-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:24:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	358825	100.000	54009	2620	1.143	--
总计		358825	100.000	54009			

图206 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1761-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:27:42	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:42		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	367763	100.000	55167	2610	1.144	--
总计		367763	100.000	55167			

图207 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1762-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:31:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	387280	100.000	57934	2618	1.149	--
总计		387280	100.000	57934			

图208 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1763-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-42	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:34:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:47		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	404344	100.000	60392	2614	1.151	--
总计		404344	100.000	60392			

图209 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1764-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-45min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:37:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:50		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	399977	100.000	60016	2611	1.145	--
总计		399977	100.000	60016			

图210 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1765-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:41:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	400027	100.000	59596	2575	1.144	--
总计		400027	100.000	59596			

图211 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1766-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:44:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:55		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	388755	100.000	58144	2611	1.141	--
总计		388755	100.000	58144			

图212 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1767-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:48:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	390540	100.000	58639	2618	1.138	--
总计		390540	100.000	58639			

图213 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1768-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P4.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:51:28	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:31:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	411593	100.000	61329	2586	1.141	--
总计		411593	100.000	61329			

图214 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1769-2 - cbzj-6000597p-ztj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P5.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-43	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:54:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	425020	100.000	63904	2617	1.135	--
总计		425020	100.000	63904			

图215 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1770-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-60min-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 22:58:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	420372	100.000	63095	2597	1.135	--
总计		420372	100.000	63095			

图216 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1771-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 23:01:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	421108	100.000	63004	2584	1.137	--
总计		421108	100.000	63004			

图217 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1772-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-17	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 23:05:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	424286	100.000	63190	2549	1.142	--
总计		424286	100.000	63190			

图218 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1773-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P3.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 23:08:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	413080	100.000	62259	2609	1.135	--
总计		413080	100.000	62259			

图219 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1776-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-jxzs-P6.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 23:18:39	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	441807	100.000	65913	2568	1.142	--
总计		441807	100.000	65913			

图222 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1777-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz2-1.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 23:22:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.188	451211	100.000	63793	2189	1.121	--
总计		451211	100.000	63793			

图223 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-1




QTL-486

<样品信息>

色谱柱	: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 2.0ml/min
柱温	: 30°C	波长	: 195nm
数据文件名	: RC\$QTL-486 - 7-68/31-1778-2 - cbzj-6000597p-zjtj6y-60mg-rcqx-2-pH6.0+3sdsjz-dz2-2.lcd		
方法文件名	: RC\$QTL-486 - QTL-486-FX280.lcm		
批处理文件名	: RC\$QTL-486 - 20250729-rc-FX280.lcb		
样品瓶号	: 4-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 20 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/07/29 23:25:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/07/30 09:32:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX280)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 195nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.186	454002	100.000	63748	2161	1.125	--
总计		454002	100.000	63748			

图224 奥利司他胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
参比制剂-6000597批(60mg规格)-pH6.0(内含3%SDS)介质
对照品溶液-2-2