




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-385-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:29:40      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:17      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
溶剂




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-386-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:33:03      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:27:22      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	98806	100.000	13587	2238	1.168	--
总计		98806	100.000	13587			

图2 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-387-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:36:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:27:26      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99038	100.000	13598	2236	1.170	--
总计		99038	100.000	13598			

图3 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-388-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:39:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:30      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99342	100.000	13622	2231	1.172	--
总计		99342	100.000	13622			

图4 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-389-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:43:15      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:27:33      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	98943	100.000	13586	2226	1.171	--
总计		98943	100.000	13586			

图5 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-390-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:46:39      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:27:37      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	98388	100.000	13559	2236	1.174	--
总计		98388	100.000	13559			

图6 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-391-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:50:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:40      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	32100	100.000	4511	2329	1.163	--
总计		32100	100.000	4511			

图7 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-392-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:53:25      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	33518	100.000	4705	2353	1.169	--
总计		33518	100.000	4705			

图8 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-393-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 14:56:47      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	33123	100.000	4631	2350	1.175	--
总计		33123	100.000	4631			

图9 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-394-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:00:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	33477	100.000	4725	2350	1.161	--
总计		33477	100.000	4725			

图10 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-395-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:03:33      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	34557	100.000	4846	2334	1.174	--
总计		34557	100.000	4846			

图11 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-396-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:06:55      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:27:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	34646	100.000	4843	2329	1.169	--
总计		34646	100.000	4843			

图12 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-397-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:10:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:01      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	37798	100.000	5316	2343	1.161	--
总计		37798	100.000	5316			

图13 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-398-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:13:41      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38231	100.000	5370	2336	1.173	--
总计		38231	100.000	5370			

图14 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-399-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:17:04      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:08      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38378	100.000	5403	2340	1.161	--
总计		38378	100.000	5403			

图15 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-400-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:20:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:12      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38713	100.000	5429	2346	1.168	--
总计		38713	100.000	5429			

图16 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-401-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:23:50      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:15      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	39524	100.000	5531	2325	1.169	--
总计		39524	100.000	5531			

图17 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-402-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-47  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:27:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:18      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	39095	100.000	5474	2344	1.175	--
总计		39095	100.000	5474			

图18 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-403-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:30:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:22      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41092	100.000	5776	2337	1.171	--
总计		41092	100.000	5776			

图19 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-404-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:33:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:25      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	40974	100.000	5762	2341	1.160	--
总计		40974	100.000	5762			

图20 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-405-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:37:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:29      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	40024	100.000	5609	2345	1.171	--
总计		40024	100.000	5609			

图21 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-406-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:40:43      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:32      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	40862	100.000	5730	2343	1.171	--
总计		40862	100.000	5730			

图22 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-407-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:44:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:36      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41018	100.000	5758	2332	1.165	--
总计		41018	100.000	5758			

图23 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-408-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:47:29      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:39      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41590	100.000	5819	2340	1.171	--
总计		41590	100.000	5819			

图24 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-409-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:50:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	40247	100.000	5645	2336	1.164	--
总计		40247	100.000	5645			

图25 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-410-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:54:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41829	100.000	5878	2331	1.171	--
总计		41829	100.000	5878			

图26 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-411-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 15:57:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41370	100.000	5786	2330	1.171	--
总计		41370	100.000	5786			

图27 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-412-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:01:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41055	100.000	5738	2325	1.169	--
总计		41055	100.000	5738			

图28 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-413-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:04:21      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:28:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	42204	100.000	5905	2323	1.164	--
总计		42204	100.000	5905			

图29 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-414-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:07:43      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:00      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	42551	100.000	5978	2334	1.173	--
总计		42551	100.000	5978			

图30 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-415-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:11:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:04      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41215	100.000	5757	2321	1.175	--
总计		41215	100.000	5757			

图31 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-416-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:14:29      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:29:07      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42370	100.000	5875	2292	1.175	--
总计		42370	100.000	5875			

图32 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-417-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:17:53      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41514	100.000	5784	2315	1.181	--
总计		41514	100.000	5784			

图33 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-418-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:21:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:14      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43014	100.000	5968	2300	1.174	--
总计		43014	100.000	5968			

图34 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-419-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:24:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:17      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	42410	100.000	5891	2310	1.181	--
总计		42410	100.000	5891			

图35 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-420-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:28:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42750	100.000	5931	2316	1.177	--
总计		42750	100.000	5931			

图36 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-421-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:31:23      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:24      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43663	100.000	6087	2310	1.179	--
总计		43663	100.000	6087			

图37 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-422-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:34:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:27      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43723	100.000	6078	2301	1.173	--
总计		43723	100.000	6078			

图38 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-423-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:38:09      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:31      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43196	100.000	5991	2300	1.177	--
总计		43196	100.000	5991			

图39 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-424-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:41:30      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:34      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43951	100.000	6114	2312	1.182	--
总计		43951	100.000	6114			

图40 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-425-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:44:52      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:38      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42583	100.000	5972	2305	1.180	--
总计		42583	100.000	5972			

图41 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-426-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:48:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:29:41      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42702	100.000	5943	2308	1.169	--
总计		42702	100.000	5943			

图42 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-427-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:51:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43894	100.000	6120	2306	1.177	--
总计		43894	100.000	6120			

图43 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-428-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-16  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:55:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43880	100.000	6112	2295	1.170	--
总计		43880	100.000	6112			

图44 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-429-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 16:58:23      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43964	100.000	6110	2300	1.174	--
总计		43964	100.000	6110			

图45 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-430-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:01:45      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43676	100.000	6043	2297	1.184	--
总计		43676	100.000	6043			

图46 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-431-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:05:08      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:29:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44609	100.000	6207	2307	1.171	--
总计		44609	100.000	6207			

图47 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-432-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-52  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:08:30      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:01      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43920	100.000	6092	2287	1.174	--
总计		43920	100.000	6092			

图48 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-433-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-8  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:11:54      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:04      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43442	100.000	6018	2301	1.180	--
总计		43442	100.000	6018			

图49 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-434-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-17  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:15:17      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:07      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	44625	100.000	6209	2319	1.171	--
总计		44625	100.000	6209			

图50 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-435-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-26  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:18:41      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	46227	100.000	6426	2299	1.165	--
总计		46227	100.000	6426			

图51 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-436-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-35  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:22:05      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:14      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	45790	100.000	6345	2301	1.188	--
总计		45790	100.000	6345			

图52 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-437-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-44  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:25:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:17      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44604	100.000	6192	2307	1.173	--
总计		44604	100.000	6192			

图53 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-438-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-53  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:28:52      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45478	100.000	6334	2299	1.181	--
总计		45478	100.000	6334			

图54 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-439-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-1  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:32:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:24      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44730	100.000	6213	2308	1.180	--
总计		44730	100.000	6213			

图55 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-440-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:35:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44796	100.000	6232	2314	1.178	--
总计		44796	100.000	6232			

图56 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-441-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:39:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:31      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44697	100.000	6213	2312	1.178	--
总计		44697	100.000	6213			

图57 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-442-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:42:23      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	45397	100.000	6304	2310	1.178	--
总计		45397	100.000	6304			

图58 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-443-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:45:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:38      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	46275	100.000	6457	2311	1.175	--
总计		46275	100.000	6457			

图59 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-444-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:49:07      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:42      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45164	100.000	6255	2296	1.175	--
总计		45164	100.000	6255			

图60 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-445-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:52:31      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:45      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	45889	100.000	6394	2314	1.178	--
总计		45889	100.000	6394			

图61 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-446-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:55:54      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:48      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	45266	100.000	6273	2299	1.176	--
总计		45266	100.000	6273			

图62 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-447-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 17:59:17      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:52      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45310	100.000	6298	2311	1.172	--
总计		45310	100.000	6298			

图63 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-448-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-29  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:02:39      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:55      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	45634	100.000	6366	2318	1.178	--
总计		45634	100.000	6366			

图64 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-449-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:06:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:30:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	45440	100.000	6306	2308	1.171	--
总计		45440	100.000	6306			

图65 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-450-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-47  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:09:24      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:02      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45875	100.000	6367	2298	1.169	--
总计		45875	100.000	6367			

图66 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-451-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:12:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99621	100.000	13661	2224	1.179	--
总计		99621	100.000	13661			

图67 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转  
 对照品溶液-2-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-452-2 - zzp-2025062621p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 1-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:16:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:09      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99881	100.000	13682	2234	1.182	--
总计		99881	100.000	13682			

图68 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-453-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-9  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:19:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:12      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-454-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:22:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:15      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	98916	100.000	13541	2210	1.176	--
总计		98916	100.000	13541			

图70 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-455-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:26:22      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:19      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99515	100.000	13575	2214	1.183	--
总计		99515	100.000	13575			

图71 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-456-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:29:47      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:22      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99000	100.000	13565	2219	1.176	--
总计		99000	100.000	13565			

图72 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-3




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-457-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:33:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:25      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	98980	100.000	13561	2212	1.177	--
总计		98980	100.000	13561			

图73 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-458-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-18  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:36:36      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:29      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.230	99086	100.000	13551	2219	1.176	--
总计		99086	100.000	13551			

图74 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-459-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:40:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:31:32      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	32924	100.000	4635	2352	1.161	--
总计		32924	100.000	4635			

图75 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-460-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-10  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:43:24      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	33403	100.000	4652	2316	1.173	--
总计		33403	100.000	4652			

图76 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-461-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:46:48      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:39      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	34481	100.000	4841	2338	1.161	--
总计		34481	100.000	4841			

图77 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-462-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:50:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:42      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	34995	100.000	4884	2326	1.178	--
总计		34995	100.000	4884			

图78 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-463-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:53:35      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:45      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	33440	100.000	4681	2318	1.173	--
总计		33440	100.000	4681			

图79 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-464-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 18:56:59      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:49      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	33867	100.000	4759	2326	1.167	--
总计		33867	100.000	4759			

图80 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-465-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-2  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:00:22      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:52      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	37971	100.000	5300	2323	1.177	--
总计		37971	100.000	5300			

图81 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-466-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-11  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:03:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:55      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	37917	100.000	5306	2331	1.173	--
总计		37917	100.000	5306			

图82 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-467-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:07:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:31:59      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38705	100.000	5380	2309	1.179	--
总计		38705	100.000	5380			

图83 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-468-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-29  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:10:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:03      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38956	100.000	5453	2326	1.171	--
总计		38956	100.000	5453			

图84 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-469-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:13:56      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:06      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38010	100.000	5327	2341	1.161	--
总计		38010	100.000	5327			

图85 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-470-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-47  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:17:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:09      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	38462	100.000	5375	2324	1.167	--
总计		38462	100.000	5375			

图86 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-471-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:20:44      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	40126	100.000	5605	2319	1.174	--
总计		40126	100.000	5605			

图87 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-472-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:24:09      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:16      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41021	100.000	5715	2296	1.175	--
总计		41021	100.000	5715			

图88 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-473-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:27:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:19      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	39993	100.000	5571	2314	1.172	--
总计		39993	100.000	5571			

图89 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-474-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:30:56      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:22      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	40209	100.000	5612	2317	1.166	--
总计		40209	100.000	5612			

图90 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-475-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:34:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:26      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	40462	100.000	5637	2319	1.183	--
总计		40462	100.000	5637			

图91 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-476-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:37:43      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:29      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	40487	100.000	5661	2326	1.175	--
总计		40487	100.000	5661			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-477-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:41:08      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:33      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41391	100.000	5756	2299	1.176	--
总计		41391	100.000	5756			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-478-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:44:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:36      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41376	100.000	5786	2321	1.173	--
总计		41376	100.000	5786			

图94 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-479-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-22  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:47:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:40      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	40481	100.000	5663	2306	1.180	--
总计		40481	100.000	5663			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-480-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:51:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42410	100.000	5884	2310	1.178	--
总计		42410	100.000	5884			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-481-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:54:44      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:46      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41753	100.000	5797	2308	1.176	--
总计		41753	100.000	5797			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-482-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 19:58:08      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	41693	100.000	5825	2311	1.180	--
总计		41693	100.000	5825			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-483-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:01:33      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:53      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41242	100.000	5751	2299	1.168	--
总计		41242	100.000	5751			

图99 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-484-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:04:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:56      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	41900	100.000	5813	2277	1.181	--
总计		41900	100.000	5813			

图100 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-485-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:08:21      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:32:59      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42828	100.000	5948	2297	1.182	--
总计		42828	100.000	5948			

图101 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-486-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:11:45      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:03      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42535	100.000	5869	2282	1.185	--
总计		42535	100.000	5869			

图102 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-487-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:15:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:06      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42350	100.000	5906	2284	1.175	--
总计		42350	100.000	5906			

图103 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-488-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:18:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:10      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42601	100.000	5898	2276	1.172	--
总计		42601	100.000	5898			

图104 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-489-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-6  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:21:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43287	100.000	5995	2289	1.189	--
总计		43287	100.000	5995			

图105 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-490-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:25:22      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:16      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43285	100.000	5987	2275	1.172	--
总计		43285	100.000	5987			

图106 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-491-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:28:47      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:20      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43088	100.000	5962	2278	1.171	--
总计		43088	100.000	5962			

图107 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-492-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-33  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:32:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:23      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43006	100.000	5965	2289	1.174	--
总计		43006	100.000	5965			

图108 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-493-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:35:35      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:26      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43062	100.000	5989	2303	1.176	--
总计		43062	100.000	5989			

图109 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-494-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:39:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:30      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43192	100.000	5986	2287	1.176	--
总计		43192	100.000	5986			

图110 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-495-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:42:24      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:33      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43432	100.000	6005	2271	1.187	--
总计		43432	100.000	6005			

图111 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-496-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-16  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:45:49      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:36      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43530	100.000	6034	2294	1.168	--
总计		43530	100.000	6034			

图112 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-497-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:49:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:40      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	46758	100.000	6445	2282	1.187	--
总计		46758	100.000	6445			

图113 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-498-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:52:38      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43867	100.000	6059	2286	1.179	--
总计		43867	100.000	6059			

图114 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-499-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:56:03      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42727	100.000	5944	2275	1.186	--
总计		42727	100.000	5944			

图115 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-500-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-52  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 20:59:26      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43472	100.000	6026	2292	1.185	--
总计		43472	100.000	6026			

图116 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-501-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-8  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:02:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43679	100.000	6069	2289	1.187	--
总计		43679	100.000	6069			

图117 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-502-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-17  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:06:17      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:33:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44573	100.000	6152	2287	1.181	--
总计		44573	100.000	6152			

图118 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-503-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-26  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:09:41      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:00      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45367	100.000	6304	2303	1.182	--
总计		45367	100.000	6304			

图119 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-504-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-35  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:13:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:04      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45255	100.000	6269	2291	1.183	--
总计		45255	100.000	6269			

图120 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-505-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-44  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:16:30      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:07      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44679	100.000	6185	2296	1.180	--
总计		44679	100.000	6185			

图121 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-506-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-53  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:19:55      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	45438	100.000	6305	2298	1.182	--
总计		45438	100.000	6305			

图122 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-507-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:23:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:14      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45247	100.000	6267	2306	1.182	--
总计		45247	100.000	6267			

图123 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-508-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:26:42      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:18      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45223	100.000	6256	2283	1.180	--
总计		45223	100.000	6256			

图124 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-509-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:30:05      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45907	100.000	6363	2296	1.175	--
总计		45907	100.000	6363			

图125 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-510-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:33:28      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:24      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45906	100.000	6361	2287	1.183	--
总计		45906	100.000	6361			

图126 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-511-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:36:52      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	45063	100.000	6272	2305	1.174	--
总计		45063	100.000	6272			

图127 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-512-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-48  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:40:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:31      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	46795	100.000	6457	2278	1.183	--
总计		46795	100.000	6457			

图128 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-513-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:43:38      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:34      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45166	100.000	6253	2287	1.185	--
总计		45166	100.000	6253			

图129 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-514-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:47:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:38      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44875	100.000	6223	2299	1.182	--
总计		44875	100.000	6223			

图130 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-515-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:50:25      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:41      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44472	100.000	6180	2292	1.177	--
总计		44472	100.000	6180			

图131 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RCHJE-4126 - 0-36/18-516-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RCHJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RCHJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-31  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:53:48      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45619	100.000	6330	2270	1.174	--
总计		45619	100.000	6330			

图132 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-517-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-40  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 21:57:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:48      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45448	100.000	6279	2284	1.185	--
总计		45448	100.000	6279			

图133 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-518-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-49  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:00:36      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45943	100.000	6350	2292	1.172	--
总计		45943	100.000	6350			

图134 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-519-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:04:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99058	100.000	13527	2204	1.175	--
总计		99058	100.000	13527			

图135 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-520-2 - zzp-2025062621p-2-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 2-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:07:23      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:34:58      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99459	100.000	13547	2194	1.180	--
总计		99459	100.000	13547			

图136 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062621批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-521-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:10:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:01      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 溶剂




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-522-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:14:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	100016	100.000	13581	2194	1.181	--
总计		100016	100.000	13581			

图138 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-523-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:17:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:08      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	99642	100.000	13566	2192	1.181	--
总计		99642	100.000	13566			


图139 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-524-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:20:56      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	99699	100.000	13577	2193	1.183	--
总计		99699	100.000	13577			

图140 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-525-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:24:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:15      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	99621	100.000	13557	2195	1.177	--
总计		99621	100.000	13557			

图141 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-526-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:27:42      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:18      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	99593	100.000	13538	2195	1.182	--
总计		99593	100.000	13538			

图142 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-527-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:31:05      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	33414	100.000	4618	2272	1.181	--
总计		33414	100.000	4618			

图143 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-528-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:34:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:25      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	33348	100.000	4619	2286	1.189	--
总计		33348	100.000	4619			

图144 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-529-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:37:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:29      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	35222	100.000	4869	2289	1.184	--
总计		35222	100.000	4869			


图145 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-530-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:41:13      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:32      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	35372	100.000	4898	2278	1.190	--
总计		35372	100.000	4898			

图146 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片4  
供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-531-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:44:36      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:36      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	34472	100.000	4756	2267	1.182	--
总计		34472	100.000	4756			

图147 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-532-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-5min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:47:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:35:40      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	35319	100.000	4863	2271	1.183	--
总计		35319	100.000	4863			

图148 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-5min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-533-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-2  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:51:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	38840	100.000	5387	2282	1.172	--
总计		38840	100.000	5387			

图149 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-534-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-11  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:54:41      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	38429	100.000	5317	2286	1.172	--
总计		38429	100.000	5317			

图150 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-535-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-20  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 22:58:04      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:50      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	37820	100.000	5235	2263	1.184	--
总计		37820	100.000	5235			

图151 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-536-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-29  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:01:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	39201	100.000	5411	2285	1.178	--
总计		39201	100.000	5411			

图152 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-537-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-38  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:04:48      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:35:57      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	38939	100.000	5412	2265	1.181	--
总计		38939	100.000	5412			

图153 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-538-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-10min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-47  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:08:10      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:01      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	38654	100.000	5352	2270	1.180	--
总计		38654	100.000	5352			

图154 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-539-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-3  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:11:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	40082	100.000	5568	2282	1.181	--
总计		40082	100.000	5568			

图155 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-540-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-12  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:14:55      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:08      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	39853	100.000	5520	2272	1.180	--
总计		39853	100.000	5520			

图156 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-541-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-21  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:18:17      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:11      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	40485	100.000	5585	2266	1.187	--
总计		40485	100.000	5585			

图157 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-542-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-30  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:21:39      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:15      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	40699	100.000	5629	2262	1.192	--
总计		40699	100.000	5629			

图158 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-543-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-39  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:25:02      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:18      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	40887	100.000	5670	2280	1.172	--
总计		40887	100.000	5670			

图159 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-544-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-15min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-48  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:28:23      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:21      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	40642	100.000	5660	2294	1.185	--
总计		40642	100.000	5660			

图160 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-545-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-4  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:31:46      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:25      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	41154	100.000	5695	2263	1.171	--
总计		41154	100.000	5695			

图161 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-546-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-13  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:35:07      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:28      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42747	100.000	5901	2276	1.181	--
总计		42747	100.000	5901			

图162 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-547-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-22  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:38:29      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:32      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42735	100.000	5884	2279	1.188	--
总计		42735	100.000	5884			

图163 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-548-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-31  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:41:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:35      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	41379	100.000	5745	2289	1.170	--
总计		41379	100.000	5745			

图164 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-549-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-40  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:45:13      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:39      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	41704	100.000	5760	2281	1.188	--
总计		41704	100.000	5760			

图165 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-550-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-20min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-49  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:48:36      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:42      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	41518	100.000	5742	2274	1.184	--
总计		41518	100.000	5742			

图166 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-551-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:51:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:46      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	41837	100.000	5776	2274	1.195	--
总计		41837	100.000	5776			

图167 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-552-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:55:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:49      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43400	100.000	6014	2287	1.176	--
总计		43400	100.000	6014			

图168 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-553-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/29 23:58:43      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:52      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42887	100.000	5906	2253	1.186	--
总计		42887	100.000	5906			

图169 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-554-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-32  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:02:05      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:36:56      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43305	100.000	5975	2266	1.186	--
总计		43305	100.000	5975			

图170 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-555-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:05:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:00      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42474	100.000	5875	2268	1.175	--
总计		42474	100.000	5875			

图171 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-556-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-30min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:08:49      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:37:03      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	43245	100.000	5985	2279	1.180	--
总计		43245	100.000	5985			

图172 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-557-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:12:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:06      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	43155	100.000	5967	2273	1.176	--
总计		43155	100.000	5967			

图173 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-558-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:15:32      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:10      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44344	100.000	6147	2278	1.173	--
总计		44344	100.000	6147			

图174 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-559-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:18:54      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:13      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	42714	100.000	5932	2275	1.181	--
总计		42714	100.000	5932			

图175 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-560-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-33  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:22:18      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:17      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43609	100.000	6034	2273	1.185	--
总计		43609	100.000	6034			

图176 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-561-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:25:39      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:20      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44081	100.000	6101	2290	1.180	--
总计		44081	100.000	6101			

图177 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-562-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-45min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:29:01      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:24      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43274	100.000	5997	2267	1.178	--
总计		43274	100.000	5997			

图178 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-563-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-7  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:32:22      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:27      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	43361	100.000	6017	2285	1.179	--
总计		43361	100.000	6017			

图179 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-浆法-50转-60min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-564-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-16  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:35:45      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:31      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44104	100.000	6089	2278	1.191	--
总计		44104	100.000	6089			

图180 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-565-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-25  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:39:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:34      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	42953	100.000	5961	2287	1.175	--
总计		42953	100.000	5961			

图181 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-566-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-34  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:42:28      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:37      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	44184	100.000	6084	2264	1.175	--
总计		44184	100.000	6084			

图182 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-567-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-43  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:45:50      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:41      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44149	100.000	6120	2277	1.177	--
总计		44149	100.000	6120			

图183 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-568-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-60min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-52  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:49:12      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:44      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	43351	100.000	5999	2269	1.183	--
总计		43351	100.000	5999			

图184 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-569-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-8  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:52:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:48      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	45141	100.000	6271	2296	1.176	--
总计		45141	100.000	6271			

图185 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-570-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-17  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:55:57      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44451	100.000	6156	2284	1.182	--
总计		44451	100.000	6156			

图186 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-571-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-26  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 00:59:20      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:55      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44369	100.000	6134	2271	1.177	--
总计		44369	100.000	6134			

图187 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-572-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-35  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:02:41      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:37:59      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44831	100.000	6174	2259	1.180	--
总计		44831	100.000	6174			

图188 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-573-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-44  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:06:06      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:02      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45284	100.000	6260	2288	1.177	--
总计		45284	100.000	6260			

图189 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-574-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-90min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-53  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:09:28      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:05      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	44946	100.000	6230	2280	1.181	--
总计		44946	100.000	6230			

图190 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-575-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-5  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:12:51      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:09      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	43380	100.000	6013	2283	1.179	--
总计		43380	100.000	6013			

图191 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-576-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-14  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:16:15      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:12      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	42530	100.000	5997	2333	1.162	--
总计		42530	100.000	5997			

图192 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-577-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-23  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:19:39      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:16      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	46511	100.000	6446	2289	1.181	--
总计		46511	100.000	6446			

图193 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-578-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-32  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:23:03      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:19      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	45181	100.000	6243	2268	1.178	--
总计		45181	100.000	6243			

图194 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-579-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-41  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:26:27      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:23      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	45490	100.000	6284	2271	1.178	--
总计		45490	100.000	6284			

图195 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-580-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-120min-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-50  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:29:50      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:26      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44483	100.000	6141	2267	1.189	--
总计		44483	100.000	6141			

图196 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-581-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-6  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:33:14      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:38:30      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44581	100.000	6167	2292	1.176	--
总计		44581	100.000	6167			

图197 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-582-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-15  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:36:37      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:33      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44959	100.000	6250	2275	1.168	--
总计		44959	100.000	6250			

图198 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-583-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P3.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-24  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:40:00      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:37      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44946	100.000	6215	2270	1.177	--
总计		44946	100.000	6215			


图199 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3  
 供试品溶液-1

## &lt;样品信息&gt;

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m) 流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-584-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P4.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-33  
 进样体积: 20  $\mu$ l 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:43:24 实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:38:40 处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## &lt;色谱图&gt;

mV



## &lt;峰表&gt;

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	45344	100.000	6279	2273	1.185	--
总计		45344	100.000	6279			




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-585-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P5.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-42  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:46:48      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:43      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	44651	100.000	6189	2273	1.173	--
总计		44651	100.000	6189			

图201 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-586-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-jxzs-P6.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 4-51  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:50:11      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2) : 2025/07/30 10:38:47      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	44791	100.000	6205	2278	1.172	--
总计		44791	100.000	6205			

图202 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6  
 供试品溶液-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5 $\mu$ m)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-587-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20  $\mu$ l      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:53:34      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:38:51      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	100822	100.000	13680	2187	1.184	--
总计		100822	100.000	13680			

图203 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1




# HJE-4126

## <样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.5ml/min  
 柱温 : 35°C      波长: 259nm  
 数据文件名: RC\$HJE-4126 - 0-36/18-588-2 - zzp-2025062721p-1-rcqx-pH6.8jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$HJE-4126 - HJE-4126-RC-FX267.lcm  
 批处理文件名: RC\$HJE-4126 - 20250729-RC-FX267.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/07/30 01:56:58      实验者: wangdan  
 处理时间 (V2): 2025/07/30 10:38:54      处理者: wangdan  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX267)

## <色谱图>

mV



## <峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.229	100320	100.000	13664	2193	1.178	--
总计		100320	100.000	13664			

图204 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出曲线测定HPLC图谱  
 自制品-2025062721批-pH6.8介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2