




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1084-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:08:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:06:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1085-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:11:59 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:06:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199001	100.000	42675	5455	1.181	--
总计		199001	100.000	42675			

图2 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1086-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:15:22 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:06:57
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199573	100.000	42803	5456	1.179	--
总计		199573	100.000	42803			

图3 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1087-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:18:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:01
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199566	100.000	42915	5497	1.180	--
总计		199566	100.000	42915			

图4 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1088-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:22:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.272	199358	100.000	42743	5457	1.180	--
总计		199358	100.000	42743			

图5 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1089-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:25:31 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.271	199196	100.000	42880	5494	1.179	--
总计		199196	100.000	42880			

图6 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1090-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:28:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:09
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	159255	100.000	36927	6561	1.181	--
总计		159255	100.000	36927			

图7 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1091-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:32:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:12
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	161942	100.000	37685	6606	1.182	--
总计		161942	100.000	37685			

图8 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1092-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:35:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.286	160373	100.000	37385	6628	1.182	--
总计		160373	100.000	37385			

图9 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1093-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:39:00 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	161568	100.000	37499	6614	1.181	--
总计		161568	100.000	37499			

图10 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1094-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 17:42:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	152101	100.000	35250	6566	1.179	--
总计		152101	100.000	35250			

图11 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1095-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:45:42 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	147089	100.000	34042	6595	1.183	--
总计		147089	100.000	34042			

图12 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1096-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:49:03 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:25
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	181717	100.000	41926	6559	1.184	--
总计		181717	100.000	41926			

图13 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1097-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:52:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:28
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	181596	100.000	41887	6562	1.183	--
总计		181596	100.000	41887			

图14 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1098-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:55:47 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	182269	100.000	42091	6572	1.180	--
总计		182269	100.000	42091			

图15 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1099-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 17:59:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	182949	100.000	42239	6561	1.181	--
总计		182949	100.000	42239			

图16 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1100-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:02:31 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:36
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	175498	100.000	40617	6582	1.183	--
总计		175498	100.000	40617			

图17 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1101-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:05:52 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	174011	100.000	40354	6575	1.181	--
总计		174011	100.000	40354			

图18 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1102-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:09:14 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	188395	100.000	43552	6570	1.182	--
总计		188395	100.000	43552			

图19 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-58转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1103-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:12:36 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	187168	100.000	43457	6570	1.181	--
总计		187168	100.000	43457			

图20 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1104-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:15:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	190856	100.000	44250	6569	1.182	--
总计		190856	100.000	44250			

图21 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-58转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1105-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:19:20 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	189685	100.000	44082	6535	1.181	--
总计		189685	100.000	44082			

图22 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1106-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:22:42 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	180990	100.000	41973	6510	1.180	--
总计		180990	100.000	41973			

图23 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1107-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 18:26:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	184397	100.000	42776	6510	1.180	--
总计		184397	100.000	42776			

图24 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1108-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:29:26 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:07:57
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	205609	100.000	47716	6504	1.181	--
总计		205609	100.000	47716			

图25 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1109-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:32:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	189989	100.000	44100	6517	1.183	--
总计		189989	100.000	44100			

图26 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-58转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1110-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:36:10 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	195210	100.000	45296	6512	1.183	--
总计		195210	100.000	45296			

图27 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1111-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:39:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:06
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	193375	100.000	44926	6517	1.182	--
总计		193375	100.000	44926			

图28 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1112-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:42:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:09
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	183982	100.000	42611	6526	1.183	--
总计		183982	100.000	42611			

图29 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1113-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 18:46:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	189279	100.000	43849	6514	1.183	--
总计		189279	100.000	43849			

图30 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1114-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:49:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:15
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	194899	100.000	45126	6493	1.182	--
总计		194899	100.000	45126			

图31 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1115-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:52:59 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	195608	100.000	45297	6491	1.183	--
总计		195608	100.000	45297			

图32 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1116-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:56:20 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:20
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	198408	100.000	45904	6501	1.182	--
总计		198408	100.000	45904			

图33 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1117-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 18:59:42 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	198107	100.000	45926	6521	1.182	--
总计		198107	100.000	45926			

图34 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1118-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:03:03 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:25
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	187902	100.000	43566	6526	1.182	--
总计		187902	100.000	43566			

图35 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1119-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:06:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:28
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	192639	100.000	44672	6528	1.181	--
总计		192639	100.000	44672			

图36 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1120-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:09:46 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	196164	100.000	45553	6544	1.182	--
总计		196164	100.000	45553			

图37 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1121-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:13:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	197724	100.000	45901	6546	1.181	--
总计		197724	100.000	45901			

图38 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1122-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:16:30 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:36
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	200487	100.000	46491	6543	1.182	--
总计		200487	100.000	46491			

图39 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1123-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 19:19:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	203556	100.000	47240	6516	1.183	--
总计		203556	100.000	47240			

图40 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-58转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1124-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:23:14 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:41
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	189271	100.000	43851	6522	1.183	--
总计		189271	100.000	43851			

图41 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1125-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:26:36 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	194720	100.000	45106	6520	1.183	--
总计		194720	100.000	45106			

图42 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1126-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:29:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	198375	100.000	45954	6501	1.183	--
总计		198375	100.000	45954			

图43 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1127-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:33:20 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	201097	100.000	46632	6516	1.182	--
总计		201097	100.000	46632			

图44 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1128-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:36:42 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	208132	100.000	48401	6530	1.182	--
总计		208132	100.000	48401			

图45 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1129-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:40:04 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	202402	100.000	47040	6514	1.182	--
总计		202402	100.000	47040			

图46 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1130-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:43:26 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:08:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	193470	100.000	44912	6501	1.182	--
总计		193470	100.000	44912			

图47 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1131-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:46:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	196470	100.000	45584	6498	1.182	--
总计		196470	100.000	45584			

图48 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1132-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:50:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:03
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.267	199258	100.000	42478	5448	1.182	--
总计		199258	100.000	42478			

图49 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1133-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf58z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:53:34 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:06
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	199218	100.000	42651	5436	1.182	--
总计		199218	100.000	42651			

图50 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 对照品溶液-2-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1134-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-tj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 19:56:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:08
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-58转
 溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1135-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:00:21 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:11
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	199718	100.000	42660	5449	1.182	--
总计		199718	100.000	42660			

图52 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1136-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 20:03:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	199820	100.000	42797	5458	1.181	--
总计		199820	100.000	42797			

图53 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1137-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:07:07 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	199768	100.000	42838	5462	1.182	--
总计		199768	100.000	42838			

图54 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1138-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:10:30 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	199773	100.000	42928	5478	1.179	--
总计		199773	100.000	42928			

图55 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1139-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:13:53 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.266	199642	100.000	42944	5489	1.179	--
总计		199642	100.000	42944			

图56 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1140-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:17:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	176957	100.000	41269	6529	1.180	--
总计		176957	100.000	41269			

图57 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1141-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:20:39 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	169253	100.000	39452	6534	1.180	--
总计		169253	100.000	39452			

图58 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1142-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:24:02 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	171919	100.000	40114	6554	1.180	--
总计		171919	100.000	40114			

图59 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1143-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:27:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	170898	100.000	39853	6531	1.181	--
总计		170898	100.000	39853			

图60 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1144-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:30:46 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	169504	100.000	39519	6541	1.180	--
总计		169504	100.000	39519			

图61 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1145-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:34:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	176301	100.000	41047	6527	1.181	--
总计		176301	100.000	41047			

图62 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1146-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:37:31 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:41
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	192255	100.000	44782	6517	1.180	--
总计		192255	100.000	44782			

图63 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1147-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:40:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	183375	100.000	42674	6508	1.180	--
总计		183375	100.000	42674			

图64 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1148-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:44:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:46
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	186520	100.000	43293	6482	1.180	--
总计		186520	100.000	43293			

图65 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1149-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:47:39 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:49
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	187235	100.000	43446	6479	1.180	--
总计		187235	100.000	43446			

图66 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1150-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 20:51:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	186103	100.000	43238	6483	1.179	--
总计		186103	100.000	43238			

图67 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1151-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:54:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	190957	100.000	44379	6496	1.180	--
总计		190957	100.000	44379			

图68 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1152-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 20:57:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:09:57
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	199769	100.000	46411	6498	1.179	--
总计		199769	100.000	46411			

图69 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1153-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:01:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:00
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	189496	100.000	44000	6487	1.179	--
总计		189496	100.000	44000			

图70 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1154-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:04:34 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	192600	100.000	44758	6498	1.178	--
总计		192600	100.000	44758			

图71 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1155-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:07:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	194389	100.000	45183	6500	1.179	--
总计		194389	100.000	45183			

图72 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1156-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 21:11:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	193196	100.000	44909	6505	1.178	--
总计		193196	100.000	44909			

图73 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1157-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-48 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:14:42 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	197792	100.000	45949	6494	1.178	--
总计		197792	100.000	45949			

图74 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1158-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:18:05 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	204386	100.000	47426	6469	1.176	--
总计		204386	100.000	47426			

图75 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1159-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:21:28 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	193019	100.000	44764	6475	1.177	--
总计		193019	100.000	44764			

图76 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1160-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:24:50 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	195944	100.000	45441	6477	1.177	--
总计		195944	100.000	45441			

图77 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1161-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:28:13 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	198274	100.000	45992	6480	1.178	--
总计		198274	100.000	45992			

图78 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1162-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:31:36 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	197009	100.000	45648	6461	1.177	--
总计		197009	100.000	45648			

图79 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1163-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-49 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:34:59 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	202899	100.000	47028	6465	1.176	--
总计		202899	100.000	47028			

图80 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1164-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:38:22 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	208611	100.000	48320	6457	1.176	--
总计		208611	100.000	48320			

图81 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1165-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:41:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	196384	100.000	45388	6435	1.176	--
总计		196384	100.000	45388			

图82 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1166-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:45:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	198482	100.000	45978	6451	1.176	--
总计		198482	100.000	45978			

图83 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1167-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 21:48:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	202506	100.000	46993	6477	1.176	--
总计		202506	100.000	46993			

图84 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1168-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:51:55 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	200132	100.000	46291	6436	1.177	--
总计		200132	100.000	46291			

图85 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1169-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 21:55:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	207807	100.000	48079	6436	1.178	--
总计		207807	100.000	48079			

图86 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1170-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 21:58:40 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	209740	100.000	48510	6426	1.179	--
总计		209740	100.000	48510			

图87 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1171-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 22:02:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	197344	100.000	45663	6429	1.177	--
总计		197344	100.000	45663			

图88 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1172-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 22:05:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	201139	100.000	46434	6425	1.178	--
总计		201139	100.000	46434			

图89 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1173-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 22:08:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	204173	100.000	47197	6434	1.178	--
总计		204173	100.000	47197			

图90 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1174-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:12:14 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	202545	100.000	46894	6447	1.178	--
总计		202545	100.000	46894			

图91 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1175-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:15:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:10:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	209287	100.000	48439	6434	1.178	--
总计		209287	100.000	48439			

图92 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-浆法-62转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1176-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:19:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	210853	100.000	48903	6474	1.179	--
总计		210853	100.000	48903			

图93 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1177-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:22:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	197072	100.000	45698	6460	1.179	--
总计		197072	100.000	45698			

图94 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1178-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:25:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	200547	100.000	46527	6468	1.179	--
总计		200547	100.000	46527			

图95 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1179-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:29:12 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	205322	100.000	47605	6469	1.179	--
总计		205322	100.000	47605			

图96 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1180-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 22:32:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	202824	100.000	47007	6464	1.179	--
总计		202824	100.000	47007			

图97 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1181-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:35:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	211966	100.000	49141	6473	1.181	--
总计		211966	100.000	49141			

图98 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1182-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:39:22 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.265	199009	100.000	42701	5442	1.180	--
总计		199009	100.000	42701			

图99 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1183-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-jf62z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:42:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	199973	100.000	43025	5452	1.178	--
总计		199973	100.000	43025			

图100 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-桨法-62转
 对照品溶液-2-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1184-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:46:06 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 - 溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1185-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:49:28 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:27
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	200525	100.000	43166	5466	1.178	--
总计		200525	100.000	43166			

图102 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1186-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:52:50 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:11:29
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	201191	100.000	43315	5467	1.178	--
总计		201191	100.000	43315			

图103 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1187-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:56:13 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:32
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	200203	100.000	43052	5449	1.179	--
总计		200203	100.000	43052			

图104 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1188-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 22:59:35 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	201208	100.000	43333	5467	1.178	--
总计		201208	100.000	43333			

图105 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1189-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:02:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	200707	100.000	43143	5450	1.179	--
总计		200707	100.000	43143			

图106 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1190-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:06:18 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:40
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	167681	100.000	38900	6492	1.179	--
总计		167681	100.000	38900			

图107 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1191-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:09:40 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:43
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	152967	100.000	35483	6505	1.178	--
总计		152967	100.000	35483			

图108 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1192-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:13:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	164678	100.000	38277	6497	1.179	--
总计		164678	100.000	38277			

图109 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1193-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 23:16:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	166049	100.000	38621	6519	1.178	--
总计		166049	100.000	38621			

图110 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1194-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:19:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	164432	100.000	38236	6504	1.178	--
总计		164432	100.000	38236			

图111 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1195-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 23:23:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	160429	100.000	37373	6531	1.178	--
总计		160429	100.000	37373			

图112 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1196-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:26:28 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	183556	100.000	42586	6517	1.179	--
总计		183556	100.000	42586			

图113 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1197-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:29:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:11:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	179089	100.000	41599	6511	1.178	--
总计		179089	100.000	41599			

图114 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1198-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:33:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	181249	100.000	42107	6513	1.178	--
总计		181249	100.000	42107			

图115 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1199-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:36:33 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:04
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	184429	100.000	42884	6508	1.178	--
总计		184429	100.000	42884			

图116 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1200-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 23:39:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	182146	100.000	42409	6528	1.179	--
总计		182146	100.000	42409			

图117 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1201-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/22 23:43:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	179718	100.000	41749	6500	1.178	--
总计		179718	100.000	41749			

图118 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1202-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:46:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	191380	100.000	44530	6511	1.177	--
总计		191380	100.000	44530			

图119 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1203-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:49:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:16
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	189655	100.000	44128	6531	1.178	--
总计		189655	100.000	44128			

图120 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1204-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:53:19 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:19
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	187408	100.000	43536	6515	1.178	--
总计		187408	100.000	43536			

图121 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1205-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/22 23:56:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:22
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	193523	100.000	44991	6518	1.177	--
总计		193523	100.000	44991			

图122 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1206-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:00:02 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:24
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	188677	100.000	43767	6512	1.179	--
总计		188677	100.000	43767			

图123 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1207-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:03:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	189615	100.000	44113	6528	1.178	--
总计		189615	100.000	44113			

图124 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1208-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:06:44 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	195413	100.000	45377	6524	1.178	--
总计		195413	100.000	45377			

图125 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1209-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:10:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	194188	100.000	45029	6507	1.179	--
总计		194188	100.000	45029			

图126 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1210-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:13:26 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	191965	100.000	44633	6526	1.179	--
总计		191965	100.000	44633			

图127 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1211-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:16:47 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	198624	100.000	46116	6528	1.178	--
总计		198624	100.000	46116			

图128 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1212-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:20:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	192877	100.000	44815	6511	1.178	--
总计		192877	100.000	44815			

图129 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1213-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:23:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	197449	100.000	45878	6520	1.177	--
总计		197449	100.000	45878			

图130 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1214-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:26:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	200282	100.000	46471	6507	1.179	--
总计		200282	100.000	46471			

图131 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1215-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:30:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	198757	100.000	46149	6509	1.177	--
总计		198757	100.000	46149			

图132 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1216-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:33:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	194011	100.000	44903	6496	1.179	--
总计		194011	100.000	44903			

图133 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1217-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:36:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	202892	100.000	47058	6499	1.178	--
总计		202892	100.000	47058			

图134 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1218-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:40:15 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:56
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	197230	100.000	45757	6520	1.177	--
总计		197230	100.000	45757			

图135 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1219-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:43:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:12:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	199861	100.000	46362	6510	1.178	--
总计		199861	100.000	46362			

图136 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1220-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:46:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:13:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	203882	100.000	47332	6517	1.177	--
总计		203882	100.000	47332			

图137 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1221-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:50:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	200480	100.000	46490	6508	1.178	--
总计		200480	100.000	46490			

图138 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1222-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 00:53:40 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:07
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	195859	100.000	45533	6520	1.176	--
总计		195859	100.000	45533			

图139 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1223-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 00:57:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	205730	100.000	47714	6525	1.177	--
总计		205730	100.000	47714			

图140 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1224-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 01:00:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	197946	100.000	45997	6532	1.177	--
总计		197946	100.000	45997			

图141 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1225-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 01:03:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:13:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	199172	100.000	46178	6515	1.177	--
总计		199172	100.000	46178			

图142 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1226-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:07:03 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	204783	100.000	47452	6504	1.176	--
总计		204783	100.000	47452			

图143 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1227-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:10:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:20
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	201795	100.000	46846	6512	1.174	--
总计		201795	100.000	46846			

图144 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1228-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:13:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:23
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	194843	100.000	45107	6481	1.174	--
总计		194843	100.000	45107			

图145 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1229-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 01:17:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	205442	100.000	47711	6510	1.172	--
总计		205442	100.000	47711			

图146 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1230-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 01:20:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	198368	100.000	45921	6497	1.174	--
总计		198368	100.000	45921			

图147 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1231-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 01:23:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:13:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	201666	100.000	46729	6503	1.174	--
总计		201666	100.000	46729			

图148 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 --极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1232-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:27:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	199108	100.000	42857	5450	1.172	--
总计		199108	100.000	42857			

图149 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1233-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-36d-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:30:33 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:13:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	198274	100.000	42604	5437	1.174	--
总计		198274	100.000	42604			

图150 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-36 -
 对照品溶液-2-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1234-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:33:56 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图151 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 - 溶剂




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1235-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:37:20 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	200688	100.000	43219	5466	1.172	--
总计		200688	100.000	43219			

图152 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-1-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1236-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:40:42 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:44
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.264	200763	100.000	43226	5465	1.174	--
总计		200763	100.000	43226			

图153 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-1-2




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1237-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:44:06 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	200733	100.000	43230	5457	1.172	--
总计		200733	100.000	43230			

图154 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-1-3




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1238-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:47:30 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	199947	100.000	43030	5455	1.174	--
总计		199947	100.000	43030			

图155 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-1-4




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1239-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:50:53 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:13:52
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.262	200684	100.000	43226	5462	1.173	--
总计		200684	100.000	43226			

图156 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-1-5




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1240-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:54:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:55
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	166362	100.000	38419	6499	1.176	--
总计		166362	100.000	38419			

图157 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1241-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 01:57:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:13:58
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	170764	100.000	39397	6500	1.177	--
总计		170764	100.000	39397			

图158 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1242-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:01:00 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:01
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	164406	100.000	37842	6490	1.178	--
总计		164406	100.000	37842			

图159 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --5min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1243-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:04:22 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:03
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	165769	100.000	38253	6492	1.177	--
总计		165769	100.000	38253			

图160 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1244-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:07:44 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:06
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	163393	100.000	37681	6486	1.178	--
总计		163393	100.000	37681			

图161 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1245-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-46 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:11:06 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:09
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	159373	100.000	36855	6483	1.176	--
总计		159373	100.000	36855			

图162 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1246-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:14:27 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:12
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	182433	100.000	42137	6480	1.176	--
总计		182433	100.000	42137			

图163 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1247-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:17:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:14
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	185025	100.000	42560	6484	1.177	--
总计		185025	100.000	42560			

图164 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1248-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:21:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:17
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	185183	100.000	42804	6494	1.177	--
总计		185183	100.000	42804			

图165 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1249-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 02:24:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	183781	100.000	42360	6492	1.178	--
总计		183781	100.000	42360			

图166 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1250-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 02:27:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	177711	100.000	40989	6505	1.177	--
总计		177711	100.000	40989			

图167 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1251-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 02:31:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	180459	100.000	41764	6497	1.175	--
总计		180459	100.000	41764			

图168 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1252-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:34:39 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:28
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	189486	100.000	43672	6493	1.177	--
总计		189486	100.000	43672			

图169 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1253-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:38:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:30
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	191168	100.000	44334	6514	1.174	--
总计		191168	100.000	44334			

图170 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1254-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:41:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:33
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	189553	100.000	43680	6491	1.175	--
总计		189553	100.000	43680			

图171 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1255-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:44:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:35
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	191338	100.000	44036	6487	1.175	--
总计		191338	100.000	44036			

图172 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1256-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:48:07 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:38
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	184394	100.000	42502	6486	1.174	--
总计		184394	100.000	42502			

图173 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1257-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 02:51:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	187354	100.000	43195	6488	1.176	--
总计		187354	100.000	43195			

图174 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1258-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:54:52 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:43
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	194011	100.000	44807	6474	1.174	--
总计		194011	100.000	44807			

图175 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1259-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 02:58:15 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:46
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	193352	100.000	44510	6463	1.175	--
总计		193352	100.000	44510			

图176 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1260-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 03:01:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	193190	100.000	44507	6479	1.172	--
总计		193190	100.000	44507			

图177 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1261-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:05:00 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:51
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	195949	100.000	45088	6470	1.174	--
总计		195949	100.000	45088			

图178 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1262-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:08:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:54
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	188742	100.000	43468	6471	1.173	--
总计		188742	100.000	43468			

图179 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1263-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 03:11:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	192989	100.000	44363	6471	1.173	--
总计		192989	100.000	44363			

图180 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1264-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:15:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:14:59
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	198424	100.000	45720	6461	1.175	--
总计		198424	100.000	45720			

图181 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --30min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1265-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:18:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:15:02
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	197359	100.000	45468	6475	1.173	--
总计		197359	100.000	45468			

图182 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1266-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:21:55 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:05
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	197001	100.000	45335	6465	1.174	--
总计		197001	100.000	45335			

图183 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --30min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1267-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 03:25:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:15:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	199175	100.000	45773	6459	1.174	--
总计		199175	100.000	45773			

图184 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --30min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1268-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:28:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:10
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	192564	100.000	44253	6457	1.174	--
总计		192564	100.000	44253			

图185 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --30min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1269-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:32:04 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:13
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	195875	100.000	44970	6454	1.173	--
总计		195875	100.000	44970			

图186 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1270-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:35:27 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:15
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	200986	100.000	46267	6462	1.173	--
总计		200986	100.000	46267			

图187 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1271-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:38:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:18
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	197676	100.000	45553	6450	1.174	--
总计		197676	100.000	45553			

图188 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1272-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:42:12 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:21
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	198910	100.000	45843	6482	1.172	--
总计		198910	100.000	45843			

图189 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1273-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 03:45:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.275	200533	100.000	46257	6480	1.173	--
总计		200533	100.000	46257			

图190 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1274-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:48:56 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:26
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	194616	100.000	44951	6470	1.172	--
总计		194616	100.000	44951			

图191 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1275-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/07/23 03:52:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	198378	100.000	45718	6486	1.173	--
总计		198378	100.000	45718			

图192 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1276-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-jx-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:55:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:31
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	200531	100.000	46123	6478	1.174	--
总计		200531	100.000	46123			

图193 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1277-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-jx-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 03:59:04 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:34
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	198231	100.000	45723	6487	1.172	--
总计		198231	100.000	45723			

图194 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1278-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-jx-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 04:02:28 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:37
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	199137	100.000	45859	6482	1.173	--
总计		199137	100.000	45859			

图195 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --极限转速-片3
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1279-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-jx-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 04:05:51 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:39
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	200884	100.000	46524	6492	1.171	--
总计		200884	100.000	46524			

图196 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1280-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-jx-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-43 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 04:09:14 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:42
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.277	195413	100.000	45191	6487	1.172	--
总计		195413	100.000	45191			

图197 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1281-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-jx-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 04:12:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:45
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.276	198159	100.000	45718	6498	1.172	--
总计		198159	100.000	45718			

图198 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 --极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1282-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 04:16:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/07/23 10:15:47
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	201505	100.000	43462	5475	1.169	--
总计		201505	100.000	43462			

图199 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-2-1




SMF-4106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 223nm
 数据文件名: RC\$SMF-4106 - 30-8/30-1283-2 - zzp-2025041711p-10mg-rcqx-pH4.5jz-38d-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4106 - SMF-4106-RCQX-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4106 - 20250722-rc-FX279.lcb
 样品瓶号: 4-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/07/23 04:19:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/07/23 10:15:50
 仪器型号:SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 223nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.263	201006	100.000	43291	5459	1.172	--
总计		201006	100.000	43291			

图200 达格列净片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025041711批(10mg规格)-pH4.5介质-38 -
 对照品溶液-2-2