




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2609-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 14:58:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2610-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:02:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	205301	100.000	36645	2053	1.131	--
总计		205301	100.000	36645			


图2 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2611-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:05:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	205847	100.000	36696	2052	1.131	--
总计		205847	100.000	36696			


图3 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2612-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:09:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	205170	100.000	36577	2049	1.132	--
总计		205170	100.000	36577			

图4 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-3




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2613-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:12:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	205335	100.000	36719	2066	1.127	--
总计		205335	100.000	36719			


图5 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2614-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:15:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.667	205676	100.000	36822	2063	1.129	--
总计		205676	100.000	36822			

图6 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-5




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2615-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:19:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	5845	8.717	1406	944	1.249	--
2	1.674	61213	91.283	11594	2306	1.127	6.731
总计		67058	100.000	13000			

图7 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2616-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:22:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	6289	8.210	1528	958	1.268	--
2	1.674	70317	91.790	13276	2313	1.126	6.759
总计		76606	100.000	14804			

图8 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2617-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:26:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	5598	9.345	1373	946	1.237	--
2	1.674	54303	90.655	10289	2314	1.126	6.741
总计		59901	100.000	11663			


图9 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2618-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:29:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:23:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	5584	9.458	1372	961	1.271	--
2	1.674	53459	90.542	10128	2324	1.125	6.768
总计		59044	100.000	11501			

图10 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2619-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:32:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	6344	10.247	1564	968	1.261	--
2	1.674	55566	89.753	10539	2325	1.131	6.781
总计		61910	100.000	12102			


图11 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2620-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:36:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	5752	8.795	1405	945	1.262	--
2	1.674	59647	91.205	11296	2326	1.126	6.747
总计		65399	100.000	12701			


图12 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2621-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:39:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	8715	7.264	2139	964	1.292	--
2	1.674	111259	92.736	21045	2310	1.125	6.766
总计		119974	100.000	23185			

图13 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2622-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:42:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	8871	7.335	2168	948	1.272	--
2	1.674	112073	92.665	21227	2315	1.127	6.746
总计		120944	100.000	23395			


图14 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2623-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:46:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	8808	7.620	2153	960	1.279	--
2	1.674	106783	92.380	20269	2330	1.123	6.775
总计		115591	100.000	22423			


图15 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2624-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:49:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:23:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	8426	7.673	2047	947	1.263	--
2	1.674	101385	92.327	19213	2320	1.125	6.747
总计		109811	100.000	21260			

图16 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2625-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:52:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	9121	8.229	2210	951	1.300	--
2	1.674	101719	91.771	19322	2324	1.123	6.756
总计		110840	100.000	21532			


图17 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2626-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:56:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	7987	7.311	1956	950	1.252	--
2	1.674	101260	92.689	19199	2320	1.127	6.754
总计		109246	100.000	21155			


图18 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2627-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 15:59:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	12546	8.488	3067	962	1.260	--
2	1.673	135260	91.512	25672	2325	1.127	6.784
总计		147807	100.000	28739			

图19 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2628-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:03:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	12346	8.340	3055	978	1.267	--
2	1.674	135689	91.660	25831	2348	1.124	6.821
总计		148036	100.000	28886			


图20 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2629-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:06:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:24:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11636	8.292	2851	956	1.266	--
2	1.674	128682	91.708	24431	2334	1.125	6.776
总计		140318	100.000	27282			


图21 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 浆法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2630-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:09:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11118	8.156	2745	972	1.273	--
2	1.674	125192	91.844	23777	2338	1.127	6.804
总计		136310	100.000	26522			


图22 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2631-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:13:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11884	8.668	2926	966	1.261	--
2	1.674	125223	91.332	23774	2333	1.124	6.789
总计		137107	100.000	26700			


图23 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2632-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:16:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11145	8.115	2751	968	1.264	--
2	1.674	126198	91.885	23993	2338	1.125	6.798
总计		137343	100.000	26744			


图24 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2633-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:19:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	16312	9.923	4029	973	1.266	--
2	1.674	148082	90.077	28156	2332	1.124	6.807
总计		164394	100.000	32185			


图25 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2634-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:23:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	15807	9.735	3941	985	1.258	--
2	1.674	146562	90.265	27934	2352	1.121	6.837
总计		162368	100.000	31876			


图26 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2635-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:26:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:24:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	14564	9.427	3595	973	1.268	--
2	1.674	139934	90.573	26513	2333	1.128	6.803
总计		154498	100.000	30108			


图27 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2636-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:29:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	14153	9.257	3504	976	1.254	--
2	1.674	138731	90.743	26363	2339	1.126	6.811
总计		152884	100.000	29867			


图28 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2637-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:33:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	15096	9.716	3737	983	1.270	--
2	1.674	140272	90.284	26712	2345	1.122	6.827
总计		155368	100.000	30449			


图29 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2638-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:36:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	14137	9.228	3495	978	1.267	--
2	1.674	139067	90.772	26438	2339	1.124	6.813
总计		153205	100.000	29933			


图30 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2639-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:40:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	24217	13.284	6007	986	1.260	--
2	1.673	158079	86.716	30097	2335	1.125	6.830
总计		182296	100.000	36103			


图31 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2640-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:43:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	22673	12.775	5640	991	1.262	--
2	1.674	154807	87.225	29453	2340	1.123	6.837
总计		177480	100.000	35094			


图32 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2641-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:46:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	21709	12.227	5386	982	1.260	--
2	1.673	155847	87.773	29626	2332	1.126	6.821
总计		177556	100.000	35012			


图33 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2642-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:50:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	20677	11.923	5132	987	1.265	--
2	1.673	152741	88.077	29041	2329	1.123	6.825
总计		173418	100.000	34173			


图34 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2643-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:53:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	21219	12.209	5271	988	1.263	--
2	1.673	152579	87.791	29064	2338	1.122	6.834
总计		173799	100.000	34335			


图35 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2644-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 16:56:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	20449	11.724	5092	992	1.267	--
2	1.673	153963	88.276	29377	2344	1.123	6.846
总计		174412	100.000	34468			


图36 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2645-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:00:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	35321	18.844	8769	989	1.261	--
2	1.673	152120	81.156	28929	2330	1.124	6.831
总计		187441	100.000	37698			

图37 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2646-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:03:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	33660	17.759	8370	990	1.255	--
2	1.673	155880	82.241	29673	2335	1.124	6.837
总计		189540	100.000	38043			


图38 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2647-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:07:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:24:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	31949	16.998	7944	994	1.262	--
2	1.673	156006	83.002	29750	2343	1.124	6.849
总计		187955	100.000	37694			


图39 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2648-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:10:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	30694	16.416	7644	993	1.258	--
2	1.674	156286	83.584	29807	2344	1.121	6.848
总计		186980	100.000	37451			

图40 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2649-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:13:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	31053	16.596	7753	998	1.265	--
2	1.673	156060	83.404	29747	2344	1.123	6.855
总计		187113	100.000	37500			


图41 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2650-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:17:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	30095	16.190	7461	991	1.269	--
2	1.673	155787	83.810	29721	2346	1.123	6.847
总计		185882	100.000	37181			


图42 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2651-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:20:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	47844	24.856	11951	1000	1.260	--
2	1.674	144639	75.144	27528	2344	1.124	6.855
总计		192482	100.000	39479			


图43 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2652-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:23:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:25:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	44768	23.431	11214	1002	1.251	--
2	1.674	146297	76.569	27899	2348	1.122	6.862
总计		191065	100.000	39113			

图44 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2653-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:27:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	42609	22.421	10614	995	1.259	--
2	1.673	147435	77.579	28092	2338	1.124	6.846
总计		190044	100.000	38706			


图45 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2654-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:30:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	41283	21.802	10311	1000	1.256	--
2	1.674	148070	78.198	28236	2346	1.124	6.861
总计		189353	100.000	38547			


图46 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2655-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:33:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:25:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	41683	21.797	10413	998	1.256	--
2	1.673	149547	78.203	28573	2348	1.123	6.860
总计		191229	100.000	38986			


图47 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2656-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:37:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	39857	21.176	9938	996	1.258	--
2	1.673	148363	78.824	28300	2341	1.125	6.852
总计		188220	100.000	38238			

图48 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2657-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:40:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	52353	27.813	13074	998	1.257	--
2	1.674	135880	72.187	25821	2343	1.124	6.850
总计		188234	100.000	38895			

图49 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2658-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:44:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.836	50127	26.107	12516	998	1.260	--
2	1.674	141882	73.893	27004	2337	1.123	6.851
总计		192009	100.000	39520			


图50 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2659-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:47:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	47828	25.009	11982	1003	1.256	--
2	1.675	143416	74.991	27303	2350	1.124	6.864
总计		191243	100.000	39285			


图51 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2660-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:50:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	45523	24.154	11392	999	1.261	--
2	1.675	142947	75.846	27108	2343	1.124	6.852
总计		188470	100.000	38500			


图52 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2661-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:54:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	46225	24.299	11560	1002	1.258	--
2	1.674	144009	75.701	27440	2351	1.123	6.869
总计		190233	100.000	39000			


图53 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2662-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 17:57:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	44379	23.591	11100	1003	1.255	--
2	1.674	143737	76.409	27351	2350	1.124	6.868
总计		188115	100.000	38451			


图54 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2663-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:00:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	205950	100.000	37008	2087	1.126	--
总计		205950	100.000	37008			


图55 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2664-2 - cbzj-12461045p-rcqx-js6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:04:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	206035	100.000	37057	2089	1.124	--
总计		206035	100.000	37057			


图56 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2665-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:07:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图57 美阿沙坦钾片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2666-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:11:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	206021	100.000	37150	2100	1.124	--
总计		206021	100.000	37150			


图58 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2667-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:14:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	205460	100.000	37130	2109	1.122	--
总计		205460	100.000	37130			


图59 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2668-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:17:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	205957	100.000	37239	2117	1.120	--
总计		205957	100.000	37239			


图60 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2669-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:21:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:25:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	205802	100.000	37165	2109	1.122	--
总计		205802	100.000	37165			


图61 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2670-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:24:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.668	205996	100.000	37193	2110	1.121	--
总计		205996	100.000	37193			


图62 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2671-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:28:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	4192	5.498	1048	994	1.247	--
2	1.674	72051	94.502	13751	2356	1.121	6.856
总计		76244	100.000	14799			


图63 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2672-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:31:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	3900	5.131	978	1008	1.252	--
2	1.675	72116	94.869	13767	2375	1.121	6.888
总计		76017	100.000	14746			

图64 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2673-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:34:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	4053	5.040	1010	990	1.246	--
2	1.675	76357	94.960	14588	2364	1.122	6.856
总计		80410	100.000	15597			


图65 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2674-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:38:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	4454	5.393	1116	993	1.238	--
2	1.675	78132	94.607	14900	2368	1.119	6.867
总计		82586	100.000	16017			


图66 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2675-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:41:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	4129	5.541	1032	998	1.269	--
2	1.676	70398	94.459	13521	2404	1.123	6.897
总计		74527	100.000	14553			

图67 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2676-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:44:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	4397	5.563	1087	962	1.281	--
2	1.676	74641	94.437	14190	2361	1.124	6.809
总计		79038	100.000	15278			


图68 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2677-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:48:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	7264	5.532	1831	1011	1.239	--
2	1.675	124042	94.468	23704	2383	1.123	6.903
总计		131306	100.000	25535			

图69 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2678-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:51:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	7053	5.343	1757	990	1.255	--
2	1.675	124951	94.657	23810	2365	1.125	6.859
总计		132003	100.000	25568			

图70 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2679-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:55:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	7065	5.262	1778	1014	1.242	--
2	1.676	127187	94.738	24321	2392	1.123	6.915
总计		134251	100.000	26099			

图71 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2680-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 18:58:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	7707	5.532	1916	985	1.260	--
2	1.675	131614	94.468	25052	2351	1.126	6.839
总计		139321	100.000	26968			


图72 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2681-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:01:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	7302	5.502	1806	972	1.249	--
2	1.675	125422	94.498	23934	2358	1.123	6.828
总计		132724	100.000	25740			

图73 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2682-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:05:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	7390	5.491	1842	999	1.261	--
2	1.675	127196	94.509	24295	2368	1.124	6.877
总计		134586	100.000	26138			


图74 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2683-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:08:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	11640	7.461	2915	996	1.248	--
2	1.675	144368	92.539	27452	2351	1.126	6.859
总计		156008	100.000	30367			

图75 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2684-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:12:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11636	7.248	2937	1017	1.245	--
2	1.676	148909	92.752	28425	2388	1.123	6.918
总计		160545	100.000	31363			

图76 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2685-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:15:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	11832	7.290	2960	1000	1.244	--
2	1.675	150470	92.710	28674	2357	1.125	6.868
总计		162301	100.000	31634			


图77 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2686-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:18:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	12436	7.528	3132	1018	1.247	--
2	1.676	152767	92.472	29202	2391	1.121	6.922
总计		165204	100.000	32334			

图78 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2687-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:22:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	12085	7.511	3042	1012	1.239	--
2	1.674	148807	92.489	28497	2373	1.120	6.901
总计		160892	100.000	31539			


图79 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2688-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:25:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	12034	7.424	3022	1007	1.256	--
2	1.675	150053	92.576	28667	2371	1.123	6.891
总计		162086	100.000	31689			


图80 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2689-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:28:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	15173	8.831	3829	1022	1.240	--
2	1.674	156639	91.169	29949	2369	1.121	6.914
总计		171812	100.000	33777			


图81 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2690-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:32:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	15496	8.720	3876	999	1.253	--
2	1.675	162210	91.280	30847	2346	1.126	6.858
总计		177706	100.000	34724			

图82 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2691-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:35:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:26:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15580	8.714	3944	1022	1.250	--
2	1.676	163206	91.286	31174	2390	1.123	6.930
总计		178785	100.000	35117			


图83 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2692-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:39:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	16146	8.895	4072	1010	1.246	--
2	1.675	165369	91.105	31490	2362	1.123	6.889
总计		181515	100.000	35562			


图84 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2693-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:42:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	15701	8.770	3962	1016	1.249	--
2	1.675	163318	91.230	31140	2359	1.121	6.897
总计		179019	100.000	35102			


图85 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2694-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:45:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	15463	8.798	3883	1001	1.245	--
2	1.675	160295	91.202	30551	2359	1.123	6.872
总计		175758	100.000	34434			


图86 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2695-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:49:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	22916	12.277	5769	1007	1.236	--
2	1.675	163746	87.723	31138	2349	1.122	6.874
总计		186662	100.000	36907			


图87 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2696-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:52:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	23122	12.221	5828	1009	1.245	--
2	1.675	166087	87.779	31633	2355	1.123	6.882
总计		189209	100.000	37461			

图88 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2697-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:56:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	23494	12.336	5924	1016	1.245	--
2	1.675	166957	87.664	31832	2362	1.122	6.898
总计		190451	100.000	37756			


图89 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2698-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 19:59:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	23669	12.435	5975	1014	1.236	--
2	1.675	166670	87.565	31754	2359	1.122	6.892
总计		190339	100.000	37729			


图90 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2699-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:02:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	23314	12.262	5867	1008	1.246	--
2	1.675	166808	87.738	31751	2353	1.122	6.881
总计		190122	100.000	37618			


图91 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2700-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:06:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	22978	12.235	5778	1008	1.251	--
2	1.675	164825	87.765	31399	2356	1.123	6.884
总计		187803	100.000	37176			


图92 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2701-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:09:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	35753	18.649	9009	1012	1.246	--
2	1.675	155962	81.351	29727	2357	1.122	6.889
总计		191715	100.000	38736			


图93 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2702-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:13:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:27:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	35906	18.502	9035	1011	1.247	--
2	1.675	158159	81.498	30068	2350	1.124	6.883
总计		194065	100.000	39103			

图94 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2703-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:16:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	36462	18.656	9179	1010	1.242	--
2	1.675	158982	81.344	30262	2354	1.123	6.885
总计		195443	100.000	39442			


图95 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2704-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:19:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	36344	18.776	9145	1009	1.247	--
2	1.675	157220	81.224	29923	2349	1.123	6.879
总计		193564	100.000	39068			


图96 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2705-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:23:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	35915	18.437	9013	1007	1.246	--
2	1.675	158885	81.563	30180	2343	1.124	6.871
总计		194800	100.000	39193			


图97 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2706-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:26:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	34408	18.300	8758	1033	1.246	--
2	1.675	153612	81.700	29329	2384	1.124	6.939
总计		188020	100.000	38087			

图98 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2707-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:29:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	44015	23.478	11081	1012	1.244	--
2	1.675	143455	76.522	27314	2353	1.121	6.886
总计		187469	100.000	38395			

图99 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2708-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:33:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	45241	23.522	11435	1020	1.243	--
2	1.675	147093	76.478	28033	2357	1.123	6.900
总计		192334	100.000	39468			


图100 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2709-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:36:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	45053	23.542	11316	1006	1.248	--
2	1.674	146319	76.458	27812	2343	1.124	6.868
总计		191372	100.000	39128			


图101 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2710-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:40:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	45499	23.711	11457	1011	1.244	--
2	1.675	146390	76.289	27874	2350	1.123	6.882
总计		191889	100.000	39330			


图102 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2711-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:43:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	45200	23.354	11404	1015	1.243	--
2	1.675	148342	76.646	28270	2357	1.123	6.894
总计		193542	100.000	39674			


图103 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2712-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:46:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	44537	23.252	11165	1003	1.250	--
2	1.675	147004	76.748	27939	2342	1.125	6.865
总计		191541	100.000	39105			


图104 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2713-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:50:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:27:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	50667	27.028	12771	1014	1.245	--
2	1.675	136797	72.972	26001	2354	1.124	6.884
总计		187465	100.000	38773			

图105 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2714-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:53:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	51691	27.078	13001	1007	1.246	--
2	1.675	139206	72.922	26412	2343	1.125	6.865
总计		190897	100.000	39414			


图106 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2715-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 20:57:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	50947	27.103	12835	1011	1.247	--
2	1.675	137026	72.897	26082	2350	1.121	6.881
总计		187973	100.000	38917			


图107 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2716-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:00:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	52005	27.288	13256	1037	1.245	--
2	1.676	138571	72.712	26483	2393	1.121	6.953
总计		190576	100.000	39739			


图108 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2717-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:03:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	51465	26.978	12986	1017	1.246	--
2	1.675	139303	73.022	26568	2361	1.122	6.901
总计		190768	100.000	39553			


图109 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2718-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:07:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	50907	26.722	12836	1016	1.243	--
2	1.675	139603	73.278	26601	2357	1.123	6.895
总计		190510	100.000	39437			


图110 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2719-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:10:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	205959	100.000	37258	2109	1.123	--
总计		205959	100.000	37258			


图111 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2720-2 - cbzj-12461045p-rcqx-cq6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:14:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	206060	100.000	37305	2112	1.121	--
总计		206060	100.000	37305			


图112 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2721-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:17:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 美阿沙坦钾片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2722-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:20:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	206253	100.000	37163	2090	1.127	--
总计		206253	100.000	37163			


图114 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2723-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:24:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	205817	100.000	37302	2108	1.121	--
总计		205817	100.000	37302			


图115 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2724-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:27:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	205908	100.000	37086	2090	1.126	--
总计		205908	100.000	37086			

图116 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-3




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2725-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:30:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	206264	100.000	37163	2091	1.127	--
总计		206264	100.000	37163			


图117 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2726-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:34:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	205717	100.000	37239	2104	1.122	--
总计		205717	100.000	37239			


图118 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2727-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:37:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	3995	5.245	979	957	1.239	--
2	1.676	72182	94.755	13750	2383	1.121	6.813
总计		76177	100.000	14729			


图119 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2728-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:41:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	4322	5.290	1061	975	1.263	--
2	1.676	77372	94.710	14776	2382	1.122	6.841
总计		81694	100.000	15837			


图120 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2729-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:44:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	4834	5.659	1204	1000	1.271	--
2	1.676	80595	94.341	15340	2366	1.121	6.868
总计		85429	100.000	16545			


图121 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2730-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:47:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	4236	5.399	1042	954	1.260	--
2	1.676	74216	94.601	14107	2373	1.127	6.801
总计		78452	100.000	15149			

图122 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2731-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:51:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	4832	5.789	1194	975	1.285	--
2	1.676	78635	94.211	14986	2378	1.122	6.838
总计		83467	100.000	16180			

图123 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2732-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:54:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	4736	5.653	1167	959	1.240	--
2	1.676	79038	94.347	15031	2368	1.123	6.801
总计		83774	100.000	16198			

图124 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2733-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 21:57:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	7426	5.779	1877	1013	1.230	--
2	1.676	121057	94.221	23041	2370	1.123	6.888
总计		128483	100.000	24918			


图125 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2734-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:01:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	7685	5.717	1909	985	1.269	--
2	1.676	126741	94.283	24070	2369	1.125	6.850
总计		134426	100.000	25980			


图126 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2735-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:04:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:28:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	8139	6.023	2037	993	1.249	--
2	1.676	127001	93.977	24150	2377	1.121	6.866
总计		135139	100.000	26187			


图127 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2736-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:07:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	7620	5.690	1905	1000	1.266	--
2	1.676	126292	94.310	24123	2387	1.123	6.886
总计		133912	100.000	26028			


图128 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2737-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:11:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	7896	5.952	1984	1006	1.255	--
2	1.676	124778	94.048	23733	2368	1.123	6.878
总计		132674	100.000	25717			


图129 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2738-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:14:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	6847	5.892	1694	985	1.248	--
2	1.675	109354	94.108	20803	2350	1.124	6.829
总计		116201	100.000	22497			


图130 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2739-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:18:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11151	7.051	2798	1006	1.254	--
2	1.676	147011	92.949	27997	2372	1.124	6.881
总计		158163	100.000	30794			


图131 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2740-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:21:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	11369	7.199	2846	997	1.249	--
2	1.676	146544	92.801	27900	2371	1.125	6.870
总计		157912	100.000	30746			


图132 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2741-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:24:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	12243	7.641	3053	1000	1.259	--
2	1.676	147981	92.359	28139	2368	1.122	6.871
总计		160224	100.000	31192			


图133 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2742-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:28:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	11573	7.194	2909	1013	1.258	--
2	1.676	149283	92.806	28532	2385	1.121	6.904
总计		160856	100.000	31441			


图134 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2743-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:31:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	11871	7.424	2986	1014	1.236	--
2	1.676	148019	92.576	28262	2387	1.122	6.906
总计		159890	100.000	31248			


图135 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2744-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:34:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.839	11564	7.337	2923	1028	1.252	--
2	1.677	146044	92.663	28089	2406	1.122	6.942
总计		157608	100.000	31012			


图136 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2745-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:38:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15033	8.555	3762	1002	1.250	--
2	1.676	160695	91.445	30559	2368	1.122	6.877
总计		175729	100.000	34320			


图137 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2746-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:41:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15257	8.845	3812	993	1.256	--
2	1.676	157230	91.155	29883	2364	1.124	6.861
总计		172487	100.000	33695			


图138 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2747-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:44:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15583	8.979	3912	1000	1.241	--
2	1.676	157967	91.021	30017	2362	1.122	6.868
总计		173550	100.000	33929			


图139 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2748-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:48:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15216	8.763	3838	1010	1.258	--
2	1.676	158420	91.237	30089	2362	1.124	6.883
总计		173636	100.000	33928			

图140 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2749-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:51:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15442	8.975	3871	1005	1.254	--
2	1.676	156619	91.025	29711	2358	1.123	6.872
总计		172061	100.000	33582			


图141 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2750-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:55:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	15468	9.016	3886	1002	1.249	--
2	1.676	156101	90.984	29619	2358	1.123	6.868
总计		171568	100.000	33505			


图142 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2751-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 22:58:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	22033	11.978	5544	1011	1.245	--
2	1.676	161918	88.022	30765	2360	1.121	6.884
总计		183951	100.000	36309			


图143 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2752-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:01:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	22629	11.997	5704	1009	1.257	--
2	1.676	165986	88.003	31507	2357	1.123	6.878
总计		188615	100.000	37211			


图144 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2753-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:05:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/08/02 15:29:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	23407	12.455	5890	1014	1.255	--
2	1.676	164530	87.545	31233	2359	1.122	6.887
总计		187937	100.000	37123			


图145 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液(pH7.8)介质-
 浆法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2754-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:08:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	22874	12.003	5733	1003	1.257	--
2	1.676	167698	87.997	31821	2356	1.123	6.869
总计		190572	100.000	37554			


图146 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2755-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:11:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	23147	12.464	5844	1012	1.245	--
2	1.676	162570	87.536	30916	2366	1.123	6.890
总计		185717	100.000	36759			


图147 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2756-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:15:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	22302	12.275	5631	1014	1.250	--
2	1.676	159382	87.725	30281	2364	1.122	6.892
总计		181683	100.000	35912			

图148 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2757-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:18:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	35775	18.359	9016	1016	1.250	--
2	1.675	159086	81.641	30371	2368	1.122	6.903
总计		194861	100.000	39388			


图149 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2758-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:21:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:29:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	36360	18.749	9143	1008	1.248	--
2	1.675	157574	81.251	30049	2357	1.123	6.882
总计		193934	100.000	39192			

图150 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2759-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:25:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	36853	18.889	9326	1021	1.243	--
2	1.675	158245	81.111	30162	2369	1.122	6.912
总计		195097	100.000	39488			


图151 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2760-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:28:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	36025	18.634	9101	1015	1.238	--
2	1.676	157305	81.366	29879	2359	1.122	6.890
总计		193330	100.000	38980			


图152 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2761-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:31:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	36073	18.761	9090	1012	1.242	--
2	1.676	156207	81.239	29709	2366	1.122	6.890
总计		192280	100.000	38799			

图153 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2762-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:35:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	35408	18.759	8933	1014	1.247	--
2	1.676	153341	81.241	29131	2359	1.122	6.889
总计		188749	100.000	38064			


图154 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2763-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:38:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	44880	23.435	11293	1011	1.247	--
2	1.675	146629	76.565	27877	2347	1.120	6.879
总计		191509	100.000	39170			


图155 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2764-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:41:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	45182	23.823	11357	1009	1.248	--
2	1.675	144478	76.177	27439	2344	1.125	6.873
总计		189659	100.000	38795			


图156 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2765-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:45:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	47352	24.457	11943	1014	1.245	--
2	1.675	146258	75.543	27826	2356	1.124	6.891
总计		193610	100.000	39769			


图157 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2766-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:48:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	44922	23.501	11293	1008	1.250	--
2	1.675	146226	76.499	27758	2343	1.124	6.871
总计		191148	100.000	39051			


图158 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2767-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:51:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	45589	23.798	11526	1016	1.250	--
2	1.676	145976	76.202	27738	2361	1.122	6.895
总计		191565	100.000	39264			


图159 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2768-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:55:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	44363	23.774	11169	1010	1.248	--
2	1.676	142241	76.226	26965	2349	1.123	6.874
总计		186604	100.000	38134			


图160 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2769-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p1-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/01 23:58:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	50776	26.991	12833	1020	1.250	--
2	1.675	137346	73.009	26152	2364	1.122	6.906
总计		188123	100.000	38985			

图161 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2770-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p2-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:02:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	52242	27.350	13211	1021	1.245	--
2	1.675	138774	72.650	26432	2366	1.121	6.909
总计		191016	100.000	39643			


图162 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2771-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p3-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:05:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	51697	27.885	13048	1014	1.246	--
2	1.675	133698	72.115	25401	2354	1.122	6.889
总计		185395	100.000	38449			


图163 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2772-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p4-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:08:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.837	51721	27.224	13115	1025	1.241	--
2	1.675	138266	72.776	26357	2372	1.121	6.919
总计		189988	100.000	39473			


图164 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2773-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p5-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:12:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	51752	27.335	13086	1019	1.245	--
2	1.676	137571	72.665	26195	2363	1.123	6.899
总计		189322	100.000	39281			


图165 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2774-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-p6-jx10min.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:15:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	0.838	51705	27.363	13116	1028	1.246	--
2	1.677	137253	72.637	26229	2384	1.120	6.929
总计		188959	100.000	39345			


图166 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2775-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:18:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.669	205215	100.000	37130	2110	1.121	--
总计		205215	100.000	37130			

图167 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-2-1




SMF-4080

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 260nm
 数据文件名: RC\$SMF-4080 - 27-101/30-2776-2 - cbzj-12461045p-rcqx-zj6y-80mg-pH7.8-jyx2-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4080 - SMF-4080-20250801-fx279.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/02 00:22:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/08/02 15:30:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 260nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.670	204860	100.000	36955	2094	1.126	--
总计		204860	100.000	36955			

图168 美阿沙坦钾片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 参比制剂-12461045批(80mg规格)-均一性2-磷酸盐溶液 (pH7.8) 介质-
 浆法-50转
 对照品溶液-2-2