


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-444-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-rj.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-9  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:05:15      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2) : 2025/08/14 08:24:53 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
溶剂

### <样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-445-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:08:39      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:01      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

### <色谱图>



### <峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.802	368516	100.000	65482	2374	1.108	--
总计		368516	100.000	65482			

图2 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-446-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:12:04      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:08 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.803	368623	100.000	65574	2379	1.109	--
总计		368623	100.000	65574			

图3 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-447-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-3.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:15:28      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:16 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	368147	100.000	65576	2381	1.108	--
总计		368147	100.000	65576			

图4 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-448-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-4.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:18:53      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:23 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.803	368247	100.000	65482	2378	1.108	--
总计		368247	100.000	65482			

图5 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-449-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz1-5.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-18  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:22:17      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:30 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.803	368086	100.000	65501	2380	1.108	--
总计		368086	100.000	65501			

图6 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-450-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:25:40      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:38 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	400606	100.000	72754	2480	1.105	--
总计		400606	100.000	72754			

图7 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-451-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P1-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-1  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:29:02      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:45 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.806	401350	100.000	72826	2483	1.107	--
总计		401350	100.000	72826			

图8 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片1  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-452-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:32:26      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:52 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.805	398410	100.000	72401	2481	1.106	--
总计		398410	100.000	72401			

图9 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-453-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-10  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:35:49      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:25:59 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	398818	100.000	72359	2478	1.107	--
总计		398818	100.000	72359			

图10 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片2  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-454-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:39:13 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:06 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.805	402192	100.000	73029	2483	1.106	--
总计		402192	100.000	73029			

图11 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片3  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-455-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P3-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-19  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:42:36      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:13 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	401908	100.000	73027	2482	1.106	--
总计		401908	100.000	73027			

图12 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-浆法-50转-片3  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-456-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:45:59 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:20 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	382326	100.000	69443	2481	1.105	--
总计		382326	100.000	69443			

图13 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-457-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P4-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-28  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:49:21      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:27 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.805	382416	100.000	69446	2480	1.105	--
总计		382416	100.000	69446			

图14 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片4  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-458-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:52:44      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:34 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	403146	100.000	73166	2477	1.106	--
总计		403146	100.000	73166			

图15 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5µm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-459-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P5-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-37  
 进样体积: 20 µl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:56:07 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:42 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.805	402374	100.000	73188	2482	1.106	--
总计		402374	100.000	73188			

图16 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片5  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-460-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 15:59:30      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:49      处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.805	395808	100.000	71822	2478	1.106	--
总计		395808	100.000	71822			

图17 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm) 流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C 波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-461-2 - cbzj-cq12y-10mg-BXJVV61p-rcd-pH1.0jz-jf50z-P6-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-46  
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 16:02:54 实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:26:56 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.805	395304	100.000	71826	2481	1.106	--
总计		395304	100.000	71826			

图18 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(BXJVV61批)(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转-片6  
 供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-462-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz2-1.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 16:06:16      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:27:03 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.804	367087	100.000	65420	2385	1.109	--
总计		367087	100.000	65420			

图19 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50\*4.6mm,5μm)      流速: 1.8ml/min  
 柱温:40°C      波长: 245nm  
 数据文件名: RC\$J632 - 0-85/10-463-2 - cbzj-cq12y-10mg-rcd-pH1.0jz-jf50z-dz2-2.lcd  
 方法文件名: RC\$J632 - J632-rcd-FX259.lcm  
 批处理文件名: RC\$J632 - J632-20250813-FX259.lcb  
 样品瓶号: 3-27  
 进样体积: 20 μl      版本号: 6.115  
 进样时间: 2025/08/13 16:09:39      实验者: xiexinhui  
 处理时间 (V2): 2025/08/14 08:27:10 处理者: xiexinhui  
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 245nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.806	367454	100.000	65459	2387	1.109	--
总计		367454	100.000	65459			

图20 盐酸伐地那非片溶出度测定长期12月HPLC图谱  
 参比制剂(10mg规格)-pH1.0介质-桨法-50转  
 对照品溶液-2-2