



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-251-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-rj.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:15:58

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-252-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:19:21

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.075	56974	100.000	8262	2192	1.151	--
总计		56974	100.000	8262			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-253-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:22:44

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	57166	100.000	8269	2186	1.167	--
总计		57166	100.000	8269			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-254-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:26:08

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.073	57528	100.000	8315	2186	1.168	--
总计		57528	100.000	8315			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-255-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:29:32

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	57853	100.000	8340	2220	1.179	--
总计		57853	100.000	8340			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-256-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:32:55

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.074	57852	100.000	8329	2202	1.163	--
总计		57852	100.000	8329			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-257-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:36:18

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	28909	100.000	4323	2333	1.190	--
总计		28909	100.000	4323			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-258-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:39:40

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	28588	100.000	4366	2348	1.181	--
总计		28588	100.000	4366			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-259-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:43:03

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	28162	100.000	4146	2273	1.187	--
总计		28162	100.000	4146			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-260-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:46:25

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	29201	100.000	4266	2219	1.211	--
总计		29201	100.000	4266			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-261-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:49:48

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	28578	100.000	4196	2218	1.196	--
总计		28578	100.000	4196			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-262-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:53:11

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	28449	100.000	4184	2251	1.176	--
总计		28449	100.000	4184			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-263-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:56:33

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	30038	100.000	4389	2237	1.193	--
总计		30038	100.000	4389			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-264-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 21:59:56

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	31575	100.000	4587	2201	1.177	--
总计		31575	100.000	4587			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-265-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:03:18

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	30216	100.000	4311	2110	1.173	--
总计		30216	100.000	4311			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-266-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:06:40

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	30515	100.000	4353	2149	1.175	--
总计		30515	100.000	4353			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-267-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:10:01

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	30151	100.000	4298	2146	1.191	--
总计		30151	100.000	4298			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-268-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:13:24

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:41:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	30640	100.000	4380	2154	1.160	--
总计		30640	100.000	4380			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-269-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:16:46

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.107	30972	100.000	4340	2081	1.215	--
总计		30972	100.000	4340			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-270-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:20:08

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.108	31771	100.000	4448	2035	1.172	--
总计		31771	100.000	4448			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-271-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:23:30

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	30604	100.000	4283	2056	1.202	--
总计		30604	100.000	4283			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-272-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:26:52

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	30713	100.000	4305	2062	1.212	--
总计		30713	100.000	4305			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-273-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:30:14

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	29976	100.000	4222	2029	1.167	--
总计		29976	100.000	4222			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-274-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:33:36

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	29886	100.000	4217	2119	1.190	--
总计		29886	100.000	4217			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-275-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:36:58

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	30677	100.000	4244	2013	1.214	--
总计		30677	100.000	4244			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-276-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:40:20

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	31270	100.000	4353	2021	1.161	--
总计		31270	100.000	4353			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-277-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:43:43

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	30217	100.000	4147	1926	1.227	--
总计		30217	100.000	4147			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-278-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:47:05

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	31544	100.000	4288	1946	1.189	--
总计		31544	100.000	4288			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-279-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:50:27

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.106	30606	100.000	4224	1950	1.195	--
总计		30606	100.000	4224			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-280-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 22:53:49

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	31137	100.000	4217	1954	1.194	--
总计		31137	100.000	4217			




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-281-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-5
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2025/08/12 22:57:12
处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:36
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	31211	100.000	4224	1928	1.184	--
总计		31211	100.000	4224			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-282-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:00:33

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	31590	100.000	4280	1903	1.211	--
总计		31590	100.000	4280			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-283-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:03:55

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	31066	100.000	4256	2002	1.216	--
总计		31066	100.000	4256			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-284-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:07:16

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	31260	100.000	4229	1931	1.220	--
总计		31260	100.000	4229			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-285-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:10:37

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	30754	100.000	4255	1936	1.214	--
总计		30754	100.000	4255			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-286-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:14:00

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.105	31205	100.000	4261	1957	1.192	--
总计		31205	100.000	4261			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-287-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:17:22

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	31271	100.000	4207	1859	1.240	--
总计		31271	100.000	4207			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-288-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:20:45

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:42:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	31744	100.000	4266	1876	1.238	--
总计		31744	100.000	4266			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-289-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:24:07

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	30459	100.000	4113	1897	1.215	--
总计		30459	100.000	4113			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-290-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:27:29

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	31834	100.000	4145	1821	1.229	--
总计		31834	100.000	4145			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-291-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:30:51

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	31035	100.000	4118	1820	1.230	--
总计		31035	100.000	4118			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-292-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:34:13

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	31401	100.000	4159	1761	1.267	--
总计		31401	100.000	4159			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-293-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:37:36

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	31602	100.000	4131	1759	1.223	--
总计		31602	100.000	4131			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-294-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:40:58

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	31316	100.000	4089	1782	1.238	--
总计		31316	100.000	4089			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-295-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:44:20

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	30559	100.000	4060	1753	1.235	--
总计		30559	100.000	4060			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-296-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:47:42

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	32321	100.000	4204	1764	1.220	--
总计		32321	100.000	4204			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-297-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:51:04

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.103	31487	100.000	4106	1742	1.246	--
总计		31487	100.000	4106			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-298-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:54:26

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.102	31154	100.000	4116	1749	1.189	--
总计		31154	100.000	4116			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-299-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/12 23:57:48

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	31133	100.000	4004	1704	1.276	--
总计		31133	100.000	4004			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-300-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:01:12

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.104	32301	100.000	4132	1684	1.249	--
总计		32301	100.000	4132			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-301-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:04:34

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	31033	100.000	3968	1678	1.274	--
总计		31033	100.000	3968			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-302-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:07:57

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	30989	100.000	4031	1598	1.250	--
总计		30989	100.000	4031			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-303-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:11:19

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	31439	100.000	4001	1634	1.267	--
总计		31439	100.000	4001			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-304-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:14:42

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	31464	100.000	4034	1731	1.241	--
总计		31464	100.000	4034			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-305-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:18:05

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	58017	100.000	7467	1782	1.461	--
总计		58017	100.000	7467			




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-306-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-1-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 3-27
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2025/08/13 00:21:28
处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:51
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长: 210nm
版本号: 6.115
实验者: wangdan
处理者: wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.067	57889	100.000	7457	1801	1.454	--
总计		57889	100.000	7457			




QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)
柱温 : 30°C
数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-307-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm
批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb
样品瓶号 : 4-9
进样体积 : 20μl
进样时间 : 2025/08/13 00:24:52
处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min
波长:210nm
版本号:6.115
实验者:wangdan
处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SHIMADZU
LabSolutions

QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-308-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:28:16

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:43:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	56139	100.000	7472	1792	1.241	--
总计		56139	100.000	7472			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-309-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:31:41

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.072	56078	100.000	7522	1831	1.245	--
总计		56078	100.000	7522			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-23/28-310-4 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:35:06

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	55941	100.000	7519	1827	1.249	--
总计		55941	100.000	7519			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-311-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:38:30

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.070	55911	100.000	7464	1810	1.236	--
总计		55911	100.000	7464			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-312-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-18

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:41:55

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.068	56758	100.000	7512	1810	1.283	--
总计		56758	100.000	7512			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-313-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-1

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:45:19

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.100	28974	100.000	3759	1715	1.248	--
总计		28974	100.000	3759			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-314-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-10

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:48:42

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	28968	100.000	3703	1658	1.275	--
总计		28968	100.000	3703			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-315-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-19

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:52:05

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.101	29262	100.000	3740	1655	1.283	--
总计		29262	100.000	3740			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-316-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-28

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:55:28

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	28391	100.000	3629	1669	1.309	--
总计		28391	100.000	3629			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-317-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-37

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 00:58:51

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	28314	100.000	3636	1661	1.290	--
总计		28314	100.000	3636			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-318-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-46

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:02:13

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	28180	100.000	3603	1666	1.293	--
总计		28180	100.000	3603			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-319-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-2

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:05:38

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.097	30677	100.000	3820	1619	1.272	--
总计		30677	100.000	3820			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-320-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-11

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:09:00

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	31011	100.000	3780	1515	1.313	--
总计		31011	100.000	3780			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-321-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-20

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:12:23

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.099	30445	100.000	3814	1561	1.268	--
总计		30445	100.000	3814			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-322-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-29

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:15:46

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	29852	100.000	3667	1510	1.275	--
总计		29852	100.000	3667			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-323-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-38

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:19:09

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	29791	100.000	3670	1575	1.313	--
总计		29791	100.000	3670			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-324-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-47

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:22:32

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	30681	100.000	3743	1529	1.329	--
总计		30681	100.000	3743			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-325-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-3

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:25:57

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	31001	100.000	3817	1491	1.298	--
总计		31001	100.000	3817			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-326-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-12

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:29:20

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	30706	100.000	3732	1461	1.368	--
总计		30706	100.000	3732			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-327-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-21

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:32:43

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.098	30580	100.000	3728	1511	1.293	--
总计		30580	100.000	3728			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-328-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-30

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:36:06

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:44:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	30232	100.000	3655	1520	1.338	--
总计		30232	100.000	3655			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-329-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-39

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:39:30

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	30377	100.000	3684	1414	1.344	--
总计		30377	100.000	3684			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-330-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-48

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:42:53

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.096	30305	100.000	3702	1492	1.329	--
总计		30305	100.000	3702			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-331-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-4

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:46:17

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	30637	100.000	3757	1406	1.382	--
总计		30637	100.000	3757			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-332-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-13

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:49:42

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	30799	100.000	3665	1377	1.369	--
总计		30799	100.000	3665			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-333-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-22

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:53:06

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	30541	100.000	3668	1399	1.357	--
总计		30541	100.000	3668			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-334-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-31

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:56:29

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	30096	100.000	3634	1339	1.377	--
总计		30096	100.000	3634			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-335-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-40

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 01:59:53

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	30406	100.000	3680	1366	1.322	--
总计		30406	100.000	3680			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-336-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-49

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:03:16

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.094	30841	100.000	3675	1428	1.373	--
总计		30841	100.000	3675			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-337-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-5

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:06:40

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	29987	100.000	3656	1423	1.396	--
总计		29987	100.000	3656			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-338-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-14

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:10:04

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	31740	100.000	3804	1352	1.390	--
总计		31740	100.000	3804			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-339-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-23

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:13:28

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	31040	100.000	3660	1440	1.422	--
总计		31040	100.000	3660			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-340-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-32

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:16:52

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	30689	100.000	3654	1269	1.435	--
总计		30689	100.000	3654			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-341-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-41

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:20:16

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	30870	100.000	3636	1308	1.359	--
总计		30870	100.000	3636			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-342-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-50

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:23:39

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.088	31073	100.000	3701	1330	1.405	--
总计		31073	100.000	3701			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-343-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-6

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:27:03

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	30637	100.000	3658	1277	1.383	--
总计		30637	100.000	3658			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-344-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-15

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:30:27

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	31053	100.000	3683	1326	1.422	--
总计		31053	100.000	3683			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-345-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-24

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:33:51

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	31034	100.000	3672	1308	1.396	--
总计		31034	100.000	3672			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-346-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-33

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:37:15

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	30070	100.000	3601	1345	1.405	--
总计		30070	100.000	3601			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-347-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-42

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:40:39

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.090	31064	100.000	3642	1265	1.457	--
总计		31064	100.000	3642			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-348-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-51

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:44:02

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:45:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	31271	100.000	3710	1320	1.401	--
总计		31271	100.000	3710			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30℃

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-349-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-7

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:47:27

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	31545	100.000	3694	1315	1.393	--
总计		31545	100.000	3694			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-350-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-16

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:50:51

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	31144	100.000	3661	1309	1.391	--
总计		31144	100.000	3661			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-351-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-25

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:54:15

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	31039	100.000	3673	1452	1.473	--
总计		31039	100.000	3673			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-352-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-34

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 02:57:39

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.093	31159	100.000	3633	1402	1.425	--
总计		31159	100.000	3633			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-353-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-43

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:01:03

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.095	30741	100.000	3672	1343	1.371	--
总计		30741	100.000	3672			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-354-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-52

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:04:26

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.091	30871	100.000	3661	1312	1.524	--
总计		30871	100.000	3661			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-355-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-8

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:07:50

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	31146	100.000	3668	1268	1.419	--
总计		31146	100.000	3668			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-356-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-17

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:11:14

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	30388	100.000	3648	1390	1.425	--
总计		30388	100.000	3648			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-357-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-26

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:14:38

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	31276	100.000	3670	1318	1.417	--
总计		31276	100.000	3670			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-358-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-35

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:18:03

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.089	30445	100.000	3604	1252	1.440	--
总计		30445	100.000	3604			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-359-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-44

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:21:28

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	31039	100.000	3627	1303	1.434	--
总计		31039	100.000	3627			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-360-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-53

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:24:52

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.092	30931	100.000	3630	1205	1.473	--
总计		30931	100.000	3630			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-361-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:28:16

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.060	56663	100.000	6919	1569	1.394	--
总计		56663	100.000	6919			



QTL-392

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 30°C

数据文件名: RC\$QTL-392 - 0-5/28-362-3 - cbzj-00287Ap-rcqx-pH6.8jz-2-jf50z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$QTL-392 - QTL-392-rcqx-FX277-1.lcm

批处理文件名: RC\$QTL-392 - 20250812-rcqx-FX277.lcb

样品瓶号 : 4-27

进样体积 : 20μl

进样时间 : 2025/08/13 03:31:41

处理时间 (V3) : 2025/08/13 11:46:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 1.0ml/min


波长:210nm

版本号:6.115

实验者:wangdan

处理者:wangdan

<色谱图>



<峰表>

检测器A 210nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.062	56197	100.000	6931	1642	1.416	--
总计		56197	100.000	6931			