


<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-989-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:27:41 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:48:27 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-990-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:31:35 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:48:36 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	32707	100.000	3816	1635	1.062	--
总计		32707	100.000	3816			


图2 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-991-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:35:29 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:48:44 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	32686	100.000	3806	1629	1.065	--
总计		32686	100.000	3806			


图3 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-992-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:39:24 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:48:51 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	32589	100.000	3806	1626	1.064	--
总计		32589	100.000	3806			


图4 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-993-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:43:17 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:48:58 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	32685	100.000	3807	1616	1.067	--
总计		32685	100.000	3807			

图5 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-994-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:47:10 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:06 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	32635	100.000	3799	1628	1.065	--
总计		32635	100.000	3799			

图6 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-995-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:51:03 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:13 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	18194	100.000	2713	2813	1.061	--
总计		18194	100.000	2713			

图7 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-996-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:54:56 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:20 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	12719	100.000	1909	2802	1.054	--
总计		12719	100.000	1909			

图8 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-997-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 15:58:49 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:27 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	18346	100.000	2746	2805	1.063	--
总计		18346	100.000	2746			

图9 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-998-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:02:41 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:35 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	17155	100.000	2569	2810	1.052	--
总计		17155	100.000	2569			

图10 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-999-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:06:33 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:42 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	18115	100.000	2710	2825	1.063	--
总计		18115	100.000	2710			


图11 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1000-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-5min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:10:26 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:50 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	15394	100.000	2314	2829	1.065	--
总计		15394	100.000	2314			


图12 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1001-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:14:19 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:49:57 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	24116	100.000	3588	2803	1.071	--
总计		24116	100.000	3588			


图13 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1002-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-10min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:18:13 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:04 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	21193	100.000	3149	2814	1.067	--
总计		21193	100.000	3149			


图14 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1003-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-10min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:22:05 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:12 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	24847	100.000	3692	2799	1.076	--
总计		24847	100.000	3692			


图15 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1004-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:25:58 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:19 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	23761	100.000	3531	2817	1.067	--
总计		23761	100.000	3531			


图16 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1005-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-10min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:29:51 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:26 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	24456	100.000	3642	2818	1.067	--
总计		24456	100.000	3642			


图17 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1006-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-10min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:33:44 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:34 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	21722	100.000	3240	2821	1.066	--
总计		21722	100.000	3240			


图18 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1007-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:37:38 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:41 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	26839	100.000	3980	2786	1.065	--
总计		26839	100.000	3980			

图19 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1008-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:41:30 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:48 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	25182	100.000	3746	2787	1.071	--
总计		25182	100.000	3746			

图20 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1009-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-15min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:45:23 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:50:55 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	27441	100.000	4073	2810	1.069	--
总计		27441	100.000	4073			

图21 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1010-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-15min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:49:15 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:03 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	26731	100.000	3975	2813	1.076	--
总计		26731	100.000	3975			

图22 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1011-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-15min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:53:08 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:10 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	27870	100.000	4134	2812	1.069	--
总计		27870	100.000	4134			

图23 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1012-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-15min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 16:57:00 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:17 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	24794	100.000	3688	2804	1.072	--
总计		24794	100.000	3688			

图24 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1013-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:00:52 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:25 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.338	28246	100.000	4200	2789	1.069	--
总计		28246	100.000	4200			

图25 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1014-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-20min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:04:45 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:33 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	27183	100.000	4038	2797	1.068	--
总计		27183	100.000	4038			

图26 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1015-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:08:38 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:40 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	28994	100.000	4299	2806	1.068	--
总计		28994	100.000	4299			

图27 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1016-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-20min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:12:31 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:47 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	28256	100.000	4194	2795	1.071	--
总计		28256	100.000	4194			


图28 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1017-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-20min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:16:24 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:51:55 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	29333	100.000	4351	2812	1.074	--
总计		29333	100.000	4351			


图29 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1018-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-20min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:20:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:02 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	26812	100.000	3971	2798	1.073	--
总计		26812	100.000	3971			

图30 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1019-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:24:09 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:09 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	29511	100.000	4390	2800	1.072	--
总计		29511	100.000	4390			

图31 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1020-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:28:02 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:17 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	29148	100.000	4313	2787	1.074	--
总计		29148	100.000	4313			

图32 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1021-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:31:55 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:24 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	30512	100.000	4524	2798	1.074	--
总计		30512	100.000	4524			

图33 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1022-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:35:47 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:32 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	29885	100.000	4427	2784	1.075	--
总计		29885	100.000	4427			


图34 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1023-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:39:40 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:39 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	30856	100.000	4588	2805	1.076	--
总计		30856	100.000	4588			

图35 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1024-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:43:33 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:47 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	28548	100.000	4228	2791	1.075	--
总计		28548	100.000	4228			

图36 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1025-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:47:26 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:52:54 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	30580	100.000	4523	2811	1.079	--
总计		30580	100.000	4523			

图37 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1026-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:51:19 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:01 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30205	100.000	4468	2808	1.072	--
总计		30205	100.000	4468			


图38 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1027-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:55:12 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:09 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31496	100.000	4667	2797	1.079	--
总计		31496	100.000	4667			

图39 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1028-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 17:59:05 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:16 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30679	100.000	4538	2800	1.074	--
总计		30679	100.000	4538			

图40 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1029-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 20µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:02:58 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:23 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32215	100.000	4764	2790	1.073	--
总计		32215	100.000	4764			

图41 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1030-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:06:50 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:31 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29895	100.000	4430	2807	1.078	--
总计		29895	100.000	4430			


图42 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1031-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:10:44 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:38 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30785	100.000	4551	2795	1.078	--
总计		30785	100.000	4551			

图43 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1032-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-60min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:14:37 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:46 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30752	100.000	4547	2814	1.076	--
总计		30752	100.000	4547			


图44 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1033-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-60min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:18:30 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:53:53 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31969	100.000	4731	2798	1.077	--
总计		31969	100.000	4731			


图45 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1034-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-60min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:22:23 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:00 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31007	100.000	4574	2801	1.074	--
总计		31007	100.000	4574			

图46 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1035-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-60min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:26:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:08 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	32481	100.000	4792	2787	1.074	--
总计		32481	100.000	4792			

图47 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1036-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-60min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:30:09 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:15 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30458	100.000	4522	2812	1.076	--
总计		30458	100.000	4522			

图48 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1037-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:34:02 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31211	100.000	4617	2784	1.083	--
总计		31211	100.000	4617			

图49 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1038-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:37:55 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:30 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31036	100.000	4592	2801	1.078	--
总计		31036	100.000	4592			

图50 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1039-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:41:48 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:38 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	32218	100.000	4761	2806	1.074	--
总计		32218	100.000	4761			

图51 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1040-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:45:42 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:45 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31490	100.000	4659	2806	1.083	--
总计		31490	100.000	4659			

图52 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1041-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:49:36 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:54:53 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	32791	100.000	4837	2796	1.075	--
总计		32791	100.000	4837			

图53 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1042-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:53:30 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:00 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31240	100.000	4633	2798	1.076	--
总计		31240	100.000	4633			

图54 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1043-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 18:57:23 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:08 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31469	100.000	4660	2797	1.077	--
总计		31469	100.000	4660			

图55 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1044-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:01:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:15 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	31122	100.000	4593	2795	1.080	--
总计		31122	100.000	4593			

图56 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1045-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:05:09 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	32451	100.000	4792	2799	1.087	--
总计		32451	100.000	4792			


图57 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1046-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:09:02 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:30 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31528	100.000	4657	2798	1.073	--
总计		31528	100.000	4657			


图58 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1047-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:12:55 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:37 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	33078	100.000	4895	2784	1.081	--
总计		33078	100.000	4895			

图59 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1048-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:16:47 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:45 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31419	100.000	4670	2802	1.075	--
总计		31419	100.000	4670			


图60 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1049-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-2
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:20:41 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:55:53 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32105	100.000	4744	2796	1.083	--
总计		32105	100.000	4744			


图61 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1050-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:24:34 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:00 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32330	100.000	4775	2775	1.079	--
总计		32330	100.000	4775			


图62 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1051-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:28:28 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:08 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	33213	100.000	4925	2797	1.078	--
总计		33213	100.000	4925			


图63 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1052-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-jx.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-29
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:32:21 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:15 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32345	100.000	4785	2793	1.085	--
总计		32345	100.000	4785			

图64 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1053-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:36:14 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	33275	100.000	4919	2798	1.078	--
总计		33275	100.000	4919			

图65 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1054-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:40:07 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:30 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32463	100.000	4806	2797	1.082	--
总计		32463	100.000	4806			


图66 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1055-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:44:01 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:38 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	32745	100.000	3783	1591	1.083	--
总计		32745	100.000	3783			

图67 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1056-2 - zzp-2025072421p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:47:55 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:45 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	32647	100.000	3811	1619	1.076	--
总计		32647	100.000	3811			

图68 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072421批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1057-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:51:50 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:52 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1058-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:55:44 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:56:59 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	32758	100.000	3819	1631	1.083	--
总计		32758	100.000	3819			

图70 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1059-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 19:59:39 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:07 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	32831	100.000	3809	1617	1.080	--
总计		32831	100.000	3809			

图71 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1060-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:03:34 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:14 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	32803	100.000	3826	1631	1.081	--
总计		32803	100.000	3826			


图72 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1061-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:07:29 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	32841	100.000	3821	1606	1.079	--
总计		32841	100.000	3821			

图73 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1062-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:11:23 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:29 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.289	32978	100.000	3827	1601	1.088	--
总计		32978	100.000	3827			

图74 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1063-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:15:17 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:36 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	14513	100.000	2159	2778	1.071	--
总计		14513	100.000	2159			

图75 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1064-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:19:11 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:44 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	14990	100.000	2233	2809	1.084	--
总计		14990	100.000	2233			

图76 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1065-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:23:05 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:52 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	14100	100.000	2102	2828	1.088	--
总计		14100	100.000	2102			

图77 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1066-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:26:58 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:57:59 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	14715	100.000	2185	2779	1.077	--
总计		14715	100.000	2185			

图78 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1067-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-5min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:30:52 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:06 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	14015	100.000	2094	2794	1.078	--
总计		14015	100.000	2094			

图79 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1068-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:34:45 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:14 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	16666	100.000	2484	2794	1.077	--
总计		16666	100.000	2484			

图80 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1069-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:38:39 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:21 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	21961	100.000	3252	2791	1.080	--
总计		21961	100.000	3252			

图81 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1070-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:42:33 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:29 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	21537	100.000	3194	2803	1.078	--
总计		21537	100.000	3194			


图82 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1071-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:46:27 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:36 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	21509	100.000	3186	2775	1.083	--
总计		21509	100.000	3186			

图83 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1072-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-10min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:50:21 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:43 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	22064	100.000	3283	2815	1.075	--
总计		22064	100.000	3283			

图84 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1073-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-10min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:54:15 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:51 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	22471	100.000	3328	2789	1.090	--
总计		22471	100.000	3328			


图85 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1074-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 20:58:09 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:58:58 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	24093	100.000	3567	2775	1.078	--
总计		24093	100.000	3567			


图86 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1075-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:02:03 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:06 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	25590	100.000	3785	2781	1.081	--
总计		25590	100.000	3785			

图87 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1076-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:05:58 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:13 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	24657	100.000	3647	2779	1.085	--
总计		24657	100.000	3647			

图88 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1077-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:09:52 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:21 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	25030	100.000	3707	2791	1.089	--
总计		25030	100.000	3707			

图89 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1078-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-15min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:13:47 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:28 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	25960	100.000	3863	2799	1.080	--
总计		25960	100.000	3863			

图90 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1079-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:17:39 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:35 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	26031	100.000	3870	2801	1.083	--
总计		26031	100.000	3870			

图91 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1080-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:21:33 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:43 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	27060	100.000	4001	2782	1.090	--
总计		27060	100.000	4001			


图92 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1081-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:25:27 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:50 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	27578	100.000	4099	2804	1.088	--
总计		27578	100.000	4099			

图93 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1082-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:29:22 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 09:59:57 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	26403	100.000	3912	2789	1.086	--
总计		26403	100.000	3912			


图94 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1083-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:33:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:05 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	26903	100.000	3977	2785	1.080	--
总计		26903	100.000	3977			


图95 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1084-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-20min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:37:10 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:13 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	27430	100.000	4055	2767	1.085	--
总计		27430	100.000	4055			


图96 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1085-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:41:04 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:20 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	28048	100.000	4154	2800	1.081	--
总计		28048	100.000	4154			

图97 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1086-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:44:58 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:27 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	28489	100.000	4233	2792	1.084	--
总计		28489	100.000	4233			


图98 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1087-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:48:52 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:35 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	29806	100.000	4426	2790	1.085	--
总计		29806	100.000	4426			

图99 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1088-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:52:47 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:42 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	28577	100.000	4226	2785	1.084	--
总计		28577	100.000	4226			

图100 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1089-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 21:56:42 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:49 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	29626	100.000	4374	2776	1.078	--
总计		29626	100.000	4374			

图101 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1090-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:00:37 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:00:57 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.339	29417	100.000	4367	2778	1.087	--
总计		29417	100.000	4367			


图102 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1091-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:04:31 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:04 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	30089	100.000	4455	2808	1.082	--
总计		30089	100.000	4455			


图103 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1092-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-30min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:08:24 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:12 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	29570	100.000	4382	2809	1.082	--
总计		29570	100.000	4382			

图104 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1093-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:12:18 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:19 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31126	100.000	4610	2802	1.086	--
总计		31126	100.000	4610			


图105 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1094-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:16:12 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:26 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	29866	100.000	4429	2788	1.083	--
总计		29866	100.000	4429			


图106 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1095-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:20:07 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:34 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	30581	100.000	4524	2777	1.083	--
总计		30581	100.000	4524			


图107 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1096-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:24:01 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:41 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31045	100.000	4568	2780	1.090	--
总计		31045	100.000	4568			

图108 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1097-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:27:54 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:48 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31075	100.000	4597	2787	1.082	--
总计		31075	100.000	4597			


图109 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1098-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:31:48 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:01:56 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	30512	100.000	4523	2794	1.082	--
总计		30512	100.000	4523			

图110 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1099-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:35:42 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:04 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31962	100.000	4714	2779	1.081	--
总计		31962	100.000	4714			

图111 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1100-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:39:37 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:11 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30302	100.000	4476	2805	1.084	--
总计		30302	100.000	4476			


图112 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1101-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:43:32 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:18 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31135	100.000	4582	2795	1.089	--
总计		31135	100.000	4582			


图113 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1102-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:47:27 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:26 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31542	100.000	4657	2782	1.083	--
总计		31542	100.000	4657			

图114 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1103-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:51:21 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:33 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31687	100.000	4678	2782	1.084	--
总计		31687	100.000	4678			


图115 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1104-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:55:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:41 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31184	100.000	4613	2791	1.089	--
总计		31184	100.000	4613			

图116 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1105-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 22:59:11 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:48 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	32809	100.000	4864	2797	1.087	--
总计		32809	100.000	4864			


图117 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1106-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:03:07 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:02:55 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31053	100.000	4582	2791	1.088	--
总计		31053	100.000	4582			


图118 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1107-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:07:00 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:03 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31585	100.000	4672	2799	1.085	--
总计		31585	100.000	4672			


图119 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1108-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:10:54 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:10 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32016	100.000	4735	2780	1.084	--
总计		32016	100.000	4735			


图120 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1109-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:14:48 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:18 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32230	100.000	4774	2802	1.086	--
总计		32230	100.000	4774			


图121 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1110-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:18:43 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:25 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31382	100.000	4654	2789	1.089	--
总计		31382	100.000	4654			

图122 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1111-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:22:36 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:33 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	32537	100.000	4812	2791	1.087	--
总计		32537	100.000	4812			

图123 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1112-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:26:29 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:40 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31199	100.000	4607	2782	1.085	--
总计		31199	100.000	4607			

图124 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1113-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:30:22 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:47 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31763	100.000	4698	2794	1.088	--
总计		31763	100.000	4698			

图125 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1114-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:34:15 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:03:55 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	32513	100.000	4789	2777	1.085	--
总计		32513	100.000	4789			

图126 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1115-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:38:08 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:02 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	32164	100.000	4751	2781	1.089	--
总计		32164	100.000	4751			

图127 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1116-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:42:01 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:10 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31471	100.000	4652	2785	1.083	--
总计		31471	100.000	4652			

图128 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1117-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:45:55 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:18 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	32715	100.000	4840	2784	1.084	--
总计		32715	100.000	4840			

图129 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1118-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-jx.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:49:49 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:25 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	31663	100.000	4693	2793	1.089	--
总计		31663	100.000	4693			

图130 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1119-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:53:43 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:33 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31942	100.000	4718	2780	1.092	--
总计		31942	100.000	4718			


图131 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1120-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-jx.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/14 23:57:37 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:41 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	32316	100.000	4790	2791	1.088	--
总计		32316	100.000	4790			

图132 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1121-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:01:30 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:48 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32432	100.000	4791	2797	1.086	--
总计		32432	100.000	4791			

图133 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1122-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-jx.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:05:23 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:04:56 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	32080	100.000	4746	2789	1.087	--
总计		32080	100.000	4746			

图134 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1123-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:09:18 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:03 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	32769	100.000	3818	1624	1.086	--
总计		32769	100.000	3818			


图135 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1124-2 - zzp-2025072521p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:13:13 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:10 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	32800	100.000	3791	1592	1.086	--
总计		32800	100.000	3791			

图136 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072521批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1125-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:17:06 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:18 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图137 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1126-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:20:59 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:25 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	32792	100.000	3803	1610	1.081	--
总计		32792	100.000	3803			

图138 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1127-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:24:52 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:32 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	32980	100.000	3838	1628	1.079	--
总计		32980	100.000	3838			

图139 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1128-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:28:45 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:40 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.291	33009	100.000	3816	1610	1.085	--
总计		33009	100.000	3816			

图140 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1129-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:32:38 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:47 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	32763	100.000	3817	1635	1.091	--
总计		32763	100.000	3817			

图141 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1130-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:36:31 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:05:55 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.292	32869	100.000	3809	1610	1.089	--
总计		32869	100.000	3809			

图142 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1131-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:40:24 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:02 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	15013	100.000	2234	2826	1.088	--
总计		15013	100.000	2234			

图143 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1132-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-5min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:44:17 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:10 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	12704	100.000	1898	2796	1.069	--
总计		12704	100.000	1898			

图144 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1133-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:48:10 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:17 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	10225	100.000	1529	2802	1.079	--
总计		10225	100.000	1529			


图145 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1134-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:52:03 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:24 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	14234	100.000	2139	2843	1.074	--
总计		14234	100.000	2139			

图146 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1135-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:55:56 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:32 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	15324	100.000	2283	2792	1.077	--
总计		15324	100.000	2283			


图147 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1136-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 00:59:50 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:39 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	13511	100.000	2017	2811	1.083	--
总计		13511	100.000	2017			


图148 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1137-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:03:42 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:47 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	21810	100.000	3223	2797	1.080	--
总计		21810	100.000	3223			

图149 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1138-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:07:35 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:06:54 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	20201	100.000	2999	2794	1.085	--
总计		20201	100.000	2999			


图150 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1139-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:11:27 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:02 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	18331	100.000	2718	2817	1.082	--
总计		18331	100.000	2718			


图151 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1140-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:15:20 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:09 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	21090	100.000	3138	2817	1.078	--
总计		21090	100.000	3138			

图152 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1141-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:19:12 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:16 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.340	21654	100.000	3215	2793	1.083	--
总计		21654	100.000	3215			

图153 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1142-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:23:04 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:24 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	20181	100.000	3009	2818	1.091	--
总计		20181	100.000	3009			


图154 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1143-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:26:57 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:31 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	25122	100.000	3712	2793	1.090	--
总计		25122	100.000	3712			


图155 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1144-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:30:49 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:39 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	23839	100.000	3533	2793	1.084	--
总计		23839	100.000	3533			

图156 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1145-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:34:41 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:46 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	22801	100.000	3382	2811	1.089	--
总计		22801	100.000	3382			


图157 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1146-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:38:33 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:07:53 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	24433	100.000	3637	2790	1.081	--
总计		24433	100.000	3637			

图158 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1147-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:42:25 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:01 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	24675	100.000	3656	2787	1.088	--
总计		24675	100.000	3656			


图159 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1148-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:46:17 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:08 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	23506	100.000	3484	2799	1.085	--
总计		23506	100.000	3484			


图160 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1149-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:50:10 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:16 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	27003	100.000	3994	2800	1.081	--
总计		27003	100.000	3994			

图161 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1150-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-20min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:54:03 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:23 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	26101	100.000	3856	2791	1.092	--
总计		26101	100.000	3856			

图162 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1151-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 01:57:55 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:31 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	25655	100.000	3779	2794	1.089	--
总计		25655	100.000	3779			


图163 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1152-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:01:47 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:38 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	26515	100.000	3913	2808	1.085	--
总计		26515	100.000	3913			


图164 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1153-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:05:39 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:47 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	26396	100.000	3893	2787	1.083	--
总计		26396	100.000	3893			


图165 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1154-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:09:32 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:08:54 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	25484	100.000	3760	2786	1.089	--
总计		25484	100.000	3760			

图166 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1155-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:13:24 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:01 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	28905	100.000	4268	2793	1.087	--
总计		28905	100.000	4268			

图167 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1156-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:17:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:09 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	28232	100.000	4165	2788	1.087	--
总计		28232	100.000	4165			

图168 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1157-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:21:08 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:16 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	28304	100.000	4191	2773	1.088	--
总计		28304	100.000	4191			

图169 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1158-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:25:01 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:24 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	28269	100.000	4181	2796	1.089	--
总计		28269	100.000	4181			

图170 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1159-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:28:52 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:31 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	28096	100.000	4154	2792	1.087	--
总计		28096	100.000	4154			


图171 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1160-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:32:44 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:38 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	27288	100.000	4033	2781	1.093	--
总计		27288	100.000	4033			

图172 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1161-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:36:36 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:46 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	29797	100.000	4417	2798	1.092	--
总计		29797	100.000	4417			

图173 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1162-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-45min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:40:28 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:09:53 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29786	100.000	4409	2806	1.090	--
总计		29786	100.000	4409			

图174 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1163-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:44:21 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:00 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30059	100.000	4425	2789	1.082	--
总计		30059	100.000	4425			

图175 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1164-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:48:13 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:08 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29381	100.000	4331	2780	1.090	--
总计		29381	100.000	4331			

图176 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1165-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:52:05 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:15 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29193	100.000	4297	2788	1.089	--
总计		29193	100.000	4297			

图177 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1166-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:55:57 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	28773	100.000	4231	2789	1.087	--
总计		28773	100.000	4231			

图178 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1167-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 02:59:49 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:30 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30394	100.000	4487	2792	1.086	--
总计		30394	100.000	4487			


图179 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1168-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:03:41 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:37 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30582	100.000	4504	2788	1.093	--
总计		30582	100.000	4504			

图180 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1169-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:07:33 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:45 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30881	100.000	4569	2799	1.082	--
总计		30881	100.000	4569			

图181 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1170-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:11:25 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:52 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30001	100.000	4415	2776	1.087	--
总计		30001	100.000	4415			

图182 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1171-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:15:17 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:10:59 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29620	100.000	4367	2788	1.087	--
总计		29620	100.000	4367			

图183 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1172-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:19:09 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:07 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29109	100.000	4290	2800	1.092	--
总计		29109	100.000	4290			

图184 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1173-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:23:03 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:14 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30894	100.000	4556	2796	1.090	--
总计		30894	100.000	4556			

图185 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1174-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:26:56 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	31483	100.000	4637	2787	1.090	--
总计		31483	100.000	4637			

图186 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1175-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:30:49 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:29 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	31146	100.000	4588	2781	1.093	--
总计		31146	100.000	4588			

图187 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1176-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:34:42 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:36 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30175	100.000	4451	2771	1.086	--
总计		30175	100.000	4451			

图188 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1177-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-90min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:38:36 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:44 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30120	100.000	4449	2807	1.090	--
总计		30120	100.000	4449			

图189 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1178-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:42:28 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:51 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	29488	100.000	4346	2778	1.090	--
总计		29488	100.000	4346			

图190 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1179-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:46:22 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:11:59 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	31340	100.000	4625	2790	1.091	--
总计		31340	100.000	4625			


图191 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1180-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:50:16 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:06 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31771	100.000	4675	2786	1.090	--
总计		31771	100.000	4675			

图192 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1181-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:54:10 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:14 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31231	100.000	4601	2779	1.092	--
总计		31231	100.000	4601			


图193 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30 $^{\circ}$ C 波长: 275nm
 数据文件名: RCSQTL-4138 - 0-57/27-1182-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-120min.lcd
 方法文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 03:58:03 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:21 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	30500	100.000	4496	2807	1.088	--
总计		30500	100.000	4496			

图194 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1183-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:01:57 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:29 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30037	100.000	4419	2790	1.091	--
总计		30037	100.000	4419			

图195 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1184-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:05:49 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:37 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	29573	100.000	4367	2792	1.089	--
总计		29573	100.000	4367			


图196 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1185-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:09:43 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:44 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	31503	100.000	4643	2776	1.089	--
总计		31503	100.000	4643			

图197 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1186-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:13:37 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:51 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	32119	100.000	4729	2786	1.096	--
总计		32119	100.000	4729			


图198 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1187-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:17:31 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:12:59 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31466	100.000	4643	2793	1.097	--
总计		31466	100.000	4643			

图199 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1188-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:21:25 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:13:08 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	31523	100.000	4653	2797	1.092	--
总计		31523	100.000	4653			

图200 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1189-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:25:19 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:13:15 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	31164	100.000	4588	2797	1.095	--
总计		31164	100.000	4588			

图201 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1190-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:29:12 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:13:22 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	30793	100.000	4541	2794	1.090	--
总计		30793	100.000	4541			

图202 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-浆法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1191-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:33:05 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:13:30 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.293	33346	100.000	3890	1638	1.082	--
总计		33346	100.000	3890			

图203 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4138

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温: 30°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$QTL-4138 - 0-57/27-1192-2 - zzp-2025072522p-rcqx-1mg-jf50z-shuijz-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-RCQX-1.5-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4138 - QTL-4138-20250814-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 20μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/08/15 04:36:59 实验者: wangzhen
 处理时间(V2): 2025/08/18 10:13:37 处理者: wangzhen
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 275nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	33347	100.000	3875	1625	1.084	--
总计		33347	100.000	3875			

图204 多替诺雷片溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-2025072522批(1mg规格)-水介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2