SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-285-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:32:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:20:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-286-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:36:11
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	97015	100.000	14135	3011	1.074	--
总计		97015	100.000	14135			

图2 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-287-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:39:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	97650	100.000	14107	3007	1.077	--
总计		97650	100.000	14107			

图3 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-288-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:42:59
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.481	97544	100.000	14152	2994	1.077	--
总计		97544	100.000	14152			

图4 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-289-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:46:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.482	97665	100.000	14168	3010	1.078	--
总计		97665	100.000	14168			

图5 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-290-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:49:46
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:16
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.479	97154	100.000	14153	3009	1.081	--
总计		97154	100.000	14153			

图6 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-291-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:53:07
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.487	33045	100.000	4950	3221	1.075	--
总计		33045	100.000	4950			

图7 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-292-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 11:56:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:21　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.484	28188	100.000	4224	3214	1.074	--
总计		28188	100.000	4224			

图8 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-294-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:03:59
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:23
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	22942	100.000	3445	3220	1.071	--
总计		22942	100.000	3445			

图9 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-295-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:07:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.494	28740	100.000	4314	3231	1.071	--
总计		28740	100.000	4314			

图10 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-296-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:10:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.492	24759	100.000	3704	3239	1.078	--
总计		24759	100.000	3704			

图11 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-297-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:14:07
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.490	27425	100.000	4101	3201	1.087	--
总计		27425	100.000	4101			

图12 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-298-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:17:31
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:34
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	52754	100.000	7900	3208	1.080	--
总计		52754	100.000	7900			

图13 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-299-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:20:53　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:36　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	56786	100.000	8518	3214	1.068	--
总计		56786	100.000	8518			

图14 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-300-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:24:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	49556	100.000	7432	3224	1.076	--
总计		49556	100.000	7432			

图15 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-301-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:27:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:41
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.494	55642	100.000	8304	3207	1.074	--
总计		55642	100.000	8304			

图16 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-302-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:31:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	52787	100.000	7900	3217	1.070	--
总计		52787	100.000	7900			

图17 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-303-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:34:24
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:47
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	55546	100.000	8309	3204	1.077	--
总计		55546	100.000	8309			

图18 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-304-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:37:48
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	68233	100.000	10213	3202	1.079	--
总计		68233	100.000	10213			

图19 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-305-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:41:10
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	72717	100.000	10843	3192	1.076	--
总计		72717	100.000	10843			

图20 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-306-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:44:33
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.492	65835	100.000	9791	3204	1.079	--
总计		65835	100.000	9791			

图21 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-307-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:47:55
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:21:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.486	69718	100.000	10417	3191	1.079	--
总计		69718	100.000	10417			

图22 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-308-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:51:19　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:00　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.486	71792	100.000	10710	3210	1.083	--
总计		71792	100.000	10710			

图23 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-309-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:54:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.489	70630	100.000	10566	3207	1.073	--
总计		70630	100.000	10566			

图24 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-310-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 12:58:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:06
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	76167	100.000	11380	3184	1.072	--
总计		76167	100.000	11380			

图25 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-311-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:01:28
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.490	79315	100.000	11829	3183	1.079	--
总计		79315	100.000	11829			

图26 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-312-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:04:50　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:11　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.489	75761	100.000	11299	3197	1.078	--
总计		75761	100.000	11299			

图27 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-313-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:08:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.488	79114	100.000	11832	3208	1.078	--
总计		79114	100.000	11832			

图28 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-314-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:11:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.487	78794	100.000	11840	3220	1.071	--
总计		78794	100.000	11840			

图29 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-315-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:14:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	78604	100.000	11665	3187	1.081	--
总计		78604	100.000	11665			

图30 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-316-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:18:20
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.489	84455	100.000	12636	3213	1.075	--
总计		84455	100.000	12636			

图31 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-317-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:21:44
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	86732	100.000	12944	3219	1.076	--
总计		86732	100.000	12944			

图32 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-318-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:25:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.490	88257	100.000	13200	3208	1.076	--
总计		88257	100.000	13200			

图33 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-319-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:28:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.491	86494	100.000	12973	3219	1.072	--
总计		86494	100.000	12973			

图34 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-320-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:31:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.327	88242	100.000	14012	3181	1.080	--
总计		88242	100.000	14012			

图35 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-321-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:35:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:37　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	85708	100.000	13612	3115	1.083	--
总计		85708	100.000	13612			

图36 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-322-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:38:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	89733	100.000	14248	3119	1.085	--
总计		89733	100.000	14248			

图37 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-323-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:42:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	89210	100.000	14180	3115	1.085	--
总计		89210	100.000	14180			

图38 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-324-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:45:25
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:45
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	90684	100.000	14412	3118	1.089	--
总计		90684	100.000	14412			

图39 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-325-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:48:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	90736	100.000	14431	3115	1.086	--
总计		90736	100.000	14431			

图40 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-326-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:52:10
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:50
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	94447	100.000	14997	3124	1.085	--
总计		94447	100.000	14997			

图41 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-327-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:55:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	89445	100.000	14191	3105	1.082	--
总计		89445	100.000	14191			

图42 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-328-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 13:58:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	91078	100.000	14454	3109	1.089	--
总计		91078	100.000	14454			

图43 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-329-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:02:20
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:22:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	88947	100.000	14099	3101	1.086	--
总计		88947	100.000	14099			

图44 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-330-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:05:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	94139	100.000	14914	3103	1.088	--
总计		94139	100.000	14914			

图45 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-331-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:09:04
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	88271	100.000	13965	3099	1.091	--
总计		88271	100.000	13965			

图46 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-332-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:12:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:06　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	91396	100.000	14482	3105	1.084	--
总计		91396	100.000	14482			

图47 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-333-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:15:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	91453	100.000	14485	3098	1.088	--
总计		91453	100.000	14485			

图48 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-334-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:19:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	87944	100.000	13872	3083	1.092	--
总计		87944	100.000	13872			

图49 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-335-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:22:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	90483	100.000	14333	3098	1.085	--
总计		90483	100.000	14333			

图50 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-336-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:26:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	90874	100.000	14444	3116	1.090	--
总计		90874	100.000	14444			

图51 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-337-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:29:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	92218	100.000	14627	3093	1.086	--
总计		92218	100.000	14627			

图52 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-338-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:32:46　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:22　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	91549	100.000	14509	3101	1.083	--
总计		91549	100.000	14509			

图53 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-339-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:36:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	91302	100.000	14440	3101	1.090	--
总计		91302	100.000	14440			

图54 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-340-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:39:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:28　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87431	100.000	13944	3162	1.084	--
总计		87431	100.000	13944			

图55 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-341-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:42:55
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	88409	100.000	14158	3176	1.086	--
总计		88409	100.000	14158			

图56 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-342-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:46:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	92377	100.000	14708	3163	1.085	--
总计		92377	100.000	14708			

图57 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-343-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:49:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	85220	100.000	13650	3177	1.081	--
总计		85220	100.000	13650			

图58 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-344-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:53:04
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	93621	100.000	14931	3172	1.084	--
总计		93621	100.000	14931			

图59 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-345-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:56:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:41　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89421	100.000	14269	3183	1.085	--
总计		89421	100.000	14269			

图60 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-346-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 14:59:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88143	100.000	14045	3164	1.086	--
总计		88143	100.000	14045			

图61 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-347-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:03:14　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:46　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	89898	100.000	14335	3171	1.089	--
总计		89898	100.000	14335			

图62 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-348-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:06:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	89928	100.000	14356	3184	1.086	--
总计		89928	100.000	14356			

图63 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-349-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:09:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:52　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88682	100.000	14177	3187	1.088	--
总计		88682	100.000	14177			

图64 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-350-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:13:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	92173	100.000	14764	3170	1.081	--
总计		92173	100.000	14764			

图65 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-351-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:16:45　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:23:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	90116	100.000	14404	3169	1.081	--
总计		90116	100.000	14404			

图66 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-352-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:20:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	97949	100.000	15079	2943	1.092	--
总计		97949	100.000	15079			

图67 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-353-2 - zzp-2025051221p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:23:32
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	98254	100.000	15142	2936	1.090	--
总计		98254	100.000	15142			

图68 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-354-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:26:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图69 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-355-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:30:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	97438	100.000	15031	2927	1.088	--
总计		97438	100.000	15031			

图70 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-356-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:33:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:11　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	97671	100.000	15049	2922	1.087	--
总计		97671	100.000	15049			

图71 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-357-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:37:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:14　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	97792	100.000	15106	2933	1.085	--
总计		97792	100.000	15106			

图72 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-358-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:40:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	97837	100.000	15114	2927	1.084	--
总计		97837	100.000	15114			

图73 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-359-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:44:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:19　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	97545	100.000	15068	2936	1.088	--
总计		97545	100.000	15068			

图74 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-360-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:47:27　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:22　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	31292	100.000	4999	3155	1.082	--
总计		31292	100.000	4999			

图75 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-361-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:50:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	23665	100.000	3776	3132	1.085	--
总计		23665	100.000	3776			

图76 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-362-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:54:15
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:27
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	29158	100.000	4651	3136	1.078	--
总计		29158	100.000	4651			

图77 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-363-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 15:57:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	29293	100.000	4658	3132	1.076	--
总计		29293	100.000	4658			

图78 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-364-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:01:01
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	30413	100.000	4816	3128	1.091	--
总计		30413	100.000	4816			

图79 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-365-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:04:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	38559	100.000	6128	3134	1.083	--
总计		38559	100.000	6128			

图80 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-366-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:07:49
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	57926	100.000	9204	3125	1.082	--
总计		57926	100.000	9204			

图81 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-367-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:11:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:40　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	53112	100.000	8457	3133	1.084	--
总计		53112	100.000	8457			

图82 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-368-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:14:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	56528	100.000	8986	3126	1.090	--
总计		56528	100.000	8986			

图83 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-369-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:18:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	55635	100.000	8838	3128	1.088	--
总计		55635	100.000	8838			

图84 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-370-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:21:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	61063	100.000	9691	3134	1.089	--
总计		61063	100.000	9691			

图85 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-371-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:24:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	63382	100.000	10025	3116	1.090	--
总计		63382	100.000	10025			

图86 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-372-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:28:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	73491	100.000	11699	3140	1.081	--
总计		73491	100.000	11699			

图87 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-373-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:31:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	68994	100.000	10996	3159	1.083	--
总计		68994	100.000	10996			

图88 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-374-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:35:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:24:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	68053	100.000	10817	3137	1.088	--
总计		68053	100.000	10817			

图89 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-375-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:38:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	71481	100.000	11324	3126	1.084	--
总计		71481	100.000	11324			

图90 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-376-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:41:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	73450	100.000	11662	3141	1.084	--
总计		73450	100.000	11662			

图91 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-377-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:45:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:07　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	77247	100.000	12280	3138	1.081	--
总计		77247	100.000	12280			

图92 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-378-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:48:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	81410	100.000	12923	3126	1.090	--
总计		81410	100.000	12923			

图93 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-379-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:52:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	78250	100.000	12413	3138	1.083	--
总计		78250	100.000	12413			

图94 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-380-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:55:24
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	75990	100.000	12125	3153	1.079	--
总计		75990	100.000	12125			

图95 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-381-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:58:48
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	77718	100.000	12389	3148	1.084	--
总计		77718	100.000	12389			

图96 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-382-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:02:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:20　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	82357	100.000	13064	3130	1.081	--
总计		82357	100.000	13064			

图97 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-383-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:05:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:23
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	82313	100.000	13074	3141	1.084	--
总计		82313	100.000	13074			

图98 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-384-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:09:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	85280	100.000	13571	3128	1.082	--
总计		85280	100.000	13571			

图99 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-385-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:14:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	86653	100.000	13710	3118	1.083	--
总计		86653	100.000	13710			

图100 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-386-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:17:25
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	83599	100.000	13293	3124	1.083	--
总计		83599	100.000	13293			

图101 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-387-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:20:49
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:34
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	87085	100.000	13763	3116	1.083	--
总计		87085	100.000	13763			

图102 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-388-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:24:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:36　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	86064	100.000	13698	3147	1.082	--
总计		86064	100.000	13698			

图103 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-389-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:27:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	89946	100.000	14259	3135	1.086	--
总计		89946	100.000	14259			

图104 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-390-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:31:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	87858	100.000	13960	3139	1.082	--
总计		87858	100.000	13960			

图105 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-391-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:34:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:45
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88740	100.000	14071	3118	1.083	--
总计		88740	100.000	14071			

图106 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-392-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:37:51
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87539	100.000	13914	3129	1.082	--
总计		87539	100.000	13914			

图107 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-393-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:41:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:50
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87014	100.000	13802	3130	1.082	--
总计		87014	100.000	13802			

图108 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-394-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:44:40
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	90214	100.000	14343	3132	1.080	--
总计		90214	100.000	14343			

图109 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-395-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:48:04
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	88216	100.000	14002	3134	1.082	--
总计		88216	100.000	14002			

图110 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-396-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:51:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:25:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	86571	100.000	13711	3101	1.082	--
总计		86571	100.000	13711			

图111 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-397-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:54:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	91161	100.000	14430	3099	1.083	--
总计		91161	100.000	14430			

图112 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-398-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:58:18
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	86844	100.000	13770	3108	1.084	--
总计		86844	100.000	13770			

图113 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-399-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:01:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:06　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	87918	100.000	13893	3115	1.083	--
总计		87918	100.000	13893			

图114 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-400-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:05:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	88338	100.000	13945	3105	1.083	--
总计		88338	100.000	13945			

图115 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-401-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:08:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88947	100.000	14111	3131	1.077	--
总计		88947	100.000	14111			

图116 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-402-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:11:54　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:14　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	88090	100.000	13999	3130	1.080	--
总计		88090	100.000	13999			

图117 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-403-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:15:18　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	89238	100.000	14167	3103	1.085	--
总计		89238	100.000	14167			

图118 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-404-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:18:43
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	87096	100.000	13778	3093	1.088	--
总计		87096	100.000	13778			

图119 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-405-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:22:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	88359	100.000	13975	3104	1.081	--
总计		88359	100.000	13975			

图120 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-406-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:25:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:25　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89051	100.000	14086	3102	1.081	--
总计		89051	100.000	14086			

图121 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-407-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:28:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	88217	100.000	13953	3105	1.080	--
总计		88217	100.000	13953			

图122 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-408-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:32:20　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:31　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	85374	100.000	13588	3157	1.082	--
总计		85374	100.000	13588			

图123 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-409-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:35:44
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87914	100.000	14044	3169	1.082	--
总计		87914	100.000	14044			

图124 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-410-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:39:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	84813	100.000	13580	3178	1.081	--
总计		84813	100.000	13580			

图125 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-411-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:42:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	86166	100.000	13745	3173	1.082	--
总计		86166	100.000	13745			

图126 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-412-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:45:53
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87217	100.000	13963	3181	1.086	--
总计		87217	100.000	13963			

图127 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-413-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:49:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	85849	100.000	13661	3157	1.088	--
总计		85849	100.000	13661			

图128 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-414-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:52:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:47
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87867	100.000	14027	3174	1.082	--
总计		87867	100.000	14027			

图129 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-415-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:56:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87898	100.000	14054	3168	1.079	--
总计		87898	100.000	14054			

图130 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-416-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:59:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	87949	100.000	14056	3168	1.080	--
总计		87949	100.000	14056			

图131 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-417-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:02:51
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	88024	100.000	14112	3177	1.081	--
总计		88024	100.000	14112			

图132 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-418-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:06:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:26:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	90250	100.000	14478	3193	1.079	--
总计		90250	100.000	14478			

图133 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-419-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:09:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	88047	100.000	14026	3176	1.089	--
总计		88047	100.000	14026			

图134 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-420-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:13:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	97299	100.000	15031	2943	1.089	--
总计		97299	100.000	15031			

图135 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-421-2 - zzp-2025051321p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:16:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:06
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	97767	100.000	15084	2926	1.087	--
总计		97767	100.000	15084			

图136 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-422-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:19:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图137 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-423-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:23:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:11　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	97636	100.000	15094	2912	1.079	--
总计		97636	100.000	15094			

图138 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-424-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:26:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.297	97204	100.000	15092	2936	1.084	--
总计		97204	100.000	15092			

图139 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-425-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:29:59　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:16　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	97310	100.000	15041	2926	1.083	--
总计		97310	100.000	15041			

图140 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-426-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:33:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	97193	100.000	15053	2928	1.084	--
总计		97193	100.000	15053			

图141 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-427-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:36:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:23
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.294	97241	100.000	15045	2921	1.082	--
总计		97241	100.000	15045			

图142 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-428-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:40:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	23075	100.000	3661	3113	1.082	--
总计		23075	100.000	3661			

图143 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-429-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:43:31
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	38509	100.000	6142	3100	1.080	--
总计		38509	100.000	6142			

图144 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-430-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:46:53
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	28750	100.000	4574	3106	1.088	--
总计		28750	100.000	4574			

图145 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-431-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:50:15
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	35908	100.000	5703	3115	1.081	--
总计		35908	100.000	5703			

图146 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-432-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:53:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	29973	100.000	4785	3110	1.082	--
总计		29973	100.000	4785			

图147 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-433-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:57:00
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	30547	100.000	4871	3132	1.080	--
总计		30547	100.000	4871			

图148 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-434-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:00:23　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:42　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	48537	100.000	7700	3100	1.084	--
总计		48537	100.000	7700			

图149 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-435-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:03:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	64285	100.000	10234	3114	1.082	--
总计		64285	100.000	10234			

图150 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-436-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:07:07　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.303	56312	100.000	8947	3093	1.083	--
总计		56312	100.000	8947			

图151 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-437-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:10:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:50
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	63522	100.000	10102	3104	1.081	--
总计		63522	100.000	10102			

图152 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-438-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:13:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	62073	100.000	9869	3111	1.082	--
总计		62073	100.000	9869			

图153 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-439-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:17:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:55
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	60224	100.000	9563	3124	1.080	--
总计		60224	100.000	9563			

图154 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-440-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:20:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:27:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	61908	100.000	9843	3112	1.081	--
总计		61908	100.000	9843			

图155 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-441-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:23:58　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	78856	100.000	12581	3124	1.080	--
总计		78856	100.000	12581			

图156 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-442-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:27:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	71283	100.000	11343	3121	1.080	--
总计		71283	100.000	11343			

图157 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-443-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:30:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:06　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	77721	100.000	12379	3136	1.082	--
总计		77721	100.000	12379			

图158 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-444-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:34:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	76355	100.000	12077	3101	1.080	--
总计		76355	100.000	12077			

图159 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-445-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:37:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	76177	100.000	12108	3132	1.078	--
总计		76177	100.000	12108			

图160 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-446-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:40:49　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:14　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	73577	100.000	11726	3123	1.082	--
总计		73577	100.000	11726			

图161 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-447-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:44:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	81661	100.000	12976	3132	1.084	--
总计		81661	100.000	12976			

图162 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-448-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:47:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	79508	100.000	12641	3108	1.079	--
总计		79508	100.000	12641			

图163 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-449-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:50:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	82253	100.000	13001	3102	1.088	--
总计		82253	100.000	13001			

图164 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-450-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:54:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	83675	100.000	13270	3098	1.080	--
总计		83675	100.000	13270			

图165 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-451-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:57:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:27　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	83815	100.000	13317	3110	1.081	--
总计		83815	100.000	13317			

图166 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-452-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:01:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	82350	100.000	13071	3119	1.084	--
总计		82350	100.000	13071			

图167 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-453-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:04:24
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	88425	100.000	14066	3149	1.080	--
总计		88425	100.000	14066			

图168 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-454-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:07:46
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	86066	100.000	13797	3158	1.081	--
总计		86066	100.000	13797			

图169 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-455-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:11:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	84993	100.000	13521	3141	1.090	--
总计		84993	100.000	13521			

图170 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-456-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:14:30　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:41　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	89244	100.000	14206	3138	1.085	--
总计		89244	100.000	14206			

图171 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-457-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:17:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	87883	100.000	14021	3146	1.086	--
总计		87883	100.000	14021			

图172 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-458-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:21:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87456	100.000	13886	3149	1.082	--
总计		87456	100.000	13886			

图173 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-459-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:24:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	90774	100.000	14441	3139	1.078	--
总计		90774	100.000	14441			

图174 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-460-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:27:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	90023	100.000	14276	3128	1.088	--
总计		90023	100.000	14276			

图175 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-461-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:31:20
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88591	100.000	14110	3150	1.081	--
总计		88591	100.000	14110			

图176 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-462-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:34:42　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:57　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	91399	100.000	14567	3151	1.078	--
总计		91399	100.000	14567			

图177 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-463-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:38:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:28:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	91314	100.000	14556	3157	1.080	--
总计		91314	100.000	14556			

图178 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-464-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:41:25
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87620	100.000	13963	3147	1.081	--
总计		87620	100.000	13963			

图179 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-465-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:44:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	89222	100.000	14189	3144	1.086	--
总计		89222	100.000	14189			

图180 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-466-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:48:09
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	91212	100.000	14554	3157	1.079	--
总计		91212	100.000	14554			

图181 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-467-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:51:31
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87840	100.000	13990	3138	1.080	--
总计		87840	100.000	13990			

图182 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-468-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:54:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	93720	100.000	14930	3145	1.081	--
总计		93720	100.000	14930			

图183 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-469-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:58:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:15　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	89875	100.000	14266	3141	1.083	--
总计		89875	100.000	14266			

图184 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-470-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:01:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	87932	100.000	13921	3113	1.079	--
总计		87932	100.000	13921			

图185 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-471-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:05:01　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:21　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89904	100.000	14205	3122	1.082	--
总计		89904	100.000	14205			

图186 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-472-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:08:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:24　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	90438	100.000	14305	3112	1.079	--
总计		90438	100.000	14305			

图187 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-473-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:11:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:27　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89392	100.000	14154	3126	1.080	--
总计		89392	100.000	14154			

图188 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-474-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:15:09
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	90105	100.000	14274	3133	1.087	--
总计		90105	100.000	14274			

图189 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-475-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:18:31
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	88438	100.000	14005	3118	1.080	--
总计		88438	100.000	14005			

图190 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-476-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:21:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	88586	100.000	14071	3137	1.082	--
总计		88586	100.000	14071			

图191 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-477-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:25:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:37
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89844	100.000	14229	3136	1.084	--
总计		89844	100.000	14229			

图192 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-478-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:28:42
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89714	100.000	14230	3122	1.078	--
总计		89714	100.000	14230			

图193 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-479-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:32:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87289	100.000	13872	3136	1.081	--
总计		87289	100.000	13872			

图194 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-480-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:35:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	90510	100.000	14364	3130	1.080	--
总计		90510	100.000	14364			

图195 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-481-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:38:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	87140	100.000	13848	3107	1.080	--
总计		87140	100.000	13848			

图196 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-482-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:42:16　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:51　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	89556	100.000	14192	3106	1.080	--
总计		89556	100.000	14192			

图197 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-483-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:45:40
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	90896	100.000	14410	3130	1.088	--
总计		90896	100.000	14410			

图198 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-484-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:49:04　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:56　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	90977	100.000	14427	3124	1.087	--
总计		90977	100.000	14427			

图199 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-485-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:52:27
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:29:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	91888	100.000	14571	3119	1.081	--
总计		91888	100.000	14571			

图200 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-486-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:55:52　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:02　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	90614	100.000	14445	3114	1.076	--
总计		90614	100.000	14445			

图201 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-487-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:59:15　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:04　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	92148	100.000	14638	3117	1.080	--
总计		92148	100.000	14638			

图202 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-488-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:02:38　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:07　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	98248	100.000	15194	2929	1.082	--
总计		98248	100.000	15194			

图203 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-489-2 - zzp-2025051421p-rcqx-js3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:06:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:09　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.296	98164	100.000	15202	2919	1.080	--
总计		98164	100.000	15202			

图204 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定加速3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-490-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:09:24　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图205 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-491-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:12:48
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	97997	100.000	15041	2924	1.086	--
总计		97997	100.000	15041			

图206 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-492-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:16:12　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.300	97734	100.000	15066	2934	1.085	--
总计		97734	100.000	15066			

图207 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-493-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:19:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:20　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.304	97665	100.000	15108	2939	1.083	--
总计		97665	100.000	15108			

图208 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-494-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:23:00　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:23　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	97470	100.000	15148	2960	1.080	--
总计		97470	100.000	15148			

图209 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-495-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:26:23
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	97839	100.000	15136	2942	1.085	--
总计		97839	100.000	15136			

图210 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-496-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:29:45　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:28　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	34474	100.000	5473	3114	1.083	--
总计		34474	100.000	5473			

图211 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-497-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:33:07
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:31
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	27779	100.000	4423	3131	1.083	--
总计		27779	100.000	4423			

图212 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-498-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:36:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	47040	100.000	7496	3136	1.077	--
总计		47040	100.000	7496			

图213 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-499-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:39:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	34444	100.000	5522	3158	1.078	--
总计		34444	100.000	5522			

图214 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-500-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:43:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	32357	100.000	5165	3129	1.078	--
总计		32357	100.000	5165			

图215 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-501-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:46:36　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:41　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	34551	100.000	5506	3139	1.079	--
总计		34551	100.000	5506			

图216 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-502-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:49:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	61433	100.000	9661	3089	1.085	--
总计		61433	100.000	9661			

图217 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-503-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:53:21　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:46　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	61245	100.000	9720	3123	1.078	--
总计		61245	100.000	9720			

图218 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-504-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:56:43
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	70583	100.000	11183	3123	1.081	--
总计		70583	100.000	11183			

图219 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-505-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:00:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	63711	100.000	10126	3126	1.077	--
总计		63711	100.000	10126			

图220 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-506-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:03:28
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	59997	100.000	9527	3116	1.084	--
总计		59997	100.000	9527			

图221 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-507-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:06:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:30:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	57684	100.000	9170	3129	1.077	--
总计		57684	100.000	9170			

图222 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-508-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:10:13
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	71742	100.000	11376	3121	1.087	--
总计		71742	100.000	11376			

图223 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-509-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:13:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	75930	100.000	12085	3115	1.080	--
总计		75930	100.000	12085			

图224 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-510-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:16:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	81334	100.000	12946	3121	1.077	--
总计		81334	100.000	12946			

图225 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-511-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:20:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	76369	100.000	12178	3126	1.078	--
总计		76369	100.000	12178			

图226 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-512-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:23:44　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:11　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	76696	100.000	12225	3124	1.080	--
总计		76696	100.000	12225			

图227 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-513-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:27:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	66454	100.000	10548	3101	1.078	--
总计		66454	100.000	10548			

图228 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-514-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:30:28　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	80496	100.000	12787	3100	1.078	--
总计		80496	100.000	12787			

图229 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-515-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:33:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	83697	100.000	13282	3115	1.081	--
总计		83697	100.000	13282			

图230 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-516-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:37:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	83462	100.000	13238	3098	1.077	--
总计		83462	100.000	13238			

图231 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-517-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:40:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	80740	100.000	12808	3095	1.080	--
总计		80740	100.000	12808			

图232 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-518-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:43:57
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	82620	100.000	13124	3130	1.085	--
总计		82620	100.000	13124			

图233 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-519-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:47:20
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	74505	100.000	11794	3104	1.082	--
总计		74505	100.000	11794			

图234 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-520-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:50:42
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.305	85594	100.000	13626	3109	1.077	--
总计		85594	100.000	13626			

图235 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-521-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:54:04
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	90271	100.000	14347	3126	1.080	--
总计		90271	100.000	14347			

图236 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-522-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:57:27
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	87340	100.000	13802	3105	1.082	--
总计		87340	100.000	13802			

图237 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-523-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:00:50　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:41　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	86358	100.000	13706	3113	1.079	--
总计		86358	100.000	13706			

图238 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-524-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:04:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	85906	100.000	13611	3109	1.082	--
总计		85906	100.000	13611			

图239 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-525-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:07:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	80747	100.000	12808	3113	1.076	--
总计		80747	100.000	12808			

图240 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-526-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:10:57
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	89808	100.000	14322	3169	1.076	--
总计		89808	100.000	14322			

图241 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-527-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:14:20
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:52
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	90307	100.000	14405	3166	1.081	--
总计		90307	100.000	14405			

图242 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-528-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:17:42
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.312	90499	100.000	14461	3171	1.079	--
总计		90499	100.000	14461			

图243 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-529-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:21:04
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:31:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	89476	100.000	14287	3180	1.079	--
总计		89476	100.000	14287			

图244 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-530-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:24:27
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:00
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	87854	100.000	14062	3189	1.079	--
总计		87854	100.000	14062			

图245 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-531-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:27:49
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:03
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	84061	100.000	13418	3168	1.082	--
总计		84061	100.000	13418			

图246 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-532-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-7
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:31:11　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:06　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	90019	100.000	14322	3160	1.083	--
总计		90019	100.000	14322			

图247 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-533-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:34:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	91349	100.000	14600	3172	1.079	--
总计		91349	100.000	14600			

图248 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-534-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-25
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:37:57　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:11　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	90981	100.000	14476	3154	1.081	--
总计		90981	100.000	14476			

图249 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-535-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:41:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:14
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	89763	100.000	14363	3177	1.081	--
总计		89763	100.000	14363			

图250 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-536-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-43
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:44:41　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:16　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	89111	100.000	14262	3177	1.083	--
总计		89111	100.000	14262			

图251 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-537-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:48:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:19
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.311	85393	100.000	13634	3173	1.084	--
总计		85393	100.000	13634			

图252 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-538-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:51:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	87785	100.000	13836	3098	1.085	--
总计		87785	100.000	13836			

图253 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-539-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:54:49
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.310	90999	100.000	14433	3130	1.078	--
总计		90999	100.000	14433			

图254 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-540-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 01:58:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:27
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	89693	100.000	14200	3102	1.079	--
总计		89693	100.000	14200			

图255 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-541-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:01:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	86885	100.000	13710	3100	1.086	--
总计		86885	100.000	13710			

图256 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-542-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:04:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	89348	100.000	14164	3113	1.077	--
总计		89348	100.000	14164			

图257 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-543-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:08:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	84659	100.000	13359	3100	1.086	--
总计		84659	100.000	13359			

图258 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-544-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:11:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	85734	100.000	13578	3109	1.081	--
总计		85734	100.000	13578			

图259 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-545-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:15:09
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	87989	100.000	13935	3111	1.086	--
总计		87989	100.000	13935			

图260 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-546-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P3.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:18:33
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:44
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	89533	100.000	14131	3094	1.084	--
总计		89533	100.000	14131			

图261 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-547-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P4.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:21:57　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:47　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	87442	100.000	13897	3117	1.077	--
总计		87442	100.000	13897			

图262 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-548-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P5.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:25:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:50
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	85927	100.000	13660	3116	1.080	--
总计		85927	100.000	13660			

图263 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-549-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P6.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:28:44
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.306	82960	100.000	13237	3120	1.076	--
总计		82960	100.000	13237			

图264 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-550-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:32:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	89956	100.000	14299	3114	1.077	--
总计		89956	100.000	14299			

图265 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-551-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:35:32
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:32:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	90242	100.000	14330	3118	1.078	--
总计		90242	100.000	14330			

图266 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-552-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:38:56　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:33:02　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	89391	100.000	14172	3101	1.075	--
总计		89391	100.000	14172			

图267 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-553-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:42:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:33:05　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.307	90726	100.000	14373	3105	1.082	--
总计		90726	100.000	14373			

图268 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-554-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:45:44
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:33:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.308	90285	100.000	14293	3102	1.079	--
总计		90285	100.000	14293			

图269 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-555-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:49:07　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:33:10　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.309	89820	100.000	14140	3095	1.087	--
总计		89820	100.000	14140			

图270 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-556-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:52:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:33:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.301	99026	100.000	15274	2935	1.079	--
总计		99026	100.000	15274			

图271 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-5/31-557-2 - zzp-2025051421p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rcqx-FX280.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX280.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 02:55:54　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:33:15　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX280)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.302	97984	100.000	15100	2941	1.090	--
总计		97984	100.000	15100			

图272 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051421批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-352-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:40:27
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:33
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图273 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-353-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:43:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:36
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	96801	100.000	14721	2941	1.084	--
总计		96801	100.000	14721			

图274 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-354-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:47:13
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:39
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	96683	100.000	14715	2945	1.083	--
总计		96683	100.000	14715			

图275 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-355-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:50:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:42
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	96848	100.000	14732	2936	1.083	--
总计		96848	100.000	14732			

图276 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-356-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:53:59
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:45
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	96621	100.000	14719	2943	1.085	--
总计		96621	100.000	14719			

图277 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-357-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 16:57:23
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	96750	100.000	14721	2946	1.082	--
总计		96750	100.000	14721			

图278 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-358-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 20 μl　　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:00:45　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:51　　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	35648	100.000	5624	3185	1.074	--
总计		35648	100.000	5624			

图279 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-359-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:04:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:53　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	26995	100.000	4253	3157	1.082	--
总计		26995	100.000	4253			

图280 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-360-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:07:31
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	25678	100.000	4049	3176	1.083	--
总计		25678	100.000	4049			

图281 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-361-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:10:55
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:39:58
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	35486	100.000	5575	3134	1.085	--
总计		35486	100.000	5575			

图282 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-362-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:14:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	26307	100.000	4152	3202	1.084	--
总计		26307	100.000	4152			

图283 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-363-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:17:40
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	25351	100.000	3970	3154	1.079	--
总计		25351	100.000	3970			

图284 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-364-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:21:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:06　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	59497	100.000	9361	3163	1.078	--
总计		59497	100.000	9361			

图285 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-365-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:24:24
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	54703	100.000	8611	3145	1.078	--
总计		54703	100.000	8611			

图286 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-366-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:27:47　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:12　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	60406	100.000	9476	3155	1.080	--
总计		60406	100.000	9476			

图287 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-367-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:31:09　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:14　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	63404	100.000	9968	3150	1.077	--
总计		63404	100.000	9968			

图288 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-368-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:34:32　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:17　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	51828	100.000	8182	3158	1.075	--
总计		51828	100.000	8182			

图289 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-369-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:37:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:20
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	52587	100.000	8281	3155	1.079	--
总计		52587	100.000	8281			

图290 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-370-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:41:17
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:22
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	73260	100.000	11498	3125	1.079	--
总计		73260	100.000	11498			

图291 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-371-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:44:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:25
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	69035	100.000	10851	3123	1.076	--
总计		69035	100.000	10851			

图292 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-372-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:48:01
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:28
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	73711	100.000	11562	3132	1.080	--
总计		73711	100.000	11562			

图293 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-373-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:51:24
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:30
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	77204	100.000	12143	3130	1.079	--
总计		77204	100.000	12143			

图294 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-374-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:54:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:34
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	65252	100.000	10272	3133	1.077	--
总计		65252	100.000	10272			

图295 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-375-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 17:58:10
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:37
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	67325	100.000	10561	3118	1.078	--
总计		67325	100.000	10561			

图296 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-376-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:01:32
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	77380	100.000	12241	3172	1.079	--
总计		77380	100.000	12241			

图297 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-377-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:04:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	77413	100.000	12234	3173	1.078	--
总计		77413	100.000	12234			

图298 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-378-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:08:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	79604	100.000	12532	3173	1.074	--
总计		79604	100.000	12532			

图299 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-379-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:11:38
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	81120	100.000	12803	3166	1.082	--
总计		81120	100.000	12803			

图300 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-380-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:15:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	74718	100.000	11779	3163	1.083	--
总计		74718	100.000	11779			

图301 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-381-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:18:25
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	76814	100.000	12144	3171	1.075	--
总计		76814	100.000	12144			

图302 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-382-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:21:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	82390	100.000	12974	3146	1.081	--
总计		82390	100.000	12974			

图303 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-383-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:25:09
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:40:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	85037	100.000	13376	3138	1.081	--
总计		85037	100.000	13376			

图304 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-384-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:28:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:02　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	87598	100.000	13785	3144	1.080	--
总计		87598	100.000	13785			

图305 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-385-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:31:53
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	85112	100.000	13387	3129	1.081	--
总计		85112	100.000	13387			

图306 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-386-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:35:15
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	85312	100.000	13424	3134	1.083	--
总计		85312	100.000	13424			

图307 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-387-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:38:37
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	85652	100.000	13477	3144	1.081	--
总计		85652	100.000	13477			

图308 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-388-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:42:00
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	85969	100.000	13529	3140	1.077	--
总计		85969	100.000	13529			

图309 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-389-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:45:23
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:16
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89341	100.000	14059	3147	1.083	--
总计		89341	100.000	14059			

图310 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-390-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:48:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	87877	100.000	13809	3141	1.080	--
总计		87877	100.000	13809			

图311 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-391-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:52:08　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:21　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	88876	100.000	14009	3148	1.078	--
总计		88876	100.000	14009			

图312 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-392-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:55:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:24　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	90073	100.000	14174	3147	1.082	--
总计		90073	100.000	14174			

图313 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-393-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 18:58:51
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:27
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89495	100.000	14093	3147	1.080	--
总计		89495	100.000	14093			

图314 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-394-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:02:13
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	86721	100.000	13663	3144	1.080	--
总计		86721	100.000	13663			

图315 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-395-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:05:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	89661	100.000	14134	3146	1.081	--
总计		89661	100.000	14134			

图316 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-396-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:08:57
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	87912	100.000	13826	3140	1.080	--
总计		87912	100.000	13826			

图317 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-397-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:12:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:37
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89174	100.000	14059	3154	1.075	--
总计		89174	100.000	14059			

图318 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-398-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:15:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	90012	100.000	14158	3143	1.080	--
总计		90012	100.000	14158			

图319 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-399-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:19:03
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	90145	100.000	14188	3144	1.080	--
总计		90145	100.000	14188			

图320 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-400-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:22:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:45
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	85550	100.000	13424	3135	1.078	--
总计		85550	100.000	13424			

图321 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-401-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:25:49
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	88517	100.000	13902	3138	1.081	--
总计		88517	100.000	13902			

图322 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-402-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:29:11
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	87037	100.000	13700	3141	1.083	--
总计		87037	100.000	13700			

图323 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-403-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:32:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	87497	100.000	13727	3133	1.083	--
总计		87497	100.000	13727			

图324 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-404-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:35:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	88642	100.000	13929	3128	1.079	--
总计		88642	100.000	13929			

图325 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-405-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:39:20
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:41:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	91935	100.000	14443	3124	1.082	--
总计		91935	100.000	14443			

图326 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-406-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:42:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	83325	100.000	13078	3116	1.080	--
总计		83325	100.000	13078			

图327 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-407-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:46:09
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	86757	100.000	13583	3116	1.082	--
总计		86757	100.000	13583			

图328 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-408-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P3.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:49:34
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	86251	100.000	13501	3110	1.080	--
总计		86251	100.000	13501			

图329 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-409-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P4.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:52:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89124	100.000	14000	3124	1.079	--
总计		89124	100.000	14000			

图330 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-410-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P5.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:56:23
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	88221	100.000	13876	3127	1.077	--
总计		88221	100.000	13876			

图331 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-411-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P6.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 19:59:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	88899	100.000	13970	3127	1.079	--
总计		88899	100.000	13970			

图332 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-412-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:03:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	89909	100.000	14103	3113	1.079	--
总计		89909	100.000	14103			

图333 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-413-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:06:37　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:21　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	89519	100.000	14038	3116	1.080	--
总计		89519	100.000	14038			

图334 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-414-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:10:02　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:23　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	88894	100.000	13910	3115	1.076	--
总计		88894	100.000	13910			

图335 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-415-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:13:27
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89825	100.000	14076	3120	1.077	--
总计		89825	100.000	14076			

图336 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-416-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:16:51
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89271	100.000	14003	3109	1.077	--
总计		89271	100.000	14003			

图337 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-417-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:20:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	91844	100.000	14368	3112	1.077	--
总计		91844	100.000	14368			

图338 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-418-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:23:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.341	96631	100.000	14709	2927	1.081	--
总计		96631	100.000	14709			

图339 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-419-2 - zzp-2025051221p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:27:01
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.342	96689	100.000	14701	2925	1.079	--
总计		96689	100.000	14701			

图340 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051221批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-420-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-rj.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:30:26　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:41　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图341 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
溶剂

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-421-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:33:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	97121	100.000	14758	2934	1.080	--
总计		97121	100.000	14758			

图342 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-422-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:37:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	96953	100.000	14754	2947	1.085	--
总计		96953	100.000	14754			

图343 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-2

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-423-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:40:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	97039	100.000	14780	2943	1.083	--
总计		97039	100.000	14780			

图344 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-3

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-424-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:44:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.344	97136	100.000	14794	2934	1.080	--
总计		97136	100.000	14794			

图345 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-4

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-425-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:47:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.345	96998	100.000	14798	2945	1.082	--
总计		96998	100.000	14798			

图346 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-1-5

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-426-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:50:53
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	44122	100.000	6947	3155	1.077	--
总计		44122	100.000	6947			

图347 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-427-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:54:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:42:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	22177	100.000	3497	3162	1.082	--
总计		22177	100.000	3497			

图348 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-428-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 20:57:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	30304	100.000	4764	3166	1.088	--
总计		30304	100.000	4764			

图349 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-429-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:01:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	23524	100.000	3720	3181	1.084	--
总计		23524	100.000	3720			

图350 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-430-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:04:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:07
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.352	31611	100.000	4997	3172	1.090	--
总计		31611	100.000	4997			

图351 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-431-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:08:21
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	36964	100.000	5835	3170	1.083	--
总计		36964	100.000	5835			

图352 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-5min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-432-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:11:44
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	70477	100.000	11108	3162	1.077	--
总计		70477	100.000	11108			

图353 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-433-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:15:07
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	50089	100.000	7915	3158	1.082	--
总计		50089	100.000	7915			

图354 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-434-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:18:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	55297	100.000	8703	3160	1.082	--
总计		55297	100.000	8703			

图355 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-435-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:21:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:21　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	52723	100.000	8314	3176	1.076	--
总计		52723	100.000	8314			

图356 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-436-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:25:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	59657	100.000	9393	3167	1.080	--
总计		59657	100.000	9393			

图357 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-437-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:28:39
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	64152	100.000	10073	3137	1.080	--
总计		64152	100.000	10073			

图358 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-10min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-438-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:32:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	79840	100.000	12596	3162	1.079	--
总计		79840	100.000	12596			

图359 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-439-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:35:26
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	65544	100.000	10324	3168	1.080	--
总计		65544	100.000	10324			

图360 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-440-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:38:50
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:34
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	69831	100.000	11044	3167	1.078	--
总计		69831	100.000	11044			

图361 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-441-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:42:13　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:37　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	68208	100.000	10755	3158	1.078	--
总计		68208	100.000	10755			

图362 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-442-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:45:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	71869	100.000	11351	3167	1.079	--
总计		71869	100.000	11351			

图363 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-443-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:48:58
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	78018	100.000	12339	3175	1.078	--
总计		78018	100.000	12339			

图364 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-15min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-444-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:52:22
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:45
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	84094	100.000	13237	3159	1.077	--
总计		84094	100.000	13237			

图365 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-445-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:55:46
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:48
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	74162	100.000	11724	3169	1.081	--
总计		74162	100.000	11724			

图366 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-446-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 21:59:08
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	77050	100.000	12177	3163	1.081	--
总计		77050	100.000	12177			

图367 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-447-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:02:32
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:53
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	77100	100.000	12176	3161	1.080	--
总计		77100	100.000	12176			

图368 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-448-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:05:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:56
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	80135	100.000	12695	3172	1.080	--
总计		80135	100.000	12695			

图369 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-449-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:09:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:43:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	82383	100.000	13000	3162	1.081	--
总计		82383	100.000	13000			

图370 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-20min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-450-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:12:43　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:01　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.346	83417	100.000	13144	3138	1.078	--
总计		83417	100.000	13144			

图371 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-451-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:16:07
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:04
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	84591	100.000	13320	3142	1.081	--
总计		84591	100.000	13320			

图372 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-452-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:19:31　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:07　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	84615	100.000	13411	3178	1.075	--
总计		84615	100.000	13411			

图373 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-453-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:22:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:09
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	86776	100.000	13716	3180	1.078	--
总计		86776	100.000	13716			

图374 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-454-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:26:18
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:12
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	87269	100.000	13793	3176	1.079	--
总计		87269	100.000	13793			

图375 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-455-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:29:42
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	88247	100.000	13921	3164	1.082	--
总计		88247	100.000	13921			

图376 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-30min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-456-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:33:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	85877	100.000	13521	3152	1.084	--
总计		85877	100.000	13521			

图377 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-457-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:36:29　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:20　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	91229	100.000	14377	3141	1.081	--
总计		91229	100.000	14377			

图378 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-458-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:39:53　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:23　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	88459	100.000	13927	3145	1.077	--
总计		88459	100.000	13927			

图379 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-459-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:43:16
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	92135	100.000	14509	3147	1.079	--
总计		92135	100.000	14509			

图380 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-460-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:46:40
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	90115	100.000	14241	3191	1.078	--
总计		90115	100.000	14241			

图381 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-461-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-45min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:50:04
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	88844	100.000	14040	3195	1.078	--
总计		88844	100.000	14040			

图382 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-45min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-462-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:53:28
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	87069	100.000	13721	3169	1.079	--
总计		87069	100.000	13721			

图383 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-463-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 22:56:53
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:38
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	90080	100.000	14196	3166	1.081	--
总计		90080	100.000	14196			

图384 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-464-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-25
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:00:17　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:40　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	93510	100.000	14710	3185	1.081	--
总计		93510	100.000	14710			

图385 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-465-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:03:41
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:43
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	90437	100.000	14218	3166	1.083	--
总计		90437	100.000	14218			

图386 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-466-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:07:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:46
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.351	90852	100.000	14311	3185	1.082	--
总计		90852	100.000	14311			

图387 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-467-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-60min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-52
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:10:29
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:49
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.350	89632	100.000	14153	3188	1.081	--
总计		89632	100.000	14153			

图388 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-60min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-468-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:13:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:51
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	85561	100.000	13437	3124	1.080	--
总计		85561	100.000	13437			

图389 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-469-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:17:17
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:54
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	88699	100.000	13915	3125	1.080	--
总计		88699	100.000	13915			

图390 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-470-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:20:42
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:57
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	88168	100.000	13862	3130	1.082	--
总计		88168	100.000	13862			

图391 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
柱　温: 35℃
流速: 1.5ml/min
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-471-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:24:06
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:44:59
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	90143	100.000	14134	3124	1.084	--
总计		90143	100.000	14134			

图392 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-472-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:27:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:02
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	89893	100.000	14116	3130	1.080	--
总计		89893	100.000	14116			

图393 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-473-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-90min-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:30:54
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:05
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	88089	100.000	13822	3129	1.080	--
总计		88089	100.000	13822			

图394 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-90min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-474-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P1.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-7
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:34:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:08
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	84465	100.000	13278	3129	1.083	--
总计		84465	100.000	13278			

图395 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-475-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P2.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-16
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:37:43
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:10
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	86174	100.000	13488	3107	1.084	--
总计		86174	100.000	13488			

图396 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-476-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P3.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-25
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:41:07
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:13
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	86904	100.000	13646	3118	1.083	--
总计		86904	100.000	13646			

图397 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-477-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P4.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-34
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:44:31
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:15
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.347	88957	100.000	13943	3119	1.084	--
总计		88957	100.000	13943			

图398 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-478-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P5.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-43
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:47:56
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:18
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	85794	100.000	13450	3126	1.080	--
总计		85794	100.000	13450			

图399 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-479-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-120min-P6.lc
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-52
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:51:20　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:21　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	85833	100.000	13429	3109	1.081	--
总计		85833	100.000	13429			

图400 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-120min-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-480-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-8
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:54:45
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:24
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	87302	100.000	13700	3108	1.082	--
总计		87302	100.000	13700			

图401 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-481-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-17
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/17 23:58:10
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:26
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.348	90537	100.000	14206	3127	1.079	--
总计		90537	100.000	14206			

图402 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-482-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-26
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:01:35
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:29
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	88136	100.000	13811	3132	1.080	--
总计		88136	100.000	13811			

图403 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-483-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-35
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:05:00
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:32
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	89945	100.000	14127	3132	1.080	--
总计		89945	100.000	14127			

图404 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-484-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-44
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:08:25
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:35
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	90253	100.000	14152	3128	1.081	--
总计		90253	100.000	14152			

图405 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片5
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-485-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 2-53
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:11:49
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:37
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.349	91057	100.000	14269	3142	1.081	--
总计		91057	100.000	14269			

图406 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）
流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃
波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-486-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl
版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:15:14
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:40
处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	97436	100.000	14853	2948	1.083	--
总计		97436	100.000	14853			

图407 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-1

SHIMADZU LabSolutions

QTL-4125

<样品信息>

色谱柱: XB-C18(50*4.6mm,5μm）　流速: 1.5ml/min
柱　温: 35℃　波长: 259nm
数据文件名: RC$QTL-4125 - 10-6/10-487-2 - zzp-2025051321p-rcqx-zjtj3y-pH6.8+0.16CTABjz-jf50z-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$QTL-4125 - QTL-4125-rc-FX259.lcm
批处理文件名: RC$QTL-4125 - 20250917-FX259.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 20 μl　版本号: 6.115
进样时间: 2025/09/18 00:18:39　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/18 08:45:43　处理者: xiexinhui
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX259)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.343	97628	100.000	14874	2944	1.080	--
总计		97628	100.000	14874			

图408 玛巴洛沙韦片溶出曲线测定中间条件3月HPLC图谱
自制品-2025051321批-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-桨法-50转
对照品溶液-2-2