


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2291-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:25:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:22:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2292-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:29:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:22:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	92175	19550	20.306	4351	1.273	--
2	2.344	361755	71520	79.694	5011	1.166	2.455
总计		453930	91071	100.000			


图2 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2293-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:33:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:22:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	92409	19670	20.383	4387	1.274	--
2	2.345	360953	71595	79.617	5043	1.166	2.464
总计		453362	91265	100.000			


图3 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2294-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:37:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:22:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.031	92418	19566	20.362	4343	1.276	--
2	2.345	361456	71420	79.638	4992	1.168	2.451
总计		453874	90986	100.000			

图4 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-3




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2295-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:41:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:22:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	92042	19478	20.340	4347	1.275	--
2	2.345	360477	71229	79.660	4991	1.167	2.449
总计		452519	90707	100.000			


图5 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2296-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:45:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:22:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	92293	19507	20.356	4345	1.276	--
2	2.346	361093	71422	79.644	5002	1.167	2.451
总计		453386	90929	100.000			


图6 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2297-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:49:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:22:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	55129	12562	18.632	5141	1.275	--
2	2.365	240757	52377	81.368	6152	1.134	2.696
总计		295886	64939	100.000			


图7 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2298-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:53:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:22:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	40596	9232	17.816	5109	1.273	--
2	2.365	187267	40717	82.184	6135	1.133	2.695
总计		227863	49950	100.000			


图8 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2299-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 13:57:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:22:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	36834	8383	18.416	5113	1.271	--
2	2.365	163177	35476	81.584	6130	1.133	2.694
总计		200011	43859	100.000			


图9 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2300-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:00:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:22:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	49520	11287	18.411	5140	1.272	--
2	2.365	219455	47779	81.589	6156	1.133	2.699
总计		268976	59066	100.000			


图10 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2301-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:04:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	48432	11035	17.759	5141	1.274	--
2	2.365	224288	48813	82.241	6153	1.134	2.697
总计		272720	59848	100.000			


图11 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2302-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:08:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	46465	10601	18.497	5142	1.271	--
2	2.364	204734	44620	81.503	6156	1.132	2.698
总计		251198	55221	100.000			


图12 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2303-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:12:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	76234	17376	20.136	5145	1.275	--
2	2.365	302359	65815	79.864	6153	1.136	2.696
总计		378593	83190	100.000			


图13 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2304-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:16:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:23:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	63729	14464	19.535	5153	1.275	--
2	2.367	262504	56786	80.465	6150	1.135	2.699
总计		326233	71250	100.000			


图14 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2305-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:20:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	68466	15535	19.963	5146	1.275	--
2	2.366	274496	59441	80.037	6142	1.137	2.695
总计		342963	74976	100.000			


图15 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2306-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:24:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	70070	15926	19.787	5152	1.275	--
2	2.366	284048	61755	80.213	6154	1.136	2.694
总计		354118	77682	100.000			


图16 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2307-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:27:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	69373	15840	19.607	5158	1.274	--
2	2.365	284453	61867	80.393	6139	1.136	2.696
总计		353826	77707	100.000			


图17 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2308-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:31:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	66080	14987	19.875	5149	1.276	--
2	2.366	266403	57676	80.125	6144	1.136	2.695
总计		332483	72663	100.000			


图18 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2309-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:35:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	82004	18725	20.347	5166	1.275	--
2	2.365	321021	69891	79.653	6147	1.137	2.695
总计		403025	88616	100.000			


图19 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2310-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:39:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	76136	17333	19.722	5147	1.275	--
2	2.365	309899	67297	80.278	6137	1.133	2.692
总计		386035	84630	100.000			


图20 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2311-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:43:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	81087	18361	20.307	5147	1.276	--
2	2.366	318211	68877	79.693	6147	1.135	2.690
总计		399297	87238	100.000			


图21 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2312-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:47:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	78332	17776	20.270	5149	1.276	--
2	2.366	308112	66852	79.730	6156	1.134	2.692
总计		386445	84628	100.000			


图22 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2314-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:55:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:23:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	74613	16961	20.488	5161	1.275	--
2	2.366	289563	62867	79.512	6146	1.133	2.692
总计		364176	79828	100.000			


图24 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2315-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 14:58:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	84872	19208	20.629	5142	1.276	--
2	2.366	326550	70634	79.371	6135	1.135	2.689
总计		411421	89842	100.000			

图25 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2316-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:02:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	84165	19091	20.448	5144	1.276	--
2	2.366	327446	71059	79.552	6140	1.134	2.689
总计		411611	90150	100.000			


图26 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2317-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:06:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	86694	19623	20.644	5142	1.277	--
2	2.366	333258	72202	79.356	6138	1.135	2.686
总计		419952	91824	100.000			


图27 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2318-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:10:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82230	18667	20.427	5152	1.276	--
2	2.366	320330	69471	79.573	6147	1.134	2.690
总计		402560	88138	100.000			


图28 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2319-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:14:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	79266	18065	20.207	5150	1.275	--
2	2.365	313005	68031	79.793	6139	1.134	2.691
总计		392271	86096	100.000			


图29 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2320-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:18:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:23:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	78709	17870	20.656	5158	1.275	--
2	2.366	302335	65606	79.344	6160	1.133	2.693
总计		381044	83476	100.000			


图30 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2321-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:22:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85446	19493	20.645	5172	1.275	--
2	2.365	328427	71408	79.355	6140	1.135	2.692
总计		413873	90901	100.000			


图31 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2322-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:26:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85287	19420	20.273	5159	1.275	--
2	2.365	335406	72905	79.727	6135	1.135	2.689
总计		420693	92325	100.000			


图32 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2323-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:29:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:23:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	90255	20428	20.848	5161	1.276	--
2	2.366	342672	74324	79.152	6149	1.135	2.687
总计		432927	94752	100.000			


图33 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2324-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:33:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:24:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	84220	19074	20.348	5149	1.277	--
2	2.366	329683	71548	79.652	6140	1.135	2.685
总计		413903	90622	100.000			


图34 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2325-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:37:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82162	18656	20.531	5149	1.276	--
2	2.365	318026	69100	79.469	6138	1.134	2.685
总计		400188	87756	100.000			


图35 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2326-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:41:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:24:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82609	18753	20.759	5150	1.276	--
2	2.365	315331	68491	79.241	6137	1.134	2.685
总计		397941	87244	100.000			


图36 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2327-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:45:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	86179	19587	20.683	5151	1.275	--
2	2.365	330490	71899	79.317	6140	1.135	2.684
总计		416668	91486	100.000			

图37 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2328-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:49:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	86194	19628	20.386	5188	1.276	--
2	2.365	336619	73281	79.614	6158	1.135	2.690
总计		422812	92909	100.000			


图38 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2329-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:53:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	91012	20781	20.934	5180	1.275	--
2	2.364	343742	74880	79.066	6153	1.135	2.691
总计		434754	95661	100.000			


图39 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2330-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 15:57:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85565	19506	20.432	5180	1.275	--
2	2.365	333205	72557	79.568	6153	1.135	2.690
总计		418770	92062	100.000			


图40 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2331-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:00:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	83043	18889	20.611	5182	1.275	--
2	2.365	319863	69637	79.389	6156	1.134	2.688
总计		402906	88526	100.000			


图41 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2332-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:04:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:24:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	84580	19361	20.969	5201	1.274	--
2	2.364	318777	69542	79.031	6158	1.133	2.692
总计		403357	88903	100.000			


图42 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2334-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:12:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	90046	20438	20.595	5174	1.276	--
2	2.365	347176	75509	79.405	6153	1.136	2.686
总计		437222	95947	100.000			

图44 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2335-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:16:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	92639	21069	20.774	5172	1.275	--
2	2.365	353298	76893	79.226	6149	1.136	2.687
总计		445937	97963	100.000			


图45 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2336-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:20:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	88598	20205	19.898	5170	1.275	--
2	2.364	356672	77649	80.102	6135	1.135	2.685
总计		445270	97853	100.000			


图46 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2337-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:24:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	83442	18920	20.574	5143	1.276	--
2	2.365	322134	70009	79.426	6132	1.135	2.679
总计		405577	88930	100.000			


图47 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2338-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:27:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	86321	19647	20.943	5178	1.275	--
2	2.364	325845	70979	79.057	6146	1.134	2.683
总计		412166	90625	100.000			


图48 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2340-2 - zzp-2025021021p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:35:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:24:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	92069	19408	20.317	4362	1.277	--
2	2.345	361092	71444	79.683	5002	1.166	2.438
总计		453161	90852	100.000			

图50 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2341-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:39:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:24:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图51 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
溶剂




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2342-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:43:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:24:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	91715	19396	20.217	4366	1.276	--
2	2.344	361931	71617	79.783	5020	1.165	2.440
总计		453646	91013	100.000			

图52 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2343-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:47:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	91839	19460	20.272	4358	1.274	--
2	2.343	361189	71137	79.728	4997	1.167	2.436
总计		453028	90597	100.000			

图53 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2344-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:51:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	92101	19456	20.337	4382	1.276	--
2	2.345	360777	71609	79.663	5037	1.164	2.444
总计		452878	91065	100.000			

图54 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2345-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:55:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	91916	19442	20.307	4356	1.274	--
2	2.344	360706	71303	79.693	5019	1.165	2.438
总计		452622	90745	100.000			


图55 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2346-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 16:59:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:24:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	91864	19533	20.326	4403	1.274	--
2	2.344	360090	71403	79.674	5060	1.163	2.446
总计		451955	90935	100.000			

图56 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2347-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:03:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	48381	10994	17.821	5128	1.274	--
2	2.363	223096	48597	82.179	6142	1.130	2.674
总计		271477	59591	100.000			


图57 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2348-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:06:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	51934	11783	18.100	5132	1.274	--
2	2.364	234991	51174	81.900	6142	1.130	2.675
总计		286925	62956	100.000			

图58 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2349-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:10:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	47618	10812	18.307	5123	1.273	--
2	2.364	212490	46279	81.693	6144	1.129	2.675
总计		260108	57091	100.000			


图59 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2350-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:14:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	46802	10619	17.390	5130	1.274	--
2	2.364	222325	48444	82.610	6149	1.130	2.673
总计		269127	59063	100.000			


图60 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2351-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:18:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	48196	10919	17.569	5123	1.274	--
2	2.363	226128	49268	82.431	6147	1.129	2.669
总计		274324	60187	100.000			


图61 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2352-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:22:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	46428	10553	17.991	5112	1.273	--
2	2.363	211627	46025	82.009	6135	1.127	2.669
总计		258054	56578	100.000			


图62 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2353-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:26:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	69844	15839	19.666	5142	1.274	--
2	2.363	285301	62170	80.334	6144	1.131	2.667
总计		355145	78009	100.000			


图63 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2354-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:30:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	70623	16020	19.624	5130	1.275	--
2	2.363	289263	62950	80.376	6128	1.132	2.667
总计		359886	78971	100.000			


图64 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2355-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:34:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	70930	16076	19.966	5135	1.275	--
2	2.363	284331	61903	80.034	6132	1.132	2.668
总计		355261	77978	100.000			


图65 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2356-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:38:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	69934	15832	19.291	5112	1.276	--
2	2.363	292577	63667	80.709	6136	1.130	2.661
总计		362511	79499	100.000			


图66 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2357-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:42:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	66843	15209	19.098	5125	1.274	--
2	2.362	283161	61546	80.902	6125	1.131	2.663
总计		350004	76755	100.000			


图67 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2358-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:45:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	67012	15216	19.721	5100	1.274	--
2	2.362	272786	59226	80.279	6112	1.131	2.660
总计		339798	74442	100.000			


图68 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2359-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:49:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	75375	17092	19.866	5139	1.276	--
2	2.362	304041	66198	80.134	6140	1.132	2.661
总计		379416	83289	100.000			


图69 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2361-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 17:57:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	80598	18317	20.615	5125	1.275	--
2	2.362	310365	67450	79.385	6117	1.132	2.661
总计		390964	85767	100.000			

图71 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2362-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:01:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	79242	18041	19.964	5156	1.274	--
2	2.362	317676	69135	80.036	6135	1.133	2.665
总计		396918	87176	100.000			


图72 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2363-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:05:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	73682	16812	19.785	5145	1.273	--
2	2.361	298720	64851	80.215	6121	1.132	2.663
总计		372402	81663	100.000			

图73 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2364-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:09:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	71186	16181	19.682	5135	1.274	--
2	2.362	290487	63138	80.318	6127	1.132	2.659
总计		361673	79319	100.000			

图74 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2365-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:13:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	78883	17865	20.359	5121	1.275	--
2	2.363	308576	67035	79.641	6110	1.132	2.659
总计		387459	84901	100.000			

图75 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2366-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:17:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	78945	17855	20.049	5112	1.275	--
2	2.363	314823	68426	79.951	6109	1.133	2.657
总计		393768	86281	100.000			

图76 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2367-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:20:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	82570	18805	20.567	5125	1.273	--
2	2.361	318888	69123	79.433	6112	1.132	2.659
总计		401457	87928	100.000			


图77 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2368-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:24:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:25:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	83317	19008	20.237	5141	1.274	--
2	2.361	328399	71214	79.763	6125	1.133	2.659
总计		411717	90223	100.000			

图78 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片4
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2369-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:28:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:25:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	74532	16957	19.748	5145	1.275	--
2	2.362	302883	65832	80.252	6129	1.132	2.661
总计		377415	82789	100.000			


图79 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2370-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:32:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	76972	17581	20.502	5149	1.271	--
2	2.360	298463	64610	79.498	6120	1.132	2.661
总计		375435	82190	100.000			


图80 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2371-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:36:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:26:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	80540	18242	20.453	5125	1.276	--
2	2.362	313243	68079	79.547	6111	1.132	2.657
总计		393783	86321	100.000			


图81 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2372-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:40:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	80928	18365	20.351	5127	1.275	--
2	2.362	316736	68841	79.649	6127	1.132	2.656
总计		397665	87206	100.000			


图82 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2373-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:44:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85373	19537	20.816	5196	1.274	--
2	2.361	324750	70681	79.184	6148	1.132	2.669
总计		410123	90218	100.000			


图83 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2374-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:48:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	85683	19567	20.424	5146	1.272	--
2	2.360	333837	72200	79.576	6119	1.134	2.658
总计		419520	91767	100.000			


图84 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2375-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:52:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	76568	17407	20.059	5161	1.274	--
2	2.362	305139	66443	79.941	6140	1.132	2.663
总计		381707	83850	100.000			


图85 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2376-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:56:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	79554	17984	20.575	5109	1.275	--
2	2.362	307092	66853	79.425	6140	1.131	2.652
总计		386646	84837	100.000			


图86 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2377-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 18:59:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:26:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	80135	18279	20.381	5189	1.273	--
2	2.362	313050	68240	79.619	6162	1.132	2.666
总计		393184	86520	100.000			


图87 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2378-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:03:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82133	18586	20.478	5144	1.276	--
2	2.362	318954	69462	79.522	6137	1.132	2.655
总计		401086	88048	100.000			


图88 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2379-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:07:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	86147	19636	20.856	5153	1.274	--
2	2.361	326900	70973	79.144	6129	1.133	2.657
总计		413047	90609	100.000			

图89 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片3
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2380-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:11:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	86991	19775	20.588	5161	1.275	--
2	2.362	335545	73032	79.412	6140	1.133	2.660
总计		422536	92807	100.000			

图90 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2381-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:15:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	77391	17611	20.129	5153	1.273	--
2	2.361	307077	66717	79.871	6140	1.132	2.657
总计		384467	84328	100.000			

图91 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2382-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:19:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	81655	18671	20.644	5191	1.273	--
2	2.360	313878	68149	79.356	6150	1.132	2.660
总计		395533	86821	100.000			


图92 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2383-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:23:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	80312	18254	20.351	5151	1.275	--
2	2.361	314328	68229	79.649	6126	1.134	2.654
总计		394640	86483	100.000			

图93 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2384-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:27:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	83004	18799	20.502	5133	1.275	--
2	2.362	321858	69986	79.498	6127	1.133	2.652
总计		404862	88785	100.000			

图94 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2385-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:31:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	89287	20403	21.013	5193	1.274	--
2	2.361	335623	72953	78.987	6153	1.133	2.661
总计		424910	93355	100.000			


图95 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2386-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:35:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	87535	19920	20.520	5179	1.275	--
2	2.361	339041	73778	79.480	6145	1.134	2.657
总计		426576	93698	100.000			

图96 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2387-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:39:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	77598	17629	20.120	5164	1.274	--
2	2.361	308081	67007	79.880	6134	1.133	2.656
总计		385680	84636	100.000			

图97 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2388-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:42:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	81395	18589	20.280	5196	1.272	--
2	2.361	319962	69595	79.720	6156	1.133	2.661
总计		401357	88185	100.000			


图98 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2389-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:46:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	93024	19623	20.334	4379	1.274	--
2	2.342	364455	71940	79.666	5035	1.165	2.420
总计		457478	91563	100.000			


图99 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2390-2 - zzp-2025021121p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:50:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	93020	19632	20.328	4349	1.276	--
2	2.342	364578	71925	79.672	4998	1.166	2.414
总计		457597	91556	100.000			

图100 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2391-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:54:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:26:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图101 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2392-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 19:58:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:26:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	91861	19472	20.292	4378	1.275	--
2	2.341	360829	71428	79.708	5031	1.165	2.422
总计		452691	90900	100.000			


图102 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2393-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:02:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:27:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	92283	19507	20.270	4343	1.275	--
2	2.341	362984	71675	79.730	4986	1.167	2.412
总计		455267	91182	100.000			

图103 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2394-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:06:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:27:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	92152	19489	20.294	4341	1.275	--
2	2.340	361927	71606	79.706	4985	1.166	2.410
总计		454079	91095	100.000			


图104 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2395-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:10:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.032	92284	19502	20.289	4345	1.276	--
2	2.341	362552	71620	79.711	4994	1.168	2.412
总计		454836	91122	100.000			


图105 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2396-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:13:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.033	92289	19464	20.288	4331	1.276	--
2	2.341	362611	71510	79.712	4987	1.167	2.410
总计		454900	90974	100.000			


图106 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2397-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:17:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.048	59899	13644	18.292	5125	1.272	--
2	2.360	267569	57859	81.708	6120	1.131	2.650
总计		327468	71503	100.000			


图107 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2398-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:21:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:27:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	64912	14711	18.722	5117	1.274	--
2	2.361	281796	61093	81.278	6108	1.130	2.649
总计		346708	75805	100.000			


图108 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2399-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:25:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	58153	13115	18.415	5112	1.273	--
2	2.362	257632	56097	81.585	6143	1.129	2.648
总计		315785	69212	100.000			


图109 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2400-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:29:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	49687	11253	17.920	5117	1.273	--
2	2.361	227577	49408	82.080	6123	1.129	2.647
总计		277263	60660	100.000			


图110 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2401-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:33:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:27:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	48273	10939	17.409	5127	1.273	--
2	2.361	229012	49752	82.591	6133	1.129	2.648
总计		277285	60691	100.000			

图111 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2402-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:37:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	38829	8802	17.859	5112	1.271	--
2	2.361	178584	38742	82.141	6130	1.128	2.649
总计		217413	47544	100.000			


图112 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2403-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:41:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	78473	17827	19.656	5146	1.273	--
2	2.361	320760	69590	80.344	6130	1.130	2.650
总计		399233	87417	100.000			


图113 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2404-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:44:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	79212	17967	19.504	5136	1.273	--
2	2.361	326925	70948	80.496	6118	1.131	2.648
总计		406137	88915	100.000			


图114 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2405-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:48:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:27:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	77981	17620	19.615	5129	1.275	--
2	2.362	319587	69476	80.385	6121	1.131	2.649
总计		397569	87095	100.000			


图115 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2406-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:52:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	70634	16040	19.356	5148	1.273	--
2	2.361	294284	63906	80.644	6125	1.131	2.651
总计		364917	79945	100.000			


图116 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2407-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 20:56:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	71903	16266	19.639	5140	1.275	--
2	2.362	294213	63988	80.361	6137	1.131	2.649
总计		366116	80255	100.000			


图117 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2408-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:00:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	72292	16453	19.420	5125	1.272	--
2	2.360	299959	64802	80.580	6115	1.133	2.644
总计		372251	81255	100.000			


图118 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2409-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:04:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82053	18649	19.779	5166	1.274	--
2	2.362	332787	72408	80.221	6141	1.131	2.657
总计		414840	91057	100.000			


图119 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2410-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:08:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:27:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	83420	18994	19.814	5148	1.272	--
2	2.360	337592	73136	80.186	6132	1.131	2.650
总计		421012	92130	100.000			


图120 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2412-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:15:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:27:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	76745	17414	19.729	5121	1.274	--
2	2.360	312244	67561	80.271	6111	1.132	2.643
总计		388989	84975	100.000			


图122 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2414-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:23:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:27:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	83097	18920	19.882	5155	1.273	--
2	2.360	334853	72630	80.118	6142	1.133	2.651
总计		417949	91550	100.000			


图124 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2415-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:27:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:28:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	84667	19198	20.169	5151	1.274	--
2	2.361	335110	72822	79.831	6128	1.132	2.650
总计		419777	92020	100.000			

图125 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2416-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:31:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85055	19343	20.046	5150	1.273	--
2	2.360	339237	73586	79.954	6138	1.131	2.649
总计		424293	92929	100.000			


图126 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2417-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:35:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:28:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	85280	19355	20.266	5146	1.274	--
2	2.361	335529	72882	79.734	6129	1.132	2.649
总计		420809	92237	100.000			

图127 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2419-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:42:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	80789	18382	20.225	5142	1.273	--
2	2.360	318652	68940	79.775	6111	1.132	2.647
总计		399441	87323	100.000			


图129 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2421-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:50:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	84654	19245	20.131	5140	1.273	--
2	2.361	335856	72727	79.869	6111	1.132	2.648
总计		420510	91972	100.000			


图131 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2422-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:54:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:28:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	85915	19425	20.096	5123	1.275	--
2	2.361	341599	74167	79.904	6119	1.131	2.645
总计		427514	93592	100.000			


图132 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2423-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 21:58:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	86464	19675	20.377	5144	1.273	--
2	2.360	337859	73106	79.623	6104	1.133	2.649
总计		424323	92782	100.000			


图133 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2424-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:02:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	82455	18545	20.334	5104	1.278	--
2	2.362	323052	70184	79.666	6113	1.131	2.643
总计		405508	88729	100.000			


图134 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2425-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:06:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82730	18769	20.459	5148	1.274	--
2	2.361	321635	69766	79.541	6113	1.132	2.647
总计		404365	88535	100.000			


图135 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2426-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:09:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	89209	20220	20.259	5133	1.275	--
2	2.361	351135	76157	79.741	6123	1.133	2.645
总计		440343	96378	100.000			


图136 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2427-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:13:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85226	19379	20.168	5138	1.274	--
2	2.360	337356	72990	79.832	6123	1.133	2.645
总计		422582	92369	100.000			


图137 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2428-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:17:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	85889	19461	20.070	5137	1.274	--
2	2.361	342061	74209	79.930	6114	1.131	2.645
总计		427951	93670	100.000			


图138 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2429-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:21:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.049	85439	19437	20.187	5152	1.274	--
2	2.360	337791	73067	79.813	6114	1.133	2.646
总计		423229	92504	100.000			


图139 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2430-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:25:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	82226	18574	20.295	5128	1.276	--
2	2.362	322935	70209	79.705	6130	1.132	2.645
总计		405161	88783	100.000			


图140 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2431-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:29:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:28:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.050	83306	18900	20.494	5136	1.274	--
2	2.360	323187	70001	79.506	6119	1.131	2.644
总计		406493	88901	100.000			


图141 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2432-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:33:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	89684	20285	20.255	5160	1.275	--
2	2.362	353095	76789	79.745	6125	1.133	2.645
总计		442779	97074	100.000			


图142 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2433-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:36:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	86400	19533	20.338	5139	1.275	--
2	2.361	338423	73472	79.662	6129	1.132	2.642
总计		424823	93004	100.000			


图143 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2434-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:40:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:28:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	86613	19573	20.175	5134	1.274	--
2	2.361	342703	74376	79.825	6114	1.131	2.643
总计		429316	93950	100.000			


图144 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2435-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:44:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:28:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	86334	19521	20.283	5146	1.274	--
2	2.361	339310	73681	79.717	6121	1.133	2.643
总计		425644	93202	100.000			


图145 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2436-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:48:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:28:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	83056	18801	20.414	5176	1.275	--
2	2.362	323799	70519	79.586	6145	1.132	2.650
总计		406855	89320	100.000			


图146 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2437-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:52:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/17 09:28:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	84303	19078	20.603	5158	1.275	--
2	2.361	324867	70570	79.397	6126	1.132	2.645
总计		409170	89648	100.000			


图147 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2438-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 22:56:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/17 09:29:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.051	89118	20181	20.132	5174	1.275	--
2	2.361	353561	76832	79.868	6126	1.133	2.648
总计		442680	97013	100.000			


图148 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2439-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 23:00:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:29:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.035	92661	19505	20.277	4358	1.275	--
2	2.343	364321	71810	79.723	5021	1.166	2.410
总计		456982	91315	100.000			


图149 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-22/27-2440-2 - zzp-2025021221p-zj6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250916-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/16 23:03:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/17 09:29:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.034	92426	19410	20.254	4346	1.277	--
2	2.343	363908	71553	79.746	5003	1.167	2.409
总计		456334	90963	100.000			

图150 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-pH6.8介质-均一性1-篮法-100转
对照品溶液-2-2