


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1577-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 13:40:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1578-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 13:44:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	90528	17743	20.057	4030	1.274	--
2	2.383	360823	69780	79.943	4897	1.181	1.887
总计		451351	87523	100.000			


图2 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1579-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 13:48:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.128	91012	17836	20.025	4021	1.276	--
2	2.383	363469	70060	79.975	4887	1.185	1.885
总计		454481	87896	100.000			


图3 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1580-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 13:52:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	90315	17664	20.033	4032	1.281	--
2	2.382	360523	69591	79.967	4878	1.187	1.885
总计		450838	87255	100.000			


图4 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1581-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 13:55:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.129	90673	17795	19.989	4031	1.281	--
2	2.384	362939	69703	80.011	4877	1.188	1.883
总计		453613	87498	100.000			


图5 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1582-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 13:59:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.127	90235	17649	20.007	4028	1.283	--
2	2.382	360789	69581	79.993	4868	1.189	1.882
总计		451023	87230	100.000			


图6 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1583-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:03:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:00:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	48705	10060	17.732	4691	1.324	--
2	2.401	225968	46927	82.268	5858	1.181	2.065
总计		274673	56987	100.000			


图7 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1584-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:07:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.142	40242	8327	17.064	4704	1.317	--
2	2.401	195588	40536	82.936	5858	1.179	2.066
总计		235830	48863	100.000			


图8 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1585-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:11:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:00:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	44537	9219	18.093	4701	1.322	--
2	2.402	201623	41947	81.907	5850	1.181	2.064
总计		246160	51166	100.000			


图9 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1586-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:15:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:00:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	34129	7055	17.176	4694	1.320	--
2	2.401	164574	34123	82.824	5855	1.180	2.062
总计		198703	41178	100.000			


图10 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1588-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:22:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	44975	9294	17.597	4708	1.324	--
2	2.401	210613	43672	82.403	5856	1.183	2.063
总计		255588	52966	100.000			


图12 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1589-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:26:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:00:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	69426	14363	19.573	4699	1.335	--
2	2.402	285272	59365	80.427	5861	1.184	2.062
总计		354698	73728	100.000			


图13 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1590-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:30:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:00:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	64385	13350	19.278	4740	1.331	--
2	2.401	269596	55928	80.722	5869	1.185	2.066
总计		333981	69277	100.000			


图14 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1591-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:34:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:00:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	62798	13033	19.557	4719	1.329	--
2	2.402	258298	53713	80.443	5868	1.184	2.061
总计		321095	66746	100.000			


图15 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1592-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:38:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:01:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	56995	11786	19.050	4710	1.317	--
2	2.401	242190	50261	80.950	5873	1.183	2.061
总计		299186	62046	100.000			


图16 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1593-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:42:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	79773	16565	20.843	4736	1.330	--
2	2.402	302956	63060	79.157	5869	1.184	2.063
总计		382729	79624	100.000			


图17 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1594-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:46:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:01:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.143	66704	13817	19.940	4734	1.331	--
2	2.401	267811	55624	80.060	5875	1.184	2.063
总计		334514	69441	100.000			


图18 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1595-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:50:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:01:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	76561	15929	20.214	4733	1.327	--
2	2.402	302196	62880	79.786	5866	1.184	2.061
总计		378757	78808	100.000			


图19 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1596-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:53:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	72072	15002	19.661	4746	1.326	--
2	2.402	294494	61335	80.339	5880	1.183	2.061
总计		366566	76336	100.000			


图20 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1597-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 14:57:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:01:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.144	69401	14466	19.874	4753	1.328	--
2	2.402	279802	58286	80.126	5890	1.182	2.062
总计		349203	72752	100.000			

图21 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1598-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:01:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	69717	14570	19.758	4757	1.318	--
2	2.403	283132	59192	80.242	5899	1.180	2.062
总计		352848	73762	100.000			


图22 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1599-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:05:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:01:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	89721	18729	21.189	4762	1.327	--
2	2.402	333703	69612	78.811	5888	1.182	2.062
总计		423423	88341	100.000			

图23 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1600-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:09:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:01:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	74607	15592	20.418	4775	1.322	--
2	2.402	290797	60707	79.582	5908	1.180	2.065
总计		365405	76299	100.000			

图24 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1601-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:13:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	77872	16283	20.209	4773	1.321	--
2	2.402	307462	64220	79.791	5897	1.179	2.063
总计		385334	80502	100.000			


图25 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1602-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:17:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	76976	16120	20.046	4770	1.325	--
2	2.402	307024	64223	79.954	5913	1.179	2.062
总计		383999	80343	100.000			


图26 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1603-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:20:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	72942	15307	20.229	4796	1.315	--
2	2.402	287645	60122	79.771	5920	1.177	2.067
总计		360587	75429	100.000			


图27 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1604-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:24:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:01:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	75137	15728	19.963	4778	1.317	--
2	2.402	301251	63020	80.037	5917	1.177	2.063
总计		376388	78748	100.000			


图28 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1605-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:28:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	93059	19498	21.281	4803	1.321	--
2	2.401	344219	71827	78.719	5917	1.178	2.064
总计		437278	91324	100.000			


图29 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1606-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:32:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	77419	16270	20.589	4803	1.320	--
2	2.402	298595	62605	79.411	5929	1.175	2.065
总计		376013	78875	100.000			


图30 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1607-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:36:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	79637	16744	20.364	4806	1.318	--
2	2.402	311430	65289	79.636	5932	1.175	2.063
总计		391067	82033	100.000			


图31 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1608-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:40:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	78792	16578	20.121	4818	1.318	--
2	2.403	312809	65699	79.879	5934	1.174	2.064
总计		391602	82278	100.000			


图32 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1609-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:44:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	74468	15668	20.422	4817	1.312	--
2	2.401	290171	60666	79.578	5931	1.175	2.064
总计		364638	76335	100.000			


图33 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1610-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:48:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	78767	16627	20.138	4840	1.310	--
2	2.402	312364	65584	79.862	5944	1.172	2.066
总计		391131	82210	100.000			


图34 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1611-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:51:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:01:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	94735	19978	21.309	4840	1.313	--
2	2.401	349834	73111	78.691	5944	1.174	2.065
总计		444570	93090	100.000			


图35 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1612-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:55:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:01:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	79355	16744	20.617	4843	1.315	--
2	2.403	305544	64171	79.383	5950	1.171	2.066
总计		384900	80915	100.000			


图36 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1613-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 15:59:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:02:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	81426	17177	20.529	4838	1.318	--
2	2.402	315215	66089	79.471	5945	1.173	2.063
总计		396641	83266	100.000			


图37 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1614-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:03:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	80508	16997	20.289	4845	1.315	--
2	2.402	316308	66427	79.711	5952	1.171	2.065
总计		396816	83425	100.000			


图38 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1615-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:07:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:02:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	75783	16001	20.509	4849	1.314	--
2	2.401	293724	61517	79.491	5953	1.170	2.064
总计		369507	77518	100.000			


图39 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1616-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:11:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	80264	16966	20.171	4860	1.310	--
2	2.402	317648	66695	79.829	5963	1.170	2.065
总计		397912	83661	100.000			


图40 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1617-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:15:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	96783	20477	21.582	4863	1.312	--
2	2.402	351666	73968	78.418	5968	1.170	2.065
总计		448448	94444	100.000			


图41 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1618-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:18:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:02:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	83203	17595	20.900	4861	1.311	--
2	2.403	314896	66317	79.100	5962	1.168	2.065
总计		398099	83911	100.000			


图42 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1619-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:22:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	85520	18090	20.305	4865	1.313	--
2	2.401	335653	70344	79.695	5965	1.169	2.064
总计		421174	88434	100.000			

图43 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1620-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:26:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:02:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	81348	17220	20.349	4875	1.310	--
2	2.403	318421	67067	79.651	5963	1.167	2.065
总计		399769	84287	100.000			


图44 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1621-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:30:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	75673	16032	20.427	4878	1.309	--
2	2.402	294786	62122	79.573	5979	1.166	2.064
总计		370458	78154	100.000			


图45 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1622-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:34:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:02:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	81634	17312	20.289	4885	1.310	--
2	2.402	320715	67447	79.711	5966	1.167	2.064
总计		402349	84759	100.000			


图46 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1623-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:38:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	97293	20635	21.630	4887	1.310	--
2	2.402	352510	74142	78.370	5979	1.167	2.063
总计		449803	94778	100.000			


图47 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1624-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:42:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	85822	18219	20.493	4893	1.308	--
2	2.402	332954	70004	79.507	5980	1.166	2.064
总计		418775	88223	100.000			


图48 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1625-2 - zzp-2025021021p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:46:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	91385	18203	19.830	4184	1.263	--
2	2.384	369460	71470	80.170	4959	1.177	1.882
总计		460845	89673	100.000			

图49 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021021批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1627-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 16:53:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1629-2 - zpz-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:01:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	90821	18071	19.988	4187	1.257	--
2	2.384	363551	70408	80.012	4968	1.174	1.880
总计		454372	88479	100.000			


图53 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1630-2 - zpz-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:05:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:02:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	90289	17974	19.961	4179	1.248	--
2	2.383	362042	70193	80.039	4958	1.175	1.877
总计		452331	88167	100.000			


图54 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1632-2 - zpz-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:13:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:02:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.131	90072	18025	19.944	4190	1.253	--
2	2.381	361554	70489	80.056	4949	1.173	1.874
总计		451627	88514	100.000			

图56 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-1-5




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1633-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:17:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:02:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	46892	10053	16.999	4933	1.279	--
2	2.400	228965	48167	83.001	5962	1.154	2.059
总计		275856	58220	100.000			


图57 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1634-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:21:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:03:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	48758	10405	17.830	4924	1.283	--
2	2.398	224698	47415	82.170	5964	1.154	2.060
总计		273456	57820	100.000			


图58 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1636-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:28:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	47102	10074	17.044	4923	1.279	--
2	2.399	229258	48323	82.956	5956	1.154	2.058
总计		276359	58397	100.000			


图60 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1638-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:36:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	45032	9657	17.404	4923	1.278	--
2	2.399	213721	44971	82.596	5961	1.151	2.057
总计		258753	54628	100.000			


图62 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm)	流速: 1.5ml/min
柱温:30°C	波长: 240nm
数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1640-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb	
样品瓶号: 2-11	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/09/17 17:44:28	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:16	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	65526	14022	19.317	4937	1.283	--
2	2.399	273696	57781	80.683	5969	1.153	2.055
总计		339222	71804	100.000			


图64 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1641-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:48:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	66233	14163	19.697	4938	1.288	--
2	2.399	270026	56928	80.303	5967	1.153	2.057
总计		336259	71091	100.000			


图65 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1642-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:52:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	70548	15105	18.916	4944	1.286	--
2	2.399	302401	63814	81.084	5967	1.153	2.055
总计		372949	78919	100.000			


图66 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1643-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 17:56:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:03:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	71305	15273	19.232	4947	1.287	--
2	2.399	299456	63179	80.768	5957	1.152	2.056
总计		370761	78452	100.000			


图67 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1644-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:00:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	67235	14381	19.234	4943	1.285	--
2	2.398	282333	59619	80.766	5968	1.151	2.056
总计		349568	73999	100.000			


图68 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1645-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:03:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	75802	16243	19.642	4954	1.285	--
2	2.399	310106	65480	80.358	5974	1.152	2.055
总计		385907	81723	100.000			

图69 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1646-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:07:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:03:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	72069	15430	19.820	4941	1.287	--
2	2.399	291541	61614	80.180	5977	1.152	2.054
总计		363610	77044	100.000			


图70 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1647-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:11:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	74566	15951	20.136	4943	1.287	--
2	2.399	295753	62356	79.864	5957	1.152	2.053
总计		370319	78308	100.000			

图71 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1648-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:15:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	79798	17102	19.500	4960	1.286	--
2	2.400	329420	69339	80.500	5966	1.152	2.053
总计		409217	86441	100.000			


图72 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1649-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:19:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	80975	17334	19.866	4954	1.287	--
2	2.399	326642	68828	80.134	5963	1.152	2.053
总计		407618	86162	100.000			


图73 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1650-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:23:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	76860	16489	19.903	4960	1.282	--
2	2.399	309319	65121	80.097	5957	1.150	2.050
总计		386179	81610	100.000			


图74 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1651-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:27:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	76296	16362	19.466	4963	1.283	--
2	2.399	315656	66618	80.534	5958	1.150	2.051
总计		391952	82979	100.000			


图75 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1652-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:31:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:03:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	73699	15793	19.787	4968	1.284	--
2	2.398	298761	63216	80.213	5965	1.150	2.053
总计		372460	79010	100.000			

图76 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1653-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:34:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:03:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	79344	17008	20.571	4946	1.285	--
2	2.398	306369	64707	79.429	5954	1.149	2.050
总计		385713	81715	100.000			

图77 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1654-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:38:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:03:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	85255	18302	19.912	4969	1.283	--
2	2.400	342910	72073	80.088	5953	1.151	2.050
总计		428164	90375	100.000			


图78 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1655-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:42:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:03:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	83348	17878	19.847	4970	1.285	--
2	2.399	336601	70869	80.153	5955	1.151	2.050
总计		419949	88747	100.000			


图79 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1656-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:46:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	80664	17335	20.078	4970	1.282	--
2	2.399	321084	67656	79.922	5965	1.149	2.049
总计		401749	84991	100.000			


图80 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1657-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:50:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	78501	16860	19.739	4976	1.283	--
2	2.399	319197	67265	80.261	5951	1.148	2.048
总计		397698	84125	100.000			


图81 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1658-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:54:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	76195	16358	19.979	4968	1.281	--
2	2.399	305182	64295	80.021	5956	1.147	2.047
总计		381377	80653	100.000			


图82 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1659-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 18:58:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	81666	17536	20.814	4972	1.283	--
2	2.399	310689	65573	79.186	5947	1.148	2.047
总计		392355	83109	100.000			


图83 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1660-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:02:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	87569	18797	19.991	4964	1.282	--
2	2.399	350483	73843	80.009	5958	1.150	2.045
总计		438052	92640	100.000			


图84 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1661-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:06:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	86208	18484	20.186	4962	1.281	--
2	2.399	340869	71911	79.814	5951	1.149	2.045
总计		427076	90395	100.000			


图85 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1662-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:09:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	82460	17682	20.142	4972	1.281	--
2	2.400	326924	68685	79.858	5948	1.148	2.045
总计		409384	86366	100.000			


图86 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1663-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:13:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	79453	17082	19.884	4974	1.278	--
2	2.398	320127	67680	80.116	5947	1.146	2.044
总计		399580	84762	100.000			


图87 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1664-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:17:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	76945	16518	20.186	4964	1.281	--
2	2.398	304229	64184	79.814	5939	1.146	2.044
总计		381174	80702	100.000			


图88 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1665-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:21:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	82463	17714	20.826	4979	1.281	--
2	2.398	313492	66286	79.174	5954	1.146	2.045
总计		395955	84000	100.000			

图89 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1666-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:25:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	84526	18165	19.481	4978	1.281	--
2	2.398	349374	73819	80.519	5948	1.147	2.042
总计		433901	91984	100.000			

图90 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1667-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:29:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	86823	18658	20.172	4973	1.281	--
2	2.398	343590	72628	79.828	5948	1.147	2.041
总计		430413	91286	100.000			


图91 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1668-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:33:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	83757	17986	20.354	4973	1.279	--
2	2.398	327747	69199	79.646	5938	1.146	2.042
总计		411504	87186	100.000			

图92 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1669-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:37:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	82094	17648	19.852	4981	1.278	--
2	2.398	331444	70053	80.148	5949	1.146	2.041
总计		413538	87701	100.000			


图93 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1671-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:45:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	82672	17773	20.751	4987	1.282	--
2	2.398	315732	66692	79.249	5947	1.144	2.043
总计		398405	84465	100.000			


图95 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1673-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:52:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:04:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	89846	19310	20.186	4977	1.278	--
2	2.398	355243	75005	79.814	5940	1.146	2.040
总计		445089	94315	100.000			

图97 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1674-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 19:56:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:04:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	83482	17954	20.377	4982	1.278	--
2	2.398	326209	68809	79.623	5935	1.144	2.041
总计		409691	86763	100.000			

图98 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1676-2 - zzp-2025021121p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:04:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:04:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	89237	17948	19.922	4238	1.242	--
2	2.380	358685	69989	80.078	4949	1.159	1.860
总计		447922	87937	100.000			

图100 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021121批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1677-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:08:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图101 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1679-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:16:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:05:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	91638	18443	19.750	4258	1.246	--
2	2.381	372351	72749	80.250	4970	1.159	1.865
总计		463989	91192	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1680-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:19:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:05:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.132	91749	18546	19.762	4271	1.242	--
2	2.380	372519	72919	80.238	4977	1.157	1.867
总计		464268	91465	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1681-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:23:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:05:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	91723	18454	19.783	4250	1.244	--
2	2.381	371924	72633	80.217	4960	1.158	1.864
总计		463647	91087	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1682-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:27:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:05:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.133	91844	18484	19.813	4252	1.243	--
2	2.381	371701	72664	80.187	4971	1.158	1.863
总计		463545	91148	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1683-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:31:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	45950	9908	17.158	4987	1.263	--
2	2.399	221859	46694	82.842	5933	1.138	2.042
总计		267809	56602	100.000			


图107 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1684-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:35:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:05:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	51046	11006	17.988	4994	1.262	--
2	2.399	232736	49025	82.012	5943	1.140	2.041
总计		283782	60031	100.000			

图108 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1685-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:39:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	32586	6961	16.584	4957	1.273	--
2	2.401	163903	34251	83.416	5930	1.139	2.039
总计		196490	41213	100.000			


图109 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1686-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:43:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	47352	10152	16.739	4985	1.266	--
2	2.401	235535	49215	83.261	5935	1.139	2.040
总计		282887	59367	100.000			

图110 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1687-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:47:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	45243	9741	16.881	4981	1.264	--
2	2.399	222767	46868	83.119	5923	1.138	2.040
总计		268010	56608	100.000			


图111 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1688-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:50:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	37214	7989	15.837	4997	1.264	--
2	2.401	197760	41367	84.163	5938	1.138	2.041
总计		234974	49356	100.000			

图112 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1689-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 20:54:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	72856	15643	19.410	4973	1.274	--
2	2.399	302502	63609	80.590	5920	1.141	2.039
总计		375358	79252	100.000			

图113 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1691-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:02:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	65134	13989	19.146	4978	1.274	--
2	2.399	275060	57783	80.854	5922	1.141	2.040
总计		340195	71772	100.000			


图115 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1692-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:06:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:05:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	71748	15417	18.799	5001	1.271	--
2	2.400	309902	65064	81.201	5923	1.141	2.040
总计		381649	80481	100.000			


图116 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1693-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:10:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:05:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	71384	15324	19.223	4983	1.276	--
2	2.399	299957	62981	80.777	5922	1.140	2.038
总计		371340	78305	100.000			


图117 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1694-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:14:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:05:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	61736	13223	18.335	4989	1.270	--
2	2.401	274982	57503	81.665	5928	1.140	2.038
总计		336718	70726	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1695-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:17:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:06:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	80301	17257	19.682	5001	1.277	--
2	2.399	327699	68991	80.318	5923	1.140	2.036
总计		408000	86248	100.000			


图119 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1696-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:21:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	83853	18027	20.091	4993	1.272	--
2	2.399	333514	70166	79.909	5920	1.141	2.036
总计		417367	88193	100.000			


图120 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1697-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:25:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	75751	16311	19.647	4995	1.273	--
2	2.397	309807	65397	80.353	5916	1.138	2.037
总计		385558	81709	100.000			


图121 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1698-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:29:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:06:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	80265	17257	19.252	5000	1.271	--
2	2.399	336662	70772	80.748	5921	1.139	2.036
总计		416927	88029	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1699-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:33:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	79908	17184	19.378	4998	1.273	--
2	2.399	332455	69934	80.622	5918	1.139	2.035
总计		412362	87118	100.000			


图123 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1700-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:37:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	71893	15399	19.233	4997	1.271	--
2	2.400	301912	63265	80.767	5915	1.138	2.034
总计		373805	78664	100.000			


图124 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1701-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:41:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	86028	18508	20.184	5003	1.272	--
2	2.399	340191	71616	79.816	5913	1.139	2.034
总计		426219	90125	100.000			


图125 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1702-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:44:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	89440	19225	20.523	4989	1.271	--
2	2.399	346368	72834	79.477	5902	1.139	2.032
总计		435808	92058	100.000			


图126 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1703-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:48:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	82050	17623	20.155	4995	1.270	--
2	2.399	325048	68385	79.845	5918	1.139	2.034
总计		407098	86008	100.000			

图127 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1704-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:52:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	84220	18099	19.595	4999	1.272	--
2	2.399	345595	72695	80.405	5910	1.138	2.032
总计		429815	90794	100.000			


图128 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1705-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 21:56:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:06:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	87368	18768	20.135	4999	1.271	--
2	2.399	346550	72904	79.865	5905	1.138	2.031
总计		433918	91672	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1706-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:00:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	76338	16391	19.624	4987	1.270	--
2	2.399	312661	65683	80.376	5901	1.137	2.031
总计		388999	82074	100.000			


图130 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1707-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:04:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	87515	18842	20.208	5000	1.268	--
2	2.398	345551	72839	79.792	5914	1.138	2.029
总计		433066	91680	100.000			


图131 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1708-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:08:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	91582	19675	20.650	4993	1.271	--
2	2.399	351921	73992	79.350	5901	1.138	2.031
总计		443503	93667	100.000			


图132 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1709-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:11:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	84669	18178	20.272	4982	1.272	--
2	2.399	333000	70051	79.728	5910	1.138	2.029
总计		417668	88229	100.000			


图133 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1710-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:15:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	87211	18714	19.940	4999	1.273	--
2	2.399	350155	73543	80.060	5909	1.138	2.030
总计		437366	92257	100.000			


图134 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1711-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:19:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	90702	19419	20.309	4992	1.273	--
2	2.399	355902	74733	79.691	5911	1.139	2.028
总计		446604	94151	100.000			


图135 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1712-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:23:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	76701	16441	19.373	4998	1.270	--
2	2.399	319221	66951	80.627	5903	1.137	2.028
总计		395923	83392	100.000			

图136 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1714-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:31:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	92681	19936	20.841	5001	1.272	--
2	2.398	352019	74124	79.159	5894	1.137	2.029
总计		444700	94060	100.000			

图138 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1715-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:34:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:06:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	85683	18353	20.288	5009	1.268	--
2	2.400	336650	70486	79.712	5903	1.137	2.029
总计		422332	88839	100.000			


图139 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1716-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:38:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:06:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	86769	18611	19.848	4994	1.270	--
2	2.399	350406	73580	80.152	5895	1.138	2.026
总计		437175	92191	100.000			


图140 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1717-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:42:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:07:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	90315	19329	20.246	4998	1.272	--
2	2.400	355778	74573	79.754	5903	1.138	2.027
总计		446094	93902	100.000			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1718-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:46:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:07:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	78534	16830	19.795	4992	1.268	--
2	2.399	318203	66833	80.205	5897	1.135	2.026
总计		396737	83663	100.000			


图142 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1719-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:50:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:07:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	88621	18985	20.259	5004	1.273	--
2	2.399	348814	73205	79.741	5898	1.138	2.025
总计		437435	92189	100.000			


图143 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1720-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:54:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:07:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	91145	19535	20.523	5002	1.272	--
2	2.399	352973	74084	79.477	5894	1.137	2.025
总计		444118	93619	100.000			

图144 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1721-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 22:58:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:07:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	86519	18496	20.409	5000	1.272	--
2	2.400	337401	70628	79.591	5893	1.138	2.026
总计		423920	89124	100.000			


图145 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1722-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 23:01:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/09/18 09:07:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	87601	18775	19.895	4992	1.269	--
2	2.399	352724	74087	80.105	5892	1.137	2.023
总计		440325	92862	100.000			

图146 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1724-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 23:09:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:07:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	79304	17001	19.684	5014	1.272	--
2	2.399	323587	67918	80.316	5900	1.136	2.026
总计		402891	84919	100.000			


图148 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1725-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 23:13:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/18 09:07:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.136	91720	18537	19.749	4285	1.232	--
2	2.383	372719	72422	80.251	4956	1.152	1.854
总计		464439	90959	100.000			


图149 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-25/29-1726-2 - zzp-2025021221p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX278.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20250917-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/09/17 23:17:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/18 09:07:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.135	91948	18530	19.763	4290	1.235	--
2	2.382	373303	72836	80.237	4967	1.150	1.856
总计		465251	91365	100.000			

图150 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 自制品-2025021221批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2