


<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-115-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 11:49:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:05:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-116-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 11:54:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:05:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.983	539765	100.000	45754	2690	0.943	--
总计		539765	100.000	45754			


图2 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-117-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:00:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:05:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.983	539570	100.000	45752	2691	0.943	--
总计		539570	100.000	45752			


图3 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-118-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:05:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:05:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.982	542812	100.000	45837	2680	0.944	--
总计		542812	100.000	45837			


图4 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-119-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:10:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.982	539124	100.000	45853	2697	0.945	--
总计		539124	100.000	45853			


图5 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-120-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:16:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.981	539962	100.000	45895	2694	0.946	--
总计		539962	100.000	45895			

图6 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-121-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:21:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.990	435200	100.000	37276	2741	0.948	--
总计		435200	100.000	37276			


图7 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-122-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:26:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	440800	100.000	37715	2736	0.947	--
总计		440800	100.000	37715			


图8 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-123-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:32:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	441558	100.000	37825	2741	0.947	--
总计		441558	100.000	37825			


图9 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-124-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:37:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	435752	100.000	37331	2741	0.948	--
总计		435752	100.000	37331			

图10 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-125-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:43:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	439698	100.000	37688	2741	0.948	--
总计		439698	100.000	37688			


图11 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-126-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:48:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.990	436245	100.000	37360	2739	0.949	--
总计		436245	100.000	37360			


图12 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-127-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:53:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	462142	100.000	39558	2742	0.949	--
总计		462142	100.000	39558			


图13 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-128-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 12:59:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.990	467933	100.000	40084	2739	0.949	--
总计		467933	100.000	40084			


图14 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-129-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:04:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	467959	100.000	40064	2741	0.949	--
总计		467959	100.000	40064			


图15 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-130-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:09:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	467786	100.000	40059	2739	0.949	--
总计		467786	100.000	40059			

图16 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-131-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:15:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	470452	100.000	40278	2741	0.950	--
总计		470452	100.000	40278			

图17 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-132-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:20:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	468546	100.000	40117	2740	0.949	--
总计		468546	100.000	40117			


图18 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-133-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:25:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	475310	100.000	40717	2743	0.951	--
总计		475310	100.000	40717			

图19 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-134-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:31:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	477642	100.000	40868	2738	0.951	--
总计		477642	100.000	40868			


图20 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-135-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:36:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	482170	100.000	41297	2742	0.951	--
总计		482170	100.000	41297			

图21 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-136-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:42:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	479602	100.000	41129	2743	0.952	--
总计		479602	100.000	41129			

图22 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-137-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:47:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	482799	100.000	41336	2740	0.951	--
总计		482799	100.000	41336			


图23 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-138-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:52:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	480954	100.000	41159	2738	0.951	--
总计		480954	100.000	41159			

图24 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-139-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 13:58:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:06:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	483063	100.000	41384	2742	0.951	--
总计		483063	100.000	41384			


图25 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-140-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:03:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:06:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	483533	100.000	41410	2739	0.952	--
总计		483533	100.000	41410			

图26 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-141-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:08:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	488378	100.000	41854	2742	0.953	--
总计		488378	100.000	41854			

图27 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-142-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:14:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.990	488279	100.000	41869	2743	0.952	--
总计		488279	100.000	41869			

图28 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-143-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:19:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	490475	100.000	42032	2742	0.953	--
总计		490475	100.000	42032			

图29 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-144-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:25:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	486882	100.000	41663	2739	0.953	--
总计		486882	100.000	41663			


图30 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-145-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:30:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	492468	100.000	42184	2743	0.953	--
总计		492468	100.000	42184			


图31 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-146-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:35:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	491746	100.000	42125	2741	0.954	--
总计		491746	100.000	42125			

图32 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-147-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:41:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	501750	100.000	42962	2740	0.954	--
总计		501750	100.000	42962			


图33 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-148-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:46:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	500159	100.000	42879	2743	0.954	--
总计		500159	100.000	42879			

图34 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-149-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:51:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	497972	100.000	42651	2741	0.955	--
总计		497972	100.000	42651			

图35 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-150-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 14:57:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	494631	100.000	42469	2747	0.955	--
总计		494631	100.000	42469			

图36 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-151-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:02:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	498310	100.000	42712	2744	0.955	--
总计		498310	100.000	42712			

图37 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-152-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:07:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	501966	100.000	43063	2747	0.955	--
总计		501966	100.000	43063			


图38 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-153-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:13:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	509701	100.000	43726	2745	0.955	--
总计		509701	100.000	43726			


图39 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-154-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:18:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	507180	100.000	43480	2743	0.955	--
总计		507180	100.000	43480			


图40 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-155-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:24:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	508506	100.000	43656	2745	0.956	--
总计		508506	100.000	43656			

图41 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-156-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:29:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	501763	100.000	43018	2742	0.956	--
总计		501763	100.000	43018			


图42 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-157-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:34:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	502940	100.000	43117	2744	0.956	--
总计		502940	100.000	43117			


图43 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-158-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:40:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	507508	100.000	43571	2747	0.957	--
总计		507508	100.000	43571			


图44 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-159-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:45:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	512636	100.000	44004	2744	0.957	--
总计		512636	100.000	44004			


图45 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-160-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:50:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	511261	100.000	43904	2745	0.957	--
总计		511261	100.000	43904			


图46 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-161-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 15:56:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	515050	100.000	44237	2744	0.957	--
总计		515050	100.000	44237			

图47 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-162-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:01:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:07:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	508010	100.000	43575	2743	0.957	--
总计		508010	100.000	43575			


图48 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-163-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:07:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:07:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	505643	100.000	43362	2746	0.956	--
总计		505643	100.000	43362			


图49 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-164-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:12:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	511361	100.000	43901	2744	0.957	--
总计		511361	100.000	43901			


图50 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-165-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:17:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.991	514642	100.000	44161	2745	0.957	--
总计		514642	100.000	44161			


图51 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-166-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-35
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:23:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.992	512827	100.000	44023	2746	0.957	--
总计		512827	100.000	44023			


图52 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-167-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:28:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	515721	100.000	44230	2744	0.957	--
总计		515721	100.000	44230			

图53 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-168-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:34:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.993	512705	100.000	43949	2742	0.957	--
总计		512705	100.000	43949			

图54 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-169-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:39:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.985	539928	100.000	46037	2702	0.958	--
总计		539928	100.000	46037			

图55 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-170-2 - zzp-25092201-1p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:44:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.985	540382	100.000	46062	2701	0.957	--
总计		540382	100.000	46062			

图56 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-1批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-171-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:50:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-172-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 16:55:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.986	542065	100.000	46221	2701	0.958	--
总计		542065	100.000	46221			

图58 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-173-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:00:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.987	542158	100.000	46203	2698	0.957	--
总计		542158	100.000	46203			

图59 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-174-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:06:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.986	541391	100.000	46182	2701	0.958	--
总计		541391	100.000	46182			

图60 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-175-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:11:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.984	541400	100.000	46142	2698	0.958	--
总计		541400	100.000	46142			

图61 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4


QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-176-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:17:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.985	540543	100.000	46043	2697	0.958	--
总计		540543	100.000	46043			


图62 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-177-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:22:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.994	423797	100.000	36362	2742	0.958	--
总计		423797	100.000	36362			


图63 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-178-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:27:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	422735	100.000	36283	2742	0.958	--
总计		422735	100.000	36283			


图64 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-179-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:33:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	429644	100.000	36877	2743	0.958	--
总计		429644	100.000	36877			

图65 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-180-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:38:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	433906	100.000	37229	2744	0.958	--
总计		433906	100.000	37229			

图66 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-181-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:44:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	428874	100.000	36809	2743	0.958	--
总计		428874	100.000	36809			

图67 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-182-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:49:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	430464	100.000	36961	2744	0.959	--
总计		430464	100.000	36961			


图68 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-183-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 17:54:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	450503	100.000	38635	2741	0.958	--
总计		450503	100.000	38635			

图69 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-184-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:01:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:08:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	453758	100.000	38920	2740	0.958	--
总计		453758	100.000	38920			

图70 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-185-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:06:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:08:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	461641	100.000	39633	2743	0.959	--
总计		461641	100.000	39633			

图71 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-186-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:11:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	458123	100.000	39305	2742	0.959	--
总计		458123	100.000	39305			

图72 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-187-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:17:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	464900	100.000	39883	2743	0.959	--
总计		464900	100.000	39883			


图73 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-188-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:22:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	457091	100.000	39204	2742	0.959	--
总计		457091	100.000	39204			


图74 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-189-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:28:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	460910	100.000	39509	2741	0.959	--
总计		460910	100.000	39509			


图75 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-190-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:33:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	463408	100.000	39757	2741	0.959	--
总计		463408	100.000	39757			

图76 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-191-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:38:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	473442	100.000	40588	2741	0.959	--
总计		473442	100.000	40588			

图77 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-192-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:44:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	470353	100.000	40378	2746	0.959	--
总计		470353	100.000	40378			

图78 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-193-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:49:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	472721	100.000	40572	2743	0.959	--
总计		472721	100.000	40572			


图79 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-194-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 18:55:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	469488	100.000	40332	2746	0.959	--
总计		469488	100.000	40332			


图80 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-195-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:00:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	468173	100.000	40171	2741	0.960	--
总计		468173	100.000	40171			


图81 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-196-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:05:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	469578	100.000	40294	2740	0.959	--
总计		469578	100.000	40294			


图82 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-197-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:11:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	479345	100.000	41156	2744	0.960	--
总计		479345	100.000	41156			


图83 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-198-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:16:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	477274	100.000	40936	2739	0.960	--
总计		477274	100.000	40936			

图84 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-199-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:22:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	479910	100.000	41186	2742	0.960	--
总计		479910	100.000	41186			


图85 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-200-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:27:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	473179	100.000	40646	2747	0.960	--
总计		473179	100.000	40646			


图86 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-201-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:32:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	477219	100.000	40960	2744	0.959	--
总计		477219	100.000	40960			


图87 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-202-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:38:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	478807	100.000	41117	2745	0.960	--
总计		478807	100.000	41117			

图88 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-203-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:43:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:09:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	487677	100.000	41855	2741	0.960	--
总计		487677	100.000	41855			

图89 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-204-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:48:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	483315	100.000	41509	2745	0.960	--
总计		483315	100.000	41509			


图90 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-205-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:54:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	490860	100.000	42192	2747	0.961	--
总计		490860	100.000	42192			

图91 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-206-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 19:59:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.994	481499	100.000	41347	2744	0.961	--
总计		481499	100.000	41347			


图92 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-207-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:05:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:09:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.994	487250	100.000	41870	2749	0.961	--
总计		487250	100.000	41870			


图93 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-208-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:10:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	488155	100.000	41939	2745	0.960	--
总计		488155	100.000	41939			

图94 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-209-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:15:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	496532	100.000	42623	2744	0.961	--
总计		496532	100.000	42623			

图95 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-210-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:21:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	492893	100.000	42376	2749	0.961	--
总计		492893	100.000	42376			

图96 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-211-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:26:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	499556	100.000	42891	2744	0.961	--
总计		499556	100.000	42891			


图97 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-212-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:32:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	492582	100.000	42328	2748	0.961	--
总计		492582	100.000	42328			

图98 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-213-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:37:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	493330	100.000	42418	2750	0.962	--
总计		493330	100.000	42418			


图99 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-214-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:42:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	491479	100.000	42247	2747	0.962	--
总计		491479	100.000	42247			


图100 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-215-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:48:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	503248	100.000	43239	2746	0.961	--
总计		503248	100.000	43239			


图101 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-216-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:53:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	499698	100.000	42959	2747	0.962	--
总计		499698	100.000	42959			


图102 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-217-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 20:59:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	504571	100.000	43340	2746	0.962	--
总计		504571	100.000	43340			


图103 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-218-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:04:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	498979	100.000	42902	2749	0.961	--
总计		498979	100.000	42902			


图104 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-219-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:09:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	498639	100.000	42898	2752	0.962	--
总计		498639	100.000	42898			

图105 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-220-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:15:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.995	497780	100.000	42784	2747	0.962	--
总计		497780	100.000	42784			

图106 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-221-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:20:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	504940	100.000	43375	2747	0.962	--
总计		504940	100.000	43375			


图107 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-222-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:26:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	502221	100.000	43088	2746	0.962	--
总计		502221	100.000	43088			

图108 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-223-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:31:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	503937	100.000	43278	2747	0.961	--
总计		503937	100.000	43278			


图109 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-224-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:36:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	500657	100.000	43037	2751	0.963	--
总计		500657	100.000	43037			


图110 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-225-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:42:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	543446	100.000	46364	2702	0.961	--
总计		543446	100.000	46364			

图111 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-226-2 - zzp-25092201-2p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:47:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.988	542865	100.000	46384	2706	0.962	--
总计		542865	100.000	46384			

图112 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-2批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-227-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:53:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图113 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-228-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 21:58:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:10:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	552428	100.000	47206	2708	0.962	--
总计		552428	100.000	47206			


图114 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-229-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:03:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:10:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.990	552657	100.000	47205	2707	0.962	--
总计		552657	100.000	47205			


图115 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-230-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:09:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.990	555578	100.000	47435	2705	0.962	--
总计		555578	100.000	47435			


图116 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-231-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:14:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:11:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	554998	100.000	47425	2708	0.962	--
总计		554998	100.000	47425			


图117 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-232-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:19:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.989	557924	100.000	47628	2703	0.962	--
总计		557924	100.000	47628			


图118 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-233-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:25:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:11:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	458491	100.000	39433	2749	0.962	--
总计		458491	100.000	39433			

图119 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-234-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:30:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	454121	100.000	39033	2749	0.963	--
总计		454121	100.000	39033			


图120 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-235-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:36:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	451964	100.000	38893	2753	0.963	--
总计		451964	100.000	38893			


图121 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-236-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:41:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	455405	100.000	39155	2751	0.963	--
总计		455405	100.000	39155			


图122 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-237-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:46:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	464561	100.000	39958	2754	0.963	--
总计		464561	100.000	39958			

图123 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-238-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:52:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	462443	100.000	39766	2753	0.963	--
总计		462443	100.000	39766			


图124 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-浆法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-239-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 22:57:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	478147	100.000	41086	2748	0.963	--
总计		478147	100.000	41086			


图125 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-240-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:02:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	482145	100.000	41456	2750	0.963	--
总计		482145	100.000	41456			


图126 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-241-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:08:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	471623	100.000	40585	2751	0.964	--
总计		471623	100.000	40585			


图127 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-242-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:13:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	476300	100.000	40938	2747	0.963	--
总计		476300	100.000	40938			


图128 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-243-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:18:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:11:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	481190	100.000	41410	2751	0.963	--
总计		481190	100.000	41410			


图129 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-244-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:24:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	477646	100.000	41062	2751	0.963	--
总计		477646	100.000	41062			


图130 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-245-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:29:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	485648	100.000	41732	2748	0.964	--
总计		485648	100.000	41732			


图131 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-246-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:35:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:11:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	489057	100.000	42076	2753	0.964	--
总计		489057	100.000	42076			


图132 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-247-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:40:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	481567	100.000	41400	2750	0.964	--
总计		481567	100.000	41400			


图133 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-248-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:45:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	488738	100.000	42051	2752	0.964	--
总计		488738	100.000	42051			


图134 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-249-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:51:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	489647	100.000	42133	2754	0.965	--
总计		489647	100.000	42133			


图135 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-250-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/24 23:56:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	488057	100.000	41972	2749	0.964	--
总计		488057	100.000	41972			


图136 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-251-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:01:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:11:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	490807	100.000	42192	2751	0.964	--
总计		490807	100.000	42192			


图137 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-252-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:07:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.998	493659	100.000	42457	2752	0.964	--
总计		493659	100.000	42457			


图138 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-253-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:12:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	485619	100.000	41713	2751	0.964	--
总计		485619	100.000	41713			

图139 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-3106

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-254-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:17:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	493053	100.000	42359	2752	0.964	--
总计		493053	100.000	42359			


图140 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-255-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:23:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.000	492089	100.000	42309	2753	0.965	--
总计		492089	100.000	42309			


图141 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-256-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:28:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	494058	100.000	42433	2748	0.964	--
总计		494058	100.000	42433			


图142 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-257-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:34:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	497312	100.000	42749	2753	0.964	--
总计		497312	100.000	42749			


图143 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-258-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:39:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.000	503414	100.000	43259	2754	0.964	--
总计		503414	100.000	43259			


图144 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5 μ m) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30 $^{\circ}$ C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-259-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10 μ l 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:44:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.000	494986	100.000	42480	2749	0.964	--
总计		494986	100.000	42480			


图145 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-260-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:50:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.999	498341	100.000	42852	2754	0.965	--
总计		498341	100.000	42852			


图146 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-261-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 00:55:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.000	497906	100.000	42797	2755	0.965	--
总计		497906	100.000	42797			


图147 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-262-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:00:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.000	502629	100.000	43143	2749	0.964	--
总计		502629	100.000	43143			


图148 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-263-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:06:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.000	507287	100.000	43584	2752	0.964	--
总计		507287	100.000	43584			


图149 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-264-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:11:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.001	512482	100.000	44002	2754	0.965	--
总计		512482	100.000	44002			


图150 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-265-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:16:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	501151	100.000	42993	2749	0.964	--
总计		501151	100.000	42993			


图151 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-266-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:22:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	505186	100.000	43368	2752	0.964	--
总计		505186	100.000	43368			


图152 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-267-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:27:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	508429	100.000	43678	2752	0.965	--
总计		508429	100.000	43678			


图153 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-268-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:32:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	511418	100.000	43919	2750	0.965	--
总计		511418	100.000	43919			


图154 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-269-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:38:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	513613	100.000	44104	2750	0.965	--
总计		513613	100.000	44104			


图155 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-270-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:43:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:12:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	516086	100.000	44316	2751	0.965	--
总计		516086	100.000	44316			


图156 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-271-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:49:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.002	506318	100.000	43449	2749	0.964	--
总计		506318	100.000	43449			


图157 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-272-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:54:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.003	508865	100.000	43717	2752	0.965	--
总计		508865	100.000	43717			


图158 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-273-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 01:59:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:12:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.003	513875	100.000	44135	2753	0.965	--
总计		513875	100.000	44135			


图159 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-274-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:05:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.003	516295	100.000	44303	2748	0.965	--
总计		516295	100.000	44303			


图160 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-275-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:10:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.004	515128	100.000	44242	2751	0.965	--
总计		515128	100.000	44242			

图161 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-276-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-17
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:15:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.004	520212	100.000	44683	2750	0.965	--
总计		520212	100.000	44683			

图162 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-277-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-26
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:21:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.005	507678	100.000	43556	2747	0.964	--
总计		507678	100.000	43556			

图163 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-278-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-35
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:26:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.005	510017	100.000	43795	2749	0.965	--
总计		510017	100.000	43795			

图164 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-279-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:31:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.005	517359	100.000	44420	2750	0.965	--
总计		517359	100.000	44420			


图165 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-280-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:37:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	4.005	519191	100.000	44518	2747	0.965	--
总计		519191	100.000	44518			

图166 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱


自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转-极限转速-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-281-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:42:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/09/25 09:13:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.996	554233	100.000	47265	2704	0.964	--
总计		554233	100.000	47265			


图167 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速:2.5ml/min
 柱 温:30°C 波长:210nm
 数据文件名: RC\$QTL-3106 - 27-6/27-282-2 - zzp-25092201-3p-rcqx-pH6.8+2sdsjz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-3106 - QTL-3106-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-3106 - 20250924-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/09/25 02:48:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/09/25 09:13:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 210nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.997	552972	100.000	47181	2707	0.964	--
总计		552972	100.000	47181			

图168 替普瑞酮颗粒溶出曲线测定HPLC图谱
 自制品-25092201-3批-pH6.8(内含2%SDS)介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2