SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-540-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 11:58:18 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:22:50 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-541-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:02:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:22:53 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.138	1714133	100.000	245698	4827	1.156	--
总计		1714133	100.000	245698			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-542-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:06:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:22:56 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.137	1715730	100.000	246014	4823	1.152	--
总计		1715730	100.000	246014			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-543-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:09:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:22:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.135	1715023	100.000	245413	4819	1.148	--
总计		1715023	100.000	245413			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-544-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:13:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:23:01 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1716769	100.000	245874	4816	1.144	--
总计		1716769	100.000	245874			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-545-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:17:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:23:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.136	1716336	100.000	245738	4809	1.141	--
总计		1716336	100.000	245738			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-546-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:21:34 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:23:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	1560851	100.000	223176	4795	1.132	--
总计		1560851	100.000	223176			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-547-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:25:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:23:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.139	1569509	100.000	223150	4737	1.126	--
总计		1569509	100.000	223150			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-548-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:29:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:23:12 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.140	1606817	100.000	227400	4695	1.122	--
总计		1606817	100.000	227400			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-549-4 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:33:10
实验者: xiexinhui
处理时间（V4）: 2025/09/26 09:23:15
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.141	1577051	100.000	223020	4696	1.120	--
总计		1577051	100.000	223020			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-550-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:37:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.141	1594609	100.000	225093	4681	1.118	--
总计		1594609	100.000	225093			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-551-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:40:54 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1564776	100.000	220940	4689	1.116	--
总计		1564776	100.000	220940			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱 温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-552-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:44:46　　实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:22　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	1645252	100.000	232916	4726	1.118	--
总计		1645252	100.000	232916			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-553-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:48:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	1636496	100.000	230283	4665	1.113	--
总计		1636496	100.000	230283			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-554-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:52:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:27
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.142	1662799	100.000	232970	4635	1.111	--
总计		1662799	100.000	232970			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-555-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:56:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	1624903	100.000	227955	4642	1.110	--
总计		1624903	100.000	227955			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-556-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:00:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	1645445	100.000	230572	4623	1.108	--
总计		1645445	100.000	230572			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-557-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:04:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.143	1623833	100.000	227214	4612	1.107	--
总计		1623833	100.000	227214			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-558-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:07:59
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:38
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1613443	100.000	228461	4706	1.112	--
总计		1613443	100.000	228461			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-559-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:11:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:40 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	1634863	100.000	229932	4641	1.107	--
总计		1634863	100.000	229932			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-560-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:15:43
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:43
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.144	1657176	100.000	232351	4613	1.105	--
总计		1657176	100.000	232351			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-561-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:19:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:45 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	1628935	100.000	227772	4589	1.104	--
总计		1628935	100.000	227772			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-562-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:23:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1620122	100.000	227359	4616	1.103	--
总计		1620122	100.000	227359			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-563-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:27:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:50 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1608718	100.000	224985	4585	1.101	--
总计		1608718	100.000	224985			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-564-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:31:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:53 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	1616997	100.000	228032	4663	1.104	--
总计		1616997	100.000	228032			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-565-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:35:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1612094	100.000	225675	4593	1.101	--
总计		1612094	100.000	225675			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-566-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:38:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:23:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	1628166	100.000	227641	4576	1.099	--
总计		1628166	100.000	227641			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-567-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:42:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:01 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1606233	100.000	224138	4558	1.097	--
总计		1606233	100.000	224138			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-568-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:46:37 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	1606282	100.000	224262	4560	1.098	--
总计		1606282	100.000	224262			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-569-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:50:30 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:06 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.145	1606301	100.000	223293	4525	1.095	--
总计		1606301	100.000	223293			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-570-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:54:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.146	1590194	100.000	223218	4612	1.099	--
总计		1590194	100.000	223218			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-571-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:58:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:11 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.089	1601181	100.000	231917	4730	1.097	--
总计		1601181	100.000	231917			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-572-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:02:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:14 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1642367	100.000	234980	4417	1.096	--
总计		1642367	100.000	234980			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-573-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:06:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1569406	100.000	225901	4449	1.098	--
总计		1569406	100.000	225901			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-574-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:09:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:19 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	1596454	100.000	229271	4421	1.097	--
总计		1596454	100.000	229271			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-575-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:13:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:22 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1597610	100.000	228539	4395	1.094	--
总计		1597610	100.000	228539			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-576-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:17:37 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1610950	100.000	232381	4467	1.098	--
总计		1610950	100.000	232381			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-577-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:21:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:28 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1578762	100.000	226547	4421	1.095	--
总计		1578762	100.000	226547			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-578-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:25:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	1623311	100.000	232051	4380	1.093	--
总计		1623311	100.000	232051			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-579-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:29:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:33 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1584390	100.000	226604	4387	1.093	--
总计		1584390	100.000	226604			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-580-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:33:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:36 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	1588669	100.000	227412	4390	1.093	--
总计		1588669	100.000	227412			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-581-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:36:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	1565805	100.000	223446	4362	1.092	--
总计		1565805	100.000	223446			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-582-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:40:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:41 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.011	1746446	100.000	251532	4452	1.096	--
总计		1746446	100.000	251532			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-34/28-583-3 - zzp-2025031021p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:44:44 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:24:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	1745626	100.000	251153	4442	1.095	--
总计		1745626	100.000	251153			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-584-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:48:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:28 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-585-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:52:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	1729415	100.000	248435	4427	1.093	--
总计		1729415	100.000	248435			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-586-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:56:27 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:34 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	1728252	100.000	247848	4416	1.093	--
总计		1728252	100.000	247848			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-587-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:00:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:37 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	1724285	100.000	247246	4413	1.092	--
总计		1724285	100.000	247246			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-588-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:04:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:40 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	1727124	100.000	247491	4409	1.091	--
总计		1727124	100.000	247491			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-589-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:08:10 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:42 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.012	1723879	100.000	246879	4403	1.091	--
总计		1723879	100.000	246879			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-590-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:12:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:45 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1199344	100.000	170523	4349	1.089	--
总计		1199344	100.000	170523			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-591-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:15:55 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1199599	100.000	170089	4320	1.088	--
总计		1199599	100.000	170089			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-592-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:19:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:50 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1193094	100.000	169052	4319	1.087	--
总计		1193094	100.000	169052			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-593-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:23:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:53 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1204943	100.000	170056	4280	1.086	--
总计		1204943	100.000	170056			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-594-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:27:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1204237	100.000	170633	4326	1.087	--
总计		1204237	100.000	170633			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-595-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:31:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:25:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1215569	100.000	171684	4295	1.086	--
总计		1215569	100.000	171684			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-596-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:35:22 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:00 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1357378	100.000	191910	4307	1.086	--
总计		1357378	100.000	191910			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-597-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:39:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:03 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1364470	100.000	192489	4277	1.086	--
总计		1364470	100.000	192489			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-598-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:43:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:05 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1361833	100.000	191977	4271	1.085	--
总计		1361833	100.000	191977			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-599-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:47:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:08 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1328245	100.000	189250	4345	1.084	--
总计		1328245	100.000	189250			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-600-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:50:55 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:11 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1364532	100.000	196660	4230	1.086	--
总计		1364532	100.000	196660			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-601-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:54:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:13 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1356032	100.000	195144	4212	1.086	--
总计		1356032	100.000	195144			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-602-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:58:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:16 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1405708	100.000	202862	4236	1.086	--
总计		1405708	100.000	202862			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-603-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:02:34 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:18 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1406930	100.000	202368	4208	1.086	--
总计		1406930	100.000	202368			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-604-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:06:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:21 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1415016	100.000	203242	4195	1.085	--
总计		1415016	100.000	203242			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-605-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:10:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:24 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1379205	100.000	198035	4199	1.086	--
总计		1379205	100.000	198035			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-606-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:14:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:27 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1414399	100.000	202749	4188	1.086	--
总计		1414399	100.000	202749			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-607-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:18:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1397239	100.000	200646	4201	1.086	--
总计		1397239	100.000	200646			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-608-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:22:02
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:33
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1440630	100.000	206398	4192	1.086	--
总计		1440630	100.000	206398			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-609-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:25:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1431089	100.000	204876	4180	1.086	--
总计		1431089	100.000	204876			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-610-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:29:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1440812	100.000	206270	4189	1.087	--
总计		1440812	100.000	206270			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-611-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:33:43 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:41 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	1411205	100.000	201729	4164	1.087	--
总计		1411205	100.000	201729			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-612-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:37:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	1451866	100.000	207162	4164	1.086	--
总计		1451866	100.000	207162			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-613-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:41:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	1445402	100.000	206182	4154	1.086	--
总计		1445402	100.000	206182			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-614-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:45:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	1477767	100.000	211155	4167	1.086	--
总计		1477767	100.000	211155			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-615-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:49:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	1485049	100.000	211500	4144	1.085	--
总计		1485049	100.000	211500			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-616-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:53:10 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1461384	100.000	208767	4167	1.085	--
总计		1461384	100.000	208767			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-617-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:57:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1468949	100.000	209265	4138	1.084	--
总计		1468949	100.000	209265			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-618-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:00:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:26:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1487157	100.000	211755	4133	1.084	--
总计		1487157	100.000	211755			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-619-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:04:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1475215	100.000	209809	4120	1.084	--
总计		1475215	100.000	209809			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-620-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:08:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1547273	100.000	220500	4133	1.083	--
总计		1547273	100.000	220500			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-621-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:12:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1531477	100.000	218106	4125	1.083	--
总计		1531477	100.000	218106			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-622-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:16:34 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1554613	100.000	220936	4105	1.083	--
总计		1554613	100.000	220936			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-623-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:20:27 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:12 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1517891	100.000	215925	4104	1.082	--
总计		1517891	100.000	215925			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-624-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:24:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:15 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1533623	100.000	218019	4103	1.082	--
总计		1533623	100.000	218019			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-625-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:28:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1560629	100.000	221311	4081	1.082	--
总计		1560629	100.000	221311			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-626-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:32:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.934	1739294	100.000	247007	4120	1.078	--
总计		1739294	100.000	247007			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-627-3 - zzp-2025031121p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:36:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:22 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1740205	100.000	247406	4114	1.078	--
总计		1740205	100.000	247406			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-628-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:39:54 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-629-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:43:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:28 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1752785	100.000	248992	4103	1.077	--
总计		1752785	100.000	248992			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-630-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:47:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1753763	100.000	248836	4095	1.076	--
总计		1753763	100.000	248836			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-631-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:51:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:33 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1752525	100.000	248596	4090	1.076	--
总计		1752525	100.000	248596			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-632-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:55:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1745342	100.000	247384	4081	1.076	--
总计		1745342	100.000	247384			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-633-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:59:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1749431	100.000	247864	4077	1.075	--
总计		1749431	100.000	247864			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-634-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:03:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:40 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1277768	100.000	179569	4002	1.078	--
总计		1277768	100.000	179569			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-635-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:06:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:43 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1243776	100.000	175479	4039	1.078	--
总计		1243776	100.000	175479			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-636-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:10:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1254384	100.000	176927	4031	1.080	--
总计		1254384	100.000	176927			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-637-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:14:43 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1281009	100.000	180638	4029	1.080	--
总计		1281009	100.000	180638			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-638-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:18:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1244659	100.000	175500	4029	1.078	--
总计		1244659	100.000	175500			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-639-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:22:27 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1301608	100.000	183340	4025	1.079	--
总计		1301608	100.000	183340			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-640-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:26:19 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1427734	100.000	200371	3992	1.081	--
总计		1427734	100.000	200371			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-641-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:30:11 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:27:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1387604	100.000	195173	4007	1.080	--
总计		1387604	100.000	195173			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-642-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:34:01 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1391376	100.000	195336	3995	1.079	--
总计		1391376	100.000	195336			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-643-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:37:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1412342	100.000	198170	3992	1.081	--
总计		1412342	100.000	198170			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-644-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:41:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1386049	100.000	194445	3985	1.079	--
总计		1386049	100.000	194445			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-645-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:45:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1442130	100.000	201825	3966	1.079	--
总计		1442130	100.000	201825			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-646-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:49:30
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:12
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.935	1482252	100.000	206441	3935	1.081	--
总计		1482252	100.000	206441			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-647-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:53:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:15 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1436728	100.000	201204	3972	1.080	--
总计		1436728	100.000	201204			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-648-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:57:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1454117	100.000	203402	3961	1.078	--
总计		1454117	100.000	203402			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-649-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:01:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1480175	100.000	206703	3952	1.080	--
总计		1480175	100.000	206703			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-650-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:04:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:23 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1428742	100.000	199680	3952	1.080	--
总计		1428742	100.000	199680			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-651-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:08:47 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1458005	100.000	203935	3960	1.077	--
总计		1458005	100.000	203935			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-652-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:12:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:28 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1472054	100.000	205252	3937	1.079	--
总计		1472054	100.000	205252			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-653-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:16:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.936	1478958	100.000	205622	3913	1.080	--
总计		1478958	100.000	205622			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-654-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:20:20 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:33 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.938	1473557	100.000	205716	3943	1.077	--
总计		1473557	100.000	205716			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-655-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:24:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:36 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1479619	100.000	206236	3932	1.077	--
总计		1479619	100.000	206236			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-656-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:28:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1458814	100.000	203272	3928	1.077	--
总计		1458814	100.000	203272			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-657-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:31:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:41 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1480275	100.000	206287	3931	1.076	--
总计		1480275	100.000	206287			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-658-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:35:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.937	1527690	100.000	211794	3886	1.077	--
总计		1527690	100.000	211794			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-659-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:39:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1471623	100.000	205089	3936	1.076	--
总计		1471623	100.000	205089			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-660-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:43:30 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1496159	100.000	207711	3904	1.076	--
总计		1496159	100.000	207711			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-661-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:47:22 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1510000	100.000	209620	3903	1.075	--
总计		1510000	100.000	209620			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-662-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:51:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1493313	100.000	206788	3877	1.077	--
总计		1493313	100.000	206788			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-663-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:55:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:56 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1524032	100.000	211167	3888	1.076	--
总计		1524032	100.000	211167			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-664-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:58:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:28:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1574571	100.000	217337	3852	1.075	--
总计		1574571	100.000	217337			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-665-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:02:47 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:01 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1539949	100.000	212663	3860	1.074	--
总计		1539949	100.000	212663			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-666-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:06:41 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.940	1553879	100.000	214530	3860	1.075	--
总计		1553879	100.000	214530			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-667-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:10:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1540597	100.000	212805	3873	1.075	--
总计		1540597	100.000	212805			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-668-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:14:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1528906	100.000	210743	3854	1.075	--
总计		1528906	100.000	210743			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-669-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:18:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:12 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1577770	100.000	217062	3841	1.075	--
总计		1577770	100.000	217062			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-670-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:22:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:14 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1762399	100.000	244138	3881	1.068	--
总计		1762399	100.000	244138			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-671-3 - zzp-2025031221p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:26:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1762957	100.000	243828	3869	1.068	--
总计		1762957	100.000	243828			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-672-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:29:54 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:19 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-673-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:33:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:22 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1783743	100.000	246130	3851	1.067	--
总计		1783743	100.000	246130			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-674-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:37:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1783434	100.000	246235	3855	1.068	--
总计		1783434	100.000	246235			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-675-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:41:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:27 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1781826	100.000	245529	3838	1.067	--
总计		1781826	100.000	245529			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-676-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:45:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1773494	100.000	244354	3838	1.067	--
总计		1773494	100.000	244354			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-677-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:49:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.939	1768734	100.000	243559	3834	1.068	--
总计		1768734	100.000	243559			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-678-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-1
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:53:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.941	1512501	100.000	207595	3825	1.072	--
总计		1512501	100.000	207595			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-679-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:57:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1468682	100.000	201578	3830	1.070	--
总计		1468682	100.000	201578			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-680-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:00:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:40 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1458507	100.000	199837	3821	1.070	--
总计		1458507	100.000	199837			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-681-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-28
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:04:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:43 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1466581	100.000	200533	3815	1.069	--
总计		1466581	100.000	200533			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-682-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:08:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1485236	100.000	202941	3802	1.070	--
总计		1485236	100.000	202941			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-683-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:12:34 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1489741	100.000	203851	3822	1.070	--
总计		1489741	100.000	203851			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-684-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-2
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:16:27 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1562797	100.000	213278	3795	1.071	--
总计		1562797	100.000	213278			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-685-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:20:19
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:54
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1543149	100.000	210473	3782	1.070	--
总计		1543149	100.000	210473			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-686-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:24:12
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:56
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1519357	100.000	207212	3785	1.070	--
总计		1519357	100.000	207212			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-687-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:28:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:29:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1543173	100.000	210152	3773	1.071	--
总计		1543173	100.000	210152			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-688-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:31:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:01 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1564249	100.000	212755	3762	1.070	--
总计		1564249	100.000	212755			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-689-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:35:49 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.942	1588295	100.000	215777	3756	1.072	--
总计		1588295	100.000	215777			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-690-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:39:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1571006	100.000	213572	3754	1.069	--
总计		1571006	100.000	213572			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-691-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:43:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1547093	100.000	210380	3757	1.071	--
总计		1547093	100.000	210380			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-692-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:47:28
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:13
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1524493	100.000	206849	3736	1.069	--
总计		1524493	100.000	206849			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-693-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:51:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:15 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1527747	100.000	207413	3741	1.071	--
总计		1527747	100.000	207413			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-694-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-39
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:55:13
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:18
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1592840	100.000	215502	3713	1.070	--
总计		1592840	100.000	215502			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-695-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 21:59:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:21 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1573216	100.000	213277	3729	1.071	--
总计		1573216	100.000	213277			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-696-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-4
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:02:58 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:24 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1614620	100.000	217816	3690	1.072	--
总计		1614620	100.000	217816			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-697-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:06:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.943	1599469	100.000	215198	3677	1.073	--
总计		1599469	100.000	215198			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-698-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:10:44 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:29 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1576927	100.000	212092	3668	1.071	--
总计		1576927	100.000	212092			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-699-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:14:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1578436	100.000	212434	3676	1.072	--
总计		1578436	100.000	212434			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-700-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:18:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:34 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1589539	100.000	213671	3659	1.071	--
总计		1589539	100.000	213671			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-701-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-49
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:22:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:36 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1632491	100.000	219340	3661	1.072	--
总计		1632491	100.000	219340			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-702-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-5
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:26:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:39 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1591791	100.000	214223	3667	1.070	--
总计		1591791	100.000	214223			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-703-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:30:10 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:41 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1578610	100.000	211838	3648	1.071	--
总计		1578610	100.000	211838			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-704-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:34:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1586591	100.000	212321	3623	1.071	--
总计		1586591	100.000	212321			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-705-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:37:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:47 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1582712	100.000	211782	3626	1.071	--
总计		1582712	100.000	211782			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-706-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:41:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1573929	100.000	210850	3631	1.070	--
总计		1573929	100.000	210850			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-707-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:45:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:52 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1622705	100.000	216787	3613	1.071	--
总计		1622705	100.000	216787			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-708-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:49:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1588672	100.000	212779	3629	1.069	--
总计		1588672	100.000	212779			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-709-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-15
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:53:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1565343	100.000	209114	3610	1.070	--
总计		1565343	100.000	209114			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-710-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 22:57:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:30:59 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.947	1550032	100.000	207079	3612	1.070	--
总计		1550032	100.000	207079			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-711-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 23:01:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:31:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1561530	100.000	208382	3600	1.069	--
总计		1561530	100.000	208382			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-712-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-42
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 23:05:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:31:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1601807	100.000	212878	3569	1.071	--
总计		1601807	100.000	212878			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-713-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 23:08:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:31:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.946	1621719	100.000	215295	3561	1.070	--
总计		1621719	100.000	215295			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-714-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 23:12:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:31:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.945	1801316	100.000	240117	3594	1.060	--
总计		1801316	100.000	240117			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-35/28-715-3 - cbzj-ACSB24005p-js6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX277-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 23:16:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:31:12 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.944	1799843	100.000	239476	3581	1.060	--
总计		1799843	100.000	239476			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1233-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 11:58:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:08 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1234-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:01:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1731023	100.000	255431	5054	1.044	--
总计		1731023	100.000	255431			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1235-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:05:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:13 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.149	1731532	100.000	255265	5027	1.045	--
总计		1731532	100.000	255265			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1236-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:09:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:16 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1731426	100.000	255465	5023	1.044	--
总计		1731426	100.000	255465			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1237-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:13:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:19 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1730944	100.000	255481	5024	1.043	--
总计		1730944	100.000	255481			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1238-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:17:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:21 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.148	1731167	100.000	255479	5025	1.042	--
总计		1731167	100.000	255479			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1239-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-1
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:21:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:24 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1630128	100.000	236407	4875	1.030	--
总计		1630128	100.000	236407			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1240-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:25:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1636090	100.000	237307	4878	1.029	--
总计		1636090	100.000	237307			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1241-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:29:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:29 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1621346	100.000	234385	4839	1.025	--
总计		1621346	100.000	234385			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1242-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-28
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:33:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.150	1608359	100.000	232609	4855	1.025	--
总计		1608359	100.000	232609			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1243-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:36:52 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:34 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.151	1602093	100.000	230824	4830	1.024	--
总计		1602093	100.000	230824			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1244-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:40:44 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:37 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	1601464	100.000	231504	4860	1.022	--
总计		1601464	100.000	231504			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1245-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-2
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:44:36
实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:40
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1649828	100.000	239583	4887	1.024	--
总计		1649828	100.000	239583			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1246-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-11
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:48:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:43 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1669213	100.000	242396	4889	1.023	--
总计		1669213	100.000	242396			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1247-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-20
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:52:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:45 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1650278	100.000	238667	4848	1.021	--
总计		1650278	100.000	238667			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1248-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-29
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 12:56:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:48 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	1648113	100.000	238369	4844	1.020	--
总计		1648113	100.000	238369			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1249-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:00:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:50 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	1652297	100.000	238440	4819	1.018	--
总计		1652297	100.000	238440			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1250-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:03:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:53 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	1654483	100.000	238671	4820	1.018	--
总计		1654483	100.000	238671			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1251-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-3
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:07:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1643827	100.000	238538	4879	1.020	--
总计		1643827	100.000	238538			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1252-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:11:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:33:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1656539	100.000	240085	4869	1.019	--
总计		1656539	100.000	240085			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1253-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-21
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:15:34 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:01 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.155	1652700	100.000	238114	4802	1.016	--
总计		1652700	100.000	238114			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1254-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:19:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:03 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1649049	100.000	237218	4789	1.014	--
总计		1649049	100.000	237218			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1255-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-39
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:23:18 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:06 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1641713	100.000	236297	4801	1.014	--
总计		1641713	100.000	236297			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1256-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:27:10 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.156	1638945	100.000	235573	4786	1.013	--
总计		1638945	100.000	235573			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1257-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-4
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:31:03 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:11 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	1618744	100.000	233682	4835	1.015	--
总计		1618744	100.000	233682			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1258-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:34:55 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:14 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	1640353	100.000	236341	4825	1.014	--
总计		1640353	100.000	236341			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1259-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:38:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	1643466	100.000	235455	4764	1.011	--
总计		1643466	100.000	235455			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1260-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:42:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	1639086	100.000	234142	4734	1.010	--
总计		1639086	100.000	234142			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1261-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:46:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:34:22 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.158	1646081	100.000	234502	4724	1.009	--
总计		1646081	100.000	234502			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1262-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-49
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:50:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.158	1628669	100.000	232560	4738	1.010	--
总计		1628669	100.000	232560			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1263-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-5
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:54:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:28 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.157	1628618	100.000	233313	4767	1.010	--
总计		1628618	100.000	233313			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1264-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 13:58:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.123	1631288	100.000	243900	5078	1.017	--
总计		1631288	100.000	243900			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1265-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:01:58 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:33 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.007	1618156	100.000	240318	4641	1.014	--
总计		1618156	100.000	240318			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1266-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:05:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:36 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1652956	100.000	244862	4605	1.012	--
总计		1652956	100.000	244862			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1267-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:09:41 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:39 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1617751	100.000	240136	4622	1.014	--
总计		1617751	100.000	240136			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1268-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:13:33 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:41 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1603831	100.000	238347	4638	1.014	--
总计		1603831	100.000	238347			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1269-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:17:25 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1606805	100.000	239251	4656	1.015	--
总计		1606805	100.000	239251			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1270-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-15
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:21:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1629962	100.000	242186	4633	1.014	--
总计		1629962	100.000	242186			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1271-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:25:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1614473	100.000	239079	4603	1.012	--
总计		1614473	100.000	239079			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1272-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:29:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:52 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.004	1601260	100.000	236876	4592	1.012	--
总计		1601260	100.000	236876			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1273-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-42
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:32:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1627554	100.000	239727	4542	1.010	--
总计		1627554	100.000	239727			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-36/26-1274-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:36:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:34:58 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1621530	100.000	238798	4550	1.011	--
总计		1621530	100.000	238798			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-37/26-1275-2 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:40:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:38:43 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.005	1772133	100.000	266568	4728	1.017	--
总计		1772133	100.000	266568			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-38/26-1276-3 - zzp-2025031021p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 1-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:44:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V3）: 2025/09/26 09:40:00 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.006	1772574	100.000	266227	4710	1.017	--
总计		1772574	100.000	266227			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1277-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:48:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:40:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1278-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:52:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:40:52 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1742719	100.000	259524	4698	1.013	--
总计		1742719	100.000	259524			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1279-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 14:56:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:40:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1743869	100.000	259597	4695	1.013	--
总计		1743869	100.000	259597			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱　温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1280-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:00:09　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:40:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1743298	100.000	259352	4689	1.013	--
总计		1743298	100.000	259352			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1281-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:04:02 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:00 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1742960	100.000	259084	4678	1.012	--
总计		1742960	100.000	259084			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1282-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:07:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	1742144	100.000	258880	4678	1.012	--
总计		1742144	100.000	258880			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1283-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-1
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:11:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:05 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1268487	100.000	187136	4623	1.010	--
总计		1268487	100.000	187136			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1284-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:15:43 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:08 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1238571	100.000	182491	4618	1.009	--
总计		1238571	100.000	182491			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1285-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:19:35 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1255647	100.000	183734	4543	1.007	--
总计		1255647	100.000	183734			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1286-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-28
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:23:28 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:13 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1229108	100.000	180276	4569	1.008	--
总计		1229108	100.000	180276			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1287-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:27:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:16 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1265565	100.000	185457	4555	1.007	--
总计		1265565	100.000	185457			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1288-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:31:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:18 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1270263	100.000	185469	4526	1.006	--
总计		1270263	100.000	185469			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1289-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-2
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:35:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:21 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1420743	100.000	208318	4571	1.007	--
总计		1420743	100.000	208318			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱 温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1290-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-11
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:39:01　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:23　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1378575	100.000	201649	4562	1.006	--
总计		1378575	100.000	201649			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1291-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:42:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1384336	100.000	202251	4527	1.007	--
总计		1384336	100.000	202251			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1292-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-29
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:46:47
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:28
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1383948	100.000	201770	4497	1.006	--
总计		1383948	100.000	201770			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1293-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:50:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1394431	100.000	203414	4516	1.005	--
总计		1394431	100.000	203414			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1294-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:54:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:33 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1399537	100.000	203950	4506	1.005	--
总计		1399537	100.000	203950			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1295-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-3
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 15:58:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:36 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1471627	100.000	214915	4526	1.006	--
总计		1471627	100.000	214915			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1296-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:02:18 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:38 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1431100	100.000	208704	4519	1.005	--
总计		1431100	100.000	208704			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1297-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-21
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:06:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:41 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1451055	100.000	211017	4477	1.005	--
总计		1451055	100.000	211017			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1298-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:10:05 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1428131	100.000	207700	4475	1.005	--
总计		1428131	100.000	207700			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1299-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-39
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:13:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:46 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1450886	100.000	211025	4476	1.005	--
总计		1450886	100.000	211025			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1300-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:17:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1456062	100.000	211558	4459	1.005	--
总计		1456062	100.000	211558			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1301-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:21:46 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:51 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1507886	100.000	219649	4490	1.005	--
总计		1507886	100.000	219649			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1302-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:25:41 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1447321	100.000	211121	4498	1.005	--
总计		1447321	100.000	211121			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1303-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:29:36 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:41:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1467974	100.000	213314	4463	1.004	--
总计		1467974	100.000	213314			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1304-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:33:29 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:00 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1429742	100.000	208163	4483	1.004	--
总计		1429742	100.000	208163			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1305-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:37:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1465759	100.000	213041	4463	1.004	--
总计		1465759	100.000	213041			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1306-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-49
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:41:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:05 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1481201	100.000	214706	4442	1.004	--
总计		1481201	100.000	214706			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1307-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:45:10 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1531697	100.000	222858	4480	1.005	--
总计		1531697	100.000	222858			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1308-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:49:03 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:11 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.015	1493688	100.000	216874	4457	1.004	--
总计		1493688	100.000	216874			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1309-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:52:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:13 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1500413	100.000	217262	4433	1.004	--
总计		1500413	100.000	217262			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1310-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 16:56:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:16 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1484405	100.000	215034	4438	1.004	--
总计		1484405	100.000	215034			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1311-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:00:44 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:19 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1500218	100.000	217207	4430	1.004	--
总计		1500218	100.000	217207			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1312-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:04:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:21 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1527567	100.000	220700	4406	1.003	--
总计		1527567	100.000	220700			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1313-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:08:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:24 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1583884	100.000	230174	4466	1.004	--
总计		1583884	100.000	230174			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1314-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-15
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:12:26 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:26 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1550874	100.000	224646	4436	1.003	--
总计		1550874	100.000	224646			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1315-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:16:20 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:29 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.014	1559141	100.000	225075	4406	1.003	--
总计		1559141	100.000	225075			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1316-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:20:12 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:31 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.013	1544593	100.000	222895	4392	1.003	--
总计		1544593	100.000	222895			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1317-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-42
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:24:06 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:34 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	1554835	100.000	224106	4416	1.003	--
总计		1554835	100.000	224106			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1318-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:27:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:37 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.023	1563955	100.000	224708	4393	1.003	--
总计		1563955	100.000	224708			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1319-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:31:53 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:39 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1773520	100.000	256603	4455	1.001	--
总计		1773520	100.000	256603			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1320-2 - zzp-2025031121p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 2-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:35:47 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:42 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	1776025	100.000	256721	4444	1.000	--
总计		1776025	100.000	256721			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1321-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-rj.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-9
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:39:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1322-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:43:32 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:47 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1764092	100.000	254385	4437	1.001	--
总计		1764092	100.000	254385			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1323-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:47:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1765512	100.000	254158	4433	1.001	--
总计		1765512	100.000	254158			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1324-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:51:17 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:52 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1763624	100.000	253835	4423	1.000	--
总计		1763624	100.000	253835			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1325-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:55:09 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:55 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1762385	100.000	253537	4417	1.000	--
总计		1762385	100.000	253537			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1326-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-18
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 17:59:00 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:57 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	1762636	100.000	253470	4409	0.999	--
总计		1762636	100.000	253470			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1327-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-1
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:02:52
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:42:59
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1336619	100.000	188282	4195	0.998	--
总计		1336619	100.000	188282			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1328-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-10
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:06:45 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1481650	100.000	208100	4185	0.998	--
总计		1481650	100.000	208100			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1329-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-19
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:10:38 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:04 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1336088	100.000	187360	4175	0.999	--
总计		1336088	100.000	187360			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1330-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-28
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:14:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:07 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1354020	100.000	190112	4193	0.999	--
总计		1354020	100.000	190112			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1331-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-37
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:18:23 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:09 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1313528	100.000	184484	4188	0.998	--
总计		1313528	100.000	184484			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1332-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-5min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-46
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:22:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:12 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1376972	100.000	193060	4167	0.998	--
总计		1376972	100.000	193060			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱 温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1333-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-2
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:26:05　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:15　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1466008	100.000	204779	4146	0.999	--
总计		1466008	100.000	204779			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1334-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-11
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:29:56 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:17 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.016	1482737	100.000	206955	4121	0.998	--
总计		1482737	100.000	206955			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1335-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-20
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:33:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1472746	100.000	205316	4120	0.997	--
总计		1472746	100.000	205316			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1336-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-29
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:37:39 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:22 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	1481575	100.000	207079	4134	0.999	--
总计		1481575	100.000	207079			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1337-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-38
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:41:30 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:25 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1455911	100.000	202837	4112	0.997	--
总计		1455911	100.000	202837			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1338-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-10min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-47
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:45:21 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:27 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1503734	100.000	209538	4116	0.997	--
总计		1503734	100.000	209538			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1339-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-3
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:49:13 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1497164	100.000	209052	4136	0.999	--
总计		1497164	100.000	209052			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1340-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-12
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:53:04 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1490735	100.000	208944	4171	0.999	--
总计		1490735	100.000	208944			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1341-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-21
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 18:56:57 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:35 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1495358	100.000	208282	4120	0.997	--
总计		1495358	100.000	208282			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1342-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-30
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:00:48 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:37 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	1513585	100.000	211719	4143	0.998	--
总计		1513585	100.000	211719			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱 温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1343-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-39
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:04:39　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:39　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	1486942	100.000	207494	4126	0.999	--
总计		1486942	100.000	207494			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1344-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-15min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:08:31 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:42 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.017	1552358	100.000	215310	4081	0.997	--
总计		1552358	100.000	215310			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1345-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-4
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:12:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:44 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1514925	100.000	210658	4102	0.997	--
总计		1514925	100.000	210658			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1346-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-13
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:16:15 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:47 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1536278	100.000	213719	4102	0.998	--
总计		1536278	100.000	213719			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1347-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-22
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:20:07 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:49 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.018	1522038	100.000	211020	4080	0.996	--
总计		1522038	100.000	211020			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1348-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-31
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:23:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:52 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	1530121	100.000	212704	4091	0.997	--
总计		1530121	100.000	212704			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1349-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:27:50 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:54 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1496243	100.000	207999	4086	0.997	--
总计		1496243	100.000	207999			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱　温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1350-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-20min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:31:41　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:43:57　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1564633	100.000	217383	4080	0.995	--
总计		1564633	100.000	217383			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）　　流速:2.5ml/min
柱 温:30℃　　波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1351-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-5
进样体积: 10μl　　版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:35:32　　实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:00　　处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1537393	100.000	213974	4093	0.997	--
总计		1537393	100.000	213974			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1352-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-14
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:39:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:02 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.019	1568912	100.000	217251	4052	0.996	--
总计		1568912	100.000	217251			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1353-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-23
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:43:16 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:05 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1524563	100.000	211635	4069	0.996	--
总计		1524563	100.000	211635			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1354-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-32
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:47:08 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:08 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1555869	100.000	215608	4053	0.995	--
总计		1555869	100.000	215608			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1355-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-41
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:50:59 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:10 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1546154	100.000	213313	4017	0.996	--
总计		1546154	100.000	213313			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1356-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-30min-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:54:51 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:13 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1623434	100.000	223922	4017	0.995	--
总计		1623434	100.000	223922			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1357-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-6
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 19:58:42 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:15 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.020	1572213	100.000	217189	4031	0.995	--
总计		1572213	100.000	217189			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1358-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-15
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:02:33
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:18
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.022	1582063	100.000	219177	4056	0.994	--
总计		1582063	100.000	219177			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1359-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P3.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-24
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:06:24 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:20 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1594660	100.000	218984	3978	0.994	--
总计		1594660	100.000	218984			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1360-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P4.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-33
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:10:14 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:22 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1596773	100.000	220598	4029	0.995	--
总计		1596773	100.000	220598			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm）
流速:2.5ml/min
柱 温:30℃
波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1361-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P5.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-42
进样体积: 10μl
版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:14:05
实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:25
处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1562687	100.000	215631	4020	0.995	--
总计		1562687	100.000	215631			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1362-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-jxzs-P6.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-51
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:17:55 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:27 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1621187	100.000	222551	3973	0.994	--
总计		1621187	100.000	222551			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1363-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:21:47 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:30 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1777524	100.000	249919	4195	0.992	--
总计		1777524	100.000	249919			

SHIMADZU LabSolutions

SXT-396

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(100*4.6mm,5μm） 流速:2.5ml/min
柱 温:30℃ 波长:250nm
数据文件名: RC$SXT-396 - 7-39/26-1364-2 - zzp-2025031221p-zjtj6y-rcqx-pH6.8+0.5tw20jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC$SXT-396 - SXT-396-RCQX-FX275-低温.lcm
批处理文件名: RC$SXT-396 - 20250925-FX275.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl 版本号:6.115
进样时间: 2025/09/25 20:25:40 实验者: xiexinhui
处理时间（V2）: 2025/09/26 09:44:32 处理者: xiexinhui
仪器型号：SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.021	1779641	100.000	250348	4199	0.992	--
总计		1779641	100.000	250348			