




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-529-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 11:44:51 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:15:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-530-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 11:49:15 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	272400	42907	100.000	2839	1.090	--
总计		272400	42907	100.000			

图2 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-531-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 11:53:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	272616	42906	100.000	2837	1.090	--
总计		272616	42906	100.000			

图3 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-532-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 11:58:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	273047	42812	100.000	2848	1.089	--
总计		273047	42812	100.000			

图4 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-533-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:02:27 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:09 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.224	272686	42897	100.000	2838	1.088	--
总计		272686	42897	100.000			

图5 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-534-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:06:51 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	272747	42935	100.000	2836	1.089	--
总计		272747	42935	100.000			

图6 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-535-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:11:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:15 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	202611	32811	100.000	3037	1.107	--
总计		202611	32811	100.000			

图7 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-536-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:15:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	207446	34138	100.000	3131	1.090	--
总计		207446	34138	100.000			

图8 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-537-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:19:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	202204	33084	100.000	3104	1.091	--
总计		202204	33084	100.000			

图9 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-538-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:24:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:24 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	203182	33088	100.000	3102	1.091	--
总计		203182	33088	100.000			

图10 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-539-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:28:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:26 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	206582	33744	100.000	3113	1.091	--
总计		206582	33744	100.000			

图11 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-540-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:33:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:29 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.238	197513	32258	100.000	3114	1.091	--
总计		197513	32258	100.000			

图12 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-541-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-2
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:37:30 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:32 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	229188	37305	100.000	3086	1.093	--
总计		229188	37305	100.000			

图13 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-542-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:41:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.231	234912	38343	100.000	3090	1.093	--
总计		234912	38343	100.000			

图14 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-543-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:46:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.232	235587	38337	100.000	3083	1.093	--
总计		235587	38337	100.000			

图15 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-544-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:50:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:40 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	231003	37466	100.000	3065	1.092	--
总计		231003	37466	100.000			

图16 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-545-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:55:01 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:43 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	237482	38596	100.000	3078	1.090	--
总计		237482	38596	100.000			

图17 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-546-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 12:59:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:46 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	229964	37541	100.000	3094	1.091	--
总计		229964	37541	100.000			

图18 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-547-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:03:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	238438	38688	100.000	3075	1.093	--
总计		238438	38688	100.000			

图19 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-548-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:08:10 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:52 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	243955	39661	100.000	3087	1.090	--
总计		243955	39661	100.000			

图20 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-549-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-21
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:12:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	245669	40113	100.000	3098	1.090	--
总计		245669	40113	100.000			

图21 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-550-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:16:55 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:16:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.228	239311	39151	100.000	3103	1.091	--
总计		239311	39151	100.000			

图22 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-551-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:21:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	247200	40233	100.000	3093	1.093	--
总计		247200	40233	100.000			

图23 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-552-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:25:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	241650	39348	100.000	3085	1.092	--
总计		241650	39348	100.000			

图24 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-553-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:30:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.226	240589	39213	100.000	3095	1.094	--
总计		240589	39213	100.000			

图25 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-554-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:34:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:09 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.227	247465	40319	100.000	3085	1.092	--
总计		247465	40319	100.000			

图26 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-555-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:38:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	249857	40691	100.000	3081	1.091	--
总计		249857	40691	100.000			

图27 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-556-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:43:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:15 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	242691	39694	100.000	3075	1.092	--
总计		242691	39694	100.000			

图28 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-557-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:47:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	250062	40869	100.000	3075	1.090	--
总计		250062	40869	100.000			

图29 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-558-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:51:57 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	245413	40170	100.000	3088	1.090	--
总计		245413	40170	100.000			

图30 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-559-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 13:56:20 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:24 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	242532	39693	100.000	3091	1.091	--
总计		242532	39693	100.000			

图31 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-560-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:00:43 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:27 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	248374	40469	100.000	3086	1.092	--
总计		248374	40469	100.000			

图32 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-561-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:05:06 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.225	252550	41152	100.000	3093	1.092	--
总计		252550	41152	100.000			

图33 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-562-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:09:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	243004	39682	100.000	3080	1.092	--
总计		243004	39682	100.000			

图34 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-563-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:13:51 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	251406	41178	100.000	3083	1.092	--
总计		251406	41178	100.000			

图35 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-564-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:18:14 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	248570	40686	100.000	3082	1.090	--
总计		248570	40686	100.000			

图36 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-565-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:22:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:41 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	244001	39969	100.000	3087	1.092	--
总计		244001	39969	100.000			

图37 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-566-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:27:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:44 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	249072	40797	100.000	3085	1.092	--
总计		249072	40797	100.000			

图38 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-567-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:31:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:47 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	250789	41150	100.000	3091	1.091	--
总计		250789	41150	100.000			

图39 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-568-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:35:46 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	245529	40175	100.000	3079	1.091	--
总计		245529	40175	100.000			

图40 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-569-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:40:08 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:52 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.223	252816	41368	100.000	3084	1.088	--
总计		252816	41368	100.000			

图41 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-570-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:44:31 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	249677	40955	100.000	3095	1.090	--
总计		249677	40955	100.000			

图42 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-571-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:48:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:17:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	243994	39969	100.000	3080	1.092	--
总计		243994	39969	100.000			

图43 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-572-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:53:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:01 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	248643	40737	100.000	3086	1.089	--
总计		248643	40737	100.000			

图44 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-573-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 14:57:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:04 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	252116	41381	100.000	3101	1.091	--
总计		252116	41381	100.000			

图45 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-574-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:02:02 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	244474	40034	100.000	3079	1.090	--
总计		244474	40034	100.000			

图46 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-575-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:06:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:09 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	250115	41077	100.000	3103	1.089	--
总计		250115	41077	100.000			

图47 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-576-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:10:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:12 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	249648	40910	100.000	3086	1.089	--
总计		249648	40910	100.000			

图48 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-577-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:15:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:15 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	274821	45041	100.000	3086	1.091	--
总计		274821	45041	100.000			

图49 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-578-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:19:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	269389	44197	100.000	3099	1.091	--
总计		269389	44197	100.000			

图50 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-579-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:23:58 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	271673	44441	100.000	3082	1.090	--
总计		271673	44441	100.000			

图51 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-580-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:28:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:23 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	266820	43593	100.000	3089	1.091	--
总计		266820	43593	100.000			

图52 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-581-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:32:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:26 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	273556	44689	100.000	3080	1.092	--
总计		273556	44689	100.000			

图53 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-582-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:37:09 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:29 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	267890	43759	100.000	3082	1.090	--
总计		267890	43759	100.000			

图54 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-583-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:41:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:32 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	269173	42673	100.000	2823	1.097	--
总计		269173	42673	100.000			

图55 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-584-2 - zzp-2025071721p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 1-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:45:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	269791	42708	100.000	2822	1.093	--
总计		269791	42708	100.000			

图56 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071721批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-585-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:50:21 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图57 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-586-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:54:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:40 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.202	268923	42594	100.000	2825	1.092	--
总计		268923	42594	100.000			

图58 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-587-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 15:59:10 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	268942	42713	100.000	2840	1.087	--
总计		268942	42713	100.000			

图59 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-588-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:03:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	270001	42770	100.000	2826	1.091	--
总计		270001	42770	100.000			

图60 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-589-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:08:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	269338	42804	100.000	2841	1.089	--
总计		269338	42804	100.000			

图61 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-590-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:12:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	269100	42784	100.000	2835	1.089	--
总计		269100	42784	100.000			

图62 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-591-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:16:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:54 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	201049	32937	100.000	3092	1.092	--
总计		201049	32937	100.000			

图63 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-592-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:21:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	206032	33686	100.000	3092	1.094	--
总计		206032	33686	100.000			

图64 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-593-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-19
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:25:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	202240	33202	100.000	3103	1.092	--
总计		202240	33202	100.000			

图65 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-594-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:30:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.220	195513	32102	100.000	3099	1.092	--
总计		195513	32102	100.000			

图66 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-595-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:34:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.222	211123	34608	100.000	3100	1.091	--
总计		211123	34608	100.000			

图67 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-596-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:38:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	196949	32256	100.000	3094	1.092	--
总计		196949	32256	100.000			

图68 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-597-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:43:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	218248	35650	100.000	3085	1.092	--
总计		218248	35650	100.000			

图69 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-598-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:47:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	233152	38073	100.000	3068	1.094	--
总计		233152	38073	100.000			

图70 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-599-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:52:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	228497	37242	100.000	3074	1.094	--
总计		228497	37242	100.000			

图71 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-600-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 16:56:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	224697	36833	100.000	3097	1.094	--
总计		224697	36833	100.000			

图72 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-601-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:00:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	234088	38220	100.000	3075	1.094	--
总计		234088	38220	100.000			

图73 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-602-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:05:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	226473	37060	100.000	3085	1.093	--
总计		226473	37060	100.000			

图74 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-603-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:09:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.221	229861	37824	100.000	3111	1.093	--
总计		229861	37824	100.000			

图75 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-604-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:14:01 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	246223	40264	100.000	3079	1.093	--
总计		246223	40264	100.000			

图76 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-605-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:18:25 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	240081	39264	100.000	3076	1.093	--
总计		240081	39264	100.000			

图77 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-606-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:22:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:36 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	240256	39140	100.000	3073	1.093	--
总计		240256	39140	100.000			

图78 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-607-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:27:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	246232	40141	100.000	3078	1.092	--
总计		246232	40141	100.000			

图79 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-608-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:31:36 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.219	242457	39651	100.000	3082	1.093	--
总计		242457	39651	100.000			

图80 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-609-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:36:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:44 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	234878	38476	100.000	3092	1.093	--
总计		234878	38476	100.000			

图81 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-610-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:40:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:47 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.218	250210	40839	100.000	3082	1.091	--
总计		250210	40839	100.000			

图82 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-611-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:44:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:50 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	244371	40034	100.000	3082	1.093	--
总计		244371	40034	100.000			

图83 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-612-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:49:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:53 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	244482	40104	100.000	3092	1.093	--
总计		244482	40104	100.000			

图84 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-613-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:53:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	248133	40639	100.000	3091	1.092	--
总计		248133	40639	100.000			

图85 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-614-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 17:57:59 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:58 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	247303	40388	100.000	3084	1.093	--
总计		247303	40388	100.000			

图86 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-615-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:02:23 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:01 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	239032	39306	100.000	3099	1.093	--
总计		239032	39306	100.000			

图87 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-616-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:06:47 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:04 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	252789	41332	100.000	3076	1.091	--
总计		252789	41332	100.000			

图88 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-617-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:11:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:07 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	246712	40504	100.000	3076	1.094	--
总计		246712	40504	100.000			

图89 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-618-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:15:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:10 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	248379	40508	100.000	3082	1.093	--
总计		248379	40508	100.000			

图90 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-619-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-41
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:19:58 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	251356	41076	100.000	3078	1.092	--
总计		251356	41076	100.000			

图91 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-620-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-50
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:24:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:15 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	249667	40969	100.000	3092	1.094	--
总计		249667	40969	100.000			

图92 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-621-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-6
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:28:46 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:18 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	240811	39384	100.000	3078	1.092	--
总计		240811	39384	100.000			

图93 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-622-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-15
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:33:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:21 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	253712	41619	100.000	3080	1.093	--
总计		253712	41619	100.000			

图94 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-623-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:37:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:24 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	248394	40719	100.000	3073	1.094	--
总计		248394	40719	100.000			

图95 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-624-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-33
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:42:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:27 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	249518	40808	100.000	3077	1.092	--
总计		249518	40808	100.000			

图96 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-625-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:46:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:30 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	250769	41163	100.000	3087	1.092	--
总计		250769	41163	100.000			

图97 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-626-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:50:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:32 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	250202	41090	100.000	3093	1.092	--
总计		250202	41090	100.000			

图98 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-627-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:55:13 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:35 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	241441	39531	100.000	3076	1.093	--
总计		241441	39531	100.000			

图99 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-628-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 18:59:37 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:38 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	253645	41422	100.000	3075	1.094	--
总计		253645	41422	100.000			

图100 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-629-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-25
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:04:02 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:40 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	248144	40478	100.000	3074	1.094	--
总计		248144	40478	100.000			

图101 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-630-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-34
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:08:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:43 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	248121	40658	100.000	3071	1.094	--
总计		248121	40658	100.000			

图102 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-631-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-43
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:12:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:46 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	251033	41011	100.000	3064	1.094	--
总计		251033	41011	100.000			

图103 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-632-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:17:14 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:49 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	250858	41075	100.000	3063	1.095	--
总计		250858	41075	100.000			

图104 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-633-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-8
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:21:39 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:52 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	272041	44502	100.000	3068	1.094	--
总计		272041	44502	100.000			

图105 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-634-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:26:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:55 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.216	274764	44861	100.000	3068	1.095	--
总计		274764	44861	100.000			

图106 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-635-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-26
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:30:29 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	268284	43925	100.000	3059	1.094	--
总计		268284	43925	100.000			

图107 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-636-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:34:53 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:00 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.217	276010	45008	100.000	3068	1.095	--
总计		276010	45008	100.000			

图108 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-637-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:39:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:03 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	272851	44618	100.000	3061	1.094	--
总计		272851	44618	100.000			

图109 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-638-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:43:43 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:06 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.214	269092	44175	100.000	3082	1.096	--
总计		269092	44175	100.000			

图110 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-639-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:48:07 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:09 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	268874	42453	100.000	2796	1.100	--
总计		268874	42453	100.000			

图111 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-640-2 - zzp-2025071821p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 2-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:52:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:11 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	268528	42340	100.000	2812	1.100	--
总计		268528	42340	100.000			

图112 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071821批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-2-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-641-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-9
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 19:56:55 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:14 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图113 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-溶剂




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-642-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:01:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:17 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	269880	42499	100.000	2808	1.098	--
总计		269880	42499	100.000			

图114 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-643-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:05:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	269699	42610	100.000	2811	1.096	--
总计		269699	42610	100.000			

图115 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-2




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-644-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:10:03 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:23 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	270125	42681	100.000	2815	1.097	--
总计		270125	42681	100.000			

图116 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-3




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-645-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:14:27 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:26 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	269827	42718	100.000	2809	1.096	--
总计		269827	42718	100.000			

图117 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-4




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-646-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-18
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:18:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:29 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	270170	42753	100.000	2807	1.094	--
总计		270170	42753	100.000			

图118 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-1-5




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-647-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-1
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:23:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	204865	33523	100.000	3043	1.098	--
总计		204865	33523	100.000			

图119 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-648-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-10
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:27:35 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	210047	34336	100.000	3054	1.097	--
总计		210047	34336	100.000			

图120 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-649-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-19
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:31:57 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	205315	33604	100.000	3047	1.097	--
总计		205315	33604	100.000			

图121 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-650-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-28
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:36:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.215	194408	31722	100.000	3051	1.100	--
总计		194408	31722	100.000			

图122 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-651-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-37
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:40:42 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.212	200647	32811	100.000	3051	1.096	--
总计		200647	32811	100.000			

图123 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-652-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-46
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:45:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	195440	32033	100.000	3065	1.099	--
总计		195440	32033	100.000			

图124 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-5min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-653-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-2
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:49:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	233480	37952	100.000	3025	1.099	--
总计		233480	37952	100.000			

图125 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-654-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-11
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:53:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.213	238817	38938	100.000	3034	1.100	--
总计		238817	38938	100.000			

图126 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-655-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-20
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 20:58:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:53 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	233796	38095	100.000	3037	1.099	--
总计		233796	38095	100.000			

图127 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-656-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-29
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:02:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:56 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	227962	37094	100.000	3028	1.100	--
总计		227962	37094	100.000			

图128 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-657-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-38
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:06:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	232475	37779	100.000	3023	1.100	--
总计		232475	37779	100.000			

图129 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-658-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-47
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:11:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	221536	35930	100.000	3014	1.100	--
总计		221536	35930	100.000			

图130 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-10min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-659-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-3
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:15:41 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	244822	39821	100.000	3024	1.101	--
总计		244822	39821	100.000			

图131 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-660-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-12
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:20:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	250003	40663	100.000	3021	1.102	--
总计		250003	40663	100.000			

图132 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-661-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-21
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:24:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:11 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.211	243907	39650	100.000	3021	1.101	--
总计		243907	39650	100.000			

图133 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-662-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-30
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:28:48 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:14 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	238471	38750	100.000	3024	1.102	--
总计		238471	38750	100.000			

图134 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-663-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-39
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:33:10 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:17 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	242237	39299	100.000	3013	1.103	--
总计		242237	39299	100.000			

图135 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-664-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-48
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:37:32 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:20 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	229657	37254	100.000	3007	1.102	--
总计		229657	37254	100.000			

图136 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-15min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-665-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-4
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:41:54 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	247942	40178	100.000	3007	1.101	--
总计		247942	40178	100.000			

图137 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-666-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-13
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:46:16 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	253422	41271	100.000	3018	1.102	--
总计		253422	41271	100.000			

图138 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-667-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-22
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:50:38 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	245307	39852	100.000	3009	1.103	--
总计		245307	39852	100.000			

图139 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-668-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-31
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:55:00 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	242450	39320	100.000	3023	1.103	--
总计		242450	39320	100.000			

图140 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-669-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-40
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 21:59:22 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:34 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	244333	39636	100.000	3005	1.102	--
总计		244333	39636	100.000			

图141 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-670-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-49
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:03:44 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:37 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.210	236935	38468	100.000	3024	1.103	--
总计		236935	38468	100.000			

图142 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-20min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-671-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-5
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:08:06 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.209	248642	40269	100.000	3011	1.104	--
总计		248642	40269	100.000			

图143 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-672-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-14
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:12:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	255339	41497	100.000	3009	1.103	--
总计		255339	41497	100.000			

图144 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-673-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-23
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:16:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	247266	40140	100.000	3006	1.102	--
总计		247266	40140	100.000			

图145 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-674-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-32
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:21:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	245014	39736	100.000	3007	1.104	--
总计		245014	39736	100.000			

图146 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-675-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-41
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:25:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	246608	39977	100.000	3000	1.104	--
总计		246608	39977	100.000			

图147 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-676-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-50
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:29:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:54 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	234077	38127	100.000	3014	1.104	--
总计		234077	38127	100.000			

图148 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-30min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-677-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-6
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:34:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:57 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	249875	40750	100.000	3009	1.105	--
总计		249875	40750	100.000			

图149 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-678-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-15
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:38:40 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:59 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	256062	41602	100.000	2999	1.104	--
总计		256062	41602	100.000			

图150 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-679-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-24
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:43:02 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:02 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	245626	39931	100.000	3000	1.107	--
总计		245626	39931	100.000			

图151 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-680-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-33
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:47:24 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:05 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	247029	39975	100.000	2995	1.105	--
总计		247029	39975	100.000			

图152 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-681-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-42
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:51:45 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:08 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	246259	40009	100.000	2997	1.103	--
总计		246259	40009	100.000			

图153 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-682-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-51
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 22:56:06 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:11 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	234897	38053	100.000	2998	1.105	--
总计		234897	38053	100.000			

图154 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-45min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-683-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-7
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:00:28 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:13 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	249375	40477	100.000	2991	1.106	--
总计		249375	40477	100.000			

图155 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-684-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-16
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:04:50 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:16 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	255391	41421	100.000	3001	1.105	--
总计		255391	41421	100.000			

图156 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-685-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-25
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:09:12 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:19 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	247295	40252	100.000	2996	1.104	--
总计		247295	40252	100.000			

图157 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-686-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-34
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:13:34 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:22 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.208	245387	39831	100.000	3004	1.105	--
总计		245387	39831	100.000			

图158 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5µm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-687-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-43
 进样体积 : 20 µl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:17:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:25 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	244647	39758	100.000	2988	1.104	--
总计		244647	39758	100.000			

图159 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-688-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-52
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:22:18 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:28 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.207	234441	38057	100.000	2994	1.104	--
总计		234441	38057	100.000			

图160 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-桨法-50转-60min-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-689-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-8
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:26:41 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:31 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	266279	43274	100.000	2997	1.107	--
总计		266279	43274	100.000			

图161 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片1-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-690-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-17
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:31:04 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:33 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	275929	44836	100.000	2991	1.106	--
总计		275929	44836	100.000			

图162 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片2-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-691-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-26
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:35:26 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:36 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	264032	42875	100.000	2987	1.106	--
总计		264032	42875	100.000			

图163 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片3-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-692-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-35
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:39:49 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:39 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.206	266737	43407	100.000	3012	1.106	--
总计		266737	43407	100.000			

图164 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片4-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-693-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-44
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:44:11 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:42 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.204	261858	42539	100.000	2995	1.108	--
总计		261858	42539	100.000			

图165 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片5-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-694-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-53
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:48:33 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:45 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.205	267522	43393	100.000	2979	1.107	--
总计		267522	43393	100.000			

图166 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-极限转速-片6-供试品溶液-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-695-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:52:56 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:48 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.192	270855	42260	100.000	2729	1.111	--
总计		270855	42260	100.000			

图167 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-2-1




WKL-378

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(50mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 :35°C 波长: 275nm
 数据文件名: RC\$WKL-378 - 9-3/25-696-2 - zzp-2025071921p-rcqx-2-pH1.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$WKL-378 - WKL-378-rcqx-fx274.lcm
 批处理文件名: RC\$WKL-378 - 20251013-rcqx-FX274.lcb
 样品瓶号 : 3-27
 进样体积 : 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间 : 2025/10/13 23:57:19 实验者: zhanghongxin
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:51 处理者: zhanghongxin
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX274)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 275nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.190	269756	42350	100.000	2746	1.108	--
总计		269756	42350	100.000			

图168 辅酶Q10片溶出曲线测定HPLC图谱-自制品-2025071921批-均一性2-pH1.2介质-浆法-50转-对照品溶液-2-2