

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2107-2 - zzp-js6y-rcd-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-9

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 14:40:32

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:29:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2108-2 - zzp-js6y-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 14:45:25

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:29:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.628	4018244	100.000	533323	5649	1.104	--
总计		4018244	100.000	533323			

图2 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2109-2 - zzp-js6y-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 14:50:18

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:29:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.627	4016038	100.000	533056	5658	1.104	--
总计		4016038	100.000	533056			

图3 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2110-2 - zzp-js6y-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 14:55:11

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:29:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.625	4018096	100.000	533439	5643	1.107	--
总计		4018096	100.000	533439			

图4 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2111-2 - zzp-js6y-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:00:04

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:29:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.623	4009247	100.000	533551	5652	1.107	--
总计		4009247	100.000	533551			

图5 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2112-2 - zzp-js6y-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:04:56

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:29:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.622	4017450	100.000	534962	5650	1.109	--
总计		4017450	100.000	534962			


图6 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2113-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 1-1	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 15:09:48	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:30:01	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.621	3972489	100.000	530319	5666	1.106	--
总计		3972489	100.000	530319			

图7 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2114-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:14:40

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.619	3964096	100.000	529250	5676	1.108	--
总计		3964096	100.000	529250			

图8 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2116-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:24:24

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.615	3806363	100.000	509962	5687	1.106	--
总计		3806363	100.000	509962			

图10 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2117-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:29:16

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.614	3989533	100.000	534407	5680	1.111	--
总计		3989533	100.000	534407			

图11 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2118-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:34:08

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:14

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	3978959	100.000	533923	5689	1.108	--
总计		3978959	100.000	533923			

图12 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2119-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:39:00

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:17

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.612	3797353	100.000	510313	5703	1.105	--
总计		3797353	100.000	510313			

图13 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2120-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:43:52

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.613	3804905	100.000	509527	5667	1.106	--
总计		3804905	100.000	509527			

图14 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2121-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:48:43

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	3901051	100.000	522187	5672	1.106	--
总计		3901051	100.000	522187			

图15 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2122-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:53:35

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:25

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.611	3904280	100.000	522943	5680	1.104	--
总计		3904280	100.000	522943			

图16 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2123-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 15:58:26

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	3938170	100.000	527627	5689	1.102	--
总计		3938170	100.000	527627			

图17 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2124-2 - zzp-25031p-js6y-rcd-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-46

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 16:03:18


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	3944874	100.000	527044	5668	1.102	--
总计		3944874	100.000	527044			


图18 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2125-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 16:08:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	4051286	100.000	541617	5668	1.101	--
总计		4051286	100.000	541617			

图19 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2126-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:13:02

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:36

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	4059673	100.000	540434	5628	1.100	--
总计		4059673	100.000	540434			

图20 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2127-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:17:54

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:38

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	3961925	100.000	528994	5657	1.095	--
总计		3961925	100.000	528994			

图21 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2128-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:22:46

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:41

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	3963698	100.000	528710	5647	1.093	--
总计		3963698	100.000	528710			

图22 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2129-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:27:38

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:44

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	3963472	100.000	528925	5662	1.089	--
总计		3963472	100.000	528925			

图23 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2130-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:32:30

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:46

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.610	3964338	100.000	528201	5630	1.089	--
总计		3964338	100.000	528201			

图24 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2131-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-29

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 16:37:22


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	4051737	100.000	537387	5586	1.089	--
总计		4051737	100.000	537387			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2132-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:42:14

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:51

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	4049063	100.000	540446	5635	1.085	--
总计		4049063	100.000	540446			

图26 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2133-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:47:06

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:54

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	3817672	100.000	509342	5626	1.081	--
总计		3817672	100.000	509342			

图27 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2134-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 16:51:58

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:30:57

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.609	3810314	100.000	504679	5583	1.078	--
总计		3810314	100.000	504679			


图28 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2135-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 1-47	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 16:56:50	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:30:59	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	3798445	100.000	504603	5569	1.077	--
总计		3798445	100.000	504603			


图29 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2136-2 - zzp-25032p-js6y-rcd-p6-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 1-47	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 17:01:42	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:02	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	3812871	100.000	505400	5549	1.074	--
总计		3812871	100.000	505400			

图30 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2137-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:06:33

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:04

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	3904807	100.000	517430	5541	1.076	--
总计		3904807	100.000	517430			

图31 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2138-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:11:26

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	3908728	100.000	518129	5535	1.074	--
总计		3908728	100.000	518129			

图32 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2139-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:16:18

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.606	4096479	100.000	542729	5520	1.074	--
总计		4096479	100.000	542729			

图33 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2140-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:21:10

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:12

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.605	4101768	100.000	541775	5487	1.074	--
总计		4101768	100.000	541775			

图34 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2141-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:26:03

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	4027619	100.000	532090	5497	1.070	--
总计		4027619	100.000	532090			

图35 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2142-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:30:55

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	4027128	100.000	529356	5445	1.072	--
总计		4027128	100.000	529356			

图36 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2143-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:35:47

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:20

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	4067203	100.000	534399	5437	1.068	--
总计		4067203	100.000	534399			


图37 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2144-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 17:40:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	4066661	100.000	533831	5425	1.070	--
总计		4066661	100.000	533831			


图38 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2145-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p5-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 1-39	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 17:45:31	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:26	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	3959840	100.000	521055	5446	1.065	--
总计		3959840	100.000	521055			

图39 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2146-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p5-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 17:50:23

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:29

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.608	3955121	100.000	518621	5420	1.064	--
总计		3955121	100.000	518621			


图40 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2147-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 1-48	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 17:55:15	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:31	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.607	4104751	100.000	536598	5373	1.068	--
总计		4104751	100.000	536598			

图41 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2148-2 - zzp-25033p-js6y-rcd-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 18:00:07

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.606	4096724	100.000	536278	5388	1.065	--
总计		4096724	100.000	536278			

图42 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2149-2 - zzp-js6y-rcd-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:05:00

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.605	4018677	100.000	524251	5346	1.066	--
总计		4018677	100.000	524251			


图43 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2150-2 - zzp-js6y-rcd-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 1-27	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 18:09:53	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:39	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.605	4017490	100.000	522223	5314	1.065	--
总计		4017490	100.000	522223			


图44 诺氟沙星胶囊溶出度测定加速6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2151-2 - zzp-zjtj6y-rcd-rj.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-9	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 18:14:47	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:42	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2152-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:19:41

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.603	4023982	100.000	522670	5299	1.063	--
总计		4023982	100.000	522670			

图46 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2153-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:24:35

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	4021639	100.000	523402	5337	1.062	--
总计		4021639	100.000	523402			

图47 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2154-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:29:28

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:31:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	4021635	100.000	522147	5299	1.062	--
总计		4021635	100.000	522147			

图48 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2155-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:34:22

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.603	4017498	100.000	520934	5276	1.060	--
总计		4017498	100.000	520934			

图49 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2156-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:39:16

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.601	4020437	100.000	520599	5280	1.062	--
总计		4020437	100.000	520599			


图50 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2157-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-1	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 18:44:09	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:31:57	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.602	3778544	100.000	491673	5323	1.057	--
总计		3778544	100.000	491673			


图51 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2158-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 18:49:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	3775345	100.000	491930	5326	1.057	--
总计		3775345	100.000	491930			


图52 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2159-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 18:53:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.600	3785010	100.000	492732	5316	1.055	--
总计		3785010	100.000	492732			


图53 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2160-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-10	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 18:58:49	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:32:05	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3780021	100.000	493512	5327	1.055	--
总计		3780021	100.000	493512			

图54 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2161-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:03:42

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3956459	100.000	514252	5287	1.057	--
总计		3956459	100.000	514252			

图55 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2163-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:13:28

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:13

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3971270	100.000	516135	5279	1.057	--
总计		3971270	100.000	516135			


图57 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2164-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p4-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-28	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 19:18:21	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:32:15	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	3969305	100.000	516257	5283	1.058	--
总计		3969305	100.000	516257			

图58 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2165-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:23:13

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3930785	100.000	510418	5272	1.056	--
总计		3930785	100.000	510418			


图59 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2166-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 19:28:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3942238	100.000	511291	5254	1.056	--
总计		3942238	100.000	511291			


图60 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2167-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p6-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 19:32:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3861068	100.000	501238	5261	1.053	--
总计		3861068	100.000	501238			

图61 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2168-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcd-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:37:52

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:26

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3866335	100.000	500586	5242	1.053	--
总计		3866335	100.000	500586			


图62 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2169-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-2	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 19:42:45	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:32:28	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	3890634	100.000	505553	5262	1.054	--
总计		3890634	100.000	505553			

图63 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2170-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:47:38

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:31

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3893753	100.000	504239	5236	1.052	--
总计		3893753	100.000	504239			

图64 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2171-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:52:31

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3914074	100.000	506468	5225	1.053	--
总计		3914074	100.000	506468			


图65 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2172-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 19:57:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	3908267	100.000	506133	5224	1.053	--
总计		3908267	100.000	506133			

图66 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2173-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 20:02:17

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:39

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	3995258	100.000	516852	5208	1.054	--
总计		3995258	100.000	516852			

图67 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2174-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p3-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-20

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 20:07:10

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:42

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	3990947	100.000	517071	5220	1.053	--
总计		3990947	100.000	517071			


图68 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2175-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p4-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 20:12:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3932796	100.000	507747	5197	1.052	--
总计		3932796	100.000	507747			


图69 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2176-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p4-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 20:16:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3930484	100.000	506217	5181	1.054	--
总计		3930484	100.000	506217			

图70 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2177-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 20:21:48

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:50

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3916329	100.000	503984	5169	1.051	--
总计		3916329	100.000	503984			


图71 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2178-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p5-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-38	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 20:26:41	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:32:53	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	3912321	100.000	503918	5164	1.051	--
总计		3912321	100.000	503918			


图72 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2179-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p6-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 20:31:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3954790	100.000	508275	5156	1.052	--
总计		3954790	100.000	508275			

图73 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2180-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcd-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 20:36:27

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:32:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	3956814	100.000	507306	5123	1.052	--
总计		3956814	100.000	507306			


图74 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2181-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p1-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-3	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 20:41:20	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:33:01	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.599	4010889	100.000	513004	5106	1.053	--
总计		4010889	100.000	513004			


图75 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2182-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 20:46:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	4003202	100.000	513039	5114	1.055	--
总计		4003202	100.000	513039			


图76 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2183-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 20:51:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.598	4098206	100.000	525715	5118	1.054	--
总计		4098206	100.000	525715			


图77 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2184-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 20:56:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.597	4096888	100.000	525605	5118	1.056	--
总计		4096888	100.000	525605			

图78 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2185-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 21:00:54

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:11

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	4039067	100.000	517571	5102	1.054	--
总计		4039067	100.000	517571			


图79 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2186-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p3-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-21	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 21:05:48	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:14	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.595	4033656	100.000	516726	5104	1.054	--
总计		4033656	100.000	516726			


图80 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2187-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p4-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 21:10:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.596	3983869	100.000	510750	5105	1.052	--
总计		3983869	100.000	510750			

图81 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2188-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 21:15:34

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:19

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	3982222	100.000	510621	5114	1.052	--
总计		3982222	100.000	510621			

图82 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2189-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-39

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 21:20:27


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.595	3968035	100.000	507562	5086	1.052	--
总计		3968035	100.000	507562			


图83 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2190-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 21:25:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	3968926	100.000	507290	5083	1.054	--
总计		3968926	100.000	507290			

图84 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2191-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p6-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 21:30:13

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:28

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	4013175	100.000	513251	5087	1.053	--
总计		4013175	100.000	513251			

图85 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2192-2 - zzp-25033p-zjtj6y-rcd-p6-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 2-48

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 21:35:06

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:30

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	4009082	100.000	512791	5100	1.053	--
总计		4009082	100.000	512791			


图86 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2193-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 21:40:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	4019907	100.000	511883	5050	1.054	--
总计		4019907	100.000	511883			


图87 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2194-2 - zzp-zjtj6y-rcd-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 2-27	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 21:44:54	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:33:36	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	4021093	100.000	514252	5100	1.053	--
总计		4021093	100.000	514252			


图88 诺氟沙星胶囊溶出度测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2195-2 - zzp-cq6y-rcd-rj.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-9	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 21:49:47	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:33:38	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图89 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2196-2 - zzp-cq6y-rcd-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 21:54:39

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	4020749	100.000	512182	5053	1.054	--
总计		4020749	100.000	512182			

图90 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2197-2 - zzp-cq6y-rcd-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 21:59:31

处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:33:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	4023975	100.000	512596	5050	1.055	--
总计		4023975	100.000	512596			


图91 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2198-2 - zzp-cq6y-rcd-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 22:04:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	4019902	100.000	509533	5018	1.056	--
总计		4019902	100.000	509533			

图92 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
 自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)柱温:30 $^{\circ}$ C

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2199-2 - zzp-cq6y-rcd-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 22:09:16

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	4025277	100.000	513159	5055	1.053	--
总计		4025277	100.000	513159			


图93 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2200-2 - zzp-cq6y-rcd-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 22:14:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	4018930	100.000	511934	5046	1.053	--
总计		4018930	100.000	511934			


图94 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2201-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 22:19:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3947644	100.000	503997	5052	1.052	--
总计		3947644	100.000	503997			


图95 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2202-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 22:23:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:33:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3946346	100.000	504970	5081	1.050	--
总计		3946346	100.000	504970			

图96 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2203-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:28:42

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:00

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.589	4101550	100.000	524204	5051	1.054	--
总计		4101550	100.000	524204			

图97 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2204-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:33:34

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	4095739	100.000	521131	5038	1.054	--
总计		4095739	100.000	521131			


图98 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2205-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p3-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-19	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 22:38:26	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:34:05	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	3949856	100.000	501666	5019	1.050	--
总计		3949856	100.000	501666			


图99 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2206-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p3-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 22:43:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	3943528	100.000	502267	5057	1.051	--
总计		3943528	100.000	502267			

图100 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2207-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:48:10

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	3963364	100.000	503177	5014	1.053	--
总计		3963364	100.000	503177			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2208-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-28

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 22:53:02


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	3958497	100.000	503331	5021	1.050	--
总计		3958497	100.000	503331			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2209-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:57:54

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	3884002	100.000	493951	5035	1.050	--
总计		3884002	100.000	493951			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2210-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 23:02:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.594	3887908	100.000	493946	5009	1.049	--
总计		3887908	100.000	493946			


图104 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2211-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p6-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-46	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 23:07:37	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:34:21	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.593	3889673	100.000	495188	5037	1.050	--
总计		3889673	100.000	495188			


图105 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2212-2 - zzp-25031p-cq6y-rcd-p6-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 23:12:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	3891358	100.000	494377	5020	1.050	--
总计		3891358	100.000	494377			

图106 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25031批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2213-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 23:17:20

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4043802	100.000	516763	5048	1.051	--
总计		4043802	100.000	516763			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2214-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p1-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 23:22:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4042691	100.000	515526	5031	1.052	--
总计		4042691	100.000	515526			

图108 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2215-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 23:27:03

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:32

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	3976707	100.000	504500	4995	1.052	--
总计		3976707	100.000	504500			


图109 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2216-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p2-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-11	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 23:31:55	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:34:35	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	3980623	100.000	507715	5026	1.052	--
总计		3980623	100.000	507715			


图110 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2217-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p3-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/13 23:36:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	3971393	100.000	505355	5002	1.050	--
总计		3971393	100.000	505355			


图111 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2218-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p3-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-20	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 23:41:38	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:34:40	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.589	3973209	100.000	505394	4994	1.053	--
总计		3973209	100.000	505394			


图112 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2219-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p4-1.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-29	版本号: 6.115
进样体积: 10μl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/13 23:46:29	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:34:43	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3987352	100.000	507009	4997	1.049	--
总计		3987352	100.000	507009			

图113 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2220-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-29

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 23:51:20


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.589	3986847	100.000	508895	5025	1.050	--
总计		3986847	100.000	508895			

图114 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2221-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p5-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-38

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 23:56:11


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm


峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3981796	100.000	506321	5006	1.049	--
总计		3981796	100.000	506321			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm)	流速: 2.0ml/min
柱温:30°C	波长: 278nm
数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2222-2 - zzp-25032p-cq6y-rcd-p5-2.lcd	
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm	
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb	
样品瓶号: 3-38	版本号: 6.115
进样体积: 10µl	实验者: jiangjinwei
进样时间: 2025/10/14 00:01:02	处理者: jiangjinwei
处理时间 (V2) : 2025/10/15 09:34:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)	

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	3980262	100.000	506782	5007	1.050	--
总计		3980262	100.000	506782			


图116 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25032批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2225-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p1-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 00:15:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:34:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	3985300	100.000	507377	5005	1.051	--
总计		3985300	100.000	507377			

图119 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2226-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/14 00:20:27

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3982738	100.000	504555	4971	1.050	--
总计		3982738	100.000	504555			


图120 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片1
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2227-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 00:25:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	3946727	100.000	499985	4955	1.050	--
总计		3946727	100.000	499985			


图121 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2228-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 00:30:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	3940209	100.000	497790	4948	1.048	--
总计		3940209	100.000	497790			

图122 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片2
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2229-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p3-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/14 00:35:02

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:10

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.589	4038300	100.000	512139	4960	1.051	--
总计		4038300	100.000	512139			


图123 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2230-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p3-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 00:39:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4045190	100.000	512552	4954	1.050	--
总计		4045190	100.000	512552			

图124 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片3
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2231-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p4-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/14 00:44:44

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4119801	100.000	521577	4948	1.052	--
总计		4119801	100.000	521577			

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2232-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p4-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/14 00:49:35

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:18

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4128409	100.000	523061	4954	1.051	--
总计		4128409	100.000	523061			


图126 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片4
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2233-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p5-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 00:54:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4079914	100.000	517005	4955	1.050	--
总计		4079914	100.000	517005			


图127 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2234-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p5-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 00:59:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.590	4086365	100.000	515616	4916	1.052	--
总计		4086365	100.000	515616			


图128 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片5
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2235-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p6-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 01:04:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3953137	100.000	498503	4925	1.049	--
总计		3953137	100.000	498503			


图129 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2236-2 - zzp-25033p-cq6y-rcd-p6-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 01:09:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	3955825	100.000	500026	4935	1.048	--
总计		3955825	100.000	500026			


图130 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品(25033批)-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质-片6
供试品溶液-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2237-2 - zzp-cq6y-rcd-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 01:13:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.592	4008380	100.000	504028	4904	1.050	--
总计		4008380	100.000	504028			


图131 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温:30°C 波长: 278nm
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-10/27-2238-2 - zzp-cq6y-rcd-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rc-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/10/14 01:18:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/10/15 09:35:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.591	4011650	100.000	504067	4887	1.053	--
总计		4011650	100.000	504067			

图132 诺氟沙星胶囊溶出度测定长期6月HPLC图谱
自制品-醋酸盐缓冲液 (pH4.0) 介质
对照品溶液-2-2