



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-741-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 1-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 14:41:01
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:48
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
溶剂



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-742-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 14:45:56
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:54
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.700	4091878	100.000	510844	5283	1.061	--
总计		4091878	100.000	510844			

图2 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-743-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 14:50:49

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:18:57


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.706	4086938	100.000	509833	5263	1.057	--
总计		4086938	100.000	509833			

图3 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-744-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 14:55:43

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.694	4089760	100.000	507354	5181	1.053	--
总计		4089760	100.000	507354			

图4 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-745-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 1-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 15:00:37
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:02
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.696	4085213	100.000	504364	5120	1.047	--
总计		4085213	100.000	504364			

图5 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-746-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 15:05:30

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.690	4086710	100.000	505300	5111	1.046	--
总计		4086710	100.000	505300			

图6 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-747-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10μl
 进样时间: 2025/10/13 15:10:24
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
 波长: 278nm

 版本号: 6.115
 实验者: jiangjinwei
 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.707	2571550	100.000	320508	5226	1.016	--
总计		2571550	100.000	320508			

图7 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-748-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 15:15:17

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.695	2447665	100.000	305070	5188	1.013	--
总计		2447665	100.000	305070			

图8 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-749-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl
 进样时间: 2025/10/13 15:20:09
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:13
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
 波长: 278nm
 版本号: 6.115
 实验者: jiangjinwei
 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.699	1755234	100.000	217697	5141	0.997	--
总计		1755234	100.000	217697			

图9 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-750-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-28

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:25:02

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.696	2371509	100.000	294024	5122	1.009	--
总计		2371509	100.000	294024			

图10 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-751-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:29:53

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.692	2120153	100.000	261854	5081	1.004	--
总计		2120153	100.000	261854			

图11 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-752-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-46

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:34:45

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.700	1433932	100.000	176553	5075	0.989	--
总计		1433932	100.000	176553			

图12 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-753-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-2

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:39:38

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:23


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.678	4216674	100.000	516808	4954	1.035	--
总计		4216674	100.000	516808			

图13 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-754-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-11

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:44:29

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:26


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.684	4375848	100.000	529879	4868	1.031	--
总计		4375848	100.000	529879			

图14 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-755-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-20

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 15:49:22

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.676	4431416	100.000	537746	4865	1.034	--
总计		4431416	100.000	537746			

图15 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-756-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-29

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:54:15

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.680	4525871	100.000	546737	4801	1.030	--
总计		4525871	100.000	546737			

图16 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-757-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-38

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 15:59:08

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:33


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.680	4321916	100.000	523435	4822	1.028	--
总计		4321916	100.000	523435			

图17 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-758-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-47

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:04:01

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.681	4194804	100.000	504704	4757	1.023	--
总计		4194804	100.000	504704			

图18 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-759-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-3

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:08:54

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:38


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.678	4400014	100.000	528956	4751	1.026	--
总计		4400014	100.000	528956			

图19 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-760-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-12

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 16:13:47

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.678	4535167	100.000	542776	4701	1.027	--
总计		4535167	100.000	542776			

图20 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-761-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-21

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:18:41

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.679	4488391	100.000	535843	4669	1.024	--
总计		4488391	100.000	535843			

图21 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-762-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 1-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 16:23:34
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:46
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.676	4579987	100.000	546931	4690	1.028	--
总计		4579987	100.000	546931			

图22 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-763-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-39

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:28:25

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.683	4341935	100.000	515053	4627	1.019	--
总计		4341935	100.000	515053			

图23 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-764-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-48

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:33:19

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.672	4497579	100.000	535606	4618	1.024	--
总计		4497579	100.000	535606			

图24 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-765-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-4

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:38:11

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:19:53


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	4417684	100.000	522472	4560	1.019	--
总计		4417684	100.000	522472			

图25 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-766-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-13

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:43:03

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:56


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	4523925	100.000	535273	4560	1.021	--
总计		4523925	100.000	535273			

图26 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-767-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-22

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 16:47:55

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:19:58


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	4487578	100.000	529974	4542	1.020	--
总计		4487578	100.000	529974			

图27 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-768-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-31

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 16:52:48

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.677	4566512	100.000	536335	4510	1.018	--
总计		4566512	100.000	536335			

图28 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-769-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-40

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 16:57:40

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	4373356	100.000	514898	4512	1.018	--
总计		4373356	100.000	514898			

图29 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-770-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-49

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 17:02:31

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.674	4517242	100.000	529638	4482	1.018	--
总计		4517242	100.000	529638			

图30 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-771-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-5

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 17:07:25

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.669	4408404	100.000	519410	4510	1.018	--
总计		4408404	100.000	519410			

图31 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-772-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:12:17

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:20:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.670	4512058	100.000	528516	4449	1.016	--
总计		4512058	100.000	528516			

图32 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-773-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-23

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:17:09

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	4483329	100.000	524661	4454	1.016	--
总计		4483329	100.000	524661			

图33 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-774-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-32

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 17:22:02

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.669	4562576	100.000	532928	4424	1.016	--
总计		4562576	100.000	532928			

图34 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-775-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:26:54

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:20:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.671	4364111	100.000	509507	4415	1.014	--
总计		4364111	100.000	509507			

图35 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-776-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-50

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:31:46

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.667	4514276	100.000	526297	4420	1.017	--
总计		4514276	100.000	526297			

图36 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-777-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:36:38

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:24


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.678	4097077	100.000	469400	4289	1.011	--
总计		4097077	100.000	469400			

图37 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-778-2 - zzp-25031p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 1-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:41:31

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.675	4087961	100.000	470407	4326	1.013	--
总计		4087961	100.000	470407			

图38 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-779-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 17:46:26
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图39 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
溶剂



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-780-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 17:51:21
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.678	4108513	100.000	468842	4248	1.011	--
总计		4108513	100.000	468842			

图40 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-781-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 17:56:14

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	4088192	100.000	468422	4263	1.010	--
总计		4088192	100.000	468422			

图41 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-782-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 18:01:08
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	4086388	100.000	467265	4246	1.009	--
总计		4086388	100.000	467265			

图42 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-783-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:06:01

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	4090095	100.000	468243	4262	1.011	--
总计		4090095	100.000	468243			

图43 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-784-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-18
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 18:10:56
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.667	4085748	100.000	465288	4214	1.008	--
总计		4085748	100.000	465288			

图44 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-785-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-1

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 18:15:50

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:20:45

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	2162293	100.000	251307	4367	0.981	--
总计		2162293	100.000	251307			

图45 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-786-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:20:43

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	3113288	100.000	358625	4292	0.991	--
总计		3113288	100.000	358625			

图46 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-787-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-19

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:25:36

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	2159441	100.000	250398	4347	0.979	--
总计		2159441	100.000	250398			

图47 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-788-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-28

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:30:29

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.669	2772428	100.000	319467	4281	0.985	--
总计		2772428	100.000	319467			

图48 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-789-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 18:35:22

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:20:55


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.677	1063711	100.000	122805	4314	0.964	--
总计		1063711	100.000	122805			

图49 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-790-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:40:16

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:20:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.670	2412202	100.000	278743	4303	0.983	--
总计		2412202	100.000	278743			

图50 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-791-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-2

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:45:09

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	4394546	100.000	503497	4205	1.005	--
总计		4394546	100.000	503497			

图51 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-792-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-11

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:50:03

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4662119	100.000	535001	4230	1.011	--
总计		4662119	100.000	535001			

图52 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-793-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 18:54:58
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4352655	100.000	497314	4183	1.003	--
总计		4352655	100.000	497314			

图53 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-794-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-29

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 18:59:51

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	4633433	100.000	528931	4172	1.006	--
总计		4633433	100.000	528931			

图54 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-795-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-38

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 19:04:43

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4438282	100.000	505827	4160	1.002	--
总计		4438282	100.000	505827			

图55 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-796-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-47

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 19:09:37

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	4435492	100.000	503209	4109	0.998	--
总计		4435492	100.000	503209			

图56 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-797-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-3

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:14:30

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:16

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4534426	100.000	511186	4057	0.995	--
总计		4534426	100.000	511186			

图57 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-798-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-12

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 19:19:24

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.660	4676476	100.000	526169	4047	0.997	--
总计		4676476	100.000	526169			

图58 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-799-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-21

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 19:24:17

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:21


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4481339	100.000	504091	4043	0.995	--
总计		4481339	100.000	504091			

图59 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-800-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-30
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 19:29:10
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4662024	100.000	510661	3815	0.993	--
总计		4662024	100.000	510661			

图60 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-801-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-39

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:34:04

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:27

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4565265	100.000	500254	3829	0.998	--
总计		4565265	100.000	500254			

图61 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-802-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 19:38:57
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.665	4500482	100.000	503546	3995	0.992	--
总计		4500482	100.000	503546			

图62 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-803-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-4
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 19:43:50
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.660	4553627	100.000	510029	4005	0.993	--
总计		4553627	100.000	510029			

图63 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-804-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-13

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 19:48:45

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:34

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4664462	100.000	522592	4002	0.996	--
总计		4664462	100.000	522592			

图64 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-805-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-22

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 19:53:38

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.666	4461761	100.000	499128	4001	0.993	--
总计		4461761	100.000	499128			

图65 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-806-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-31

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 19:58:33

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:39


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4651421	100.000	521499	4006	0.998	--
总计		4651421	100.000	521499			

图66 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-807-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-40

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 20:03:25

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.670	4553420	100.000	507261	3969	0.993	--
总计		4553420	100.000	507261			

图67 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-808-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-49

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 20:08:19


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4512065	100.000	502145	3940	0.990	--
总计		4512065	100.000	502145			

图68 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-809-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 2-5
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 20:13:12
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:47
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.665	4539081	100.000	499164	3846	0.987	--
总计		4539081	100.000	499164			

图69 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-810-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 20:18:06

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:49


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4659539	100.000	514328	3865	0.991	--
总计		4659539	100.000	514328			

图70 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-811-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-23

进样体积: 10 μ l

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 20:23:01

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:52

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4451518	100.000	487174	3798	0.988	--
总计		4451518	100.000	487174			

图71 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-812-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-32

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 20:27:54

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4641399	100.000	507654	3802	0.992	--
总计		4641399	100.000	507654			

图72 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-813-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 20:32:48

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:21:57


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	4570511	100.000	496958	3744	0.987	--
总计		4570511	100.000	496958			

图73 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-814-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-50

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 20:37:42

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:21:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4527570	100.000	492634	3750	0.988	--
总计		4527570	100.000	492634			

图74 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-815-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 20:42:36

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:02

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.669	4088551	100.000	438645	3673	0.987	--
总计		4088551	100.000	438645			

图75 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-816-2 - zzp-25032p-js6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 2-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 20:47:30

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:05


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4090882	100.000	437459	3633	0.986	--
总计		4090882	100.000	437459			

图76 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-817-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-9

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 20:52:22

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:07

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图77 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
溶剂



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-818-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 20:57:15

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	4083152	100.000	437220	3630	0.985	--
总计		4083152	100.000	437220			

图78 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-819-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 21:02:08

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:12

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4082853	100.000	433221	3562	0.981	--
总计		4082853	100.000	433221			

图79 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-820-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 21:07:01

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	4084441	100.000	434223	3568	0.983	--
总计		4084441	100.000	434223			

图80 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-821-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 21:11:53

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	4078781	100.000	430259	3529	0.980	--
总计		4078781	100.000	430259			

图81 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-822-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl
 进样时间: 2025/10/13 21:16:45
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
 波长: 278nm
 版本号: 6.115
 实验者: jiangjinwei
 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.666	4092865	100.000	432060	3528	0.981	--
总计		4092865	100.000	432060			

图82 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-823-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-1

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 21:21:39

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:22

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.676	1478034	100.000	157411	3615	0.949	--
总计		1478034	100.000	157411			

图83 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-824-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 21:26:32

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.671	1639210	100.000	176307	3664	0.952	--
总计		1639210	100.000	176307			

图84 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-825-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-19

版本号: 6.115

进样体积: 10μl

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 21:31:25


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.672	2082700	100.000	221869	3591	0.954	--
总计		2082700	100.000	221869			

图85 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-826-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-28

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 21:36:17

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.673	1256933	100.000	134536	3632	0.947	--
总计		1256933	100.000	134536			

图86 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-827-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-37

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 21:41:09

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:33


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.675	1617551	100.000	171672	3585	0.949	--
总计		1617551	100.000	171672			

图87 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-828-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-46

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 21:46:01

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:36


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.674	1508842	100.000	160912	3606	0.950	--
总计		1508842	100.000	160912			

图88 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-829-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-2

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 21:50:54

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4303529	100.000	454509	3504	0.973	--
总计		4303529	100.000	454509			

图89 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-830-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-11

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 21:55:46

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4358473	100.000	462178	3540	0.976	--
总计		4358473	100.000	462178			

图90 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-831-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-20

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 22:00:37

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.665	4284259	100.000	453285	3517	0.974	--
总计		4284259	100.000	453285			

图91 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-832-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-29

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 22:05:30

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:22:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4179182	100.000	443089	3530	0.974	--
总计		4179182	100.000	443089			

图92 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-833-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-38

版本号: 6.115

进样体积: 10 μ l

实验者: jiangjinwei

进样时间: 2025/10/13 22:10:20


处理者: jiangjinwei

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4496915	100.000	473421	3476	0.975	--
总计		4496915	100.000	473421			

图93 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-834-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-47

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 22:15:13

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4347289	100.000	460355	3518	0.974	--
总计		4347289	100.000	460355			

图94 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-835-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-3

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:20:05

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:55

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.665	4450781	100.000	467634	3468	0.974	--
总计		4450781	100.000	467634			

图95 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-836-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-12

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 22:24:57

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.667	4519515	100.000	473448	3452	0.974	--
总计		4519515	100.000	473448			

图96 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-837-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-21

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:29:50

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:22:59

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4484425	100.000	471273	3462	0.974	--
总计		4484425	100.000	471273			

图97 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-838-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-30

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 22:34:42

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4453591	100.000	468321	3462	0.974	--
总计		4453591	100.000	468321			

图98 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-839-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-39

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 22:39:34

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:23:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4556666	100.000	476140	3416	0.972	--
总计		4556666	100.000	476140			

图99 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-840-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 3-48
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 22:44:25
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:07
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4565552	100.000	477801	3436	0.974	--
总计		4565552	100.000	477801			

图100 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-841-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-4

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 22:49:17

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:10


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4438068	100.000	463891	3421	0.972	--
总计		4438068	100.000	463891			

图101 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-842-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-13

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 22:54:09

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:23:12


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4486018	100.000	469873	3433	0.973	--
总计		4486018	100.000	469873			

图102 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-843-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-22

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/13 22:59:00

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:23:15

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	4489124	100.000	471531	3444	0.974	--
总计		4489124	100.000	471531			

图103 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-844-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-31

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 23:03:52

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	4453947	100.000	465388	3416	0.972	--
总计		4453947	100.000	465388			

图104 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-845-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 3-40
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 23:08:45
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:20
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.655	4568368	100.000	478583	3417	0.975	--
总计		4568368	100.000	478583			

图105 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-846-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 3-49
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 23:13:38
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4546739	100.000	473242	3387	0.971	--
总计		4546739	100.000	473242			

图106 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-847-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-5

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 23:18:29

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	4433475	100.000	463534	3404	0.972	--
总计		4433475	100.000	463534			

图107 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-848-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 23:23:21

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:23:28


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4490789	100.000	466235	3369	0.970	--
总计		4490789	100.000	466235			

图108 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
 柱温:30℃
 数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-849-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10μl
 进样时间: 2025/10/13 23:28:13
 处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:30
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
 波长: 278nm

 版本号: 6.115
 实验者: jiangjinwei
 处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.657	4480933	100.000	467422	3392	0.972	--
总计		4480933	100.000	467422			

图109 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-850-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-32

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/13 23:33:04

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.657	4446199	100.000	460746	3346	0.970	--
总计		4446199	100.000	460746			

图110 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-851-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 23:37:56

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:23:35

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	4552368	100.000	472459	3360	0.971	--
总计		4552368	100.000	472459			

图111 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-852-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 3-50
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 23:42:48
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	4557010	100.000	473609	3362	0.972	--
总计		4557010	100.000	473609			

图112 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-853-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 3-27

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/13 23:47:40

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4088305	100.000	416750	3244	0.969	--
总计		4088305	100.000	416750			

图113 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-854-2 - zzp-25031p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 3-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 23:52:33
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:43
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4093467	100.000	418216	3267	0.970	--
总计		4093467	100.000	418216			

图114 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25031批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-855-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-rj.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-9
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/13 23:57:26
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:45
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.680	32065	100.000	3358	3331	0.958	--
总计		32065	100.000	3358			

图115 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
溶剂



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-856-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:02:18

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4084074	100.000	415671	3238	0.969	--
总计		4084074	100.000	415671			

图116 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-857-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 00:07:12

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.665	4082554	100.000	412802	3195	0.967	--
总计		4082554	100.000	412802			

图117 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-2



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-858-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:12:06

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4082691	100.000	413802	3209	0.967	--
总计		4082691	100.000	413802			

图118 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-859-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 00:16:59

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:23:56


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	4082639	100.000	411701	3171	0.966	--
总计		4082639	100.000	411701			

图119 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-4



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-860-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-18

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:21:54

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:23:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.667	4083919	100.000	412512	3195	0.967	--
总计		4083919	100.000	412512			

图120 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-1-5



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-861-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-1

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:26:46

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	4120298	100.000	420697	3245	0.963	--
总计		4120298	100.000	420697			

图121 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-862-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-10

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:31:38

版本号: 6.115

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:04


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.666	1881588	100.000	193011	3301	0.945	--
总计		1881588	100.000	193011			

图122 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片2
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-863-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-5min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-19
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 00:36:29
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:06
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.664	1972222	100.000	202655	3300	0.947	--
总计		1972222	100.000	202655			

图123 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-864-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-28

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:41:21

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	3286429	100.000	334952	3258	0.955	--
总计		3286429	100.000	334952			

图124 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-865-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-37

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:46:14

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	3455776	100.000	353112	3257	0.958	--
总计		3455776	100.000	353112			

图125 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-866-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-46

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 00:51:05

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	1728523	100.000	175998	3255	0.942	--
总计		1728523	100.000	175998			

图126 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-867-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-2

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 00:55:58

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:24:17


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.654	4690087	100.000	479914	3237	0.969	--
总计		4690087	100.000	479914			

图127 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片1
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-868-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-11
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:00:51
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	4482202	100.000	454338	3191	0.964	--
总计		4482202	100.000	454338			

图128 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片2
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-869-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-20
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:05:45
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:22
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.655	4524312	100.000	460820	3207	0.966	--
总计		4524312	100.000	460820			

图129 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片3
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-870-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-29
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:10:39
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:24
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4578285	100.000	461439	3161	0.963	--
总计		4578285	100.000	461439			

图130 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-871-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-38
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:15:30
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:27
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.655	4780161	100.000	485901	3193	0.967	--
总计		4780161	100.000	485901			

图131 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-872-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-10min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-47
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:20:23
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:29
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4637509	100.000	466435	3145	0.963	--
总计		4637509	100.000	466435			

图132 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-10min-片6
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>


色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-873-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-3
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:25:16
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:32
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm

版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.657	4694233	100.000	473541	3146	0.964	--
总计		4694233	100.000	473541			

图133 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-874-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-12

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 01:30:09

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.654	4734254	100.000	478135	3146	0.965	--
总计		4734254	100.000	478135			

图134 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片2
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-875-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-15min.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-21
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 01:35:02
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:38
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4547280	100.000	455691	3113	0.962	--
总计		4547280	100.000	455691			

图135 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-876-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-30

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 01:39:54

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.654	4590401	100.000	462306	3130	0.964	--
总计		4590401	100.000	462306			

图136 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-877-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-39

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 01:44:46

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4797077	100.000	478418	3087	0.963	--
总计		4797077	100.000	478418			

图137 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-878-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-48

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 01:49:39

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:24:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	4688995	100.000	470407	3107	0.963	--
总计		4688995	100.000	470407			

图138 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-15min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-879-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-4

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 01:54:32

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:24:48


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	4684563	100.000	468079	3080	0.961	--
总计		4684563	100.000	468079			

图139 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片1
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-880-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-13

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 01:59:24

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:24:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.656	4733211	100.000	475551	3113	0.962	--
总计		4733211	100.000	475551			

图140 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-881-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-22

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 02:04:17

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:24:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.660	4541373	100.000	452608	3081	0.959	--
总计		4541373	100.000	452608			

图141 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-882-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-31

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 02:09:11

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:24:56


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.659	4587199	100.000	458632	3100	0.960	--
总计		4587199	100.000	458632			

图142 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片4
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-883-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-40

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 02:14:04

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:24:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.657	4795085	100.000	477616	3065	0.961	--
总计		4795085	100.000	477616			

图143 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-884-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-49

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 02:18:57

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:25:01


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.663	4676449	100.000	466426	3077	0.960	--
总计		4676449	100.000	466426			

图144 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-20min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-885-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-5

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 02:23:50

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:25:04


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.657	4677244	100.000	466632	3072	0.960	--
总计		4677244	100.000	466632			

图145 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-886-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-14

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 02:28:43

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:25:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.660	4725089	100.000	467352	3032	0.958	--
总计		4725089	100.000	467352			

图146 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片2
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-887-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-23

进样体积: 10μl

版本号: 6.115

进样时间: 2025/10/14 02:33:36

实验者: jiangjinwei


处理时间 (V2): 2025/10/14 09:25:09

处理者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.658	4532349	100.000	449527	3042	0.958	--
总计		4532349	100.000	449527			

图147 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片3
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-888-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-32

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 02:38:28

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:25:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4559859	100.000	450396	3019	0.957	--
总计		4559859	100.000	450396			

图148 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5 μ m)

流速: 2.0ml/min

柱温:30 $^{\circ}$ C

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-889-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-41

进样体积: 10 μ l

进样时间: 2025/10/14 02:43:20

版本号: 6.115

处理时间 (V2): 2025/10/14 09:25:14


实验者: jiangjinwei

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.660	4794864	100.000	475198	3040	0.960	--
总计		4794864	100.000	475198			

图149 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片5
供试品溶液-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

流速: 2.0ml/min

柱温:30℃

波长: 278nm

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-890-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-50

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 02:48:13

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:25:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.662	4659725	100.000	457723	2985	0.956	--
总计		4659725	100.000	457723			

图150 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质-30min-片6
供试品溶液-1



Y09


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)
柱温:30℃
数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-891-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-1.lcd
方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm
批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb
样品瓶号: 4-27
进样体积: 10μl
进样时间: 2025/10/14 02:53:07
处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:25:19
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min
波长: 278nm
版本号: 6.115
实验者: jiangjinwei
处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.661	4070820	100.000	395411	2924	0.957	--
总计		4070820	100.000	395411			

图151 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-2-1



Y09

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150*4.6mm,5μm)

柱温:30℃

数据文件名: RC\$Y09 - 28-9/28-892-2 - zzp-25032p-zjtj6y-rcqx-pH1.2jz-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$Y09 - Y09-rcqx-FX277.lcm

批处理文件名: RC\$Y09 - Y09-20251013-FX277.lcb

样品瓶号: 4-27

进样体积: 10μl

进样时间: 2025/10/14 02:58:00

处理时间 (V2) : 2025/10/14 09:25:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

流速: 2.0ml/min

波长: 278nm


版本号: 6.115

实验者: jiangjinwei

处理者: jiangjinwei

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 278nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	3.668	4073364	100.000	391284	2882	0.955	--
总计		4073364	100.000	391284			

图152 诺氟沙星胶囊溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-25032批-pH1.2介质
对照品溶液-2-2