


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2647-3 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:23:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3) : 2025/11/21 09:43:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2648-3 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:27:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V3): 2025/11/21 09:43:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	94289	21070	34.539	4429	1.250	--
2	2.305	178705	36865	65.461	5268	1.130	3.107
总计		272994	57935	100.000			


图2 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2649-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:31:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.928	94448	21082	34.574	4421	1.250	--
2	2.304	178727	36849	65.426	5268	1.130	3.096
总计		273175	57930	100.000			


图3 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2650-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:35:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:43:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	94726	21095	34.604	4378	1.251	--
2	2.304	179020	36762	65.396	5226	1.132	3.069
总计		273746	57857	100.000			


图4 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2651-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:39:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.929	94784	21165	34.690	4396	1.249	--
2	2.302	178444	36594	65.310	5238	1.130	3.060
总计		273227	57759	100.000			


图5 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2652-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:43:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.930	94739	21144	34.677	4397	1.249	--
2	2.301	178469	36492	65.323	5233	1.131	3.051
总计		273208	57636	100.000			


图6 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2653-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:47:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	46718	11164	31.652	5115	1.236	--
2	2.317	100883	22226	68.348	6118	1.108	3.269
总计		147601	33390	100.000			


图7 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2654-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:50:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	53580	12817	32.381	5117	1.234	--
2	2.316	111889	24680	67.619	6112	1.108	3.264
总计		165469	37497	100.000			


图8 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2655-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:54:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.944	57878	13831	33.182	5132	1.236	--
2	2.314	116549	25835	66.818	6112	1.106	3.258
总计		174427	39666	100.000			


图9 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2656-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:58:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	55638	13323	32.640	5136	1.235	--
2	2.314	114823	25445	67.360	6108	1.106	3.247
总计		170461	38769	100.000			


图10 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2657-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:02:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	53694	12859	31.447	5126	1.237	--
2	2.314	117049	25942	68.553	6115	1.108	3.236
总计		170742	38800	100.000			


图11 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2658-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:06:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	49875	11967	30.596	5134	1.234	--
2	2.314	113136	25074	69.404	6105	1.107	3.233
总计		163011	37041	100.000			


图12 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2659-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:10:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:43:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	91124	21873	36.649	5171	1.238	--
2	2.313	157519	34943	63.351	6111	1.109	3.232
总计		248643	56816	100.000			


图13 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2660-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:14:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:43:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	94535	22636	36.559	5153	1.239	--
2	2.311	164045	36281	63.441	6096	1.109	3.227
总计		258580	58917	100.000			


图14 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2661-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:17:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:43:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	94735	22704	36.592	5155	1.239	--
2	2.313	164158	36398	63.408	6106	1.109	3.224
总计		258894	59101	100.000			


图15 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2662-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:21:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	91744	22002	35.590	5169	1.240	--
2	2.312	166036	36791	64.410	6103	1.109	3.220
总计		257781	58793	100.000			


图16 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2663-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:25:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	94102	22554	36.479	5157	1.238	--
2	2.311	163860	36242	63.521	6101	1.109	3.213
总计		257962	58795	100.000			


图17 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2664-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:29:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:43:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	92613	22212	36.556	5163	1.238	--
2	2.311	160735	35487	63.444	6087	1.109	3.212
总计		253348	57700	100.000			


图18 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2665-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:33:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	97128	23242	35.333	5178	1.241	--
2	2.312	177766	39401	64.667	6109	1.110	3.207
总计		274894	62643	100.000			


图19 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2666-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:37:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	97095	23222	35.123	5169	1.241	--
2	2.311	179348	39671	64.877	6105	1.109	3.198
总计		276443	62893	100.000			


图20 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2667-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:41:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	99401	23774	35.778	5162	1.240	--
2	2.310	178430	39398	64.222	6106	1.110	3.192
总计		277831	63173	100.000			


图21 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2668-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:45:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	95999	22934	34.596	5156	1.240	--
2	2.311	181487	40067	65.404	6096	1.110	3.191
总计		277486	63001	100.000			


图22 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2669-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:48:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	95089	22677	34.764	5165	1.241	--
2	2.311	178437	39464	65.236	6114	1.109	3.190
总计		273526	62141	100.000			


图23 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2670-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:52:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	94215	22568	34.910	5183	1.241	--
2	2.309	175667	38617	65.090	6104	1.111	3.185
总计		269882	61185	100.000			


图24 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2671-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:56:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	98029	23398	34.855	5182	1.241	--
2	2.310	183221	40427	65.145	6113	1.110	3.184
总计		281250	63825	100.000			


图25 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2672-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:00:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	97845	23364	34.801	5180	1.241	--
2	2.309	183308	40277	65.199	6100	1.111	3.177
总计		281153	63641	100.000			


图26 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2673-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:04:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	97681	23363	34.884	5169	1.240	--
2	2.308	182336	40219	65.116	6088	1.112	3.172
总计		280017	63582	100.000			


图27 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2674-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:08:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	92990	22177	33.530	5188	1.241	--
2	2.309	184342	40606	66.470	6095	1.112	3.167
总计		277332	62783	100.000			


图28 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2675-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:12:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.949	95444	22814	34.332	5193	1.241	--
2	2.308	182561	40324	65.668	6095	1.112	3.167
总计		278005	63138	100.000			


图29 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2676-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:16:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	96548	22942	34.781	5185	1.241	--
2	2.310	181045	39908	65.219	6105	1.110	3.163
总计		277593	62851	100.000			


图30 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2677-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:19:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	96432	22933	34.103	5168	1.241	--
2	2.308	186334	41120	65.897	6089	1.111	3.159
总计		282766	64053	100.000			


图31 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2678-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:23:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	97737	23155	34.623	5188	1.243	--
2	2.308	184550	40705	65.377	6097	1.111	3.156
总计		282287	63859	100.000			


图32 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2679-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:27:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	95493	22672	34.220	5186	1.241	--
2	2.308	183564	40589	65.780	6101	1.112	3.148
总计		279056	63261	100.000			


图33 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2680-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:31:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.950	96459	22991	34.156	5185	1.241	--
2	2.306	185946	41304	65.844	6104	1.111	3.150
总计		282405	64296	100.000			


图34 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2681-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:35:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	95890	22835	34.270	5171	1.240	--
2	2.309	183919	40469	65.730	6102	1.112	3.144
总计		279808	63305	100.000			


图35 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2682-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:39:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.951	95028	22500	34.255	5174	1.242	--
2	2.307	182386	40373	65.745	6091	1.111	3.143
总计		277414	62873	100.000			


图36 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2683-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:43:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	96536	22982	34.125	5186	1.240	--
2	2.307	186356	41331	65.875	6111	1.112	3.137
总计		282892	64313	100.000			


图37 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2684-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:47:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	98849	23541	34.725	5170	1.240	--
2	2.308	185816	41095	65.275	6101	1.112	3.133
总计		284666	64636	100.000			


图38 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2685-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:50:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:44:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	96211	22942	34.315	5164	1.239	--
2	2.308	184162	40653	65.685	6092	1.112	3.127
总计		280373	63595	100.000			


图39 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2686-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:54:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	96063	22783	34.010	5155	1.242	--
2	2.306	186396	41359	65.990	6082	1.111	3.120
总计		282459	64142	100.000			


图40 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2687-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:58:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	84418	20002	31.522	5113	1.242	--
2	2.307	183391	40558	68.478	6057	1.112	3.109
总计		267809	60560	100.000			


图41 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2688-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:02:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:45:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.952	95688	22604	34.380	5115	1.242	--
2	2.306	182633	40462	65.620	6065	1.111	3.112
总计		278321	63066	100.000			


图42 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2689-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:06:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	96668	23021	34.194	5134	1.241	--
2	2.308	186039	41021	65.806	6080	1.113	3.109
总计		282708	64043	100.000			

图43 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2690-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:10:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	96961	23076	34.252	5133	1.241	--
2	2.307	186124	41156	65.748	6069	1.112	3.105
总计		283086	64231	100.000			

图44 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2691-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:14:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	96847	23045	34.555	5135	1.241	--
2	2.306	183424	40606	65.445	6068	1.113	3.103
总计		280270	63651	100.000			


图45 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2692-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:17:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.953	96448	22926	34.092	5122	1.241	--
2	2.306	186461	41322	65.908	6073	1.112	3.099
总计		282910	64248	100.000			


图46 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2693-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:21:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	94034	22389	33.889	5122	1.241	--
2	2.306	183442	40645	66.111	6075	1.112	3.094
总计		277476	63034	100.000			


图47 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2694-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:25:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	87872	20887	32.428	5114	1.241	--
2	2.308	183106	40390	67.572	6060	1.113	3.091
总计		270978	61277	100.000			


图48 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2695-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:29:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	95161	20907	34.886	4351	1.254	--
2	2.292	177620	36172	65.114	5144	1.137	2.857
总计		272781	57079	100.000			


图49 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2696-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:33:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:45:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	94932	20916	34.934	4344	1.252	--
2	2.291	176811	36190	65.066	5145	1.136	2.853
总计		271743	57106	100.000			

图50 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2697-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:37:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2698-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:41:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:45:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	95122	20919	21.048	4332	1.250	--
2	2.290	356811	72952	78.952	5130	1.143	2.843
总计		451933	93871	100.000			


图52 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2699-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:45:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	94822	20859	21.003	4334	1.251	--
2	2.290	356648	72939	78.997	5124	1.143	2.839
总计		451470	93798	100.000			


图53 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2700-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:49:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	94735	20847	20.999	4347	1.251	--
2	2.290	356402	72911	79.001	5133	1.142	2.842
总计		451137	93758	100.000			


图54 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2701-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:52:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	94998	20908	20.978	4350	1.250	--
2	2.290	357855	73171	79.022	5129	1.142	2.841
总计		452852	94079	100.000			


图55 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2702-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:56:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	94770	20912	20.987	4348	1.250	--
2	2.289	356801	73102	79.013	5134	1.142	2.841
总计		451571	94014	100.000			


图56 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2703-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:00:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	70173	16598	22.033	5099	1.242	--
2	2.307	248316	54841	77.967	6056	1.115	3.065
总计		318489	71439	100.000			


图57 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2704-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:04:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	69409	16479	22.081	5102	1.240	--
2	2.305	244925	54194	77.919	6036	1.114	3.066
总计		314334	70674	100.000			


图58 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2705-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:08:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	70711	16722	21.694	5100	1.241	--
2	2.307	255236	56386	78.306	6048	1.115	3.062
总计		325947	73108	100.000			


图59 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2706-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:12:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	66638	15795	21.358	5102	1.241	--
2	2.306	245371	54277	78.642	6052	1.114	3.063
总计		312009	70073	100.000			


图60 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2707-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:16:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:45:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	66679	15753	21.848	5091	1.243	--
2	2.306	238513	52771	78.152	6054	1.114	3.058
总计		305192	68524	100.000			


图61 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2708-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:20:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	61862	14607	21.541	5107	1.243	--
2	2.307	225320	49848	78.459	6057	1.114	3.059
总计		287181	64455	100.000			


图62 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2709-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:24:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	88377	20830	21.276	5109	1.243	--
2	2.307	327012	72221	78.724	6043	1.118	3.054
总计		415389	93051	100.000			


图63 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2710-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:28:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	89056	21129	21.783	5124	1.241	--
2	2.305	319771	70774	78.217	6045	1.117	3.056
总计		408827	91903	100.000			


图64 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2711-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:31:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	89693	21240	21.056	5112	1.242	--
2	2.305	336273	74389	78.944	6032	1.118	3.048
总计		425966	95629	100.000			


图65 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2712-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:35:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:46:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	87357	20682	21.036	5114	1.242	--
2	2.305	327923	72656	78.964	6050	1.118	3.048
总计		415280	93339	100.000			

图66 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2713-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:39:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	87610	20738	21.296	5108	1.242	--
2	2.305	323788	71656	78.704	6045	1.117	3.046
总计		411398	92394	100.000			


图67 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2714-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:43:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:46:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	85737	20282	21.403	5106	1.242	--
2	2.305	314854	69674	78.597	6043	1.117	3.045
总计		400591	89956	100.000			


图68 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2715-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:47:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	91989	21781	21.127	5118	1.242	--
2	2.304	343427	76044	78.873	6052	1.117	3.044
总计		435417	97825	100.000			


图69 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2716-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:51:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	91299	21713	21.515	5127	1.241	--
2	2.303	333062	73549	78.485	6044	1.118	3.044
总计		424361	95262	100.000			


图70 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2717-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:55:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	93145	22018	20.743	5103	1.243	--
2	2.304	355890	78733	79.257	6046	1.118	3.035
总计		449035	100751	100.000			


图71 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2718-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:59:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	90532	21412	20.585	5106	1.243	--
2	2.304	349269	77316	79.415	6053	1.117	3.037
总计		439801	98728	100.000			


图72 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2719-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:03:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	92473	21745	21.126	5116	1.244	--
2	2.305	345244	76417	78.874	6037	1.118	3.036
总计		437717	98162	100.000			


图73 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2720-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:06:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	90306	21224	21.352	5115	1.244	--
2	2.305	332641	73646	78.648	6047	1.117	3.033
总计		422947	94870	100.000			


图74 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2721-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:10:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	91818	21551	20.890	5116	1.245	--
2	2.305	347712	77004	79.110	6051	1.118	3.031
总计		439530	98554	100.000			


图75 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2722-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:14:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	92376	21739	21.456	5115	1.244	--
2	2.304	338153	74822	78.544	6042	1.117	3.033
总计		430529	96561	100.000			


图76 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2723-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:18:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	93415	21960	20.548	5113	1.244	--
2	2.304	361213	79960	79.452	6051	1.118	3.030
总计		454627	101920	100.000			


图77 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2724-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:22:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	89610	21071	20.195	5113	1.244	--
2	2.304	354114	78281	79.805	6038	1.118	3.026
总计		443723	99352	100.000			

图78 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2725-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:26:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	92510	21761	20.891	5123	1.244	--
2	2.304	350312	77524	79.109	6051	1.117	3.026
总计		442822	99285	100.000			


图79 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2726-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:30:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	90982	21429	21.275	5118	1.244	--
2	2.303	336672	74435	78.725	6035	1.117	3.025
总计		427654	95864	100.000			


图80 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2727-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:34:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	92346	21675	20.963	5112	1.244	--
2	2.304	348166	76973	79.037	6039	1.117	3.022
总计		440512	98648	100.000			


图81 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2728-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:38:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:46:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	90220	21144	20.929	5102	1.245	--
2	2.304	340852	75405	79.071	6047	1.117	3.019
总计		431072	96549	100.000			


图82 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2729-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:42:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:46:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	94411	22224	20.726	5137	1.244	--
2	2.303	361119	79742	79.274	6050	1.118	3.019
总计		455530	101967	100.000			


图83 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2730-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:45:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:47:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	92562	21713	20.619	5110	1.244	--
2	2.303	356352	78771	79.381	6050	1.118	3.015
总计		448914	100485	100.000			


图84 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2731-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:49:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	93546	21996	20.954	5130	1.243	--
2	2.304	352887	78001	79.046	6035	1.118	3.019
总计		446433	99996	100.000			


图85 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2732-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:53:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	90444	21254	21.027	5112	1.243	--
2	2.302	339695	74898	78.973	6037	1.118	3.014
总计		430139	96152	100.000			


图86 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2733-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:57:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	93074	21895	21.025	5129	1.243	--
2	2.303	349600	77289	78.975	6035	1.117	3.015
总计		442674	99184	100.000			


图87 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2734-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:01:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	93633	22054	21.426	5109	1.242	--
2	2.304	343371	76003	78.574	6050	1.117	3.010
总计		437004	98057	100.000			


图88 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2735-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:05:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:47:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	94733	22297	20.749	5132	1.243	--
2	2.303	361835	79871	79.251	6038	1.119	3.012
总计		456568	102168	100.000			


图89 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2736-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:09:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	91696	21624	20.459	5119	1.241	--
2	2.304	356491	78831	79.541	6036	1.118	3.007
总计		448187	100455	100.000			

图90 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2737-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:13:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	92962	21936	20.901	5121	1.241	--
2	2.304	351816	77791	79.099	6038	1.118	3.007
总计		444778	99727	100.000			


图91 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2738-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:17:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	92234	21780	21.267	5114	1.241	--
2	2.304	341462	75563	78.733	6048	1.117	3.006
总计		433695	97344	100.000			


图92 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2739-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:21:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	92866	22022	21.001	5151	1.240	--
2	2.305	349338	77293	78.999	6043	1.118	3.012
总计		442204	99315	100.000			


图93 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2740-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:24:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	93223	22071	21.297	5127	1.240	--
2	2.304	344510	76287	78.703	6054	1.117	3.003
总计		437733	98358	100.000			


图94 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2741-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:28:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	93054	22054	20.485	5149	1.241	--
2	2.303	361195	79829	79.515	6044	1.118	3.002
总计		454248	101884	100.000			


图95 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2742-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:32:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	92098	21792	20.502	5120	1.240	--
2	2.304	357127	79039	79.498	6047	1.117	2.998
总计		449225	100831	100.000			


图96 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2743-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:36:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	91084	21529	20.590	5132	1.240	--
2	2.303	351276	77498	79.410	6041	1.118	2.998
总计		442359	99027	100.000			


图97 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2744-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:40:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	91867	21731	21.111	5118	1.241	--
2	2.304	343284	75966	78.889	6050	1.117	2.995
总计		435151	97698	100.000			


图98 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2745-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:44:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.945	94514	20868	21.003	4373	1.249	--
2	2.286	355477	72805	78.997	5146	1.142	2.778
总计		449991	93672	100.000			


图99 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2746-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:48:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	95144	20983	20.994	4361	1.249	--
2	2.289	358051	73467	79.006	5135	1.141	2.774
总计		453195	94450	100.000			

图100 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2747-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:52:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图101 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2748-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:56:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	95310	21082	20.828	4377	1.247	--
2	2.288	362288	74467	79.172	5148	1.141	2.776
总计		457598	95549	100.000			


图102 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2749-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:59:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:47:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.946	94668	20945	20.803	4380	1.246	--
2	2.286	360399	73801	79.197	5143	1.142	2.777
总计		455067	94746	100.000			


图103 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2750-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:03:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:47:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	95055	21046	20.786	4383	1.248	--
2	2.288	362240	74423	79.214	5146	1.142	2.775
总计		457295	95469	100.000			


图104 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2751-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:07:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.947	94667	20967	20.780	4385	1.249	--
2	2.287	360896	74098	79.220	5144	1.143	2.775
总计		455563	95065	100.000			


图105 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2753-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:15:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	57410	13585	22.176	5112	1.239	--
2	2.303	201470	44590	77.824	6047	1.114	2.989
总计		258880	58175	100.000			


图107 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2754-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:19:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	52522	12411	21.644	5092	1.238	--
2	2.304	190143	42097	78.356	6054	1.114	2.987
总计		242665	54508	100.000			


图108 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2755-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:23:12 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	56932	13482	21.821	5123	1.237	--
2	2.303	203977	45100	78.179	6053	1.114	2.990
总计		260909	58581	100.000			


图109 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2756-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:27:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	53146	12573	21.275	5088	1.239	--
2	2.304	196665	43533	78.725	6052	1.114	2.984
总计		249811	56106	100.000			


图110 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2757-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:30:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	58567	13854	21.292	5093	1.238	--
2	2.304	216500	47906	78.708	6050	1.115	2.984
总计		275067	61760	100.000			


图111 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2758-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:34:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:48:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	52883	12497	21.132	5092	1.240	--
2	2.304	197374	43693	78.868	6051	1.114	2.983
总计		250257	56189	100.000			


图112 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2759-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:38:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:48:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	81703	19342	21.630	5116	1.239	--
2	2.303	296028	65339	78.370	6046	1.117	2.986
总计		377731	84681	100.000			


图113 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2760-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:42:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	80573	19120	21.420	5138	1.238	--
2	2.303	295583	65183	78.580	6037	1.118	2.987
总计		376156	84303	100.000			


图114 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2761-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:46:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	85404	20217	21.296	5125	1.239	--
2	2.301	315622	69399	78.704	6037	1.119	2.981
总计		401026	89617	100.000			


图115 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2762-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:50:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	83628	19849	20.761	5132	1.238	--
2	2.304	319192	70591	79.239	6038	1.118	2.981
总计		402819	90440	100.000			


图116 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2763-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:54:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:48:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	84327	20000	20.840	5125	1.238	--
2	2.302	320314	70597	79.160	6045	1.119	2.978
总计		404641	90597	100.000			


图117 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2764-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:58:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:48:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	83353	19801	21.109	5139	1.238	--
2	2.303	311516	68910	78.891	6043	1.118	2.981
总计		394868	88711	100.000			

图118 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2766-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:05:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	87177	20685	21.319	5119	1.240	--
2	2.302	321747	70907	78.681	6035	1.118	2.976
总计		408924	91592	100.000			


图120 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2767-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:09:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	91811	21787	20.956	5126	1.239	--
2	2.302	346313	76272	79.044	6034	1.119	2.974
总计		438124	98059	100.000			


图121 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2768-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:13:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	91948	21805	20.619	5123	1.239	--
2	2.302	353979	77888	79.381	6028	1.119	2.973
总计		445927	99693	100.000			


图122 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2769-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:17:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	92327	21890	20.833	5127	1.239	--
2	2.301	350850	76999	79.167	6032	1.120	2.972
总计		443177	98889	100.000			


图123 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2770-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:21:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:48:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	90715	21524	20.862	5144	1.239	--
2	2.300	344119	75727	79.138	6023	1.120	2.970
总计		434833	97251	100.000			


图124 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2771-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:25:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	88867	21074	21.591	5121	1.239	--
2	2.301	322720	70864	78.409	6031	1.119	2.969
总计		411588	91938	100.000			


图125 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2772-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:28:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:48:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	88307	20969	21.194	5145	1.239	--
2	2.301	328354	72050	78.806	6029	1.120	2.970
总计		416661	93019	100.000			


图126 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2773-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:32:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	93956	22311	20.984	5132	1.239	--
2	2.301	353793	77711	79.016	6033	1.120	2.964
总计		447750	100022	100.000			


图127 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2774-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:36:37 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	93659	22257	20.605	5143	1.239	--
2	2.300	360899	79444	79.395	6026	1.121	2.962
总计		454558	101701	100.000			


图128 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2775-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:40:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:49:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	93525	22167	20.696	5124	1.240	--
2	2.300	358374	78710	79.304	6024	1.121	2.963
总计		451899	100877	100.000			


图129 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2776-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:44:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:49:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	91970	21831	20.678	5130	1.239	--
2	2.301	352802	77465	79.322	6039	1.121	2.959
总计		444773	99296	100.000			


图130 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2777-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:48:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	89464	21213	21.615	5128	1.239	--
2	2.300	324438	71359	78.385	6019	1.119	2.961
总计		413902	92572	100.000			


图131 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2778-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:52:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	88442	20969	21.016	5127	1.238	--
2	2.300	332395	73248	78.984	6023	1.120	2.959
总计		420837	94218	100.000			


图132 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2780-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:59:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	94133	22345	20.442	5131	1.239	--
2	2.300	366365	80537	79.558	6025	1.121	2.956
总计		460498	102882	100.000			


图134 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2781-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:03:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	94515	22450	20.785	5136	1.239	--
2	2.300	360201	79354	79.215	6022	1.120	2.956
总计		454716	101804	100.000			


图135 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2782-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:07:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	90045	21354	20.260	5126	1.238	--
2	2.299	354395	78362	79.740	6021	1.120	2.950
总计		444440	99716	100.000			


图136 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2783-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:11:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 09:49:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	89272	21197	21.565	5132	1.238	--
2	2.301	324699	71260	78.435	6040	1.120	2.955
总计		413971	92457	100.000			


图137 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2784-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:15:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	89506	21260	21.198	5122	1.238	--
2	2.300	332741	73365	78.802	6030	1.120	2.952
总计		422247	94625	100.000			


图138 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2785-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:19:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	93143	22131	20.708	5140	1.239	--
2	2.300	356645	78509	79.292	6040	1.121	2.954
总计		449788	100640	100.000			


图139 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2786-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:22:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	91243	21661	20.000	5133	1.239	--
2	2.300	364963	80184	80.000	6035	1.121	2.950
总计		456206	101845	100.000			


图140 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2788-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:30:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	91616	21769	20.523	5128	1.240	--
2	2.299	354792	78446	79.477	6033	1.120	2.947
总计		446408	100214	100.000			


图142 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2789-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:34:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	88791	21094	21.517	5136	1.239	--
2	2.300	323868	71368	78.483	6032	1.120	2.952
总计		412659	92462	100.000			


图143 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2790-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:38:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	89933	21335	21.290	5128	1.240	--
2	2.300	332489	73163	78.710	6021	1.120	2.947
总计		422422	94498	100.000			


图144 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2791-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:42:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	91549	21764	20.581	5141	1.237	--
2	2.300	353281	77838	79.419	6023	1.121	2.948
总计		444830	99602	100.000			


图145 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2792-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:46:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	93558	22212	20.444	5129	1.238	--
2	2.299	364079	80416	79.556	6029	1.121	2.942
总计		457637	102628	100.000			


图146 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2793-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:49:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:49:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	93350	22169	20.701	5139	1.239	--
2	2.300	357586	78717	79.299	6020	1.121	2.942
总计		450936	100886	100.000			


图147 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2794-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:53:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 09:49:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	93380	22165	20.813	5131	1.239	--
2	2.300	355272	78294	79.187	6027	1.121	2.943
总计		448652	100458	100.000			


图148 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-35/27-2795-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx1-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX276.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX276.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:57:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 09:50:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX276)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.948	94322	20885	20.810	4387	1.248	--
2	2.282	358940	73635	79.190	5142	1.143	2.731
总计		453262	94521	100.000			

图149 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性1-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

