


<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1386-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:23:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图1 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1387-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:27:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.940	95420	21376	34.705	4422	1.211	--
2	2.349	179526	36798	65.295	5381	1.101	3.343
总计		274946	58174	100.000			


图2 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1388-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:31:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.940	95370	21371	34.709	4429	1.209	--
2	2.348	179401	36888	65.291	5395	1.100	3.334
总计		274771	58258	100.000			


图3 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1389-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:35:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.941	95429	21276	34.690	4422	1.212	--
2	2.347	179664	36879	65.310	5370	1.101	3.317
总计		275093	58155	100.000			


图4 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1390-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:39:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.942	94967	21139	34.700	4425	1.211	--
2	2.347	178715	36758	65.300	5381	1.101	3.307
总计		273682	57897	100.000			


图5 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1391-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:43:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.943	95077	21082	34.748	4425	1.212	--
2	2.346	178540	36686	65.252	5376	1.101	3.296
总计		273617	57768	100.000			


图6 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1392-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:47:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	52819	12566	31.259	5111	1.201	--
2	2.361	116154	25265	68.741	6131	1.081	3.508
总计		168972	37831	100.000			


图7 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1393-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:50:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	46576	11071	28.996	5116	1.205	--
2	2.360	114055	24728	71.004	6117	1.083	3.498
总计		160631	35799	100.000			


图8 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1394-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:54:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	50677	12075	30.732	5122	1.197	--
2	2.359	114221	24689	69.268	6110	1.084	3.489
总计		164898	36764	100.000			


图9 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1395-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 14:58:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:06:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.958	55398	13150	33.315	5126	1.204	--
2	2.358	110888	24009	66.685	6108	1.084	3.481
总计		166285	37159	100.000			


图10 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1396-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:02:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:35 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	51166	12094	31.497	5113	1.203	--
2	2.358	111278	24092	68.503	6106	1.083	3.472
总计		162444	36187	100.000			


图11 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1397-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:06:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:06:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	48714	11509	30.384	5112	1.201	--
2	2.358	111614	24230	69.616	6104	1.083	3.462
总计		160329	35739	100.000			


图12 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1398-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:10:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.959	93579	22215	36.390	5144	1.202	--
2	2.357	163577	35674	63.610	6114	1.086	3.465
总计		257156	57889	100.000			


图13 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1399-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:14:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	92751	22003	36.514	5145	1.201	--
2	2.357	161263	35058	63.486	6107	1.085	3.456
总计		254014	57061	100.000			


图14 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1400-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:18:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	86165	20425	34.457	5132	1.201	--
2	2.357	163898	35652	65.543	6099	1.085	3.448
总计		250063	56077	100.000			


图15 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1401-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:21:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	91532	21840	36.562	5142	1.199	--
2	2.357	158816	34567	63.438	6113	1.085	3.445
总计		250348	56407	100.000			


图16 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1402-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:25:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.960	92077	21844	36.164	5146	1.204	--
2	2.356	162535	35532	63.836	6117	1.084	3.442
总计		254612	57376	100.000			

图17 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1403-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:29:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:06:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	90727	21645	36.019	5152	1.200	--
2	2.356	161158	35148	63.981	6113	1.084	3.436
总计		251885	56793	100.000			


图18 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1404-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:33:30 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:06:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	97291	23183	35.081	5143	1.201	--
2	2.355	180044	39300	64.919	6107	1.086	3.429
总计		277335	62484	100.000			


图19 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1405-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:37:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	94598	22567	34.976	5147	1.199	--
2	2.355	175870	38396	65.024	6105	1.085	3.423
总计		270468	60963	100.000			


图20 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1406-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:41:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	93612	22305	34.156	5149	1.199	--
2	2.354	180462	39372	65.844	6099	1.085	3.419
总计		274074	61677	100.000			


图21 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1407-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:45:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	94538	22575	35.144	5149	1.200	--
2	2.354	174467	38072	64.856	6100	1.085	3.414
总计		269005	60647	100.000			


图22 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1408-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:48:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	96013	22936	34.820	5143	1.200	--
2	2.354	179726	39212	65.180	6110	1.085	3.409
总计		275740	62148	100.000			


图23 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1409-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:52:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	94883	22664	34.880	5155	1.199	--
2	2.353	177142	38612	65.120	6104	1.085	3.405
总计		272025	61276	100.000			

图24 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1410-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 15:56:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	96890	23161	34.556	5156	1.199	--
2	2.353	183496	39964	65.444	6101	1.085	3.400
总计		280386	63126	100.000			

图25 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1411-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:00:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	92365	22081	33.899	5151	1.198	--
2	2.353	180102	39227	66.101	6096	1.085	3.395
总计		272467	61308	100.000			


图26 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1412-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:04:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:07:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	98478	23551	34.741	5141	1.199	--
2	2.352	184982	40235	65.259	6099	1.086	3.389
总计		283460	63786	100.000			


图27 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1413-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:08:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	86793	20740	32.719	5152	1.199	--
2	2.352	178480	38769	67.281	6100	1.085	3.385
总计		265273	59509	100.000			


图28 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1414-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:12:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:07:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	96240	23004	34.421	5154	1.201	--
2	2.352	183353	39844	65.579	6099	1.086	3.382
总计		279594	62848	100.000			


图29 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1415-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:15:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	95146	22718	34.410	5143	1.200	--
2	2.352	181357	39412	65.590	6101	1.086	3.378
总计		276503	62130	100.000			


图30 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1416-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:19:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	96754	23157	34.298	5157	1.199	--
2	2.352	185348	40316	65.702	6120	1.084	3.376
总计		282101	63473	100.000			


图31 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1417-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:23:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	94288	22498	34.335	5149	1.201	--
2	2.352	180324	39146	65.665	6093	1.087	3.369
总计		274612	61644	100.000			


图32 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1418-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:27:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:07:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm


峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.964	98940	23619	34.225	5135	1.198	--
2	2.351	190145	41149	65.775	6092	1.085	3.369
总计		289084	64767	100.000			

图33 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1419-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:31:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	96399	22992	34.454	5144	1.200	--
2	2.352	183389	39853	65.546	6104	1.084	3.367
总计		279788	62846	100.000			


图34 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1420-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:35:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:07:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	94746	22645	33.605	5151	1.201	--
2	2.351	187198	40528	66.395	6100	1.085	3.363
总计		281944	63173	100.000			


图35 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1421-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:39:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:52 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	94657	22590	33.838	5151	1.200	--
2	2.351	185076	40065	66.162	6098	1.085	3.357
总计		279733	62655	100.000			


图36 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1422-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:43:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	96558	23048	34.070	5144	1.199	--
2	2.350	186853	40548	65.930	6090	1.085	3.351
总计		283412	63596	100.000			


图37 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1423-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:46:56 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:07:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	94243	22501	34.028	5153	1.199	--
2	2.350	182713	39693	65.972	6094	1.086	3.347
总计		276956	62194	100.000			


图38 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1424-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:50:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.966	96729	23054	34.036	5157	1.201	--
2	2.350	187469	40699	65.964	6092	1.087	3.344
总计		284198	63753	100.000			


图39 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1425-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:54:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	95346	22661	34.496	5150	1.203	--
2	2.349	181048	39460	65.504	6084	1.085	3.339
总计		276393	62120	100.000			


图40 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1426-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 16:58:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:06 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	95695	22792	34.052	5148	1.200	--
2	2.349	185331	40342	65.948	6080	1.085	3.335
总计		281026	63134	100.000			


图41 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1427-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:02:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	93963	22288	33.884	5159	1.201	--
2	2.350	183346	39819	66.116	6096	1.085	3.336
总计		277309	62108	100.000			


图42 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1428-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:06:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.966	94526	22439	33.727	5158	1.202	--
2	2.349	185742	40404	66.273	6091	1.085	3.332
总计		280268	62842	100.000			


图43 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1429-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:10:09 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	94047	22312	34.049	5162	1.202	--
2	2.349	182165	39689	65.951	6095	1.086	3.330
总计		276212	62001	100.000			


图44 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1430-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:14:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.966	96397	22940	34.114	5162	1.202	--
2	2.349	186179	40634	65.886	6093	1.085	3.328
总计		282576	63574	100.000			


图45 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1431-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:17:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	91762	21690	33.619	5159	1.198	--
2	2.350	181186	39375	66.381	6096	1.086	3.326
总计		272948	61065	100.000			


图46 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1432-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:21:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	94125	22293	33.692	5160	1.203	--
2	2.349	185247	40371	66.308	6095	1.087	3.325
总计		279372	62664	100.000			


图47 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1433-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:25:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.969	94906	22546	34.029	5170	1.198	--
2	2.351	183991	39840	65.971	6108	1.087	3.323
总计		278897	62386	100.000			

图48 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1434-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:29:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.954	95119	21213	34.655	4446	1.206	--
2	2.334	179351	36692	65.345	5347	1.101	3.102
总计		274470	57905	100.000			


图49 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1435-2 - cbzj-LC1771p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:33:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	95062	21182	34.703	4447	1.212	--
2	2.335	178866	36598	65.297	5345	1.102	3.100
总计		273928	57780	100.000			

图50 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LC1771批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1436-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:37:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:08:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图51 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1437-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:41:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:08:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	94995	21213	21.028	4458	1.206	--
2	2.334	356759	73032	78.972	5341	1.107	3.092
总计		451753	94245	100.000			


图52 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1438-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:45:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.956	95270	21280	21.014	4453	1.205	--
2	2.334	358095	73309	78.986	5339	1.107	3.087
总计		453365	94589	100.000			


图53 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1439-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:49:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:08:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	94935	21174	21.028	4446	1.208	--
2	2.333	356529	73085	78.972	5339	1.108	3.084
总计		451463	94260	100.000			

图54 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1440-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:52:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:08:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.955	95562	21446	21.033	4499	1.200	--
2	2.333	358779	73757	78.967	5369	1.104	3.096
总计		454342	95203	100.000			


图55 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-4

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1441-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 17:56:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:08:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.957	94984	21184	21.012	4461	1.209	--
2	2.334	357054	72941	78.988	5347	1.108	3.082
总计		452038	94124	100.000			

图56 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1442-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:00:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:08:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	69360	16556	21.857	5160	1.194	--
2	2.350	247970	53885	78.143	6094	1.089	3.292
总计		317330	70441	100.000			


图57 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1443-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:04:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:08:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	67606	16110	21.256	5162	1.197	--
2	2.349	250444	54551	78.744	6094	1.088	3.291
总计		318050	70661	100.000			


图58 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1445-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:12:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:09:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	63899	15247	21.584	5161	1.195	--
2	2.349	232151	50574	78.416	6077	1.087	3.285
总计		296050	65821	100.000			


图60 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1446-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:16:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	65906	15735	20.965	5167	1.194	--
2	2.349	248454	54137	79.035	6097	1.087	3.284
总计		314360	69872	100.000			


图61 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1447-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:20:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	66348	15836	21.787	5167	1.195	--
2	2.348	238180	51974	78.213	6088	1.087	3.282
总计		304529	67809	100.000			


图62 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1448-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:24:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	89514	21378	21.391	5167	1.197	--
2	2.348	328946	71844	78.609	6085	1.090	3.277
总计		418459	93222	100.000			


图63 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1449-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:27:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	88182	21042	21.394	5174	1.197	--
2	2.347	324000	70782	78.606	6074	1.090	3.276
总计		412182	91824	100.000			


图64 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1450-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:31:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	86012	20549	21.316	5168	1.197	--
2	2.348	317493	69348	78.684	6083	1.090	3.272
总计		403504	89897	100.000			


图65 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1451-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:35:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.970	85589	20421	21.323	5168	1.196	--
2	2.347	315801	68999	78.677	6076	1.089	3.271
总计		401390	89420	100.000			


图66 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1452-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:39:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	88409	21112	20.528	5167	1.198	--
2	2.347	342260	74782	79.472	6077	1.090	3.267
总计		430669	95894	100.000			


图67 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1453-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:43:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	86199	20572	21.222	5164	1.195	--
2	2.346	319989	69935	78.778	6074	1.090	3.265
总计		406189	90507	100.000			


图68 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1454-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:47:19 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	93081	22262	21.015	5180	1.196	--
2	2.347	349840	76501	78.985	6084	1.091	3.264
总计		442921	98763	100.000			


图69 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1455-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:51:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.971	90870	21695	21.109	5157	1.196	--
2	2.346	339608	74226	78.891	6075	1.090	3.259
总计		430478	95921	100.000			

图70 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1456-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:55:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	86406	20625	20.454	5164	1.195	--
2	2.347	336032	73479	79.546	6098	1.090	3.257
总计		422437	94104	100.000			


图71 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1457-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 18:58:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	89925	21476	21.089	5171	1.196	--
2	2.347	336488	73530	78.911	6080	1.091	3.255
总计		426414	95006	100.000			


图72 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1458-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:02:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	92432	22107	20.167	5173	1.197	--
2	2.346	365890	80195	79.833	6112	1.090	3.254
总计		458322	102302	100.000			


图73 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1459-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:06:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	89864	21447	20.887	5168	1.196	--
2	2.346	340373	74395	79.113	6081	1.090	3.252
总计		430236	95841	100.000			


图74 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1460-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:10:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:09:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	93922	22447	20.916	5188	1.196	--
2	2.346	355129	77795	79.084	6106	1.090	3.252
总计		449051	100242	100.000			


图75 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1461-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:14:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	92830	22164	21.256	5172	1.197	--
2	2.346	343885	75199	78.744	6085	1.090	3.247
总计		436715	97363	100.000			


图76 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1462-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:18:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	91019	21699	21.053	5177	1.198	--
2	2.347	341313	74618	78.947	6082	1.090	3.245
总计		432332	96317	100.000			


图77 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1463-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:22:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:09:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	90877	21710	21.067	5162	1.195	--
2	2.346	340505	74446	78.933	6089	1.090	3.243
总计		431382	96156	100.000			


图78 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1464-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:26:11 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	92770	22132	19.990	5180	1.198	--
2	2.346	371310	81081	80.010	6076	1.091	3.241
总计		464080	103213	100.000			

图79 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1465-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:30:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:09:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.972	91416	21844	20.936	5179	1.197	--
2	2.345	345231	75322	79.064	6075	1.090	3.240
总计		436647	97166	100.000			

图80 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1466-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:33:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	94129	22450	20.877	5179	1.195	--
2	2.346	356751	77946	79.123	6078	1.091	3.237
总计		450881	100396	100.000			


图81 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1467-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:37:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	90376	21595	20.714	5172	1.196	--
2	2.345	345919	75453	79.286	6078	1.090	3.235
总计		436295	97048	100.000			


图82 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1469-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-32
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:45:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.973	90753	21680	20.923	5196	1.195	--
2	2.345	342993	75006	79.077	6103	1.089	3.235
总计		433746	96686	100.000			


图84 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1470-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:49:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	93878	22389	20.069	5187	1.199	--
2	2.345	373895	81613	79.931	6072	1.091	3.230
总计		467774	104002	100.000			


图85 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1471-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:53:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	91802	21848	20.883	5176	1.197	--
2	2.345	347791	76051	79.117	6086	1.090	3.229
总计		439593	97899	100.000			

图86 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1472-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 19:57:20 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	93527	22268	20.827	5177	1.198	--
2	2.345	355529	77579	79.173	6074	1.091	3.225
总计		449056	99847	100.000			


图87 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1473-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:01:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	92692	22058	21.070	5177	1.196	--
2	2.345	347228	75875	78.930	6103	1.089	3.224
总计		439920	97933	100.000			


图88 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1474-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:05:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	90234	21482	20.834	5172	1.197	--
2	2.345	342873	74820	79.166	6074	1.090	3.222
总计		433107	96302	100.000			


图89 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1475-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:09:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	92625	21967	21.172	5179	1.197	--
2	2.345	344857	75364	78.828	6084	1.090	3.223
总计		437481	97332	100.000			


图90 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1476-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:12:53 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.974	92267	21894	19.832	5169	1.199	--
2	2.345	372982	81373	80.168	6075	1.091	3.217
总计		465249	103267	100.000			


图91 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1477-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:16:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	90427	21413	20.555	5187	1.198	--
2	2.345	349500	76373	79.445	6085	1.091	3.220
总计		439926	97786	100.000			

图92 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1478-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:20:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:10:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	93284	22155	20.753	5179	1.197	--
2	2.345	356219	77644	79.247	6066	1.091	3.216
总计		449502	99799	100.000			


图93 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1479-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-16
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:24:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	93851	22211	21.185	5183	1.197	--
2	2.345	349146	76257	78.815	6083	1.090	3.217
总计		442997	98467	100.000			

图94 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1480-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:28:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:10:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	90500	21495	20.864	5183	1.199	--
2	2.344	343254	74759	79.136	6066	1.090	3.213
总计		433753	96254	100.000			


图95 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1481-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:32:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:45 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	89691	21293	20.640	5188	1.200	--
2	2.344	344856	75181	79.360	6084	1.090	3.215
总计		434547	96474	100.000			


图96 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1482-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:36:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:10:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.975	93332	22145	20.031	5189	1.198	--
2	2.344	372596	81106	79.969	6071	1.091	3.209
总计		465928	103251	100.000			

图97 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1483-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:40:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:10:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.976	91604	21641	20.623	5189	1.199	--
2	2.345	352570	77030	79.377	6093	1.090	3.210
总计		444174	98670	100.000			

图98 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1484-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:44:01 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:10:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	95315	21185	20.885	4486	1.207	--
2	2.329	361064	74553	79.115	5351	1.106	3.002
总计		456379	95737	100.000			


图99 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1485-2 - cbzj-LA6362p-js6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:47:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:10:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	95810	21423	20.858	4503	1.202	--
2	2.331	363524	75217	79.142	5369	1.105	3.011
总计		459334	96640	100.000			


图100 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1486-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-9
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:51:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图101 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定加速6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
溶剂




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1487-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:55:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:03 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	96655	21513	21.036	4466	1.203	--
2	2.329	362828	74890	78.964	5336	1.106	2.999
总计		459483	96404	100.000			


图102 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1488-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 20:59:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:11:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.961	95832	21318	20.999	4476	1.206	--
2	2.328	360531	74321	79.001	5346	1.107	3.001
总计		456363	95639	100.000			


图103 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-2

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1489-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:03:22 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:11:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	96153	21479	20.950	4487	1.204	--
2	2.330	362813	74893	79.050	5343	1.106	3.001
总计		458965	96371	100.000			


图104 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-3

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1490-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:07:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:11:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.962	96067	21418	20.944	4480	1.203	--
2	2.328	362626	74754	79.056	5337	1.106	2.996
总计		458693	96171	100.000			




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1491-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-18
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:11:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.963	96099	21442	20.943	4478	1.205	--
2	2.329	362771	74927	79.057	5343	1.105	2.997
总计		458870	96369	100.000			


图106 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-1-5

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1492-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:14:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:11:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	57398	13597	21.617	5179	1.195	--
2	2.345	208125	45447	78.383	6084	1.087	3.201
总计		265523	59044	100.000			

图107 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1493-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-10
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:18:49 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:20 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	46524	11047	20.979	5182	1.192	--
2	2.346	175242	38369	79.021	6094	1.085	3.202
总计		221766	49416	100.000			


图108 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1494-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-19
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:22:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:11:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.976	52240	12336	21.768	5169	1.193	--
2	2.344	187743	40955	78.232	6097	1.086	3.201
总计		239984	53291	100.000			


图109 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1495-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:26:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:11:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.976	54635	12932	22.204	5191	1.196	--
2	2.345	191423	41744	77.796	6078	1.086	3.201
总计		246059	54677	100.000			


图110 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1496-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-37
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:30:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:11:29 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.976	62686	14801	21.171	5171	1.195	--
2	2.344	233404	50783	78.829	6082	1.089	3.194
总计		296090	65584	100.000			


图111 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片5
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1497-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:34:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:11:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	54082	12800	21.843	5178	1.193	--
2	2.345	193511	42226	78.157	6079	1.087	3.197
总计		247593	55026	100.000			


图112 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-5min-片6
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1498-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-2
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:38:07 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	85741	20229	21.035	5193	1.199	--
2	2.343	321866	70038	78.965	6085	1.091	3.192
总计		407607	90267	100.000			


图113 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1499-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:41:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	81070	19230	20.699	5202	1.197	--
2	2.344	310590	67556	79.301	6074	1.091	3.193
总计		391660	86786	100.000			

图114 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1500-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-20
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:45:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:11:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	85492	20248	21.569	5187	1.195	--
2	2.343	310877	67605	78.431	6078	1.091	3.188
总计		396369	87853	100.000			


图115 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1501-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-29
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:49:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:11:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	78109	18506	21.596	5186	1.194	--
2	2.344	283567	61712	78.404	6076	1.090	3.190
总计		361676	80218	100.000			

图116 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1502-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-38
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:53:34 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	84099	19993	20.330	5202	1.193	--
2	2.343	329576	71703	79.670	6087	1.091	3.186
总计		413675	91697	100.000			

图117 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1503-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 21:57:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	78727	18677	21.808	5198	1.195	--
2	2.343	282271	61351	78.192	6077	1.090	3.189
总计		360997	80028	100.000			


图118 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-10min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1504-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-3
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:01:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	91994	21837	20.463	5200	1.196	--
2	2.343	357574	77610	79.537	6080	1.092	3.183
总计		449568	99447	100.000			

图119 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1505-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-12
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:05:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:56 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	89730	21252	20.400	5191	1.196	--
2	2.342	350131	75896	79.600	6071	1.092	3.181
总计		439861	97148	100.000			

图120 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1506-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-21
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:09:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:11:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	91605	21714	21.015	5189	1.194	--
2	2.343	344292	74733	78.985	6079	1.091	3.179
总计		435897	96447	100.000			


图121 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1507-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-30
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:12:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:12:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	86405	20440	21.507	5182	1.198	--
2	2.342	315346	68350	78.493	6069	1.091	3.178
总计		401751	88789	100.000			


图122 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片4
供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1508-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:16:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:12:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	92075	21908	20.540	5205	1.194	--
2	2.342	356197	77533	79.460	6096	1.091	3.177
总计		448272	99441	100.000			

图123 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1509-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:20:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.976	84216	19949	21.533	5191	1.198	--
2	2.342	306889	66646	78.467	6067	1.091	3.178
总计		391106	86595	100.000			

图124 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-15min-片6
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1510-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:24:26 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:12:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	94879	22570	20.540	5186	1.193	--
2	2.343	367044	79534	79.460	6079	1.092	3.173
总计		461923	102104	100.000			


图125 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1511-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-13
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:28:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	92350	21932	20.447	5200	1.194	--
2	2.342	359299	78091	79.553	6062	1.093	3.171
总计		451649	100024	100.000			


图126 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1512-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-22
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:32:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:12:16 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	93818	22348	21.014	5191	1.193	--
2	2.342	352637	76510	78.986	6082	1.092	3.171
总计		446455	98858	100.000			

图127 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片3
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1513-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-31
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:36:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:19 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	80257	19055	19.928	5198	1.194	--
2	2.341	322479	70244	80.072	6068	1.092	3.169
总计		402736	89299	100.000			

图128 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1514-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-40
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:39:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	94686	22611	20.636	5207	1.195	--
2	2.343	364153	79138	79.364	6077	1.092	3.168
总计		458838	101750	100.000			


图129 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1515-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:43:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:12:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	85440	20335	21.320	5181	1.192	--
2	2.342	315307	68473	78.680	6071	1.091	3.163
总计		400747	88808	100.000			


图130 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-20min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1516-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-5
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:47:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:12:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	94156	22438	20.282	5201	1.194	--
2	2.342	370086	80280	79.718	6079	1.093	3.166
总计		464242	102717	100.000			


图131 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片1
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1517-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-14
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:51:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:12:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.977	93514	22231	20.468	5201	1.196	--
2	2.341	363360	79306	79.532	6074	1.092	3.163
总计		456874	101537	100.000			

图132 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片2
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1518-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-23
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:55:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:33 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	94539	22549	20.984	5210	1.194	--
2	2.342	355980	77484	79.016	6090	1.090	3.164
总计		450518	100033	100.000			


图133 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1519-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-32
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 22:59:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	88252	21019	21.030	5193	1.195	--
2	2.341	331389	72295	78.970	6074	1.092	3.159
总计		419641	93314	100.000			


图134 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1520-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:02:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:12:39 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	92700	22139	20.180	5209	1.194	--
2	2.342	366667	79726	79.820	6076	1.092	3.160
总计		459367	101865	100.000			


图135 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片5
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1521-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-50
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:06:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	84968	20282	21.010	5204	1.192	--
2	2.342	319446	69471	78.990	6074	1.091	3.157
总计		404414	89753	100.000			


图136 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-30min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1522-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:10:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:12:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	94226	22494	20.382	5194	1.194	--
2	2.341	368064	80011	79.618	6060	1.093	3.154
总计		462289	102505	100.000			

图137 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1523-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-15
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:14:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	93774	22334	20.471	5197	1.193	--
2	2.341	364311	79538	79.529	6072	1.092	3.152
总计		458085	101872	100.000			


图138 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30 $^{\circ}$ C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1524-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-24
 进样体积: 10 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:18:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/21 11:12:50 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	93751	22353	20.906	5198	1.195	--
2	2.341	354687	77267	79.094	6064	1.093	3.154
总计		448439	99620	100.000			


图139 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1525-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-33
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:22:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	89467	21312	21.287	5202	1.194	--
2	2.341	330817	72268	78.713	6073	1.091	3.151
总计		420285	93580	100.000			


图140 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片4
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1526-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-42
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:26:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	93868	22401	20.460	5204	1.196	--
2	2.341	364926	79643	79.540	6060	1.092	3.150
总计		458794	102045	100.000			

图141 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1527-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:29:59 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:12:58 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	86752	20692	21.298	5203	1.193	--
2	2.341	320573	69967	78.702	6074	1.091	3.148
总计		407325	90659	100.000			


图142 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-45min-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1528-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-7
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:33:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:13:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	93415	22281	20.273	5205	1.194	--
2	2.340	367380	80273	79.727	6061	1.093	3.148
总计		460795	102554	100.000			

图143 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1529-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:37:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:13:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	93989	22435	20.523	5202	1.192	--
2	2.341	363975	79491	79.477	6068	1.092	3.145
总计		457965	101926	100.000			


图144 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片2
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1530-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-25
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:41:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2) : 2025/11/21 11:13:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	94117	22425	21.022	5198	1.195	--
2	2.340	353598	77293	78.978	6059	1.092	3.144
总计		447715	99718	100.000			


图145 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片3
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1531-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-34
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:45:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:13:09 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.980	89748	21437	21.327	5202	1.194	--
2	2.341	331068	72152	78.673	6076	1.092	3.144
总计		420817	93589	100.000			

图146 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1532-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:49:15 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:13:12 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.978	91528	21788	20.129	5184	1.192	--
2	2.339	363187	79473	79.871	6064	1.092	3.140
总计		454715	101261	100.000			

图147 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




SMF-4035

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1533-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-JX-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-52
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:53:05 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:13:15 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.979	87021	20706	21.343	5188	1.196	--
2	2.341	320707	70069	78.657	6071	1.091	3.141
总计		407727	90775	100.000			


图148 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转-极限转速-片6
 供试品溶液-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1534-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/20 23:56:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:13:18 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.965	95187	21197	21.038	4486	1.206	--
2	2.324	357268	73636	78.962	5329	1.106	2.939
总计		452455	94833	100.000			


图149 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-1

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温:30°C 波长: 240nm
 数据文件名: RC\$SMF-4035 - 27-37/30-1535-2 - cbzj-LA6362p-cq6y-rcqx-pH6.8jz-lf100z-jyx2-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-4035 - SMF-4035-rcqx-FX279.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-4035 - 20251120-FX279.lcb
 样品瓶号: 3-27
 进样体积: 10μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/21 00:00:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间 (V2): 2025/11/21 11:13:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX279)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 240nm

峰号	保留时间	面积	高度	面积%	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.967	95343	21154	21.029	4497	1.206	--
2	2.326	358052	73565	78.971	5341	1.106	2.942
总计		453395	94718	100.000			

图150 氨氯地平阿托伐他汀钙片溶出曲线测定长期6月HPLC图谱
 参比制剂-LA6362批-均一性2-pH6.8介质-篮法-100转
 对照品溶液-2-2