




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-142-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-9 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:09:41 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:38:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-143-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号:6.115
 进样体积 : 10µl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:13:04 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:38:58
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.749	836442	100.000	157803	2602	1.170	--
总计		836442	100.000	157803			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.102	125907	100.000	28187	1467	1.280	--
总计		125907	100.000	28187			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-144-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz1-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-18	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:16:28	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:01	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.743	835258	100.000	156495	2585	1.175	--
总计		835258	100.000	156495			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.099	124012	100.000	28131	1460	1.278	--
总计		124012	100.000	28131			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-145-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:19:51 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:04
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.741	837619	100.000	157732	2581	1.175	--
总计		837619	100.000	157732			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	125690	100.000	28328	1451	1.286	--
总计		125690	100.000	28328			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-146-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:23:14 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:07
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	835846	100.000	158125	2575	1.172	--
总计		835846	100.000	158125			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	124808	100.000	28314	1450	1.278	--
总计		124808	100.000	28314			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-147-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-18 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:26:37 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:10
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.742	837408	100.000	156957	2580	1.176	--
总计		837408	100.000	156957			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	125662	100.000	28209	1453	1.283	--
总计		125662	100.000	28209			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-148-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-5min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-1	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:30:00	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:13	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	9115	100.000	1754	2653	1.151	--
总计		9115	100.000	1754			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	9278	100.000	2122	1445	1.272	--
总计		9278	100.000	2122			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-149-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-5min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-10	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:33:22	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:15	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	10004	100.000	1935	2609	1.144	--
总计		10004	100.000	1935			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	13480	100.000	3090	1464	1.251	--
总计		13480	100.000	3090			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-150-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-5min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-19	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:36:44	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:18	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	13652	100.000	2621	2580	1.153	--
总计		13652	100.000	2621			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	21865	100.000	5008	1460	1.256	--
总计		21865	100.000	5008			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-151-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-5min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-28	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:40:06	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:21	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	6299	100.000	1215	2554	1.155	--
总计		6299	100.000	1215			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	11254	100.000	2566	1453	1.260	--
总计		11254	100.000	2566			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-152-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-5min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-37	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:43:28	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.739	10679	100.000	2034	2575	1.170	--
总计		10679	100.000	2034			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	16581	100.000	3820	1457	1.248	--
总计		16581	100.000	3820			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-153-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-5min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-46	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:46:50	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:26	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	10611	100.000	2038	2585	1.161	--
总计		10611	100.000	2038			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	18171	100.000	4165	1455	1.261	--
总计		18171	100.000	4165			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-154-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-2 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:50:12 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:28
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	31155	100.000	5991	2592	1.160	--
总计		31155	100.000	5991			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	59091	100.000	13454	1456	1.272	--
总计		59091	100.000	13454			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-155-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-11 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 16:53:35 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	31487	100.000	6025	2571	1.162	--
总计		31487	100.000	6025			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	67502	100.000	15449	1454	1.267	--
总计		67502	100.000	15449			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-156-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-10min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-20	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 16:56:57	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:34	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	31925	100.000	6124	2584	1.156	--
总计		31925	100.000	6124			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	75346	100.000	17202	1454	1.268	--
总计		75346	100.000	17202			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-157-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-29 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:00:19 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:37
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	25907	100.000	4990	2574	1.156	--
总计		25907	100.000	4990			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	60080	100.000	13740	1455	1.269	--
总计		60080	100.000	13740			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-158-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-10min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-38	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:03:42	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:39	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	29451	100.000	5638	2578	1.157	--
总计		29451	100.000	5638			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	76313	100.000	17432	1453	1.264	--
总计		76313	100.000	17432			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-159-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-10min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-47	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:07:04	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:42	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	29791	100.000	5680	2579	1.164	--
总计		29791	100.000	5680			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	76281	100.000	17325	1449	1.272	--
总计		76281	100.000	17325			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-160-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-15min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-3	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:10:26	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	41077	100.000	7802	2569	1.167	--
总计		41077	100.000	7802			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	88103	100.000	19985	1447	1.273	--
总计		88103	100.000	19985			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-161-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-15min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-12	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:13:48	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:47	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	40918	100.000	7805	2566	1.164	--
总计		40918	100.000	7805			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	88262	100.000	19886	1442	1.280	--
总计		88262	100.000	19886			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-162-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-21 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:17:11 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:50
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	40983	100.000	7845	2575	1.163	--
总计		40983	100.000	7845			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	90902	100.000	20685	1449	1.272	--
总计		90902	100.000	20685			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-163-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-15min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-30	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:20:33	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:52	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	39446	100.000	7555	2577	1.161	--
总计		39446	100.000	7555			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	92659	100.000	21010	1454	1.277	--
总计		92659	100.000	21010			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-164-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-15min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-39	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:23:57	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:55	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	39829	100.000	7613	2576	1.157	--
总计		39829	100.000	7613			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	94898	100.000	21665	1454	1.269	--
总计		94898	100.000	21665			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-165-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-15min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-48	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:27:19	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:39:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	39539	100.000	7545	2569	1.162	--
总计		39539	100.000	7545			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	91558	100.000	20835	1449	1.273	--
总计		91558	100.000	20835			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-166-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-4 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:30:41 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	48223	100.000	9194	2576	1.159	--
总计		48223	100.000	9194			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	98922	100.000	22466	1451	1.275	--
总计		98922	100.000	22466			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-167-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-13 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:34:03 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:03
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	45887	100.000	8770	2588	1.162	--
总计		45887	100.000	8770			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	95486	100.000	21726	1455	1.271	--
总计		95486	100.000	21726			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-168-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-20min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-22	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:37:25	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:06	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	44491	100.000	8499	2573	1.165	--
总计		44491	100.000	8499			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	95008	100.000	21660	1452	1.269	--
总计		95008	100.000	21660			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-169-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-20min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-31	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:40:47	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:08	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	44602	100.000	8506	2586	1.166	--
总计		44602	100.000	8506			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	100728	100.000	22897	1454	1.273	--
总计		100728	100.000	22897			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-170-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-40 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:44:10 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	44395	100.000	8480	2574	1.168	--
总计		44395	100.000	8480			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	102852	100.000	23218	1444	1.279	--
总计		102852	100.000	23218			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-171-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-20min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-49	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:47:31	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:13	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	44348	100.000	8461	2581	1.165	--
总计		44348	100.000	8461			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	98783	100.000	22475	1453	1.274	--
总计		98783	100.000	22475			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-172-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-30min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-5	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 17:50:54	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:16	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	50854	100.000	9700	2576	1.160	--
总计		50854	100.000	9700			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	106763	100.000	24073	1449	1.279	--
总计		106763	100.000	24073			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-173-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-14 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:54:16 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:18
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	97646	100.000	18652	2579	1.167	--
总计		97646	100.000	18652			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	104607	100.000	23700	1455	1.277	--
总计		104607	100.000	23700			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-174-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-23 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 17:57:38 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:21
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	50395	100.000	9532	2573	1.146	--
总计		50395	100.000	9532			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	103928	100.000	23480	1448	1.278	--
总计		103928	100.000	23480			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-175-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-32 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:01:00 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:24
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	49409	100.000	9397	2570	1.170	--
总计		49409	100.000	9397			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	108741	100.000	24522	1446	1.281	--
总计		108741	100.000	24522			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-176-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-30min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-41	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:04:22	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:26	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	50194	100.000	9623	2589	1.163	--
总计		50194	100.000	9623			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	112389	100.000	25444	1456	1.279	--
总计		112389	100.000	25444			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-177-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-50 版本号:6.115
 进样体积 : 10µl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:07:44 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	56747	100.000	10853	2589	1.162	--
总计		56747	100.000	10853			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	108011	100.000	24619	1456	1.271	--
总计		108011	100.000	24619			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-178-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-45min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-6	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:11:06	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:32	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	55627	100.000	10578	2572	1.169	--
总计		55627	100.000	10578			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	112435	100.000	25320	1450	1.282	--
总计		112435	100.000	25320			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-179-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-45min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-15	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:14:28	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:35	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	54728	100.000	10473	2585	1.160	--
总计		54728	100.000	10473			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	107157	100.000	24426	1457	1.270	--
总计		107157	100.000	24426			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-180-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-45min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-24 版本号:6.115
 进样体积 : 10µl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:17:50 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:37
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	53317	100.000	10168	2581	1.172	--
总计		53317	100.000	10168			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	108158	100.000	24329	1446	1.280	--
总计		108158	100.000	24329			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-181-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-45min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-33	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:21:12	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:40	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	53679	100.000	10257	2581	1.164	--
总计		53679	100.000	10257			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	113900	100.000	25942	1455	1.273	--
总计		113900	100.000	25942			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-182-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-45min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-42 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:24:34 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:43
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	54089	100.000	10262	2571	1.167	--
总计		54089	100.000	10262			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	116169	100.000	26201	1451	1.276	--
总计		116169	100.000	26201			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-183-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-45min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-51	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:27:56	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	53573	100.000	10278	2594	1.160	--
总计		53573	100.000	10278			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	112583	100.000	25462	1455	1.274	--
总计		112583	100.000	25462			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-184-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-60min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-7	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:31:18	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:48	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	58625	100.000	11107	2569	1.168	--
总计		58625	100.000	11107			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	115133	100.000	26249	1453	1.271	--
总计		115133	100.000	26249			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-185-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-60min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-16	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:34:40	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	57357	100.000	10911	2573	1.170	--
总计		57357	100.000	10911			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	110698	100.000	24964	1449	1.278	--
总计		110698	100.000	24964			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-186-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-60min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-25 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:38:03 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	55967	100.000	10709	2586	1.164	--
总计		55967	100.000	10709			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	109746	100.000	24949	1455	1.273	--
总计		109746	100.000	24949			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-187-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-60min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-34	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:41:25	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:56	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	56105	100.000	10720	2579	1.162	--
总计		56105	100.000	10720			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	117574	100.000	26556	1455	1.276	--
总计		117574	100.000	26556			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-188-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-60min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-43 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:44:47 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:40:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	55905	100.000	10670	2584	1.164	--
总计		55905	100.000	10670			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	117601	100.000	26553	1453	1.280	--
总计		117601	100.000	26553			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-189-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-60min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-52 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:48:08 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:01
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	54981	100.000	10485	2586	1.166	--
总计		54981	100.000	10485			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	111955	100.000	25494	1460	1.275	--
总计		111955	100.000	25494			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-190-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-8	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:51:31	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:04	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	60664	100.000	11605	2581	1.167	--
总计		60664	100.000	11605			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	121004	100.000	27375	1458	1.278	--
总计		121004	100.000	27375			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-191-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-17	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 18:54:54	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:07	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	58648	100.000	11219	2593	1.164	--
总计		58648	100.000	11219			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	111767	100.000	25434	1464	1.275	--
总计		111767	100.000	25434			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-192-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-26 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 18:58:17 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:10
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	57575	100.000	10949	2573	1.168	--
总计		57575	100.000	10949			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	111641	100.000	25313	1449	1.278	--
总计		111641	100.000	25313			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-193-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-35 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:01:40 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	58409	100.000	11095	2576	1.170	--
总计		58409	100.000	11095			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	120428	100.000	27142	1449	1.279	--
总计		120428	100.000	27142			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-194-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-44	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:05:04	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:15	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	58560	100.000	11189	2587	1.164	--
总计		58560	100.000	11189			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	121882	100.000	27547	1451	1.277	--
总计		121882	100.000	27547			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-195-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-53	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:08:26	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:18	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.733	56866	100.000	10859	2571	1.161	--
总计		56866	100.000	10859			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.095	114375	100.000	25913	1451	1.272	--
总计		114375	100.000	25913			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-196-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 1-27 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:11:49 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	834711	100.000	156877	2574	1.176	--
总计		834711	100.000	156877			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	124731	100.000	28170	1452	1.280	--
总计		124731	100.000	28170			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-197-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH4.5jz-150mg20mg-jf50z-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 1-27	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:15:12	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	834897	100.000	156546	2573	1.178	--
总计		834897	100.000	156546			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	124061	100.000	28151	1456	1.279	--
总计		124061	100.000	28151			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-198-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-9 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:18:36 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:25
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-199-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-18 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:22:00 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:28
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	818121	100.000	148562	2349	1.186	--
总计		818121	100.000	148562			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.087	120770	100.000	24895	1172	1.286	--
总计		120770	100.000	24895			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-200-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz1-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-18	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:25:24	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:31	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	821493	100.000	148652	2344	1.186	--
总计		821493	100.000	148652			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.086	121176	100.000	24930	1169	1.287	--
总计		121176	100.000	24930			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-201-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz1-3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-18	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:28:48	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:33	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	821383	100.000	148778	2352	1.186	--
总计		821383	100.000	148778			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.087	121811	100.000	24954	1168	1.293	--
总计		121811	100.000	24954			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-202-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz1-4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-18	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:32:12	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:36	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.729	820789	100.000	148749	2351	1.186	--
总计		820789	100.000	148749			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.087	121556	100.000	24946	1170	1.289	--
总计		121556	100.000	24946			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-203-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz1-5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-18	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:35:36	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:38	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	821631	100.000	148695	2347	1.186	--
总计		821631	100.000	148695			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.087	121036	100.000	24921	1166	1.285	--
总计		121036	100.000	24921			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-204-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-1 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:39:00 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.734	67121	100.000	12804	2585	1.167	--
总计		67121	100.000	12804			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	10199	100.000	2343	1470	1.252	--
总计		10199	100.000	2343			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-205-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-10 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:42:25 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:44
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	52693	100.000	10090	2587	1.169	--
总计		52693	100.000	10090			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	13128	100.000	3014	1461	1.256	--
总计		13128	100.000	3014			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-206-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-5min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-19	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:45:48	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:46	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	88342	100.000	16823	2587	1.171	--
总计		88342	100.000	16823			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	5576	100.000	1277	1461	1.239	--
总计		5576	100.000	1277			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-207-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-28 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 19:49:10 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:49
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	49622	100.000	9489	2586	1.166	--
总计		49622	100.000	9489			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	13076	100.000	2993	1459	1.247	--
总计		13076	100.000	2993			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-208-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-5min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-37	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:52:33	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	59877	100.000	11459	2591	1.170	--
总计		59877	100.000	11459			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	7571	100.000	1743	1484	1.255	--
总计		7571	100.000	1743			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-209-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-5min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-46	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:55:56	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:54	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	95426	100.000	18273	2597	1.166	--
总计		95426	100.000	18273			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	9183	100.000	2120	1476	1.245	--
总计		9183	100.000	2120			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-210-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-10min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-2	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 19:59:19	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:57	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	379459	100.000	71837	2583	1.171	--
总计		379459	100.000	71837			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	48162	100.000	11056	1466	1.263	--
总计		48162	100.000	11056			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-211-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-10min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-11	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:02:42	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:41:59	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	369198	100.000	69623	2578	1.175	--
总计		369198	100.000	69623			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	50025	100.000	11421	1463	1.268	--
总计		50025	100.000	11421			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-212-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-20 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 20:06:05 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	394605	100.000	74710	2582	1.173	--
总计		394605	100.000	74710			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	44756	100.000	10268	1467	1.266	--
总计		44756	100.000	10268			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-213-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-29 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 20:09:28 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:05
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	343484	100.000	65109	2585	1.174	--
总计		343484	100.000	65109			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	48818	100.000	11189	1464	1.265	--
总计		48818	100.000	11189			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-214-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-10min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-38	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:12:51	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:07	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	335024	100.000	63474	2580	1.174	--
总计		335024	100.000	63474			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	43634	100.000	10018	1468	1.268	--
总计		43634	100.000	10018			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-215-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-10min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-47	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:16:14	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:10	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	385586	100.000	73166	2592	1.173	--
总计		385586	100.000	73166			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	47553	100.000	10934	1471	1.263	--
总计		47553	100.000	10934			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-216-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-15min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-3	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:19:38	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:13	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	529975	100.000	99845	2578	1.175	--
总计		529975	100.000	99845			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	62633	100.000	14318	1464	1.270	--
总计		62633	100.000	14318			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-217-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-15min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-12	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:23:01	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:15	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	528180	100.000	99983	2583	1.173	--
总计		528180	100.000	99983			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	65182	100.000	14896	1465	1.271	--
总计		65182	100.000	14896			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-218-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-15min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-21	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:26:24	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:18	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	545205	100.000	102924	2582	1.174	--
总计		545205	100.000	102924			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	64232	100.000	14653	1463	1.271	--
总计		64232	100.000	14653			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-219-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-15min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-30	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:29:48	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:20	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	515001	100.000	97351	2577	1.174	--
总计		515001	100.000	97351			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	64744	100.000	14759	1460	1.273	--
总计		64744	100.000	14759			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-220-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-15min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-39	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:33:11	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:23	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	528591	100.000	100110	2583	1.173	--
总计		528591	100.000	100110			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	64534	100.000	14733	1465	1.275	--
总计		64534	100.000	14733			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-221-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-15min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-48	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:36:34	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:26	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	523990	100.000	98870	2578	1.174	--
总计		523990	100.000	98870			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	61936	100.000	14122	1459	1.270	--
总计		61936	100.000	14122			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-222-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-20min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-4	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:39:57	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:29	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	619247	100.000	117075	2583	1.174	--
总计		619247	100.000	117075			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	70925	100.000	16175	1465	1.273	--
总计		70925	100.000	16175			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-223-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-20min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-13	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:43:21	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:31	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.735	604979	100.000	113747	2575	1.175	--
总计		604979	100.000	113747			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.096	71763	100.000	16416	1462	1.272	--
总计		71763	100.000	16416			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-224-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-20min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-22	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:46:44	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:34	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	618065	100.000	116695	2577	1.174	--
总计		618065	100.000	116695			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	71545	100.000	16363	1465	1.269	--
总计		71545	100.000	16363			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-225-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-20min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-31	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:50:08	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:37	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	613014	100.000	115853	2587	1.174	--
总计		613014	100.000	115853			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	73456	100.000	16718	1466	1.276	--
总计		73456	100.000	16718			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-226-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-40 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 20:53:31 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	619208	100.000	117157	2582	1.173	--
总计		619208	100.000	117157			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	72704	100.000	16610	1461	1.271	--
总计		72704	100.000	16610			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-227-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-20min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-49	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 20:56:54	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:42	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	609066	100.000	115366	2583	1.172	--
总计		609066	100.000	115366			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	69973	100.000	15982	1462	1.272	--
总计		69973	100.000	15982			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-228-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-30min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-5	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:00:18	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:45	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	725137	100.000	136786	2584	1.174	--
总计		725137	100.000	136786			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	81039	100.000	18485	1466	1.274	--
总计		81039	100.000	18485			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-229-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-30min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-14	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:03:42	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:47	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	701105	100.000	132361	2583	1.173	--
总计		701105	100.000	132361			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	81490	100.000	18454	1464	1.278	--
总计		81490	100.000	18454			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-230-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-30min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-23	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:07:05	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:50	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	710139	100.000	134005	2579	1.173	--
总计		710139	100.000	134005			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	80937	100.000	18502	1467	1.272	--
总计		80937	100.000	18502			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-231-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-30min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-32	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:10:29	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:53	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	708564	100.000	133734	2579	1.173	--
总计		708564	100.000	133734			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	81453	100.000	18599	1462	1.272	--
总计		81453	100.000	18599			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-232-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-41 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 21:13:52 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	732193	100.000	138311	2587	1.173	--
总计		732193	100.000	138311			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	83384	100.000	19034	1464	1.275	--
总计		83384	100.000	19034			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-233-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-30min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-50	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:17:16	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:42:58	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	695992	100.000	131456	2576	1.172	--
总计		695992	100.000	131456			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	78271	100.000	17845	1463	1.271	--
总计		78271	100.000	17845			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-234-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-45min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-6	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:20:39	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:01	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	787027	100.000	148923	2590	1.173	--
总计		787027	100.000	148923			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	87678	100.000	19991	1470	1.276	--
总计		87678	100.000	19991			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-235-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-45min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-15	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:24:03	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:03	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	775698	100.000	146188	2585	1.174	--
总计		775698	100.000	146188			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	88827	100.000	20325	1471	1.274	--
总计		88827	100.000	20325			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-236-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-45min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-24	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:27:26	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:06	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	783026	100.000	147703	2581	1.173	--
总计		783026	100.000	147703			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	89118	100.000	20292	1466	1.277	--
总计		89118	100.000	20292			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-237-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-45min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-33 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 21:30:49 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:09
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	767316	100.000	144751	2580	1.173	--
总计		767316	100.000	144751			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	87036	100.000	19930	1468	1.271	--
总计		87036	100.000	19930			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-238-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-45min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-42	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:34:13	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:11	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	802634	100.000	151435	2582	1.173	--
总计		802634	100.000	151435			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	90462	100.000	20706	1465	1.272	--
总计		90462	100.000	20706			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-239-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-45min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-51 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 21:37:36 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	762124	100.000	144182	2585	1.172	--
总计		762124	100.000	144182			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	85366	100.000	19473	1467	1.272	--
总计		85366	100.000	19473			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-240-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-60min-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-7	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:41:00	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:17	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	813205	100.000	153328	2586	1.174	--
总计		813205	100.000	153328			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	90915	100.000	20788	1467	1.276	--
总计		90915	100.000	20788			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-241-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-60min-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-16	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:44:26	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:19	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	797193	100.000	150686	2580	1.173	--
总计		797193	100.000	150686			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	92685	100.000	21109	1464	1.276	--
总计		92685	100.000	21109			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-242-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-60min-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-25	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:47:49	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:22	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	815038	100.000	153693	2578	1.173	--
总计		815038	100.000	153693			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	93424	100.000	21366	1466	1.276	--
总计		93424	100.000	21366			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-243-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-60min-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-34	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:51:13	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:25	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	824985	100.000	155861	2588	1.173	--
总计		824985	100.000	155861			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	94393	100.000	21548	1470	1.275	--
总计		94393	100.000	21548			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-244-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-60min-P5.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-43	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:54:37	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:27	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	836135	100.000	157496	2585	1.174	--
总计		836135	100.000	157496			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	95105	100.000	21727	1469	1.277	--
总计		95105	100.000	21727			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-245-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-60min-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-52	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 21:58:01	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:30	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	802937	100.000	151434	2582	1.172	--
总计		802937	100.000	151434			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	90546	100.000	20668	1461	1.273	--
总计		90546	100.000	20668			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-246-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-8	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:01:24	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:33	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	816499	100.000	154326	2581	1.172	--
总计		816499	100.000	154326			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	92334	100.000	21053	1462	1.275	--
总计		92334	100.000	21053			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-247-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-17	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:04:49	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:36	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.736	800244	100.000	150525	2578	1.174	--
总计		800244	100.000	150525			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.097	93349	100.000	21310	1467	1.276	--
总计		93349	100.000	21310			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-248-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P3.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-26	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:08:12	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:38	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	829983	100.000	156922	2585	1.172	--
总计		829983	100.000	156922			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	96030	100.000	21939	1468	1.276	--
总计		96030	100.000	21939			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-249-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P4.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-35	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:11:35	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:41	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	828748	100.000	156193	2583	1.173	--
总计		828748	100.000	156193			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	95157	100.000	21751	1467	1.274	--
总计		95157	100.000	21751			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.0ml/min
 柱温 : 40°C 波长:237nm/250nm
 数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-250-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm
 批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb
 样品瓶号 : 2-44 版本号:6.115
 进样体积 : 10μl 实验者:xiechoajun
 进样时间 : 2025/11/24 22:14:58 处理者:xiechoajun
 处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:43
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.738	853341	100.000	161166	2592	1.173	--
总计		853341	100.000	161166			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	97959	100.000	22338	1470	1.276	--
总计		97959	100.000	22338			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-251-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-jxzs-P6.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-53	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:18:22	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:46	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.737	807615	100.000	152661	2584	1.173	--
总计		807615	100.000	152661			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.098	91850	100.000	20994	1466	1.273	--
总计		91850	100.000	20994			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5µm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-252-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz2-1.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-27	版本号:6.115
进样体积 : 10µl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:21:46	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:49	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.731	825864	100.000	149959	2354	1.181	--
总计		825864	100.000	149959			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	121610	100.000	25076	1170	1.282	--
总计		121610	100.000	25076			




SMF-227

<样品信息>


色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)	流速: 1.0ml/min
柱温 : 40°C	波长:237nm/250nm
数据文件名: RC\$SMF-227 - 0-11/11-253-2 - zzp-25111201p-rcqx-pH6.8jz-150mg20mg-jf50z-dz2-2.lcd	
方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX260.lcm	
批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251124-FX260.lcb	
样品瓶号 : 2-27	版本号:6.115
进样体积 : 10μl	实验者:xiechoajun
进样时间 : 2025/11/24 22:25:10	处理者:xiechoajun
处理时间 (V2) : 2025/11/25 11:43:51	
仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX260)	

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.730	822142	100.000	148887	2352	1.186	--
总计		822142	100.000	148887			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.088	121480	100.000	24893	1170	1.289	--
总计		121480	100.000	24893			