




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-4-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzp1-1.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 18:33:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:16:48		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.247	160016	100.000	15962	1154	1.177	--
总计		160016	100.000	15962			


图2 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-5-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzp1-2.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 18:38:40	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:16:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.245	159682	100.000	15992	1159	1.175	--
总计		159682	100.000	15992			


图3 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-6-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzp1-3.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 18:44:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:16:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.244	159687	100.000	16013	1162	1.175	--
总计		159687	100.000	16013			


图4 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-7-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzpl-4.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 18:49:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:16:57		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.242	159325	100.000	16060	1170	1.172	--
总计		159325	100.000	16060			


图5 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-8-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzpl-5.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-18	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 18:54:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:16:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.241	159327	100.000	16045	1168	1.173	--
总计		159327	100.000	16045			


图6 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-9-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp1.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:00:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图7 吡哌美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-10-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:05:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图8 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-11-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:10:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图9 吡哌美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-12-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp4.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:16:16	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:10		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图10 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-13-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp5.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:21:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图11 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min  
供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-14-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp6.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:27:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图12 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-15-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp7.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:32:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图13 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-16-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp8.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-11	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:37:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图14 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5μm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-17-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp9.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 μl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:43:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图15 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-18-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:48:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图16 吡啉美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-19-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-60min-gsp11.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 19:53:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图17 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-60min<br>供试品溶液-1






**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-22-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-120min-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 20:09:52	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							


图20 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-120min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-23-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-120min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 20:15:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:39		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图21 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-120min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-25-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-120min-gsp5.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 20:25:56	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:17:45		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图23 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-120min<br>供试品溶液-1














**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-32-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-120min-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:03:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.290	311	100.000	40	2102	1.192	--
总计		311	100.000	40			


图30 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-120min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-33-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp1.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-5	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:08:49	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:05		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	1596	100.000	199	1835	1.240	--
总计		1596	100.000	199			

图31 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-35-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:20:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:11		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	628	100.000	78	1871	1.209	--
总计		628	100.000	78			


图33 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-36-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp4.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:25:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:13		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	1478	100.000	185	1714	1.189	--
总计		1478	100.000	185			

图34 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-38-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp6.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-50	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:36:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	2026	100.000	248	1830	1.222	--
总计		2026	100.000	248			


图36 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-39-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp7.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-6	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:41:31	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.284	1089	100.000	133	1777	1.158	--
总计		1089	100.000	133			


图37 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-40-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp8.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-15	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:46:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:25		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	1331	100.000	164	1799	1.196	--
总计		1331	100.000	164			


图38 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-41-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp9.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-24	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:52:15	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:27		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	1186	100.000	147	1895	1.222	--
总计		1186	100.000	147			


图39 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱  
自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min  
供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-42-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 21:57:36	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:30		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	1182	100.000	148	1884	1.202	--
总计		1182	100.000	148			

图40 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-44-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-240min-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 22:08:19	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:35		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	1658	100.000	198	1784	1.245	--
总计		1658	100.000	198			


图42 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-240min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-45-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp1.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-7	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 22:13:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	2199	100.000	269	1794	1.198	--
总计		2199	100.000	269			

图43 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-47-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 22:24:25	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.285	729	100.000	93	1778	1.126	--
总计		729	100.000	93			


图45 吡啉美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-48-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp4.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-34	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 22:29:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	2471	100.000	300	1769	1.248	--
总计		2471	100.000	300			

图46 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-50-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp6.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-52	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 22:40:29	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	3165	100.000	387	1761	1.201	--
总计		3165	100.000	387			


图48 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-51-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp7.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-8	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 22:45:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:18:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	1440	100.000	176	1857	1.240	--
总计		1440	100.000	176			

图49 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1






**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-54-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-35	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 23:01:58	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:01		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	1418	100.000	173	1830	1.286	--
总计		1418	100.000	173			

图52 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-56-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-360min-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-53	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 23:12:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:06		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	2147	100.000	263	1829	1.171	--
总计		2147	100.000	263			

图54 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-360min<br>供试品溶液-1






**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-59-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-480min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 23:28:54	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:14		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	741	100.000	89	1938	1.403	--
总计		741	100.000	89			

图57 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-480min<br>供试品溶液-1






**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-62-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-480min-gsp6.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/19 23:45:03	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	4004	100.000	487	1796	1.213	--
总计		4004	100.000	487			

图60 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-480min<br>供试品溶液-1












**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-68-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-480min-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 00:17:21	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:37		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.278	2355	100.000	289	1810	1.232	--
总计		2355	100.000	289			


图66 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-480min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-69-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-720min-gsp1.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 00:22:44	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:40		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	4197	100.000	518	1826	1.192	--
总计		4197	100.000	518			


图67 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-720min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-70-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-720min-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 00:28:07	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:19:43		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	1155	100.000	145	1878	1.239	--
总计		1155	100.000	145			

图68 吡啉美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-720min<br>供试品溶液-1
















**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-78-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-720min-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 01:11:12	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	2294	100.000	286	1862	1.181	--
总计		2294	100.000	286			

图76 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-720min<br>供试品溶液-1








**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-82-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1080min-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-14	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 01:32:46	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	1506	100.000	188	1994	1.178	--
总计		1506	100.000	188			


图80 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1080min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-83-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1080min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-23	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 01:38:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:19		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.283	1329	100.000	165	1934	1.181	--
总计		1329	100.000	165			


图81 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1080min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-84-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1080min-gsp4.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-32	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 01:43:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:22		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	7782	100.000	965	1849	1.196	--
总计		7782	100.000	965			


图82 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1080min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-85-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1080min-gsp5.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-41	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 01:48:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:24		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.279	1018	100.000	128	2036	1.128	--
总计		1018	100.000	128			

图83 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1080min<br>供试品溶液-1










**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-90-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1080min-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-33	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 02:15:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	3015	100.000	379	1882	1.213	--
总计		3015	100.000	379			

图88 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1080min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-92-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1080min-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-51	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 02:26:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	5237	100.000	651	1873	1.188	--
总计		5237	100.000	651			

图90 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1080min<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-94-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1440min-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-16	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 02:37:24	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.281	1259	100.000	159	1843	1.188	--
总计		1259	100.000	159			


图92 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1440min<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-95-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1440min-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-25	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 02:42:47	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:20:52		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.280	1077	100.000	134	1840	1.159	--
总计		1077	100.000	134			

图93 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1440min<br>供试品溶液-1












**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-101-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-1440min-gsp9.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 2-26	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 03:15:06	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.282	1847	100.000	227	1829	1.159	--
总计		1847	100.000	227			

图99 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600-1440min<br>供试品溶液-1








**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-105-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzp2-1.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 03:36:41	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:18		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	156940	100.000	16138	1213	1.170	--
总计		156940	100.000	16138			


图103 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-106-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-dzp2-2.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 1-27	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 03:42:04	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	157189	100.000	16111	1205	1.173	--
总计		157189	100.000	16111			


图104 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-107-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp1.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-1	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 03:47:26	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	278773	100.000	28466	1195	1.170	--
总计		278773	100.000	28466			


图105 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-108-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-10	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 03:52:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:26		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	326075	100.000	32318	1189	1.186	--
总计		326075	100.000	32318			


图106 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-109-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-19	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 03:58:10	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:28		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	285544	100.000	28221	1187	1.191	--
总计		285544	100.000	28221			


图107 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-110-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp4.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-28	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:03:32	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:31		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	318310	100.000	31483	1191	1.188	--
总计		318310	100.000	31483			


图108 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-111-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp5.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-37	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:08:53	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:33		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	312609	100.000	30901	1192	1.190	--
总计		312609	100.000	30901			


图109 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-112-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp6.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-46	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:14:14	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:36		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	278248	99.646	27602	1196	1.187	--
2	2.608	987	0.354	42	873	3.874	1.224
总计		279235	100.000	27644			


图110 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-113-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp7.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-2	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:19:35	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:38		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	275515	96.898	27806	1189	1.195	--
2	2.607	8821	3.102	511	15	--	0.255
总计		284336	100.000	28317			

图111 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1




**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-115-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp9.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-20	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:30:18	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:44		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	309520	100.000	30518	1192	1.189	--
总计		309520	100.000	30518			


图113 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-116-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-29	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:35:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:46		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	318644	100.000	31412	1186	1.189	--
总计		318644	100.000	31412			


图114 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-117-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp11.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-38	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:41:00	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:49		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	298037	99.642	29193	1186	1.200	--
2	2.600	1069	0.358	41	983	5.317	1.240
总计		299107	100.000	29234			


图115 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-118-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pw-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-47	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:46:22	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:51		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.233	307655	100.000	30112	1193	1.196	--
总计		307655	100.000	30112			


图116 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-119-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp1.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-3	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:51:43	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:54		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	115779	93.884	11667	1198	1.229	--
2	2.604	7542	6.116	404	13	--	0.233
总计		123321	100.000	12071			


图117 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-120-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp2.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-12	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 04:57:05	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:56		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	115902	100.000	11752	1197	1.166	--
总计		115902	100.000	11752			


图118 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-121-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp3.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-21	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:02:27	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:21:59		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	108039	100.000	11010	1198	1.167	--
总计		108039	100.000	11010			


图119 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-122-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp4.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-30	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:07:48	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:02		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.234	141679	100.000	14455	1198	1.164	--
总计		141679	100.000	14455			


图120 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-123-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp5.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-39	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:13:09	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:04		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	120721	100.000	12263	1196	1.166	--
总计		120721	100.000	12263			


图121 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-124-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp6.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-48	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:18:30	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:07		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	96811	100.000	9867	1195	1.162	--
总计		96811	100.000	9867			


图122 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-125-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp7.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-4	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:23:51	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:09		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	90527	100.000	9232	1197	1.156	--
总计		90527	100.000	9232			


图123 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-126-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp8.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-13	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:29:13	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:12		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	130575	100.000	13311	1198	1.162	--
总计		130575	100.000	13311			


图124 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-127-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp9.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-22	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:34:34	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:15		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	112369	100.000	11483	1196	1.163	--
总计		112369	100.000	11483			


图125 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 9-2/9-128-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp10.lcd		
方法文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKSS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-31	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:39:55	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:17		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.235	89824	100.000	9160	1198	1.162	--
总计		89824	100.000	9160			


图126 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions** **YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-129-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp11.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-40	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:45:17	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:20		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	86262	100.000	8770	1196	1.155	--
总计		86262	100.000	8770			


图127 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1

**SHIMADZU**  
**LabSolutions YMP-4085**

<样品信息>

色谱柱	: XB-C8(50mm*4.6mm,5µm)	流速	: 1.0ml/min
柱温	: 40°C	波长	: 254nm
数据文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 9-2/9-130-2 - YMP-4085-twtp-1-600z-pn-gsp12.lcd		
方法文件名	: TWKS\$YMP-4085 - YMP-4085-TWTP-FX258.lcm		
批处理文件名	: TWKS\$YMP-4085 - 20251119-FX258.lcb		
样品瓶号	: 3-49	版本号	: 6.115
进样体积	: 10 µl	实验者	: xiexinhui
进样时间	: 2025/11/20 05:50:38	处理者	: xiexinhui
处理时间(V2)	: 2025/11/20 10:22:23		
仪器型号	: SHIMADZU LC-2050C (FX258)		

<色谱图>



<峰表>

检测器A 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.236	91275	100.000	9271	1196	1.157	--
总计		91275	100.000	9271			

图128 吡啶美辛搽剂溶出曲线测定HPLC图谱<br>自制品-twt批-  
PBS7.4介质-600<br>供试品溶液-1