




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-946-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:09:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:57:40 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-948-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:16:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:57:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	2741861	100.000	674999	6591	1.122	--
总计		2741861	100.000	674999			

图3 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-949-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:19:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:57:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	2734912	100.000	668523	6577	1.122	--
总计		2734912	100.000	668523			

图4 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-950-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:23:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:57:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	2736471	100.000	674742	6605	1.121	--
总计		2736471	100.000	674742			

图5 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-951-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:26:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:57:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	2739804	100.000	673771	6578	1.121	--
总计		2739804	100.000	673771			

图6 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-952-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:29:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.163	2450423	100.000	606333	6670	1.123	--
总计		2450423	100.000	606333			

图7 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-953-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-5min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-10
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:33:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	2449459	100.000	606294	6672	1.121	--
总计		2449459	100.000	606294			

图8 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-954-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:36:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	2505676	100.000	618451	6655	1.122	--
总计		2505676	100.000	618451			

图9 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-955-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:39:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2492506	100.000	613172	6644	1.122	--
总计		2492506	100.000	613172			

图10 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-956-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:43:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2497166	100.000	614581	6627	1.120	--
总计		2497166	100.000	614581			

图11 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-957-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-5min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:46:38 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	2516387	100.000	615838	6633	1.123	--
总计		2516387	100.000	615838			

图12 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-958-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:49:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2507017	100.000	618762	6668	1.121	--
总计		2507017	100.000	618762			

图13 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-959-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:53:21 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2558639	100.000	630814	6654	1.124	--
总计		2558639	100.000	630814			

图14 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-960-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 15:56:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	2579747	100.000	636952	6656	1.123	--
总计		2579747	100.000	636952			

图15 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-961-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:00:06 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:26 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2564253	100.000	631103	6630	1.121	--
总计		2564253	100.000	631103			

图16 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-962-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:03:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:29 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2552950	100.000	625798	6658	1.125	--
总计		2552950	100.000	625798			

图17 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-963-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:06:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:32 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2573827	100.000	628187	6608	1.122	--
总计		2573827	100.000	628187			

图18 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-964-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:10:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:35 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2517656	100.000	621059	6663	1.121	--
总计		2517656	100.000	621059			

图19 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-965-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:13:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2552539	100.000	629087	6663	1.123	--
总计		2552539	100.000	629087			

图20 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-966-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:16:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	2578203	100.000	631258	6639	1.123	--
总计		2578203	100.000	631258			

图21 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-967-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:20:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2568061	100.000	627652	6620	1.123	--
总计		2568061	100.000	627652			

图22 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-968-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:23:40 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2556290	100.000	623398	6607	1.122	--
总计		2556290	100.000	623398			

图23 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-969-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:27:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V3): 2025/11/24 16:58:49 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.162	2590333	100.000	637374	6610	1.122	--
总计		2590333	100.000	637374			

图24 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-970-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:30:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V3): 2025/11/24 16:58:52 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2509957	100.000	616504	6666	1.125	--
总计		2509957	100.000	616504			

图25 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-971-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:33:46 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2545791	100.000	624372	6662	1.123	--
总计		2545791	100.000	624372			

图26 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-972-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:37:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:58:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	2551098	100.000	630223	6692	1.125	--
总计		2551098	100.000	630223			

图27 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-973-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:40:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:01 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	2558238	100.000	630096	6613	1.123	--
总计		2558238	100.000	630096			

图28 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-977-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:53:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.159	2543863	100.000	621921	6644	1.124	--
总计		2543863	100.000	621921			

图32 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-978-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 16:57:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	2550798	100.000	629497	6620	1.123	--
总计		2550798	100.000	629497			

图33 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-979-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-30min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-32
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:00:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2535970	100.000	624153	6606	1.125	--
总计		2535970	100.000	624153			

图34 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-980-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:04:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	2543100	100.000	626669	6562	1.120	--
总计		2543100	100.000	626669			

图35 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-981-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:07:30 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.157	2565542	100.000	632027	6580	1.122	--
总计		2565542	100.000	632027			

图36 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-982-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:10:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	2490877	100.000	616487	6631	1.124	--
总计		2490877	100.000	616487			

图37 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-983-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:14:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.161	2523932	100.000	621790	6654	1.123	--
总计		2523932	100.000	621790			

图38 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-984-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:17:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	2537565	100.000	627714	6591	1.123	--
总计		2537565	100.000	627714			

图39 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-985-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:20:58 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	2530963	100.000	619929	6617	1.123	--
总计		2530963	100.000	619929			

图40 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-986-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:24:20 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	2529825	100.000	624730	6584	1.122	--
总计		2529825	100.000	624730			

图41 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-987-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:27:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	2535241	100.000	625662	6605	1.122	--
总计		2535241	100.000	625662			

图42 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-988-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:31:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2731480	100.000	669971	6550	1.122	--
总计		2731480	100.000	669971			

图43 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-989-3 - cbzj-240920336p-rcqx-1-pH7.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:34:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	2721661	100.000	670033	6594	1.122	--
总计		2721661	100.000	670033			

图44 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-990-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-9
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:37:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图45 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
溶剂




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-991-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:41:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	2728988	100.000	665508	6550	1.124	--
总计		2728988	100.000	665508			

图46 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-992-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:44:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 16:59:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.154	2735249	100.000	672751	6540	1.121	--
总计		2735249	100.000	672751			

图47 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-993-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:48:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2720800	100.000	669977	6585	1.125	--
总计		2720800	100.000	669977			

图48 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-994-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:51:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2740272	100.000	669114	6515	1.122	--
总计		2740272	100.000	669114			

图49 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-995-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:54:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.160	2734894	100.000	670766	6607	1.123	--
总计		2734894	100.000	670766			

图50 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-996-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-5min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-1
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 17:58:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:08 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2536361	100.000	625520	6596	1.123	--
总计		2536361	100.000	625520			

图51 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-998-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-5min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-19
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:05:04 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2462193	100.000	606621	6619	1.124	--
总计		2462193	100.000	606621			

图53 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱:XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-999-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-5min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-28
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:08:26 实验者: wangdan
 处理时间 (V3): 2025/11/24 17:00:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	2534511	100.000	625519	6602	1.122	--
总计		2534511	100.000	625519			

图54 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1000-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-5min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-37
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:11:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2518835	100.000	625185	6615	1.124	--
总计		2518835	100.000	625185			

图55 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1002-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-10min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-2
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:18:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2607365	100.000	640932	6593	1.123	--
总计		2607365	100.000	640932			

图57 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1003-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-10min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-11
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:21:59 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	2627835	100.000	647213	6614	1.122	--
总计		2627835	100.000	647213			

图58 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1004-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-10min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-20
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:25:22 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	2524540	100.000	622682	6597	1.121	--
总计		2524540	100.000	622682			

图59 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1005-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-10min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-29
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:28:45 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.158	2596853	100.000	637458	6608	1.123	--
总计		2596853	100.000	637458			

图60 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1006-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-10min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-38
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:32:09 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:37 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	2659673	100.000	653665	6537	1.119	--
总计		2659673	100.000	653665			

图61 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1007-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-10min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-47
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:35:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2618687	100.000	646945	6610	1.124	--
总计		2618687	100.000	646945			

图62 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1008-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-15min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-3
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:38:56 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2604182	100.000	644969	6600	1.122	--
总计		2604182	100.000	644969			

图63 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1009-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-15min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-12
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:42:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.155	2608314	100.000	648358	6663	1.123	--
总计		2608314	100.000	648358			

图64 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1010-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-15min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-21
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:45:43 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	2514882	100.000	617526	6635	1.122	--
总计		2514882	100.000	617526			

图65 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1011-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-15min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-30
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:49:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2577819	100.000	633229	6578	1.122	--
总计		2577819	100.000	633229			

图66 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1012-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-15min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-39
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:52:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:54 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2572152	100.000	632638	6626	1.124	--
总计		2572152	100.000	632638			

图67 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1013-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-15min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:55:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:00:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	2622779	100.000	642704	6600	1.124	--
总计		2622779	100.000	642704			

图68 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1014-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-20min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-4
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 18:59:19 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2600061	100.000	640280	6577	1.125	--
总计		2600061	100.000	640280			

图69 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1015-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-20min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:02:44 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	2592779	100.000	643854	6614	1.122	--
总计		2592779	100.000	643854			

图70 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1016-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-20min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-22
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:06:08 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.153	2517303	100.000	619827	6580	1.121	--
总计		2517303	100.000	619827			

图71 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1017-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-20min-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-31
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:09:31 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.148	2572422	100.000	635270	6551	1.122	--
总计		2572422	100.000	635270			

图72 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1018-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-20min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-40
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:12:54 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:12 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2569955	100.000	630987	6542	1.123	--
总计		2569955	100.000	630987			

图73 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1019-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-20min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:16:17 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:15 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2617550	100.000	639123	6563	1.123	--
总计		2617550	100.000	639123			

图74 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1020-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-30min-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-5
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:19:41 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:18 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2566362	100.000	633248	6645	1.123	--
总计		2566362	100.000	633248			

图75 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1021-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-30min-P2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:23:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:21 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	2577487	100.000	632340	6658	1.126	--
总计		2577487	100.000	632340			

图76 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1022-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-30min-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-23
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:26:28 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:24 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.145	2481867	100.000	614421	6606	1.121	--
总计		2481867	100.000	614421			

图77 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1024-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-30min-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-41
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:33:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.147	2540612	100.000	629431	6577	1.123	--
总计		2540612	100.000	629431			

图79 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1025-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-30min-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-50
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:36:38 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2599249	100.000	639369	6528	1.122	--
总计		2599249	100.000	639369			

图80 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1026-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:40:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	2572038	100.000	636268	6636	1.124	--
总计		2572038	100.000	636268			

图81 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1028-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-24
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:46:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.156	2479859	100.000	612885	6616	1.122	--
总计		2479859	100.000	612885			

图83 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1029-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:50:15 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.150	2535052	100.000	623160	6585	1.123	--
总计		2535052	100.000	623160			

图84 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1030-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:53:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.152	2564161	100.000	628782	6544	1.119	--
总计		2564161	100.000	628782			

图85 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1031-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-jxzs-P6.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-51
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 19:57:02 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.146	2568799	100.000	637179	6582	1.122	--
总计		2568799	100.000	637179			

图86 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱 温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1032-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 20:00:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.149	2722164	100.000	670144	6567	1.124	--
总计		2722164	100.000	670144			

图87 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-4141

<样品信息>

色谱柱 :XB-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速:2.0ml/min
 柱温:35°C 波长:220nm
 数据文件名: RC\$QTL-4141 - 0-27/28-1033-3 - cbzj-240920336p-rcqx-2-pH7.2jz-jf50z-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-4141 - QTL-4141-rcqx-FX277.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-4141 - 20251121-rcqx-FX277.lcb
 样品瓶号: 2-27
 进样体积: 10 μl 版本号:6.115
 进样时间: 2025/11/21 20:03:52 实验者: wangdan
 处理时间 (V3) : 2025/11/24 17:01:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX277)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 220nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.151	2728773	100.000	667176	6578	1.125	--
总计		2728773	100.000	667176			

图88 布洛芬混悬液溶出曲线测定HPLC图谱
 参比制剂-240920336批-pH7.2介质-桨法-50转
 对照品溶液-2-2