




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-485-2 - zzp-yxys30t-bz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-rj.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-36
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:21:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:17:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速
溶剂




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-486-2 - zzp-yxys30t-bz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-45
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:24:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:18:02 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	100987	100.000	15518	2853	1.285	--
总计		100987	100.000	15518			

图2 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速
 对照品溶液-1-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-487-2 - zzp-yxys30t-bz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-45
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:27:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:18:06 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	101186	100.000	15536	2853	1.288	--
总计		101186	100.000	15536			

图3 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速
 对照品溶液-1-2




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-488-2 - zzp-yxys30t-bz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-45
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:31:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:18:09 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	101044	100.000	15535	2857	1.287	--
总计		101044	100.000	15535			

图4 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速
 对照品溶液-1-3




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-489-2 - zzp-yxys30t-bz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-45
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:34:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:18:13 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	101033	100.000	15528	2857	1.288	--
总计		101033	100.000	15528			

图5 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速
 对照品溶液-1-4




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-490-2 - zzp-yxys30t-bz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-45
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:38:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:18:16 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.197	100928	100.000	15521	2853	1.283	--
总计		100928	100.000	15521			

图6 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速
 对照品溶液-1-5




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-491-2 - zzp-yxys30t-bz-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-3
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:41:23 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:19 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.201	91304	100.000	14237	2988	1.285	--
总计		91304	100.000	14237			

图7 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-492-2 - zzp-yxys30t-bz-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-12
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:44:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:22 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	93777	100.000	14534	2957	1.288	--
总计		93777	100.000	14534			

图8 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-493-2 - zzp-yxys30t-bz-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-21
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:48:10 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:25 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	96231	100.000	14909	2953	1.286	--
总计		96231	100.000	14909			

图9 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-494-2 - zzp-yxys30t-bz-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-30
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:51:33 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:28 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	92657	100.000	14418	2962	1.283	--
总计		92657	100.000	14418			

图10 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-495-2 - zzp-yxys30t-bz-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:54:55 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:31 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	94502	100.000	14677	2957	1.283	--
总计		94502	100.000	14677			

图11 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-496-2 - zzp-yxys30t-bz-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 19:58:18 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:34 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	94268	100.000	14632	2954	1.289	--
总计		94268	100.000	14632			

图12 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-497-2 - zzp-yxys30t-bz-gs-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-4
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:01:42 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:38 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	97087	100.000	15104	2957	1.284	--
总计		97087	100.000	15104			

图13 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-498-2 - zzp-yxys30t-bz-gs-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-13
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:05:05 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:41 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	96413	100.000	14993	2956	1.289	--
总计		96413	100.000	14993			

图14 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-499-2 - zzp-yxys30t-bz-gs-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-22
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:08:29 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:44 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.200	99769	100.000	15554	2979	1.287	--
总计		99769	100.000	15554			

图15 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-500-2 - zzp-yxys30t-bz-gs-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-31
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:11:53 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:47 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	96955	100.000	15094	2952	1.286	--
总计		96955	100.000	15094			

图16 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-501-2 - zzp-yxys30t-bz-gs-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-40
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:15:16 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:50 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	96501	100.000	15039	2953	1.280	--
总计		96501	100.000	15039			

图17 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-502-2 - zzp-yxys30t-bz-gs-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:18:39 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:53 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	97574	100.000	15185	2955	1.289	--
总计		97574	100.000	15185			

图18 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装高湿HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-503-2 - zzp-yxys30t-bz-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-5
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:22:03 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:18:57 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	96748	100.000	15148	2968	1.280	--
总计		96748	100.000	15148			

图19 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片1
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-504-2 - zzp-yxys30t-bz-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-14
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:25:27 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:00 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	97779	100.000	15218	2955	1.283	--
总计		97779	100.000	15218			

图20 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片2
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-505-2 - zzp-yxys30t-bz-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-23
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:28:51 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:03 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	97329	100.000	15154	2951	1.292	--
总计		97329	100.000	15154			

图21 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片3
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-506-2 - zzp-yxys30t-bz-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-32
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:32:14 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:07 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	95760	100.000	14933	2967	1.285	--
总计		95760	100.000	14933			

图22 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片4
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-507-2 - zzp-yxys30t-bz-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-41
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:35:37 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:10 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	99147	100.000	15455	2968	1.288	--
总计		99147	100.000	15455			

图23 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片5
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5 μ m) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35 $^{\circ}$ C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-508-2 - zzp-yxys30t-bz-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-50
 进样体积: 20 μ l 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:39:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:14 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	97260	100.000	15160	2972	1.288	--
总计		97260	100.000	15160			

图24 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天包装光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-极限转速-片6
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-509-2 - zzp-yxys30t-lf-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-6
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:42:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:17 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	96990	100.000	15086	2962	1.293	--
总计		96990	100.000	15086			

图25 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片1
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-510-2 - zzp-yxys30t-lf-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-15
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:45:49 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:20 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	96716	100.000	15086	2962	1.289	--
总计		96716	100.000	15086			

图26 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片2
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-511-2 - zzp-yxys30t-lf-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-24
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:49:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:23 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	97727	100.000	15239	2964	1.288	--
总计		97727	100.000	15239			

图27 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片3
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-512-2 - zzp-yxys30t-lf-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-33
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:52:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:27 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	95175	100.000	14829	2954	1.284	--
总计		95175	100.000	14829			

图28 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片4
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-513-2 - zzp-yxys30t-lf-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-42
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:56:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:30 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	95946	100.000	14919	2956	1.293	--
总计		95946	100.000	14919			

图29 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片5
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-514-2 - zzp-yxys30t-lf-gw-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-51
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 20:59:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:33 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.203	111960	100.000	17740	3076	1.286	--
总计		111960	100.000	17740			

图30 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放高温HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片6
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-515-2 - zzp-yxys30t-lf-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P1-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-7
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:02:48 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:36 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	97745	100.000	15206	2954	1.286	--
总计		97745	100.000	15206			

图31 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片1
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-516-2 - zzp-yxys30t-lf-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-16
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:06:12 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:39 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.198	98331	100.000	15328	2965	1.291	--
总计		98331	100.000	15328			

图32 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片2
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-517-2 - zzp-yxys30t-lf-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P3-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-25
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:09:36 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:42 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	97902	100.000	15234	2962	1.289	--
总计		97902	100.000	15234			

图33 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片3
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-518-2 - zzp-yxys30t-lf-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P4-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-34
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:13:00 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:45 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	98520	100.000	15351	2968	1.286	--
总计		98520	100.000	15351			

图34 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片4
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-519-2 - zzp-yxys30t-lf-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P5-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-43
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:16:24 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:48 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	98151	100.000	15274	2960	1.282	--
总计		98151	100.000	15274			

图35 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片5
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-520-2 - zzp-yxys30t-lf-gz-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-P6-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-52
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:19:47 实验者: wangdan
 处理时间 (V2) : 2025/12/03 14:19:51 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.199	98128	100.000	15282	2973	1.288	--
总计		98128	100.000	15282			

图36 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天裸放光照HPLC图谱
 自制品(2025090921批)-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速-片6
 供试品溶液-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-521-2 - zzp-yxys30t-lf-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-54
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:23:11 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:19:55 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.195	99990	100.000	15340	2852	1.295	--
总计		99990	100.000	15340			

图37 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速
 对照品溶液-2-1




HJE-4158

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm) 流速: 1.5ml/min
 柱温 : 35°C 波长: 259nm
 数据文件名: RC\$HJE-4158 - 0-4/26-522-2 - zzp-yxys30t-lf-2025090921p-rcd-pH6.8+0.16CTABjz-jx-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-FX275.lcm
 批处理文件名: RC\$HJE-4158 - HJE-4158-RC-20251202-FX275.lcb
 样品瓶号: 4-54
 进样体积: 20 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/12/02 21:26:35 实验者: wangdan
 处理时间 (V2): 2025/12/03 14:19:58 处理者: wangdan
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX275)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 259nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	2.196	100098	100.000	15370	2857	1.291	--
总计		100098	100.000	15370			

图38 玛巴洛沙韦干混悬剂溶出度测定影响因素30天HPLC图谱
 自制品-pH6.8(内含0.16%CTAB)介质-篮法-极限转速
 对照品溶液-2-2