




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RCSQTL-359 - 27-66/29-3107-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
 方法文件名: RCSQTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RCSQTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 10:49:15 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:17:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图1 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3108-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 10:52:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:17:44
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	402306	100.000	72143	2129	1.155	--
总计		402306	100.000	72143			

图2 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3109-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 10:55:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:17:47
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	405215	100.000	73149	2166	1.148	--
总计		405215	100.000	73149			

图3 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3110-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 10:57:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:17:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	402922	100.000	72853	2154	1.149	--
总计		402922	100.000	72853			

图4 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3111-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:00:47 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:17:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	399140	100.000	71722	2131	1.154	--
总计		399140	100.000	71722			

图5 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3112-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:03:40 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:17:57
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	402547	100.000	72429	2141	1.152	--
总计		402547	100.000	72429			

图6 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3113-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:06:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	32091	100.000	6554	2810	1.132	--
总计		32091	100.000	6554			

图7 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3114-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:09:26 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	31414	100.000	6422	2826	1.139	--
总计		31414	100.000	6422			

图8 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3115-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:12:17 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:05
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	34403	100.000	6997	2806	1.138	--
总计		34403	100.000	6997			

图9 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3116-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 11:15:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	34637	100.000	7078	2842	1.137	--
总计		34637	100.000	7078			

图10 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3117-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:18:02 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	33765	100.000	6915	2837	1.133	--
总计		33765	100.000	6915			

图11 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3118-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 11:20:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	34737	100.000	7133	2837	1.133	--
总计		34737	100.000	7133			

图12 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3119-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:23:47 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	67909	100.000	13883	2838	1.134	--
总计		67909	100.000	13883			

图13 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3120-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:26:39 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	69715	100.000	14325	2847	1.134	--
总计		69715	100.000	14325			

图14 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3121-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:29:31 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:22
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	72869	100.000	14986	2860	1.130	--
总计		72869	100.000	14986			

图15 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3122-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:32:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:25
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	70058	100.000	14344	2854	1.127	--
总计		70058	100.000	14344			

图16 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3123-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 11:35:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:27 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	70108	100.000	14333	2848	1.132	--
总计		70108	100.000	14333			

图17 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3124-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:38:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:30
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	73460	100.000	15120	2872	1.125	--
总计		73460	100.000	15120			

图18 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3125-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:41:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:33
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	101099	100.000	20731	2854	1.131	--
总计		101099	100.000	20731			

图19 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3126-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:43:53 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:36
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	102657	100.000	20958	2837	1.132	--
总计		102657	100.000	20958			

图20 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3127-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:46:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	107393	100.000	22025	2853	1.133	--
总计		107393	100.000	22025			

图21 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3128-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:49:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:42
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	105022	100.000	21537	2854	1.131	--
总计		105022	100.000	21537			

图22 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3129-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:52:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	104097	100.000	21330	2850	1.132	--
总计		104097	100.000	21330			

图23 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3130-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 11:55:21 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:47 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	108933	100.000	22294	2846	1.132	--
总计		108933	100.000	22294			

图24 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3131-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 11:58:13 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:50
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	127974	100.000	26263	2857	1.132	--
总计		127974	100.000	26263			

图25 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3132-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:01:06 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	129959	100.000	26642	2859	1.132	--
总计		129959	100.000	26642			

图26 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3133-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:03:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	133148	100.000	27213	2842	1.131	--
总计		133148	100.000	27213			

图27 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3134-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:06:51 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:18:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	131267	100.000	26981	2861	1.130	--
总计		131267	100.000	26981			

图28 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3135-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-40
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:09:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:01 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	132281	100.000	27089	2849	1.131	--
总计		132281	100.000	27089			

图29 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3136-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:12:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	134669	100.000	27563	2865	1.133	--
总计		134669	100.000	27563			

图30 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3137-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:15:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	163396	100.000	33458	2845	1.132	--
总计		163396	100.000	33458			

图31 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3138-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:18:21 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	167999	100.000	34428	2858	1.132	--
总计		167999	100.000	34428			

图32 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3139-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-23
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:21:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	169921	100.000	34717	2863	1.129	--
总计		169921	100.000	34717			

图33 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3140-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:24:05 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:17
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	165613	100.000	33766	2852	1.134	--
总计		165613	100.000	33766			

图34 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3141-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:26:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	169297	100.000	34785	2864	1.132	--
总计		169297	100.000	34785			

图35 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3142-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:29:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:23
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	171289	100.000	35128	2864	1.131	--
总计		171289	100.000	35128			

图36 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3143-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-6
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:32:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	200591	100.000	41071	2857	1.133	--
总计		200591	100.000	41071			

图37 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3144-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:35:33 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	204156	100.000	41770	2850	1.132	--
总计		204156	100.000	41770			

图38 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3145-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:38:25 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:31 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	207501	100.000	42561	2862	1.131	--
总计		207501	100.000	42561			

图39 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3146-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:41:18 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	203341	100.000	41672	2862	1.132	--
总计		203341	100.000	41672			

图40 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3147-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:44:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	203358	100.000	41583	2849	1.133	--
总计		203358	100.000	41583			

图41 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3148-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-51
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:47:02 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	206427	100.000	42310	2859	1.132	--
总计		206427	100.000	42310			

图42 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3149-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 12:49:54 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	228505	100.000	46795	2855	1.132	--
总计		228505	100.000	46795			

图43 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3150-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:52:46 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	230755	100.000	47110	2850	1.134	--
总计		230755	100.000	47110			

图44 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3151-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:55:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:48
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	229418	100.000	46859	2853	1.133	--
总计		229418	100.000	46859			

图45 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3152-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 12:58:30 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	230766	100.000	47323	2862	1.133	--
总计		230766	100.000	47323			

图46 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3153-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:01:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:54 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	231251	100.000	47323	2862	1.132	--
总计		231251	100.000	47323			

图47 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3154-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:04:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	232545	100.000	47593	2861	1.132	--
总计		232545	100.000	47593			

图48 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3155-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-8 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:07:10 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:19:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	261259	100.000	53744	2878	1.129	--
总计		261259	100.000	53744			

图49 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3156-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-17 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:10:04 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	265386	100.000	54357	2863	1.132	--
总计		265386	100.000	54357			

图50 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3157-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-26 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:12:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:05
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	263717	100.000	53813	2853	1.134	--
总计		263717	100.000	53813			

图51 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3158-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-35 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:15:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	256474	100.000	52468	2855	1.132	--
总计		256474	100.000	52468			

图52 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3159-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:18:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	262621	100.000	53858	2868	1.131	--
总计		262621	100.000	53858			

图53 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3160-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-53
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:21:35 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:14 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	264609	100.000	54008	2845	1.132	--
总计		264609	100.000	54008			

图54 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3161-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-1
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:24:27 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	280887	100.000	57224	2844	1.134	--
总计		280887	100.000	57224			

图55 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3162-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:27:19 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	284751	100.000	58257	2849	1.132	--
总计		284751	100.000	58257			

图56 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3163-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:30:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:22
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	285384	100.000	58437	2853	1.132	--
总计		285384	100.000	58437			

图57 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3164-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-28
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:33:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	280993	100.000	57237	2844	1.134	--
总计		280993	100.000	57237			

图58 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3165-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:35:55 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:28
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	284567	100.000	58236	2854	1.132	--
总计		284567	100.000	58236			

图59 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3166-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-46
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:38:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:30 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	288891	100.000	59172	2852	1.131	--
总计		288891	100.000	59172			

图60 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3167-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:41:39 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:33
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	312042	100.000	63645	2845	1.133	--
总计		312042	100.000	63645			

图61 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3168-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-11
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:44:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	315159	100.000	64139	2846	1.134	--
总计		315159	100.000	64139			

图62 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3169-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:47:22 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	312196	100.000	63860	2851	1.132	--
总计		312196	100.000	63860			

图63 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3170-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:50:14 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:42
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	310085	100.000	63470	2854	1.130	--
总计		310085	100.000	63470			

图64 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3171-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:53:06 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	309534	100.000	63101	2838	1.133	--
总计		309534	100.000	63101			

图65 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3172-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 13:55:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	311981	100.000	63838	2852	1.131	--
总计		311981	100.000	63838			

图66 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3173-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 13:58:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	327037	100.000	66896	2845	1.132	--
总计		327037	100.000	66896			

图67 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3174-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:01:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	327578	100.000	66857	2858	1.132	--
总计		327578	100.000	66857			

图68 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3175-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:04:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:57
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	327541	100.000	66830	2847	1.132	--
总计		327541	100.000	66830			

图69 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3176-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:07:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:20:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	322572	100.000	65887	2849	1.132	--
总计		322572	100.000	65887			

图70 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3177-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 14:10:14 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	326942	100.000	66862	2853	1.131	--
总计		326942	100.000	66862			

图71 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3178-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 14:13:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	325920	100.000	66602	2847	1.132	--
总计		325920	100.000	66602			

图72 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3179-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-4
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 14:15:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	327434	100.000	66798	2840	1.133	--
总计		327434	100.000	66798			

图73 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3180-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:18:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	331659	100.000	67918	2851	1.132	--
总计		331659	100.000	67918			

图74 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3181-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:21:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	329631	100.000	67333	2858	1.132	--
总计		329631	100.000	67333			

图75 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3182-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:24:33 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:17
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	326943	100.000	66629	2840	1.133	--
总计		326943	100.000	66629			

图76 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3183-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:27:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	330597	100.000	67558	2843	1.133	--
总计		330597	100.000	67558			

图77 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3184-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 14:30:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:23 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	332299	100.000	68144	2858	1.131	--
总计		332299	100.000	68144			

图78 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3185-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:33:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:26
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	398910	100.000	72022	2140	1.153	--
总计		398910	100.000	72022			

图79 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3186-2 - zzp-2025050421p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:36:02 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	399235	100.000	71985	2144	1.153	--
总计		399235	100.000	71985			

图80 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050421批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3187-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:38:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图81 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
溶剂




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3188-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:41:52 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:34
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	406163	100.000	74178	2188	1.146	--
总计		406163	100.000	74178			

图82 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3189-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 14:44:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.681	406259	100.000	74217	2187	1.147	--
总计		406259	100.000	74217			

图83 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3190-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 14:47:41 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	402442	100.000	72568	2146	1.154	--
总计		402442	100.000	72568			

图84 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3191-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:50:35 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:42
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	405062	100.000	73394	2162	1.150	--
总计		405062	100.000	73394			

图85 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3192-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:53:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	403212	100.000	72897	2149	1.152	--
总计		403212	100.000	72897			

图86 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3193-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:56:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:48
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	27673	100.000	5636	2823	1.142	--
总计		27673	100.000	5636			

图87 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3194-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 14:59:18 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	25643	100.000	5239	2823	1.136	--
总计		25643	100.000	5239			

图88 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3195-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:02:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	26352	100.000	5357	2825	1.126	--
总计		26352	100.000	5357			

图89 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3196-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-28 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:05:05 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	26224	100.000	5335	2810	1.135	--
总计		26224	100.000	5335			

图90 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3197-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:07:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:21:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	24982	100.000	5065	2808	1.144	--
总计		24982	100.000	5065			

图91 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3198-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 15:10:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	25666	100.000	5217	2804	1.143	--
总计		25666	100.000	5217			

图92 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3199-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:13:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:05
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	64109	100.000	13055	2841	1.138	--
总计		64109	100.000	13055			

图93 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3200-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:16:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	63086	100.000	12933	2852	1.134	--
总计		63086	100.000	12933			

图94 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3201-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:19:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	52103	100.000	10666	2856	1.132	--
总计		52103	100.000	10666			

图95 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3202-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:22:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:13
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	62662	100.000	12829	2850	1.130	--
总计		62662	100.000	12829			

图96 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3203-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-38 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:25:18 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	53466	100.000	10906	2827	1.134	--
总计		53466	100.000	10906			

图97 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3204-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-47 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:28:10 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	58904	100.000	12061	2847	1.137	--
总计		58904	100.000	12061			

图98 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3205-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:31:04 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:22
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	98005	100.000	19983	2840	1.135	--
总计		98005	100.000	19983			

图99 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3206-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:33:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:25
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	95814	100.000	19653	2861	1.130	--
总计		95814	100.000	19653			

图100 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3207-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:36:50 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:28
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	93899	100.000	19219	2845	1.130	--
总计		93899	100.000	19219			

图101 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3208-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:39:43 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	98088	100.000	20008	2849	1.132	--
总计		98088	100.000	20008			

图102 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3209-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-39 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:42:36 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:34
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	86402	100.000	17615	2853	1.136	--
总计		86402	100.000	17615			

图103 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3210-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 15:45:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:36 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	94963	100.000	19439	2864	1.132	--
总计		94963	100.000	19439			

图104 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3211-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:48:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:39
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	125670	100.000	25612	2837	1.136	--
总计		125670	100.000	25612			

图105 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3212-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-13
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 15:51:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	123744	100.000	25204	2836	1.136	--
总计		123744	100.000	25204			

图106 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3213-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:54:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	123130	100.000	25237	2846	1.132	--
总计		123130	100.000	25237			

图107 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3214-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:57:05 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:48
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	127016	100.000	25988	2848	1.136	--
总计		127016	100.000	25988			

图108 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3215-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 15:59:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:50
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	117885	100.000	24044	2838	1.134	--
总计		117885	100.000	24044			

图109 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3216-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-49
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:02:51 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:53 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	123556	100.000	25366	2850	1.132	--
总计		123556	100.000	25366			

图110 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3217-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:05:45 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	162835	100.000	33364	2861	1.133	--
总计		162835	100.000	33364			

图111 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3218-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:08:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:22:59 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	162004	100.000	33015	2834	1.137	--
总计		162004	100.000	33015			

图112 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3219-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:11:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:01
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	161011	100.000	32833	2837	1.134	--
总计		161011	100.000	32833			

图113 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3220-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:14:26 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:04
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	163194	100.000	33387	2843	1.134	--
总计		163194	100.000	33387			

图114 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3221-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:17:20 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:07
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	158419	100.000	32377	2840	1.132	--
总计		158419	100.000	32377			

图115 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3222-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:20:13 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:10
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	160108	100.000	32668	2836	1.135	--
总计		160108	100.000	32668			

图116 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3223-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-6
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:23:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:13 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	201557	100.000	41271	2849	1.134	--
总计		201557	100.000	41271			

图117 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3224-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:26:00 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	200328	100.000	40935	2847	1.134	--
总计		200328	100.000	40935			

图118 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3225-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:28:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	198769	100.000	40498	2832	1.135	--
总计		198769	100.000	40498			

图119 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3226-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-33
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:31:48 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	200301	100.000	40920	2836	1.134	--
总计		200301	100.000	40920			

图120 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3227-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-42
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:34:42 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	198658	100.000	40609	2845	1.133	--
总计		198658	100.000	40609			

图121 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3228-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:37:35 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:28
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	198555	100.000	40418	2832	1.135	--
总计		198555	100.000	40418			

图122 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3229-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:40:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	226178	100.000	46239	2839	1.134	--
总计		226178	100.000	46239			

图123 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3230-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-16 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:43:22 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:34
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	225957	100.000	46257	2853	1.131	--
总计		225957	100.000	46257			

图124 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3231-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:46:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:37
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	227503	100.000	46484	2838	1.133	--
总计		227503	100.000	46484			

图125 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3232-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-34
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:49:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:40 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	226420	100.000	46129	2833	1.136	--
总计		226420	100.000	46129			

图126 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3233-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-43
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 16:52:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:43 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	226970	100.000	46524	2846	1.133	--
总计		226970	100.000	46524			

图127 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3234-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:54:58 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:46
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	226483	100.000	46381	2853	1.133	--
总计		226483	100.000	46381			

图128 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3235-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-8 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 16:57:53 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:49
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	259079	100.000	52803	2843	1.135	--
总计		259079	100.000	52803			

图129 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3236-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-17 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:00:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:52
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	261504	100.000	53524	2845	1.132	--
总计		261504	100.000	53524			

图130 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3237-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-26 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:03:43 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	261809	100.000	53686	2845	1.132	--
总计		261809	100.000	53686			

图131 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3238-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-35
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 17:06:38 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:23:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	260820	100.000	53426	2849	1.133	--
总计		260820	100.000	53426			

图132 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3239-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-44
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 17:09:32 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:00 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	260315	100.000	53348	2845	1.133	--
总计		260315	100.000	53348			

图133 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3240-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-53 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:12:26 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:03
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	259013	100.000	53153	2857	1.131	--
总计		259013	100.000	53153			

图134 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3241-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:15:18 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:06
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	281456	100.000	57261	2836	1.135	--
总计		281456	100.000	57261			

图135 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3242-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-14 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:18:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	282810	100.000	57796	2841	1.134	--
总计		282810	100.000	57796			

图136 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3243-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:21:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	284594	100.000	58317	2846	1.132	--
总计		284594	100.000	58317			

图137 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3244-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:23:53 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	282902	100.000	57814	2848	1.134	--
总计		282902	100.000	57814			

图138 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3245-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-41
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 17:26:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:17 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	281969	100.000	57564	2833	1.134	--
总计		281969	100.000	57564			

图139 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3246-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:29:36 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:20
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	280930	100.000	57552	2843	1.132	--
总计		280930	100.000	57552			

图140 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3247-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-6
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 17:32:28 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	309372	100.000	63487	2854	1.132	--
总计		309372	100.000	63487			

图141 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3248-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-15 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:35:19 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:25
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	311027	100.000	63446	2837	1.134	--
总计		311027	100.000	63446			

图142 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3249-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-24 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:38:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:28
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	309736	100.000	63493	2844	1.132	--
总计		309736	100.000	63493			

图143 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3250-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-33 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:41:03 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	312559	100.000	64234	2858	1.132	--
总计		312559	100.000	64234			

图144 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3251-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:43:55 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:34
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	312013	100.000	63861	2852	1.132	--
总计		312013	100.000	63861			

图145 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3252-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-51
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 17:46:46 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:37 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	305767	100.000	62440	2838	1.134	--
总计		305767	100.000	62440			

图146 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3253-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-7 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:49:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:40
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	323250	100.000	66249	2844	1.133	--
总计		323250	100.000	66249			

图147 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3254-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-16
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 17:52:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:42 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	326828	100.000	67076	2851	1.133	--
总计		326828	100.000	67076			

图148 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3255-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:55:21 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	325490	100.000	66614	2839	1.134	--
总计		325490	100.000	66614			

图149 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3256-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 17:58:13 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:48
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	322653	100.000	66008	2840	1.133	--
总计		322653	100.000	66008			

图150 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3257-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-43
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:01:04 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	325801	100.000	66922	2862	1.132	--
总计		325801	100.000	66922			

图151 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3258-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:03:55 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	313839	100.000	64004	2848	1.134	--
总计		313839	100.000	64004			

图152 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3259-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-8
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:06:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:57 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	322734	100.000	66045	2843	1.134	--
总计		322734	100.000	66045			

图153 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3260-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-17 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:09:40 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:24:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	331108	100.000	67786	2841	1.134	--
总计		331108	100.000	67786			

图154 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3261-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-26 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:12:33 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	330078	100.000	67594	2845	1.134	--
总计		330078	100.000	67594			

图155 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3262-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-35 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:15:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:05
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	325529	100.000	66468	2839	1.134	--
总计		325529	100.000	66468			

图156 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3263-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-44
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:18:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	328808	100.000	67171	2839	1.134	--
总计		328808	100.000	67171			

图157 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3264-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 3-53
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:21:08 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	325081	100.000	66533	2849	1.132	--
总计		325081	100.000	66533			

图158 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3265-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:24:03 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.682	403817	100.000	73304	2163	1.151	--
总计		403817	100.000	73304			

图159 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3266-2 - zzp-2025050621p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 2-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:26:57 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	400999	100.000	72257	2144	1.156	--
总计		400999	100.000	72257			

图160 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050621批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3267-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-rj.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-9 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:29:50 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

图161 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转
 溶剂




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3268-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:32:43 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	406281	100.000	73370	2166	1.151	--
总计		406281	100.000	73370			

图162 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3269-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:35:36 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	401789	100.000	72185	2140	1.157	--
总计		401789	100.000	72185			

图163 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-2




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3270-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-3.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:38:29 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.684	402463	100.000	72184	2141	1.157	--
总计		402463	100.000	72184			

图164 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-3




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3271-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-4.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:41:23 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.685	406386	100.000	73218	2159	1.152	--
总计		406386	100.000	73218			

图165 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-4




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3272-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz1-5.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-18
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:44:16 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:34 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.683	405274	100.000	73320	2160	1.152	--
总计		405274	100.000	73320			

图166 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-1-5




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3273-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-1 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:47:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:37
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	26478	100.000	5398	2814	1.141	--
总计		26478	100.000	5398			

图167 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3274-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:50:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:40
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	26812	100.000	5484	2831	1.130	--
总计		26812	100.000	5484			

图168 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3275-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:52:52 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:43
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	26607	100.000	5487	2854	1.136	--
总计		26607	100.000	5487			

图169 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3276-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 18:55:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:46 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	27096	100.000	5552	2854	1.141	--
总计		27096	100.000	5552			

图170 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3277-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-37 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 18:58:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:48
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	28665	100.000	5874	2831	1.126	--
总计		28665	100.000	5874			

图171 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3278-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-5min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-46
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:01:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:51 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	29519	100.000	6051	2847	1.135	--
总计		29519	100.000	6051			

图172 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-5min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3279-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:04:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	61418	100.000	12603	2856	1.133	--
总计		61418	100.000	12603			

图173 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3280-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:07:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:25:57
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	61491	100.000	12530	2834	1.132	--
总计		61491	100.000	12530			

图174 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3281-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:10:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	63043	100.000	12905	2841	1.130	--
总计		63043	100.000	12905			

图175 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3282-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:13:00 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:02
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	61272	100.000	12532	2848	1.136	--
总计		61272	100.000	12532			

图176 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3283-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-38
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:15:52 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	64540	100.000	13175	2837	1.133	--
总计		64540	100.000	13175			

图177 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3284-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-10min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-47
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:18:44 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	65268	100.000	13396	2856	1.131	--
总计		65268	100.000	13396			

图178 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-10min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3285-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:21:37 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:11
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	96049	100.000	19642	2841	1.134	--
总计		96049	100.000	19642			

图179 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3286-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:24:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	94740	100.000	19470	2866	1.131	--
总计		94740	100.000	19470			

图180 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3287-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:27:21 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:16
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	97013	100.000	19759	2838	1.132	--
总计		97013	100.000	19759			

图181 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3288-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:30:14 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:19
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	93976	100.000	19254	2848	1.134	--
总计		93976	100.000	19254			

图182 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3289-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-39
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:33:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:22 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	98892	100.000	20324	2856	1.132	--
总计		98892	100.000	20324			

图183 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3290-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-15min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:35:58 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:25 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	98724	100.000	20272	2857	1.131	--
总计		98724	100.000	20272			

图184 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-15min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3291-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-4
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:38:50 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:28 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	123466	100.000	25272	2845	1.134	--
总计		123466	100.000	25272			

图185 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3292-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:41:43 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:31
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	122238	100.000	25023	2851	1.134	--
总计		122238	100.000	25023			

图186 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3293-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:44:36 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:34
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	123728	100.000	25452	2859	1.131	--
总计		123728	100.000	25452			

图187 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3294-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:47:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:37
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	119961	100.000	24622	2856	1.132	--
总计		119961	100.000	24622			

图188 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3295-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:50:21 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:40
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	125118	100.000	25619	2849	1.133	--
总计		125118	100.000	25619			

图189 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3296-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-20min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-49 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:53:13 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:42
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	124661	100.000	25526	2849	1.134	--
总计		124661	100.000	25526			

图190 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-20min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3297-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-5 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 19:56:05 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:45
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	163751	100.000	33533	2840	1.133	--
总计		163751	100.000	33533			

图191 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3298-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-14
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 19:58:57 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:48 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	162946	100.000	33479	2860	1.134	--
总计		162946	100.000	33479			

图192 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3299-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-23 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:01:49 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:51
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	160756	100.000	32994	2853	1.134	--
总计		160756	100.000	32994			

图193 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3300-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-32 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:04:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:54
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	155847	100.000	31900	2846	1.133	--
总计		155847	100.000	31900			

图194 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3301-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-41 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:07:33 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:26:57
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	162022	100.000	33159	2838	1.135	--
总计		162022	100.000	33159			

图195 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3302-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-30min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-50 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:10:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:00
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	161399	100.000	33148	2860	1.131	--
总计		161399	100.000	33148			

图196 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-30min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3303-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-6 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:13:17 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:03
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	201765	100.000	41418	2853	1.132	--
总计		201765	100.000	41418			

图197 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3304-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-15
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:16:10 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	197474	100.000	40430	2846	1.134	--
总计		197474	100.000	40430			

图198 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3305-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-24
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:19:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:08 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	200305	100.000	41026	2843	1.132	--
总计		200305	100.000	41026			

图199 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3306-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-33
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:21:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:11 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	194737	100.000	39991	2854	1.134	--
总计		194737	100.000	39991			

图200 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3307-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-42 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:24:47 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:14
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.701	200143	100.000	40929	2854	1.133	--
总计		200143	100.000	40929			

图201 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3308-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-45min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-51 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:27:39 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:18
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	197743	100.000	40372	2837	1.135	--
总计		197743	100.000	40372			

图202 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-45min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3309-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-7
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:30:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:21 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	228105	100.000	46789	2852	1.133	--
总计		228105	100.000	46789			

图203 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3310-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-16
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:33:24 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	226531	100.000	46520	2856	1.133	--
总计		226531	100.000	46520			

图204 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3311-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-25 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:36:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:27
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.702	225178	100.000	45987	2840	1.135	--
总计		225178	100.000	45987			

图205 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3312-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-34 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:39:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.703	223152	100.000	45733	2852	1.133	--
总计		223152	100.000	45733			

图206 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3313-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-43
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:42:00 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:32 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	226268	100.000	46368	2844	1.134	--
总计		226268	100.000	46368			

图207 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3314-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-60min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-52 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:44:52 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:35
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	223058	100.000	45755	2847	1.135	--
总计		223058	100.000	45755			

图208 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-60min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3315-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-8
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:47:45 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:38 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	260406	100.000	53462	2853	1.133	--
总计		260406	100.000	53462			

图209 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3316-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-17 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:50:38 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:41
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.706	261844	100.000	53910	2881	1.129	--
总计		261844	100.000	53910			

图210 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3317-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-26 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:53:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:44
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.706	259044	100.000	53310	2862	1.133	--
总计		259044	100.000	53310			

图211 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3318-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-35 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 20:56:24 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:47
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	254143	100.000	52169	2846	1.133	--
总计		254143	100.000	52169			

图212 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流速: 2.0ml/min
 柱温: 30°C 波长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3319-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-44
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 20:59:17 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:49 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	256022	100.000	52587	2857	1.132	--
总计		256022	100.000	52587			

图213 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3320-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-90min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-53 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:02:09 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:52
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	257736	100.000	52881	2850	1.133	--
总计		257736	100.000	52881			

图214 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-90min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3321-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-1
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:05:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:55 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	282780	100.000	58026	2852	1.132	--
总计		282780	100.000	58026			

图215 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3322-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-10 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:07:56 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:27:58
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	282436	100.000	58004	2852	1.131	--
总计		282436	100.000	58004			

图216 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3323-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-19 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:10:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:01
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	282891	100.000	58050	2852	1.133	--
总计		282891	100.000	58050			

图217 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3324-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-28
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:13:40 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:04 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	278130	100.000	57098	2853	1.132	--
总计		278130	100.000	57098			

图218 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3325-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-37
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:16:31 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:07 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	282460	100.000	58058	2857	1.133	--
总计		282460	100.000	58058			

图219 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3326-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-120min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-46
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:19:23 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:10 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	278797	100.000	57308	2861	1.133	--
总计		278797	100.000	57308			

图220 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-120min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3327-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-2 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:22:16 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:12
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	308238	100.000	63340	2858	1.132	--
总计		308238	100.000	63340			

图221 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3328-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-11 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:25:08 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:15
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	311717	100.000	63983	2853	1.133	--
总计		311717	100.000	63983			

图222 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3329-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-20 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:28:01 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:18
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	311747	100.000	64051	2858	1.132	--
总计		311747	100.000	64051			

图223 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3330-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-29 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:30:54 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:21
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.704	304162	100.000	62521	2859	1.132	--
总计		304162	100.000	62521			

图224 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3331-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-38
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:33:47 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:24 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	311508	100.000	64059	2860	1.132	--
总计		311508	100.000	64059			

图225 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3332-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-180min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-47
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:36:39 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:26 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	308110	100.000	63206	2847	1.134	--
总计		308110	100.000	63206			

图226 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-180min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3333-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-3 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:39:32 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:29
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	326035	100.000	67058	2864	1.134	--
总计		326035	100.000	67058			

图227 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3334-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-12 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:42:25 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:32
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	328004	100.000	67369	2859	1.134	--
总计		328004	100.000	67369			

图228 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3335-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-21 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:45:18 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:35
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	327453	100.000	67317	2858	1.132	--
总计		327453	100.000	67317			

图229 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3336-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-30 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:48:11 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:38
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	321906	100.000	66205	2863	1.133	--
总计		321906	100.000	66205			

图230 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3337-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-39
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:51:03 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:41 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	327883	100.000	67312	2853	1.133	--
总计		327883	100.000	67312			

图231 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3338-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-240min.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-48
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 21:53:55 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:44 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	321591	100.000	66141	2864	1.132	--
总计		321591	100.000	66141			

图232 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-240min-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3339-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p1-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-4 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:56:48 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:47
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	329285	100.000	67677	2860	1.132	--
总计		329285	100.000	67677			

图233 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片1
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3340-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p2-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-13 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 21:59:41 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:50
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	328817	100.000	67535	2857	1.132	--
总计		328817	100.000	67535			

图234 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片2
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3341-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p3-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-22 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 22:02:35 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:53
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	330173	100.000	67900	2859	1.131	--
总计		330173	100.000	67900			

图235 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片3
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3342-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p4-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-31 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 22:05:29 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:56
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.705	324308	100.000	66674	2858	1.132	--
总计		324308	100.000	66674			

图236 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片4
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3343-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p5-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-40 版本号: 6.115
 进样体积: 10 µl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 22:08:20 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:28:59
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.706	329941	100.000	67803	2867	1.131	--
总计		329941	100.000	67803			

图237 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片5
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5µm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3344-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-p6-jx.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 4-49
 进样体积: 10 µl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 22:11:13 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:29:02 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>

mV



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.706	324603	100.000	66679	2866	1.133	--
总计		324603	100.000	66679			

图238 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-桨法-50转-极限转速-片6
 供试品溶液-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3345-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-1.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-27
 进样体积: 10 μl 版本号: 6.115
 进样时间: 2025/11/27 22:14:06 实验者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:29:05 处理者: jiangjinwei
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	406196	100.000	73278	2156	1.155	--
总计		406196	100.000	73278			

图239 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-1




QTL-359

<样品信息>

色谱柱: LP-C18(150mm*4.6mm,5μm) 流 速: 2.0ml/min
 柱 温: 30°C 波 长: 254nm
 数据文件名: RC\$QTL-359 - 27-66/29-3346-2 - zzp-2025050821p-zjtj6y-rcqx-15mg-jf50z-pH6.8jz-dz2-2.lcd
 方法文件名: RC\$QTL-359 - QTL-359-rcqx-FX278-新.lcm
 批处理文件名: RC\$QTL-359 - 20251127-FX278.lcb
 样品瓶号: 1-27 版本号: 6.115
 进样体积: 10 μl 实验者: jiangjinwei
 进样时间: 2025/11/27 22:16:59 处理者: jiangjinwei
 处理时间(V2): 2025/11/28 09:29:08
 仪器型号: SHIMADZU LC-2050C (FX278)

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 254nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.686	407047	100.000	73483	2154	1.154	--
总计		407047	100.000	73483			

图240 托伐普坦口崩片溶出曲线测定中间条件6月HPLC图谱
 自制品-2025050821批(15mg规格)-pH6.8介质-浆法-50转
 对照品溶液-2-2