



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-230-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:20:30

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-231-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:23:53

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	867814	100.000	144357	2297	1.226	--
总计		867814	100.000	144357			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65769	100.000	12516	1252	1.276	--
总计		65769	100.000	12516			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-232-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:27:16

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	862662	100.000	143005	2279	1.229	--
总计		862662	100.000	143005			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65335	100.000	12389	1245	1.277	--
总计		65335	100.000	12389			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-233-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:30:39

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	866820	100.000	144286	2296	1.227	--
总计		866820	100.000	144286			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65463	100.000	12468	1255	1.276	--
总计		65463	100.000	12468			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-234-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:34:02

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	864308	100.000	143551	2286	1.227	--
总计		864308	100.000	143551			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65221	100.000	12410	1254	1.273	--
总计		65221	100.000	12410			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-235-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:37:24

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	857997	100.000	141695	2265	1.229	--
总计		857997	100.000	141695			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.216	64463	100.000	12309	1249	1.277	--
总计		64463	100.000	12309			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-236-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:40:47

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	241544	100.000	40069	2277	1.226	--
总计		241544	100.000	40069			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	3905	100.000	738	1193	1.313	--
总计		3905	100.000	738			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-237-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:44:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	412215	100.000	68729	2307	1.223	--
总计		412215	100.000	68729			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	20437	100.000	3932	1282	1.269	--
总计		20437	100.000	3932			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-238-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:47:35

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	403070	100.000	67284	2305	1.222	--
总计		403070	100.000	67284			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	26774	100.000	5126	1272	1.276	--
总计		26774	100.000	5126			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-239-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:50:58

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	272772	100.000	45330	2285	1.228	--
总计		272772	100.000	45330			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	35568	100.000	6808	1263	1.278	--
总计		35568	100.000	6808			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-240-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:54:21

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	235130	100.000	39126	2293	1.227	--
总计		235130	100.000	39126			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	16695	100.000	3207	1272	1.268	--
总计		16695	100.000	3207			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-241-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 16:57:44

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	94942	100.000	15758	2277	1.226	--
总计		94942	100.000	15758			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	8558	100.000	1635	1279	1.292	--
总计		8558	100.000	1635			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-242-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:01:07

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:39:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	752082	100.000	124487	2270	1.229	--
总计		752082	100.000	124487			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	31605	100.000	6040	1267	1.276	--
总计		31605	100.000	6040			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-243-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:04:29

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	823215	100.000	136692	2284	1.228	--
总计		823215	100.000	136692			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	34956	100.000	6664	1258	1.283	--
总计		34956	100.000	6664			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-244-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:07:51

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	819149	100.000	135754	2274	1.230	--
总计		819149	100.000	135754			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	49471	100.000	9450	1263	1.276	--
总计		49471	100.000	9450			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-245-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:11:13

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.873	804634	100.000	133400	2281	1.229	--
总计		804634	100.000	133400			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	53369	100.000	10218	1263	1.281	--
总计		53369	100.000	10218			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-246-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:14:35

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	802729	100.000	133270	2283	1.227	--
总计		802729	100.000	133270			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	39914	100.000	7634	1266	1.280	--
总计		39914	100.000	7634			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-247-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:17:57

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	553619	100.000	91789	2274	1.224	--
总计		553619	100.000	91789			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	23995	100.000	4583	1260	1.270	--
总计		23995	100.000	4583			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-248-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:21:19

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	865865	100.000	143379	2270	1.226	--
总计		865865	100.000	143379			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	40319	100.000	7687	1259	1.282	--
总计		40319	100.000	7687			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-249-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:24:41

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	874474	100.000	144719	2264	1.221	--
总计		874474	100.000	144719			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	42791	100.000	8169	1256	1.274	--
总计		42791	100.000	8169			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-250-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:28:03

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	867073	100.000	143548	2269	1.224	--
总计		867073	100.000	143548			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	55920	100.000	10699	1265	1.276	--
总计		55920	100.000	10699			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-251-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:31:25

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	868876	100.000	143618	2261	1.222	--
总计		868876	100.000	143618			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	58676	100.000	11152	1256	1.274	--
总计		58676	100.000	11152			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-252-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-39

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:34:47

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	908110	100.000	150019	2258	1.222	--
总计		908110	100.000	150019			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	49716	100.000	9453	1253	1.277	--
总计		49716	100.000	9453			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-253-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:38:09

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	857882	100.000	141550	2257	1.223	--
总计		857882	100.000	141550			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	40575	100.000	7726	1253	1.282	--
总计		40575	100.000	7726			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-254-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:41:33

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	874649	100.000	144077	2247	1.221	--
总计		874649	100.000	144077			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	45043	100.000	8601	1255	1.275	--
总计		45043	100.000	8601			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-255-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:44:56

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	873731	100.000	144577	2264	1.219	--
总计		873731	100.000	144577			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	48937	100.000	9322	1256	1.277	--
总计		48937	100.000	9322			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-256-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:48:19

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	862396	100.000	142421	2258	1.220	--
总计		862396	100.000	142421			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	58883	100.000	11256	1256	1.276	--
总计		58883	100.000	11256			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-257-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:51:42

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	865994	100.000	143332	2267	1.221	--
总计		865994	100.000	143332			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	60716	100.000	11576	1263	1.277	--
总计		60716	100.000	11576			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-258-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:55:05

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:46

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	892200	100.000	147763	2269	1.220	--
总计		892200	100.000	147763			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	53977	100.000	10293	1262	1.281	--
总计		53977	100.000	10293			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-259-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 17:58:27

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	862724	100.000	143068	2274	1.218	--
总计		862724	100.000	143068			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	46594	100.000	8912	1268	1.271	--
总计		46594	100.000	8912			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-260-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:01:49

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	875290	100.000	144637	2258	1.218	--
总计		875290	100.000	144637			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	50587	100.000	9645	1258	1.273	--
总计		50587	100.000	9645			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-261-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:05:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	865832	100.000	142938	2255	1.219	--
总计		865832	100.000	142938			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	55044	100.000	10523	1259	1.272	--
总计		55044	100.000	10523			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-262-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:08:35

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:40:57

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	862029	100.000	142694	2264	1.217	--
总计		862029	100.000	142694			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	62601	100.000	11959	1261	1.274	--
总计		62601	100.000	11959			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-263-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:11:58

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	858740	100.000	141855	2256	1.217	--
总计		858740	100.000	141855			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	62842	100.000	12005	1263	1.273	--
总计		62842	100.000	12005			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-264-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:15:21

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	886332	100.000	146663	2266	1.219	--
总计		886332	100.000	146663			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	59537	100.000	11384	1262	1.276	--
总计		59537	100.000	11384			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-265-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:18:43

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	909496	100.000	150528	2266	1.216	--
总计		909496	100.000	150528			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	56270	100.000	10774	1267	1.270	--
总计		56270	100.000	10774			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-266-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:22:06

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	850440	100.000	140766	2264	1.219	--
总计		850440	100.000	140766			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	55049	100.000	10539	1266	1.272	--
总计		55049	100.000	10539			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-267-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:25:28

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	851446	100.000	141104	2272	1.217	--
总计		851446	100.000	141104			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	59761	100.000	11450	1265	1.277	--
总计		59761	100.000	11450			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-268-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:28:50

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	858978	100.000	142498	2278	1.216	--
总计		858978	100.000	142498			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	64406	100.000	12350	1267	1.270	--
总计		64406	100.000	12350			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-269-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:32:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	826353	100.000	136997	2273	1.218	--
总计		826353	100.000	136997			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	61818	100.000	11842	1267	1.273	--
总计		61818	100.000	11842			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-270-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:35:34

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	871935	100.000	144829	2283	1.218	--
总计		871935	100.000	144829			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	62137	100.000	11906	1270	1.274	--
总计		62137	100.000	11906			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-271-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:38:56

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	890714	100.000	148085	2285	1.217	--
总计		890714	100.000	148085			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	61520	100.000	11772	1269	1.272	--
总计		61520	100.000	11772			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-272-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:42:19

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.869	846383	100.000	140920	2298	1.218	--
总计		846383	100.000	140920			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	57879	100.000	11152	1280	1.270	--
总计		57879	100.000	11152			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-273-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:45:42

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	850202	100.000	141348	2285	1.218	--
总计		850202	100.000	141348			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	62021	100.000	11871	1274	1.282	--
总计		62021	100.000	11871			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-274-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-25

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:49:05

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.872	846806	100.000	140735	2285	1.218	--
总计		846806	100.000	140735			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.219	64274	100.000	12299	1264	1.272	--
总计		64274	100.000	12299			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-275-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:52:27

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	842428	100.000	140455	2300	1.218	--
总计		842428	100.000	140455			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	63034	100.000	12126	1279	1.271	--
总计		63034	100.000	12126			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-276-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-43

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:55:49

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	865505	100.000	143847	2286	1.220	--
总计		865505	100.000	143847			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	63231	100.000	12113	1265	1.278	--
总计		63231	100.000	12113			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-277-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 18:59:11

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	904831	100.000	150604	2291	1.218	--
总计		904831	100.000	150604			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65605	100.000	12517	1263	1.273	--
总计		65605	100.000	12517			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-278-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:02:34

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	896719	100.000	149406	2295	1.217	--
总计		896719	100.000	149406			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	63340	100.000	12141	1276	1.270	--
总计		63340	100.000	12141			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-279-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-17

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:05:58

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	830635	100.000	138322	2295	1.217	--
总计		830635	100.000	138322			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	58564	100.000	11312	1289	1.269	--
总计		58564	100.000	11312			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-280-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:09:21

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	835395	100.000	138788	2282	1.215	--
总计		835395	100.000	138788			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	58663	100.000	11275	1280	1.273	--
总计		58663	100.000	11275			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-281-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:12:43

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	926664	100.000	153735	2276	1.215	--
总计		926664	100.000	153735			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	64314	100.000	12275	1262	1.268	--
总计		64314	100.000	12275			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-282-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:16:06

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:54

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	895230	100.000	148471	2278	1.216	--
总计		895230	100.000	148471			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	62632	100.000	11987	1265	1.273	--
总计		62632	100.000	11987			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-283-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:19:29

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:41:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.870	887810	100.000	147393	2278	1.216	--
总计		887810	100.000	147393			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65194	100.000	12498	1270	1.276	--
总计		65194	100.000	12498			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-284-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:22:52

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:00

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	865785	100.000	143639	2276	1.216	--
总计		865785	100.000	143639			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.218	65188	100.000	12410	1255	1.272	--
总计		65188	100.000	12410			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-285-3 - zzp-25112601p-pH1.2jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 1-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:26:15

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.871	864650	100.000	143529	2277	1.214	--
总计		864650	100.000	143529			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.217	65274	100.000	12398	1250	1.273	--
总计		65274	100.000	12398			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-286-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:29:39

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:06

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-287-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:33:03

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:09

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	877805	100.000	152631	2549	1.217	--
总计		877805	100.000	152631			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	66627	100.000	14011	1576	1.282	--
总计		66627	100.000	14011			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-288-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:36:28

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	880217	100.000	153100	2549	1.218	--
总计		880217	100.000	153100			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	66827	100.000	14055	1576	1.286	--
总计		66827	100.000	14055			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-289-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:39:52

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	871650	100.000	151311	2550	1.222	--
总计		871650	100.000	151311			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	65988	100.000	13873	1574	1.285	--
总计		65988	100.000	13873			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-290-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:43:18

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	878560	100.000	152858	2553	1.220	--
总计		878560	100.000	152858			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	66697	100.000	14005	1572	1.286	--
总计		66697	100.000	14005			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-291-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:46:43

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	877056	100.000	152672	2549	1.218	--
总计		877056	100.000	152672			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	66679	100.000	14052	1572	1.281	--
总计		66679	100.000	14052			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-292-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:50:06

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	16843	100.000	2946	2530	1.206	--
总计		16843	100.000	2946			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	30543	100.000	6451	1570	1.278	--
总计		30543	100.000	6451			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-293-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:53:29

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	11096	100.000	1934	2509	1.212	--
总计		11096	100.000	1934			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	30808	100.000	6443	1563	1.296	--
总计		30808	100.000	6443			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-294-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 19:56:52

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	12761	100.000	2240	2586	1.199	--
总计		12761	100.000	2240			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	32090	100.000	6710	1562	1.288	--
总计		32090	100.000	6710			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-295-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:00:15

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	18448	100.000	3259	2606	1.222	--
总计		18448	100.000	3259			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	28513	100.000	6016	1584	1.277	--
总计		28513	100.000	6016			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-296-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:03:38

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.876	12949	100.000	2258	2556	1.229	--
总计		12949	100.000	2258			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	32091	100.000	6732	1572	1.284	--
总计		32091	100.000	6732			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-297-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:07:01

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:37

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	10663	100.000	1863	2554	1.191	--
总计		10663	100.000	1863			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	21930	100.000	4596	1572	1.281	--
总计		21930	100.000	4596			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-298-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:10:25

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	32952	100.000	5712	2523	1.211	--
总计		32952	100.000	5712			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	45530	100.000	9537	1557	1.282	--
总计		45530	100.000	9537			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-299-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:13:49

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	32009	100.000	5519	2521	1.222	--
总计		32009	100.000	5519			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	48161	100.000	10055	1557	1.292	--
总计		48161	100.000	10055			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-300-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:17:13

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	33033	100.000	5736	2542	1.217	--
总计		33033	100.000	5736			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	49306	100.000	10296	1556	1.289	--
总计		49306	100.000	10296			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-301-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:20:36

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	34614	100.000	6031	2543	1.216	--
总计		34614	100.000	6031			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	48071	100.000	10150	1581	1.282	--
总计		48071	100.000	10150			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-302-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:24:00

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:51

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	31592	100.000	5486	2547	1.217	--
总计		31592	100.000	5486			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	47741	100.000	9969	1557	1.282	--
总计		47741	100.000	9969			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-303-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:27:23

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	32098	100.000	5586	2554	1.224	--
总计		32098	100.000	5586			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	46994	100.000	9851	1567	1.284	--
总计		46994	100.000	9851			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-304-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:30:46

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	40787	100.000	7152	2564	1.217	--
总计		40787	100.000	7152			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	52561	100.000	11163	1594	1.278	--
总计		52561	100.000	11163			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-305-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:34:10

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:42:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	39418	100.000	6865	2544	1.213	--
总计		39418	100.000	6865			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	53887	100.000	11284	1563	1.283	--
总计		53887	100.000	11284			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-306-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:37:34

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	40180	100.000	6991	2534	1.219	--
总计		40180	100.000	6991			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	54165	100.000	11366	1570	1.286	--
总计		54165	100.000	11366			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-307-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:40:57

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	40346	100.000	7001	2533	1.227	--
总计		40346	100.000	7001			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	52865	100.000	11118	1569	1.283	--
总计		52865	100.000	11118			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-308-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-39

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:44:20

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	39912	100.000	6962	2551	1.220	--
总计		39912	100.000	6962			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	53648	100.000	11318	1579	1.282	--
总计		53648	100.000	11318			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-309-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:47:44

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	38970	100.000	6747	2521	1.218	--
总计		38970	100.000	6747			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	52095	100.000	10913	1563	1.285	--
总计		52095	100.000	10913			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-310-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:51:07

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	44160	100.000	7656	2521	1.222	--
总计		44160	100.000	7656			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	54517	100.000	11429	1560	1.285	--
总计		54517	100.000	11429			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-311-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:54:31

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	43764	100.000	7590	2535	1.213	--
总计		43764	100.000	7590			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	57724	100.000	12099	1564	1.280	--
总计		57724	100.000	12099			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-312-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 20:57:55

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	43537	100.000	7534	2505	1.215	--
总计		43537	100.000	7534			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	55945	100.000	11685	1549	1.286	--
总计		55945	100.000	11685			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-313-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:01:19

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	43634	100.000	7590	2535	1.222	--
总计		43634	100.000	7590			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	55724	100.000	11704	1568	1.287	--
总计		55724	100.000	11704			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-314-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:04:43

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	43774	100.000	7588	2523	1.228	--
总计		43774	100.000	7588			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	55784	100.000	11706	1562	1.284	--
总计		55784	100.000	11706			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-315-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:08:06

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	43041	100.000	7463	2535	1.221	--
总计		43041	100.000	7463			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	55295	100.000	11562	1557	1.288	--
总计		55295	100.000	11562			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-316-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:11:30

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	46483	100.000	8042	2523	1.227	--
总计		46483	100.000	8042			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	55053	100.000	11453	1548	1.291	--
总计		55053	100.000	11453			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-317-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:14:54

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	47083	100.000	8187	2545	1.220	--
总计		47083	100.000	8187			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	58295	100.000	12234	1569	1.282	--
总计		58295	100.000	12234			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-318-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:18:18

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	47552	100.000	8220	2514	1.222	--
总计		47552	100.000	8220			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	58031	100.000	12104	1551	1.288	--
总计		58031	100.000	12104			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-319-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:21:42

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	46604	100.000	8061	2516	1.229	--
总计		46604	100.000	8061			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	56686	100.000	11824	1552	1.287	--
总计		56686	100.000	11824			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-320-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:25:05

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	47225	100.000	8214	2536	1.217	--
总计		47225	100.000	8214			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	57258	100.000	12086	1580	1.277	--
总计		57258	100.000	12086			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-321-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:28:29

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:45

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	46313	100.000	7997	2510	1.227	--
总计		46313	100.000	7997			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	57041	100.000	11919	1555	1.286	--
总计		57041	100.000	11919			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-322-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:31:52

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:48

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	50173	100.000	8628	2491	1.220	--
总计		50173	100.000	8628			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	56994	100.000	11850	1540	1.282	--
总计		56994	100.000	11850			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-323-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:35:15

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	51979	100.000	9005	2515	1.222	--
总计		51979	100.000	9005			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	60835	100.000	12771	1570	1.278	--
总计		60835	100.000	12771			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-324-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:38:39

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	50882	100.000	8780	2491	1.218	--
总计		50882	100.000	8780			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59813	100.000	12480	1545	1.289	--
总计		59813	100.000	12480			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-325-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:42:03

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	50507	100.000	8709	2492	1.223	--
总计		50507	100.000	8709			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59282	100.000	12321	1538	1.286	--
总计		59282	100.000	12321			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-326-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:45:26

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:43:59

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	51296	100.000	8888	2520	1.227	--
总计		51296	100.000	8888			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	59117	100.000	12410	1562	1.280	--
总计		59117	100.000	12410			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-327-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:48:50

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:03

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	50285	100.000	8671	2499	1.228	--
总计		50285	100.000	8671			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	58987	100.000	12323	1554	1.280	--
总计		58987	100.000	12323			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-328-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:52:14

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	52821	100.000	9043	2480	1.224	--
总计		52821	100.000	9043			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	57277	100.000	11933	1543	1.285	--
总计		57277	100.000	11933			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-329-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:55:38

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	54740	100.000	9499	2530	1.215	--
总计		54740	100.000	9499			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	61679	100.000	13008	1584	1.278	--
总计		61679	100.000	13008			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-330-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-25

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 21:59:02

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	53192	100.000	9162	2497	1.224	--
总计		53192	100.000	9162			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	60264	100.000	12575	1551	1.286	--
总计		60264	100.000	12575			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-331-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:02:25

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	52295	100.000	8981	2485	1.219	--
总计		52295	100.000	8981			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59217	100.000	12321	1539	1.286	--
总计		59217	100.000	12321			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-332-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-43

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:05:48

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	52706	100.000	9133	2520	1.223	--
总计		52706	100.000	9133			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59123	100.000	12404	1569	1.279	--
总计		59123	100.000	12404			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-333-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:09:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	53210	100.000	9220	2525	1.220	--
总计		53210	100.000	9220			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	60904	100.000	12788	1562	1.284	--
总计		60904	100.000	12788			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-334-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:12:37

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	55608	100.000	9530	2478	1.225	--
总计		55608	100.000	9530			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	58661	100.000	12213	1547	1.287	--
总计		58661	100.000	12213			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-335-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-17

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:16:01

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	56679	100.000	9864	2549	1.224	--
总计		56679	100.000	9864			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	61863	100.000	13082	1590	1.277	--
总计		61863	100.000	13082			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-336-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:19:25

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	55601	100.000	9624	2505	1.223	--
总计		55601	100.000	9624			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	61393	100.000	12840	1554	1.284	--
总计		61393	100.000	12840			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-337-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:22:49

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	55093	100.000	9481	2494	1.221	--
总计		55093	100.000	9481			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	60593	100.000	12622	1546	1.281	--
总计		60593	100.000	12622			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-338-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:26:14

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	52423	100.000	9028	2475	1.217	--
总计		52423	100.000	9028			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	57109	100.000	11890	1537	1.279	--
总计		57109	100.000	11890			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-339-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:29:38

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:39

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	55479	100.000	9530	2489	1.218	--
总计		55479	100.000	9530			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	61089	100.000	12785	1548	1.276	--
总计		61089	100.000	12785			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-340-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:33:02

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:42

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	869766	100.000	149742	2492	1.221	--
总计		869766	100.000	149742			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	66076	100.000	13801	1551	1.283	--
总计		66076	100.000	13801			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-341-3 - zzp-25112601p-pH4.5jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 2-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:36:26

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	874958	100.000	150530	2488	1.221	--
总计		874958	100.000	150530			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	66307	100.000	13859	1545	1.280	--
总计		66307	100.000	13859			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-342-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-rj.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-9

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:39:48

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
总计							



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-343-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:43:10

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	850430	100.000	146386	2497	1.223	--
总计		850430	100.000	146386			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	64335	100.000	13457	1549	1.287	--
总计		64335	100.000	13457			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-344-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:46:33

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	853331	100.000	146978	2496	1.224	--
总计		853331	100.000	146978			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	64605	100.000	13560	1555	1.284	--
总计		64605	100.000	13560			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-345-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-3.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:49:55

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:56

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	857165	100.000	147904	2503	1.222	--
总计		857165	100.000	147904			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	64867	100.000	13638	1557	1.279	--
总计		64867	100.000	13638			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-346-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-4.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:53:17

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:44:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	848606	100.000	146075	2495	1.224	--
总计		848606	100.000	146075			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	64369	100.000	13445	1555	1.287	--
总计		64369	100.000	13445			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-347-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz1-5.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-18

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 22:56:40

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	852828	100.000	146791	2489	1.224	--
总计		852828	100.000	146791			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	64617	100.000	13519	1552	1.285	--
总计		64617	100.000	13519			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-348-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-1

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:00:01

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	104130	100.000	17914	2481	1.224	--
总计		104130	100.000	17914			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	7851	100.000	1622	1517	1.291	--
总计		7851	100.000	1622			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-349-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-10

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:03:23

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	49031	100.000	8447	2498	1.223	--
总计		49031	100.000	8447			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	19029	100.000	3972	1549	1.283	--
总计		19029	100.000	3972			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-350-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-19

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:06:45

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	54742	100.000	9422	2496	1.229	--
总计		54742	100.000	9422			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	6527	100.000	1369	1536	1.288	--
总计		6527	100.000	1369			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40°C

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-351-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-28

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:10:07

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	84826	100.000	14642	2501	1.224	--
总计		84826	100.000	14642			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	16602	100.000	3481	1555	1.297	--
总计		16602	100.000	3481			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-352-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-37

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:13:29

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:15

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.876	49053	100.000	8453	2511	1.230	--
总计		49053	100.000	8453			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	21364	100.000	4449	1533	1.288	--
总计		21364	100.000	4449			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-353-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-5min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-46

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:16:51

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:18

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	34014	100.000	5854	2488	1.227	--
总计		34014	100.000	5854			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	8217	100.000	1701	1525	1.336	--
总计		8217	100.000	1701			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-354-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-2

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:20:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:21

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	393051	100.000	67774	2501	1.225	--
总计		393051	100.000	67774			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	31924	100.000	6674	1546	1.279	--
总计		31924	100.000	6674			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-355-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-11

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:23:34

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:24

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	410485	100.000	70998	2516	1.225	--
总计		410485	100.000	70998			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	36660	100.000	7720	1567	1.292	--
总计		36660	100.000	7720			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-356-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-20

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:26:55

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:27

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	333664	100.000	57330	2496	1.229	--
总计		333664	100.000	57330			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	31808	100.000	6662	1547	1.287	--
总计		31808	100.000	6662			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-357-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-29

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:30:17

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:30

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	429527	100.000	74112	2505	1.227	--
总计		429527	100.000	74112			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	36322	100.000	7579	1549	1.287	--
总计		36322	100.000	7579			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-358-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-38

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:33:39

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:33

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	390441	100.000	67375	2506	1.226	--
总计		390441	100.000	67375			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	36346	100.000	7609	1551	1.285	--
总计		36346	100.000	7609			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-359-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-10min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-47

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:37:00

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:36

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.876	312263	100.000	53591	2497	1.230	--
总计		312263	100.000	53591			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	32202	100.000	6705	1547	1.292	--
总计		32202	100.000	6705			



SHIMADZU
LabSolutions

SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-360-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-3

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:40:22

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	559327	100.000	96208	2495	1.228	--
总计		559327	100.000	96208			

检测器A Ch2 250nm

峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	42334	100.000	8846	1553	1.290	--
总计		42334	100.000	8846			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-361-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-12

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:43:44

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:41

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	550296	100.000	94979	2504	1.227	--
总计		550296	100.000	94979			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	42892	100.000	9016	1560	1.281	--
总计		42892	100.000	9016			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-362-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-21

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:47:05

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:44

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.876	523487	100.000	89964	2502	1.230	--
总计		523487	100.000	89964			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	42152	100.000	8815	1550	1.293	--
总计		42152	100.000	8815			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-363-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-30

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:50:26

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	565244	100.000	97164	2498	1.230	--
总计		565244	100.000	97164			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	43073	100.000	8997	1551	1.291	--
总计		43073	100.000	8997			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-364-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-39

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:53:47

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:50

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	548601	100.000	94789	2515	1.226	--
总计		548601	100.000	94789			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	43101	100.000	9058	1569	1.292	--
总计		43101	100.000	9058			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-365-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-15min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-48

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/02 23:57:08

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:53

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	525129	100.000	90462	2504	1.228	--
总计		525129	100.000	90462			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	42763	100.000	8924	1555	1.289	--
总计		42763	100.000	8924			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-366-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-4

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:00:29

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	645061	100.000	110886	2497	1.228	--
总计		645061	100.000	110886			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	47460	100.000	9897	1547	1.292	--
总计		47460	100.000	9897			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-367-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-13

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:03:51

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:45:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	645653	100.000	111354	2502	1.227	--
总计		645653	100.000	111354			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	47939	100.000	10050	1555	1.289	--
总计		47939	100.000	10050			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-368-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-22

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:07:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:02

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	615344	100.000	105708	2496	1.228	--
总计		615344	100.000	105708			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	46811	100.000	9804	1553	1.288	--
总计		46811	100.000	9804			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-369-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-31

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:10:33

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:05

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	655214	100.000	112590	2493	1.229	--
总计		655214	100.000	112590			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	47960	100.000	10016	1549	1.292	--
总计		47960	100.000	10016			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-370-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-40

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:13:55

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:08

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	632178	100.000	108792	2495	1.228	--
总计		632178	100.000	108792			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	46550	100.000	9718	1552	1.292	--
总计		46550	100.000	9718			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-371-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-20min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-49

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:17:16

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:11

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	614908	100.000	105724	2487	1.228	--
总计		614908	100.000	105724			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	46935	100.000	9795	1549	1.290	--
总计		46935	100.000	9795			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-372-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-5

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:20:38

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:14

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	725128	100.000	124309	2483	1.229	--
总计		725128	100.000	124309			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.225	52095	100.000	10848	1547	1.289	--
总计		52095	100.000	10848			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-373-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-14

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:23:59

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:17

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	730181	100.000	125538	2487	1.228	--
总计		730181	100.000	125538			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	51851	100.000	10869	1552	1.290	--
总计		51851	100.000	10869			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-374-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-23

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:27:20

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:20

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	724819	100.000	124895	2495	1.226	--
总计		724819	100.000	124895			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	52950	100.000	11123	1557	1.283	--
总计		52950	100.000	11123			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-375-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-32

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:30:41

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:23

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	741479	100.000	127455	2489	1.229	--
总计		741479	100.000	127455			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	52507	100.000	10957	1553	1.287	--
总计		52507	100.000	10957			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-376-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-41

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:34:03

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:26

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	731918	100.000	125950	2490	1.228	--
总计		731918	100.000	125950			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	51009	100.000	10686	1557	1.291	--
总计		51009	100.000	10686			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-377-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-30min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-50

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:37:24

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	728233	100.000	125385	2492	1.226	--
总计		728233	100.000	125385			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	52803	100.000	11058	1546	1.284	--
总计		52803	100.000	11058			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-378-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-6

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:40:46

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:31

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	798176	100.000	137290	2492	1.226	--
总计		798176	100.000	137290			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	56186	100.000	11742	1552	1.287	--
总计		56186	100.000	11742			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-379-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-15

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:44:08

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:34

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	800779	100.000	137582	2486	1.227	--
总计		800779	100.000	137582			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	55956	100.000	11698	1552	1.293	--
总计		55956	100.000	11698			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-380-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-24

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:47:30

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:38

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.880	802062	100.000	138720	2516	1.224	--
总计		802062	100.000	138720			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.228	57536	100.000	12145	1570	1.279	--
总计		57536	100.000	12145			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-381-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-33

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:50:51

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:40

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	814621	100.000	140118	2486	1.226	--
总计		814621	100.000	140118			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	56651	100.000	11868	1550	1.286	--
总计		56651	100.000	11868			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-382-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-42

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:54:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:43

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	810139	100.000	139244	2487	1.227	--
总计		810139	100.000	139244			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	54910	100.000	11483	1554	1.293	--
总计		54910	100.000	11483			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-383-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-45min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-51

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 00:57:33

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:47

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	799434	100.000	137294	2480	1.227	--
总计		799434	100.000	137294			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	56160	100.000	11773	1549	1.290	--
总计		56160	100.000	11773			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-384-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-7

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:00:54

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:49

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	837554	100.000	144016	2485	1.225	--
总计		837554	100.000	144016			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	58774	100.000	12288	1551	1.285	--
总计		58774	100.000	12288			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-385-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-16

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:04:17

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:52

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	832751	100.000	143065	2486	1.227	--
总计		832751	100.000	143065			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	58005	100.000	12115	1550	1.289	--
总计		58005	100.000	12115			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-386-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-25

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:07:38

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:55

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	826165	100.000	141994	2484	1.228	--
总计		826165	100.000	141994			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59806	100.000	12314	1527	1.322	--
总计		59806	100.000	12314			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-387-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-34

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:10:59

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:46:58

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	851686	100.000	146553	2489	1.226	--
总计		851686	100.000	146553			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	58912	100.000	12331	1555	1.283	--
总计		58912	100.000	12331			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-388-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-43

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:14:21

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:01

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	846899	100.000	145373	2486	1.228	--
总计		846899	100.000	145373			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	56874	100.000	11877	1547	1.290	--
总计		56874	100.000	11877			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-389-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-60min.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-52

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:17:42

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:04

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	844552	100.000	145296	2489	1.228	--
总计		844552	100.000	145296			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59075	100.000	12353	1553	1.289	--
总计		59075	100.000	12353			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-390-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p1-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-8

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:21:05

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:07

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	851755	100.000	146660	2491	1.226	--
总计		851755	100.000	146660			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	60022	100.000	12533	1552	1.290	--
总计		60022	100.000	12533			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-391-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p2-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-17

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:24:27

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:10

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	846518	100.000	145287	2483	1.228	--
总计		846518	100.000	145287			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	58912	100.000	12276	1544	1.291	--
总计		58912	100.000	12276			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-392-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p3-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-26

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:27:49

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:13

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	839862	100.000	144106	2475	1.228	--
总计		839862	100.000	144106			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59623	100.000	12444	1544	1.287	--
总计		59623	100.000	12444			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-393-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p4-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-35

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:31:12

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:16

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	856212	100.000	146832	2468	1.225	--
总计		856212	100.000	146832			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	59344	100.000	12375	1540	1.287	--
总计		59344	100.000	12375			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-394-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p5-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-44

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:34:34

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:19

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min

波长:237nm/250nm


版本号:6.115

实验者:jiangjinwei


处理者:jiangjinwei

<色谱图>

mV



mV



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.877	848970	100.000	145251	2469	1.227	--
总计		848970	100.000	145251			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	56922	100.000	11837	1541	1.289	--
总计		56922	100.000	11837			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-395-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-p6-jx.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-53

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:37:56

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:22

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	852087	100.000	145936	2468	1.226	--
总计		852087	100.000	145936			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	59711	100.000	12410	1540	1.290	--
总计		59711	100.000	12410			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-396-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-1.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:41:18

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:25

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min


波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.879	855840	100.000	147192	2485	1.222	--
总计		855840	100.000	147192			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.227	64928	100.000	13588	1552	1.278	--
总计		64928	100.000	13588			



SMF-227

<样品信息>

色谱柱 : XB-C18(50*4.6mm,5μm)

柱温 : 40℃

数据文件名: RC\$SMF-227 - 29-8/29-397-3 - zzp-25112601p-pH6.8jz-150mg10mg-rcqx-lf100z-dz2-2.lcd

方法文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-RC-FX278.lcm

批处理文件名: RC\$SMF-227 - SMF-227-20251202-FX278.lcb

样品瓶号 : 3-27

进样体积 : 10μl

进样时间 : 2025/12/03 01:44:40

处理时间 (V3) : 2025/12/03 13:47:28

仪器型号: SHIMADZU LC-2050C(FX278)

流速: 1.0ml/min



波长:237nm/250nm

版本号:6.115

实验者:jiangjinwei

处理者:jiangjinwei

<色谱图>



<峰表>

检测器A Ch1 237nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.878	853166	100.000	146400	2479	1.224	--
总计		853166	100.000	146400			

检测器A Ch2 250nm							
峰号	保留时间	面积	面积%	高度	理论塔板数(USP)	拖尾因子	分离度(USP)
1	1.226	64720	100.000	13470	1548	1.287	--
总计		64720	100.000	13470			